張繼禹 主編

中華道藏

華夏出版社

中華道藏

第二一册

『十五』國家重點圖書出版規劃項目

主　編　張繼禹

本册主編　高文鑄　王炳暘

華夏出版社

目録

001 圖經衍義本草 …… 一
002 葛仙翁肘後備急方 …… 六〇六

001 圖經衍義本草

經名：《圖經衍義本草》。宋·寇宗奭撰。四十二卷。底本出處：《正統道藏》洞神部。參校本：《重修政和經史證類備用本草》張氏（存惠）刻晦明軒本，簡稱明軒本。

目録 ❺

圖經衍義本草上卷一
序例上
補注總叙　圖經序　開寶重訂序　唐本序　梁·陶隱居序
圖經衍義本草上卷二
序例上
重廣補注神農本草并圖經序　雷公炮炙論序
圖經衍義本草上卷三
序例上
衍義總序
序例中
序例下
圖經衍義本草上卷四
序例上
序例下
療風通用　風眩　頭面風　中風脚弱　久風濕痹　賊風攣痛　暴風瘙癢　傷寒大熱　勞復　瘧　中惡　霍亂　轉筋　嘔噦　大腹水腫　腸澼下痢　大便淋　小便利　溺血　消渴　黄疸　上氣咳嗽　嘔吐　痰飲　宿食　腹脹滿　心腹冷痛　腸鳴　心下滿急　心煩　積聚癥瘕　鬼疰尸疰　驚邪　癲癎　喉痹痛　噎病　鯁　齒痛　口瘡　吐唾血　鼻齆　鼻衄血　鼻齆　耳聾　鼻息肉　目赤熱痛　目膚翳　聲喑啞　面皯皰　髮禿落　滅瘢　金瘡　蹉折　陰癢　痛　婦人崩中　經閉　無子　安胎　墮胎　難産　産後病　下乳汁　中蠱　出汗　止汗　驚悸心氣　肺痿　下氣　蝕膿　女人血閉腹痛　女人血氣歷腰　女人腹堅脹　解百藥及金石等毒例　服藥食忌例　凡藥不宜入湯酒者
圖經衍義本草卷之一
玉石部上品
丹砂　雲母　玉屑　玉泉　石鍾乳　礬石　消石　芒消　朴消　玄明粉　馬牙消　生消
圖經衍義本草卷之二
石部上品
滑石　石膽　空青　曾青　禹余糧　太一餘糧　白石英　紫石英　青石、赤石、黄石、白石、黑石脂等　青石脂　赤石脂　白石脂　緑青　石中黄子　無名異　黄石脂　黑石脂　白青　菩薩石　婆娑石　緑礬　柳絮礬　扁青　金錢礬　波斯白礬　古鏡　金漿　鐵銹　銅盆　黄銀　石黄　玄黄石　石欄

杆　石髓　玉膏

圖經衍義本草卷之三

玉石部中品

雄黃　食鹽　石硫黃　雌黃　水銀　石膏　金屑　銀屑　生銀　靈砂　水銀粉

圖經衍義本草卷之四

玉石部中品

磁石　玄石　凝水石　陽起石　孔公孽　殷孽　蜜陀僧　鐵精　生鐵　柔鐵　珊瑚　石蟹　長石　桃花石　馬瑙　太陰玄精　綠鹽　鐵漿　秤錘　鐵華粉　鐵粉　鐵落　石腦　理石　馬銜　礪石　石花　光明鹽　石床　膚青　車轄　天子藉田三推犁下土　社壇四角土　鑄鐘黃土　土蜂窠上細土　春牛角上土　桑根下土　胡燕窠內土　柱下土　蟻穴中出土　故茅屋上塵

圖經衍義本草卷之五

玉石部下品

伏龍肝　石灰　礬石　硇砂　鉛丹　鉛粉　錫　銅青　代赭　石燕　鐺墨　東壁土　赤銅屑　銅鏡鼻　井底砂　戎鹽　大鹽　鹵鹹　漿水　井華水　菊華水　地漿　臘雪　泉水　半天河　熱湯

圖經衍義本草卷之六

玉石部下品

白堊　青琅玕　自然銅　金牙　金星石　礞石　薑石　井泉石　花乳石　不灰木　蓬砂　鉛霜　蛇黃　古文錢　冬灰　銅礦石　銅弩牙　特生礬石　握雪礬石　梁上塵　陰孽　車脂　釭中膏　煆竈灰　淋石灰　方解石　蒼石　石蠶　石腦油　白瓷瓦屑　烏古瓦　玉井水　秋露水　甘露水　梅雨水　醴泉　甘露蜜　水花　生熟湯　屋漏水

圖經衍義本草卷之七

草部上品之上

黃精　菖蒲　菊花　人參　天門冬　甘草　乾地黃　生地黃　術　菟絲子　旋花　蛇牀子　地膚子　千歲藾　景天　茵蔯蒿　杜若　沙參　徐長卿　石龍芻　雲實　王不留行　地不容　飛廉　蘭草　忍冬　薇銜　白兔藿　鬼督郵　白花藤　人肝藤　越王餘算　石蕫　海根

圖經衍義本草卷之八

草部上品之上

牛膝　柴胡　麥門冬　獨活　升麻　車前子　木香　薏苡人　澤瀉　薯蕷　茺蔚子　女萎、萎蕤　防葵

圖經衍義本草卷之九

草部上品之上

遠志　細辛　石斛　巴戟天　赤箭　菴蕳子　萯實子　蒼實　卷柏　龍膽　白蒿　白英　紫芝　赤芝　黑芝　青芝　黃芝　白芝　兜木香　無風獨搖草　羊不吃草　仙人草　千里及　錢葛　甜藤　地楊梅　天竺乾薑

圖經衍義本草卷之十

草部上品之下

黃精　烏蘡　黃連　蒺藜子　黃耆　肉蓯蓉　中膏　煆竈灰　淋石灰　方解石　蒼石　石蠶　石腦油　白瓷瓦屑　烏古瓦　防風　蒲黃　香蒲　續斷　漏蘆　藍實　玉井水　秋露水　甘露水　梅雨水　醴泉　甘露蜜　水花　生熟湯　屋漏水　茯苓　琥珀　松脂　松蕈　雷丸　地耳　木耳　柏實　酸棗　女貞實　冬青　五味子　旋花　蛇牀子　地膚子　千歲藾　景天　茵蔯蒿　杜若　沙參　徐長卿　石龍芻　雲實　王不留行　地不容　飛廉　蘭草　忍冬　薇銜　白兔藿　鬼督郵　白花藤　人肝藤　越王餘算　石蕫　海根

圖經衍義本草卷之十二
草部中品之上
乾薑　生薑　菜耳　葛根　葛粉　栝樓
苦參　當歸　麻黄　通草　芍藥　蠡實
瞿麥　玄參　秦艽　百合
圖經衍義本草卷之十三
草部中品之上
知母　貝母　白芷　淫羊藿　黄芩　狗
脊　石龍芮　茅根　紫菀　紫草　前胡
敗醬　白鮮　酸漿　紫參　藁本　石韋
草蘚　杜蘅　白薇　金釵股　離鬲草
圖經衍義本草卷之十四
草部中品之下
牛蒡子　水萍　王瓜　地榆　大小薊
根　海藻　澤蘭　昆布　防己　天麻
阿魏　高良薑　百部根　檾香子　款
冬花　紅藍花　牡丹　京三棱　薑黄
蓽撥
圖經衍義本草卷之十五
草部中品之下
蒟醬　蘼蕪子　青黛　鬱金　盧會　馬
先蒿　延胡索　肉豆蔻　補骨脂　零
陵香　縮紗蜜　蓬莪茂　積雪草　白
前薺苨　白藥　荭草　莎草根　蓽澄
茄　胡黄連　船底苔　紅豆蔻　茅香
花　馬蘭　使君子　乾苔　百脉根　白
豆蔻　土馬鬃　蜀羊泉　菟葵　蘚草
鱧腸　爵床　井中苔萍　蒔蘿　艾納
香　甘松香　垣衣　陟釐　鳧葵　女苑
王孫　地筍　海帶　陀得花　剪草　迭
迷香　故魚綱　故繳脚布　江中採出
蘆　虱建草　含生草　兔肝草　石芒
蠶鋼草　問荆
圖經衍義本草卷之十六
草部下品之上
附子　烏頭　射罔鳥喙　天雄　側子　半
夏　虎掌　由跋　鳶尾　大黄　葶藶
桔梗　莨菪子　草蒿　旋覆藒花
圖經衍義本草卷之十七
草部下品之上
金鏁草　斷罐草　蕨杷草　百草灰
産死婦人冢上草　孝子衫襟灰　靈
床下鞋履　虹母草　故蓑衣結　故炊
帚　天羅勒　毛蓼　蛇芮草　萬一藤
螺厴草　繼母草　甲煎　金瘡小草
鬼釵草
圖經衍義本草卷之十八
草部下品之下
何首烏　商陸　威靈仙　牽牛子　蓖
麻子　蒴藋　天南星　羊蹄　菰根　萹
蓄　狼毒　豨薟　馬鞭草　荸根　白頭
翁　甘蕉根　蘆根　鬼臼　角蒿　馬兜
鈴　仙茅　羊桃　鼠尾草　女青　故麻
鞋底　劉寄奴草　骨碎補
圖經衍義本草卷之十九
草部下品之下
木賤　薏草　蒲公英　穀精草　牛扁
草　苦芙　酢漿草　昨葉何草　蒴頭
夏枯草　燕蓐草　鴨跖草　山慈菰根
荷實　赤車使者　狼跋子　屋遊　地
牙子　及己　羊躑躅　瓶香　釵子股
錦草　敗船茹　燈心草　五毒草　鼠
麴草　列當　馬勃　屐屧　質汗　水蓼
猫草　敗芒箔　狗舌草　海金沙　萱

草根　格注草　鷄窠中草　鷄冠子
地椒　草三棱根　合明草　鹿藥　敗
天公　毛茛　陰命　毒菌　草禹餘糧
鼠蓑草　廉薑　草石蠶蟲石蠶　漆姑
草　鹿目　梨豆　諸草有毒

圖經衍義本草卷之二十三

木部上品

桂　牡桂　菌桂　松脂松實、松葉、松節、
松根　槐實　槐花　枸杞　柏實　茯苓
茯神　琥珀　榆皮　酸棗　檗木　楮實
槐膠　蟹

圖經衍義本草卷之二十四

木部上品

乾漆　五加皮　牡荆實　蔓荆實　辛
夷　桑上寄生　杜仲　楓香脂　女貞
實　木蘭　蕤核　丁香　沉香　薰陸香
鷄舌香　檀香　乳香　降真香　蘇合
香　藿香　金櫻子　落雁木　詹糖香
皋蘆葉　不凋木　牛奶藤　木蜜

圖經衍義本草卷之二十五

木部中品

桑根白皮　竹葉　吳茱萸　檳榔　栀
子　紫礦騏驎竭　龍腦香及膏香　食
茱萸　蕪荑　枳殼　枳實　厚朴　茗、
苦茶　秦皮

圖經衍義本草卷之二十六

木部中品

秦椒　山茱萸　紫葳　胡桐泪　猪苓
烏藥　没藥　龍眼　菴摩勒　衛矛　海
桐皮　虎杖根　五倍子　蜜蒙花　墨
棘刺花　安息香　松羅　大腹　天竺
黄　白棘　仙人杖　毗梨勒　鬱金香
紫藤　合歡　伏牛花　天竺桂　折傷
木　桑花　椿莢　水楊葉　楊櫨木欖子　柞
子　石荆　木梨蘆

圖經衍義本草卷之二十七

木部下品

巴豆　蜀椒　皂莢　訶梨勒　柳花　楝
實　椿木　樗木　鬱李人　莽草　黄藥
根　槲若　桐葉　無食子　雷丸　胡椒
蘇方木　白楊樹皮　桃椰子　櫸樹皮
釣樟根皮　千金膝　南燭枝葉　無患
子皮　梓白皮

圖經衍義本草卷之二十八

木部下品

橡實　益智子　鼠李　椰子皮　紫荆
木　南藤　杉木　接骨木　木鱉子　釣
藤　棕櫚子　芫花　枳椇　紫真檀　烏
臼木　鹽麩子　楠材　柘木　木槿　石
南　木天蓼　黄環　溲疏　小天蓼　小
蘗　莢蒾　楓柳皮　赤爪木　櫰木皮
橀藤子　榧實　欒荆　扶芳木皮　藥
實根　欒華　蔓椒　感藤　赤櫪木　突
厥白　賣子木　婆羅得　甘露藤　大
空　椿莢　水楊葉　楊櫨木欖子　柞
木皮　黄櫨　柯樹皮　敗扇　罌子桐
子　石荆　木梨蘆

圖經衍義本草卷之二十九

人部

發髮　亂發　人乳汁　頭垢　故臘頭
巾　人牙齒　人屎　人溺　婦人月水
天靈蓋　人髭　人血　人肉　人膽

圖經衍義本草卷之三十

獸部上品

龍骨　麝香　牛黄　熊膽　象牙　白膠
阿膠　酥　羊乳　牛乳　酪　醍醐　馬
乳　乳腐　底野迦　烏氈　海獺　土撥
鼠

圖經衍義本草卷之三十八

獸部中品

鹿茸　白馬莖　牛角鰓　羖羊角　牡狗陰莖　羚羊角　犀角　虎骨　兔頭骨　狸骨　獐骨　豹肉　筆頭灰　犢子臍屎　靈猫陰　震肉

圖經衍義本草卷之二十九

獸部下品

豚卵　狐陰莖　獺肝　鼠鼬　鼠腥　肭臍　鹿　野猪黄　敗鼓皮　麋脂　驢屎　猸肉、胞、膏　豺皮　野駝脂　獼猴　六畜毛蹄甲　諸血　果然肉　諸肉有毒

圖經衍義本草卷之三十

禽部上品

丹雄鷄　白雄鷄、烏雄鷄、黑雌鷄、黄雌鷄、鷄子　白鵝膏　鷲肪　鷓鴣　禽部中品

雀卵　伏翼　雉肉

禽部下品

孔雀屎　白鶴　烏雅　雄鵲肉　鸕鷀　屎　啄木鳥　慈鴉　雁肪　燕屎　天鼠屎　鷹屎白　鴟頭　灑鵝　斑鶴　練鵲　鴝鵒肉　鸛骨　白鴿　百勞　鶉　鶻嘲　鵜鶘嘴　鴛鴦　陽烏　鸛　魚　狗　百舌　烏　布穀脚、腦、骨　杜鵑

圖經衍義本草卷之三十一

蟲魚部上品

石蜜　蜂子　蜜臘　牡蠣　龜甲　秦龜　真珠　玳瑁　桑螵蛸　石決明　海蛤　文蛤　蠯魚　鯊魚　鱔魚　鯽魚　鯉魚　膽　蜆蛤　鮑魚　時魚　黄魚　魴魚　鱘魚　海豚魚　膻魚肝　水龜　蛇

圖經衍義本草卷之三十二

蟲魚部中品

蜬皮　露蜂房　鱉甲　蚱蟬　蟬花　螬蟟　烏賊魚骨　鰻鱺魚　鮀魚甲　白殭蠶　原蠶蛾　蠶退　蛞蝓　蝸牛　石龍子　槔鷄　木蝨　廯蟲　鮫魚皮　青魚　紫貝　緣桑螵蛸　蜚蝨　蜚蠊　白魚　鱖魚　海馬　齊蛤　蚱蜢

圖經衍義本草卷之三十三

蟲魚部下品

蝦蟆　牡鼠　馬刀　蚌　蚺蛇膽　蛇蜕　白頸蚯蚓　蜘蛛　蠐螬　葛上亭長　蛤蚧　蜈蚣　水蛭　斑猫　蛤蜊　蜆　蜬蜷　車螯　蚶　蠮螉　淡菜　蝦　蝮蛇

榲桲　榛子　獼猴桃　柰　菴羅果　無漏子　懸鈎根皮　鈎栗　諸果有毒

圖經衍義本草卷之三十七

米谷部上品

胡麻　青蘘　麻賁　白油麻　飴糖

圖經衍義本草卷之三十八

米谷部中品

生大豆　赤小豆　大豆黄卷　酒　粟米　秫米　粳米　青粱米　黍米　丹黍米　白粱米　黄粱米　蘗米　小麥　大麥　麯　蕎麥　藊豆　豉　緑豆　舂杵頭細糠　穬麥　白豆

圖經衍義本草卷之三十九

米谷部下品

醋　稻米　稷米　腐婢　醬　陳廩米　罌子粟　師草實　寒食飯　狼尾草　胡豆子　麥苗　社酒

圖經衍義本草卷之四十

菜部上品

冬葵子　蕪菁及蘆菔　瓜蒂　白冬瓜　白瓜子　莧實　胡荽　菘　苦菜　黄蜀葵花　蜀葵　甜瓜　薺　邪蒿　同蒿　羅勒　石胡荽　芥　萊菔根　荏子　胡瓜葉　越瓜　白芥、龍葵　苦耽　苦苣　苜蓿　蕨葉

圖經衍義本草卷之四十一

菜部中品

蓼實　葱實　韭　薤　蘇　水蘇　香需　假蘇　白襄荷　薄荷　恭菜　秦荻梨　醍醐菜

圖經衍義本草卷之四十二

菜部下品

苦瓠　馬齒範　葫　蒜　茄子　馬芹子　蕓苔　菠薐　胡葱　蒓　水蘄　蘩萎　鷄腸草　白苣　落葵　堇葉　蕺　雍菜　苦蕒　鹿角菜　莙薘　東風菜

圖經衍義本草上卷一

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

序例上

補注總敘

舊説《本草經》神農所作，而不經見，《漢書·藝文志》亦無録焉。《平帝紀》云：元始五年，舉天下通知方術、本草者，在所爲駕一封，軺傳遣詣京師。《樓護傳》稱：護，少誦醫經、本草、方術數十萬言。本草之名，蓋見於此。而英公李世勣等注引班固叙《黄帝内外經》云：本草石之寒温，原疾病之深淺。此乃論經方之語，而無本草之名。惟梁《七録》載《神農本草》三卷，推以爲始，斯爲失矣。或疑其間所載生出郡縣，有後漢地名者，以爲似張仲景、華佗輩所爲，是又不然也。《淮南子》云：神農嘗百草之滋味，一日而

七十毒，由是醫方興焉。蓋上世未著文字，師學相傳，謂之本草。兩漢以來，名醫益衆，張機、華佗輩，始因古學，附以新説，通爲編述，本草繇是見於經録。然舊經纔三卷，藥止三百六十五種，至梁·陶隱居，又進《名醫别録》，亦三百六十五種，因而注釋，分爲七卷。唐顯慶中，監門衛長史蘇恭，又摭其差謬，表請刊定，乃命司空英國公李世勣等，與恭參考得失，又增一百一十四種，分門部類，廣爲二十卷，世謂之《唐本草》。國朝開寶中，兩詔醫工劉翰、道士馬志等，相與撰集，又取醫家嘗用有效者一百三十三種，而附益之；仍命翰林學士盧多遜、李昉、王祐、扈蒙等，重爲刊定，乃有《詳定》、《重定》之目，并鏤板摹行。由是，醫者用藥，遂知適從。而僞蜀孟昶，亦嘗命其學士韓保昇等，以《唐本圖經》參比爲書，稍或增廣，世謂之《蜀本草》今亦傳行。是書自漢迄今，甫千歲，其間三經譔著，所增藥六百餘種，收採彌廣，可謂大備。而知醫者，猶以爲傳行既久，後來講求，浸多參校；近之所用，頗亦漏略，宜有纂録，以備頤生驅❶疾之用。嘉祐二年八月，有詔臣禹錫、臣億、臣頌、臣洞等，再加校正。臣等亦既被命，遂更研覈。竊謂前世醫工，原診用藥，隨效輒記，遂至增多。概見諸書，浩博難究；雖屢加删定，而去取非一。或《本經》已載，而所述粗略；或字；餘所增者，皆别立條，并以墨字。凡陶隱居所進者，謂之《名醫别録》，并俚俗嘗用，而太醫未聞。嚮非因事詳著，則遺散多矣。乃請因其疏捂，更爲補注。應諸家醫書、藥譜所載物品功用，并從採掇；誕，則所不取。自餘經史百家，雖非方餌之急，其間或有參説，藥驗較然可據者，亦兼收載，務從該洽，以副詔意。凡名本草者非一家，今以《開寶重定》本爲正；其分布卷類、經注雜糅、間以朱墨，并從舊例，不復厘改。凡補注并據諸書所説，其意義與舊文相參者，則從删削，以避重複；其舊已著見，而意有未完，後書復言，亦具存之，欲詳而易曉；仍每條并以朱書其端，云臣等謹按某書云某事；其别立條者，則解於其末，云見某書。凡所引書，以唐、蜀二本草爲先，他書則以所著先後爲次第。凡書舊名本草者，今所引用，但著其所作人名曰某人，惟唐、蜀本則曰唐本云、蜀本云。凡字朱、墨之别，所謂《神農本經》者以朱字，名醫因《神農》舊條而有增補者，以墨字間於朱字；凡陶隱居所增者，舊經未有者，於逐條後開列云新補。凡藥舊分上中下三品，今之新補，難於詳辨，但以類附見，如緑礬次於礬石，山薑花次於豆蔻，扶移次於水楊之類是也。凡藥有功用，《本經》未見，而舊注已曾引據，今之所增，但涉相類，更不立條，并附本注之末曰續注，如地衣附於垣衣，燕覆附於通草，馬藻附於海藻之類是也。凡舊注出於陶氏者曰陶隱居云；出於顯慶者，曰唐本注；出於開寶者，曰今注；其開寶考據傳記者，别

曰今按、今詳、又按，皆以朱字別於其端。凡藥名《本經》已見而功用未備，今有所益者，亦附於本注之末。凡藥有今世已嘗用，而諸書未見，無所辨證者，如葫蘆巴、海帶之類，則請從太醫衆論參議，別立爲條，曰新定。舊藥九百八十三種；新補八十二種，附於注者不預焉；新定一十七種。總新、舊一千八十二條，皆隨類粗釋。推以十五凡，則補注之意可見矣。舊著《開寶》、英公、陶氏三序，皆有義例，所不可去，仍載於首篇云。

新舊藥合一千八十二種

三百六十種《神農本經》

一百八十二種《名醫別録》

一百一十四種唐本先附

一百三十三種今附

一百九十四種有名未用

八十二種新補

一十七種新定

圖經序

昔神農嘗百草之滋味，以救萬民之疾苦，後世師祖，由是本草之學興焉。漢魏以來，名醫相繼，傳其書者，則有吴普、李當之《藥録》，陶隱居、蘇恭等注解。國初兩詔近臣，總領上醫，兼集諸家之説，則有《開寶重定本草》，用永徽故事，重命編述。臣禹錫以理臣頌、殿中丞臣檢、光禄寺丞臣保衡，相次被選，仍領醫官秦宗古、朱有章等，編繹累年，既而補注本草成書，奏御，又詔天下郡縣，圖上所産藥本，謂：考正群書，資衆見，則其功易就；論著文事❸，出異手，則其體不一。今天下所上，繪事千名，其解説物類，皆據世醫之所聞見，事有詳略，言多鄙俚，嚮非專一整此❹。緣飾以文，則前後不倫，披尋難曉。乃以臣頌嚮嘗刻意此書，於是建言奏請，俾專撰述。臣頌既被旨，則裒集衆説，類聚詮次，粗有條目。其間玉石、金土之名，草木、蟲魚之别，有一物而雜出諸郡者，有同名而形類全别者，則參用古今之説，互相發明；其莖梗之細大，華實之榮落，雖與舊説相戾，并兼存之；崖略不備，則稍援舊注，以足成文意；注又不足，尋。宜乎聖君哲輔，留意於搜輯也。先是詔命儒臣，重校《神農本草》等凡八書，光禄卿直秘閣臣禹錫、尚書祠部郎中秘閣校理臣億、太常博士集賢校

乃更旁引經史，及方書、小說，以條悉其本原。若陸英爲蒴藿花，則據《爾雅》之訓以言之；諸香本同❺，則用《嶺表録異》以證之之類是也。生出郡縣，則以《本經》爲先，今時所宜次之。若菟絲生於朝鮮，今則出於菟句；奚獨❻生於少室，今乃來自三蜀之類是也。收採時月有不同者，亦兩存其説，若赤箭，《本經》但著採根，今乃并取莖苗之類是也。生於外夷者，則據今傳聞，或用書傳所載，若玉屑、玉泉，今人但云玉出於于闐，不究所得之因，乃用平居近，而人未的識，或出於遠方，莫能形似者，但於前條附之，若搜疏附於枸杞，琥珀附於茯苓之類是也。藥有上中下品，皆用《本經》爲次第。其性類相書所載，簡而要者，昔人已述其明驗，今世亦常用之，及今諸郡醫工所陳經效之藥，皆并載其方，用天寶之例也。自餘書傳所無，今醫又不能解，則不敢以臆説淺見，傅會其文，故但闕而不録。又有今醫所用，而舊經不載者，并以類次，系於末卷，曰本經外類；其間功用尤著，與舊名附近者，則次於逐條載之，若通脱次於木通，石蛇次於石蟹之類是也。總二十卷，目録一卷。撰次甫就，將備親覽。恭惟主上，以至仁厚德，函養生類，一物失所，則爲之惻然。且謂札瘥薦臻，四時代有，救恤之患，無先醫術。蚤歲屢敕近臣，讎校岐黄《内經》，重定針艾俞穴，或範金揭功用，爲之注釋，列爲七卷，南國行焉。石，或鏤板聯編，憫南方蠱惑之妖，於隸乎有唐，别加參校，增藥餘八百味，是作《慶曆善救方》以賜之；思下民資添注爲二十一卷。《本經》漏功則補用之闕，於是作《簡要濟衆方》以示之。之，陶氏誤説則證之。然而載歷年祀，今復廣藥譜之未備，圖地産之所宜；又逾四百，朱字、墨字，無本得同；舊注、新注，其文互闕；非聖主撫大同之物色萬殊，指掌斯見；將使合和者，得十全之效；飲餌者，無疆之休，其何以改而正之哉！斯民於壽康，召和氣於穹壤，太平之致，兹有助焉。臣學不該通，職預編述，仰奉宸旨，深愧寡聞。嘉祐六年九月日，朝奉郎太常博士充集賢校理新差知潁州軍州兼管内勸農及管句開治溝洫河道事騎都尉借紫臣蘇頌謹上。

開寶重定序

三墳之書，神農預其一。百藥既辨，本草存其録。舊經三卷，世所流傳。《名醫别録》，互爲編纂。至梁·貞白先生陶弘景，乃以《别録》參其《本經》，朱墨雜書，時謂明白；而又考彼

薑、乾薑，同歸一説。至於鷄腸、蘩蔞、陸英、蒴藿，以類相似，從而附之。仍採陳藏器《拾遺》、李含光《音義》，或討源於别本，或傳效於醫家，參而較之，辨其臧否。至如突屈白，舊説灰類，今是本❽根；天麻根解似赤箭，今又全異。去非取是，特立新條。自餘刊正，不可悉數，下採衆議，定爲印板。乃以白字爲神農所説；墨字爲名醫所傳；唐附、今附，各加顯注；詳其解釋，審其形性，證謬誤而辨之者，署爲今注；考文記而述之者，又爲今按。義既刊定，理亦詳明。今以新舊藥合九百八十三種，并目録二十一卷，廣頒天下，傳而行焉。

唐本序

禮部郎中孔志約撰

蓋聞天地之大德曰生，運陰陽以播物；含靈之所保曰命，資亭育以盡年。蟄穴栖巢，感物之情蓋寡；范金揉木，逐欲之道方滋。而五味或爽，時昧甘辛之節；六氣斯沴，易愆寒燠之宜。中外交侵，形神分戰。飲食伺釁，成腸胃之眚；風濕候隙，遘手足之灾。仍幾纏膚腠，莫知救止；漸固膏肓，期於夭折。暨炎暉紀物，識藥石之功；雲瑞名官，窮診候之術。草木咸得其性，承疑行妄，曾無有覺；疾瘵多殆，良深慨嘆。既而朝議郎行右監門府長史騎都尉臣蘇恭，撫陶氏之乖違，辨俗用之紕紊，遂表請修定，深副聖懷。乃詔太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣無忌、太中大夫行尚藥奉御臣許孝崇等二十二人，與蘇恭詳撰。竊以動植形生，因方舛性；春秋節變，感氣殊功。離其本土，則質同而效異；乖於採摘，乃物是而時非。名實既爽，寒温多謬。用之凡庶，其欺已甚；施之君父，逆莫大焉。於是上稟神規，下詢衆議；普頒天下，營求藥物。羽毛鱗介，無遠不臻；根莖花實，有名咸萃。遂乃詳探秘要，博綜方術。《本經》雖闕，有驗必書；《别録》雖存，無稽必正。考其同異，擇其去取。鉛翰昭章，定群言之得失；丹青綺煥，備庶物之形容。撰《本草》并《圖經》、《目録》等，凡成五

十四卷。臣禹錫等謹按《蜀本草·序》作五十三卷，及唐英公《進本草表》云：勒成《本草》二十卷，《目録》二卷，《藥圖》七卷，凡五十三卷。又英公序云：撰《本草》并《圖經》、《目録》等，凡成五十三卷，據此，三者合作五十三卷。又據李含光《本草音義》云：正經三❾十卷，《目録》一卷，又別立圖二十五卷，《目録》一卷，《圖經》七卷，凡五十四卷。二説不同，今并注之。庶以網羅今古，開滌耳目，盡醫方之妙極，拯生靈之性命。傳萬祀而無昧，懸百王而不朽。

梁·陶隱居序

隱居先生，在乎茅山岩嶺之上，以吐納餘暇，頗遊意方技，覽本草藥性，以爲盡聖人之心，故撰而論之。舊説皆稱《神農本經》，合農氏之王天下也，晝八卦，以通鬼神之情；造耕種，以省殺生之弊；宣藥療疾，以拯夭傷之命。此三道者，歷衆聖而滋彰。文王、孔子，象象係辭，幽贊人天。后稷伊尹，播厥百穀，惠被群生。岐黄彭扁，振楊輔導，恩流含氣。并歲逾三千，民到於今賴之。但軒轅以前，文字未傳，如六爻指垂，畫象稼穡，即事成迹。至於藥性所主，當以識識相因，不爾，何由得聞。至於桐雷，乃著在於編簡，此書應與《素問》同類，但後人多更修飾之爾。秦皇所焚，醫方卜術不預，故猶得全録。而遭漢獻遷徙，晉懷奔迸，文籍焚靡，臣禹錫等謹按蜀本作廢，音糜。千不遺一。今之所存，有此四卷，臣禹錫等謹按《唐本》亦作四卷。韓保昇又云：《神農本草》上中下并序録，合四卷。今按：四字當作三，傳寫之誤也。何則？按梁《七録》云：《神農本草》三卷。又據今《本經》陶序後朱書云：《本草經》卷上、卷中、卷下。卷上注云：序藥性之源本，論病名之形軫❿；卷中云：玉石、草、木三品；卷下云：蟲獸、果菜、米食三品。即不云三卷外別有序録，明如韓保昇所云：承⓫據誤本，妄生曲説，今當從三卷爲正。是其《本經》。所出郡縣，乃後漢時制，疑仲景、元化等所記。又有《桐君採藥録》，説其花葉形色。《藥對》四卷，論其佐使相須，魏晉已來，吴普臣禹錫等謹按《蜀本》注云：普，廣陵人也，華佗弟子。撰《本草》一卷李當之臣禹錫等謹按《蜀本》注云：普，廣陵人也，華佗弟子。修神農舊經，而世少行用等，更復損益⓬。或五百九十五，或四百四十一，或三百一十九；或三品混糅，冷熱舛錯，草石不分，蟲獸無辨；識相因，不爾，何由得聞。至於桐雷，乃著在於編簡，此書應與《素問》同類，但後人多更修飾之爾。秦皇所焚，醫方卜術不預，故猶得全録。而遭漢獻遷徙，晉懷奔迸，文籍焚靡，臣禹錫等謹按蜀本作廢，音糜。千不遺一。今之所存，有此四卷，臣禹錫等謹按《唐本》亦作四卷。韓保昇又云：《神農本草》上中下并序録，合四卷。今按：四字當作三，傳寫之誤也。何則？按梁《七録》云：《神農本草》三卷。又據今《本經》陶序後朱書云：《本草經》卷上、卷中、卷下。卷上注云：序藥性之源本，論病名之形軫⓭；卷中云：玉石、草、木三品；卷下云：蟲獸、果菜、米食三品。即不云三卷外別有序録，明如韓保昇所云：承⓮據誤本，妄生曲説，今當從三卷爲正。是其《本經》。所出郡縣，乃後漢時制，疑仲景、元化等所記。又有《桐君採藥録》，説其花葉形色。《藥對》四卷，論其佐使相須，魏晉已來，吴普臣禹錫等謹按《蜀本》注云：普，廣陵人也，華佗弟子。撰《本草》一卷李當之臣禹錫等謹按《蜀本》注云：普，廣陵人也，華佗弟子。修神農舊經，而世少行用等，更復損益⓯。或五百九十五，或四百四十一，或三百一十九；或三品混糅，冷熱舛錯，草石不分，蟲獸無辨；識相因，不爾，何由得聞。至於桐雷，乃著在於編簡，此書應與《素問》同類，但後人多更修飾之爾。秦皇所焚，醫方卜術不預，故猶得全録。而遭漢獻遷徙，晉懷奔迸，文籍焚靡，臣禹錫等謹按蜀本作廢，音糜。千不遺一。今之所存，有此四卷，臣禹錫等謹按《唐本》亦作四卷。韓保昇又云：《神農本草》上中下并序録，合四卷。今按：四字當作三，傳寫之誤也。何則？按梁《七録》云：《神農本草》三卷。又據今《本經》陶序後朱書云：《本草經》卷上、卷中、卷下。卷上注云：序藥性之源本，論病名之形軫，題記品録，詳覽施用。

《本草經》卷上序藥性之源本，論病名之形軫，題記品録，詳覽施用。

《本草經》卷中玉石、草、木三品。

《本草經》卷下蟲獸、果菜、米食三品，有名未用三品。

右三卷，其中、下二卷，藥合七百三十種，各別有目録，并朱、墨雜書并子注，今大書分爲七卷。唐本注《漢書·藝文志》有黄帝内外經。班固論云：經方者，本草石之寒温，原疾病之深淺。乃班固論經方之語，而無本草之名。惟梁《七録》有《神農本草》三卷，陶據此以《别録》加之，爲七卷。序云：三品混糅，冷熱舛錯，

草石不分，蟲獸無辨。豈使草木同品，蟲獸共條，披覽既難，圖繪非易。今以序爲一卷，例爲二卷，玉石三品爲三卷，草三品爲六卷，木三品爲三卷，禽獸爲一卷，蟲魚爲一卷，果爲一卷，菜爲一卷，有名未用爲一卷，合二十卷。其十八卷中，藥合八百五十種，三百六十一種《本經》，一百八十一種《別録》，一百一十五種新附，一百九十二種有名未用。

上藥一百二十種爲君，主養命以應天，無毒，多服久服不傷人。欲輕身益氣，不老延年者，本上經。

中藥一百二十種爲臣，主養性以應人，無毒、有毒，斟酌其宜。欲遏⑭病補虚羸者，本中經。

下藥一百二十五種爲佐使，主治病以應地，多毒，不可久服。欲除寒熱邪氣、破積聚、愈疾者，本下經。

三品合三百六十五種，法三百六十五度，一度應一日以成一歲，倍其數，合七百三十名也。臣禹錫等謹按本草例：《神農本經》以朱書，《名醫別録》以墨書。《神農本經》藥三百六十五種，今此言倍其數，合七百三十名，是併《名醫別録》副品而言也。則此一節，《別録》之文也，當作墨書矣。蓋傳寫浸久，朱墨錯亂之所致耳。遂令後世覽之者，捃摭此類，以謂非神農之書，乃後人附託之文者，率以此故也。

右本説如此。今按上品藥性，亦皆能遣疾，但其勢力和厚，不爲倉率之效，然而歲月常服，必獲大益，病既愈矣，命亦兼申。一百二十種者，當謂寅、卯、辰、巳之月，法萬物生榮時也。中品藥性，療病之辭漸深，輕身之説稍薄，於服之者祛患當速，而延齡爲緩。人懷情性，故云應人。一百二十種者，當謂午、未、申、酉之月，法萬物成熟時也。下品藥性，專主攻擊，毒烈之氣，傾損中和，不可常服，疾愈即止。地體收殺，故云應地。一百二十五種者，當謂戌、亥、子、丑之月，法萬物枯藏時也，兼以閏之，盈數加之。

凡合和之體，不必偏用之，自隨人患參而共行。但君臣配隸，依後所説，若單服之者，所不論爾。

藥有君、臣、佐、使，以相宣攝。合和宜用一君、二臣、三佐、五使；又可一君、三臣、九佐使也。

右本説如此。今按用藥，猶如立人之制，若多君少臣，多臣少佐，則氣力不周也。而檢仙經、世俗諸方亦不必皆爾。大抵養命之藥則多君，養性之藥則多臣，療病之藥則多佐；猶依本性所主，而兼復斟酌，詳用此者益當爲善。又恐上品君中，復各有貴賤，譬如列國諸侯，雖并得稱制，而猶歸宗周；臣佐之中，亦當如此。所以門冬、遠志，別有君臣；甘草國老，大黄將軍，明其優劣，皆不同秩。自非農岐之徒孰詮？正應領略輕重，爲其分劑也。

藥有陰陽配合，臣禹錫等謹按《蜀本》注云：凡天地萬物，皆有陰陽、大小，各有色類，尋究其理，并有法象。故毛羽之類，皆生於陽而屬於陰；鱗介之類，皆生於陰而屬於陽。所以空青法木，故色青而主肝；丹砂法火，故色赤而主心；雲母法金，故色白而主肺；雌黄法土，故色黄而主脾；磁石法水，故色黑而主腎。餘皆以此推之，例可知也。子母兄弟，臣禹錫等謹按蜀本注云：若榆皮爲母，厚朴爲子之類是也。根莖花實，草石骨肉。有單行者，有相須者，有相使者，有相畏者，有相惡者，有相反者，有相殺者。凡此七情，合和時視之，當用相須、相使者良，勿用相惡、相反者。

若有毒宜制，可用相畏、相殺者；不爾，勿合用也。臣禹錫等謹按蜀本注云：凡三百六十五種，有單行者七十一種，相須者十二種，相使者九十種，相畏者七十八種，相惡者六十種，相反者十八種，相殺者三⑰十六種。凡此七情，合和視之。

右本説如此。今按其主療雖同，而性理不和，更以成患。今檢舊方用藥，亦有相惡、相反者，服之乃不爲害。或能有制持之者，猶如寇、賈輔漢，程、周佐吳，人⑯體既正，不得以私情爲害。雖爾，恐不如不用。今仙方甘草丸，有防己、細辛，俗方玉石散，用栝蔞、乾薑，略舉大體如此。其餘復有數十條，別注在後。半夏有毒，用之必須生薑，此是取其所畏，以相制爾。其相須、相使者，不必同類，猶如和羹、調食魚肉，葱、豉各有所宜，其相宣發也。

藥有酸、鹹、甘、苦、辛五味，又有寒、熱、温、凉四氣，及有毒、無毒。陰乾、暴乾，採進⑰時月，生熟，土地所出，真僞陳新，并各有法。

右本説如此。又有分劑秤兩，輕重多少，皆須甄別。若用得其宜，與病相會，入口必愈，身安壽延；若冷熱乖衷，真假非類，分兩違舛，湯丸失度，當差反劇，以至殞命。醫者意也，古之所謂良醫者，蓋善以意量得其節也。諺云：俗無良醫，枉死者半；拙醫療病，不如不療。喻如宰夫，以鱔鱉爲葅羹，食之更足成病，豈充饑之可望乎？故仲景云：如此死者，愚醫殺之也。

藥性有宜丸者，宜散者，宜水煮者，宜酒漬者，宜膏煎者，亦有一物兼宜者，亦有不可入湯酒者，并隨藥性，不可違越。

右本説如此。又按病有宜服丸者，服散者，服湯者，服酒者，服膏煎者，亦兼參用，察病之源，以爲其制也。

欲療病，先察其源，先候病機，五藏未虚，六腑未竭，血脉未亂，精神未散，服藥必活。若病已成，可得半愈。

右本説如此。按今自非明醫，聽聲察色，至乎診脉，孰能知未病之病乎？且未病之人，亦無肯自療。故桓侯怠於皮膚之微，以致骨髓之痼。今非但識悟之爲難，亦乃信受之弗易。倉公有言曰：病不肯服藥，一死也；信巫不信醫，二死也；輕身薄命，不能將謹⑱，三死也。夫病之所由來雖多端，而皆關於邪。邪者，不正之因，謂非人身之常理，風、寒、暑、濕、饑、飽、勞、逸，皆各是邪，非獨鬼氣疫癘者矣。人生氣中，如魚在水，水濁則魚瘦，氣昏則人病。邪氣之傷人，最爲深重，經絡既受此氣，傳入藏腑，藏腑隨其虚實冷熱，結以成病，病又相生，故流變遂廣。精神者，本宅身以爲用。身既受邪，精神亦亂。神既亂矣，則鬼靈斯入，鬼力漸强，神守稍弱，豈得不致於死乎？古人譬之植楊，斯理當矣。但病亦別有先從鬼神來者，則宜以祈禱祛之，雖曰可祛，猶因藥療致益⑯，昔李子豫有赤丸之例是也。其藥療無益者，是則不可祛，晉景公膏肓之例是也。大都鬼神之害則多端，疾病之源惟一種，蓋有輕重者爾。《真誥》中有言曰：常不能謹事上者，自致百疴之本，而怨咎於神靈乎？當風卧濕，反責

他人於失覆，皆痴人也。夫謹⑳事上者，謂舉動之事，必皆謹思；若飲食恣情，陰陽不節，最爲百疴之本。致使虛損内起，風濕外侵，所以共成其害，如此者，豈得關於神明乎？惟當勤於藥術療理爾。

若用毒藥療病，先起如黍粟，病去即止，不去倍之，不去十之，取去爲度。

右本説如此。按今藥中單行一兩種有毒物，只如巴豆、甘遂之輩，不可便令至劑爾。如經所言：一物一毒，服一丸如細麻；二物一毒，服二丸如大麻；三物一毒，服三丸如胡豆；四物一毒，服四丸如小豆；五物一毒，服五丸如大豆；六物一毒，服六丸如梧子。從此至十，皆如梧子，以數爲丸。而毒中又有輕重，且如狼毒、鉤吻，豈同附子、芫花輩邪？凡此之類，皆須量宜也。臣禹錫等謹按唐本舊云：三物一毒，服三丸如小豆；四物一毒，服四丸如大豆；五物一毒，服五丸如兔屎。注云：謹按兔屎大如梧子，等差不類，今以胡豆替小豆，小豆替大豆，大豆替兔屎，以爲折衷。

療寒以熱藥，療熱以寒藥，飲食不消以吐下藥，鬼疰蟲毒以毒藥，癰腫瘡瘤以瘡藥，風濕以風濕藥。各隨其所宜。

右本説如此。又按藥性，一物兼主十餘病者，取其偏長爲本，復應觀人之虛實、補瀉，男女老少，苦樂榮悴，鄉壤風俗，并各不同。褚澄療寡婦、尼僧，異乎妻妾，此是達其性懷之所致也。

病在胸膈以上者，先食後服藥；病在心腹以下者，先服藥而後食；病在四肢、血脉者，宜空腹而在旦；病在骨髓者，宜飽滿而在夜。

右本説如此。按其非但藥性之多方，其節適早晚，復須調理。今方家所云先食、後食，蓋此義也。又有須酒服者、飲服者、冷服者、暖服者。服湯則有疏、有數，煮湯則有生、有熟，各有法用，并宜審詳爾。

夫大病之主，有中風、傷寒，寒熱、温瘧，中惡、霍亂，大腹、水腫，腸澼、下痢，大小便不通，賁豚上氣，咳逆嘔吐，黄疸、消渴，留飲、癖食，堅積、癥瘕，驚邪、癲癎、鬼疰，喉痹、齒痛，耳聾、目盲，金瘡、蹉折，癰腫、惡瘡，痔瘻、瘻瘤；男子五勞七傷，虛乏羸瘦；女子帶下、崩中，血閉、陰蝕；蟲蛇蠱毒所傷。此大略宗兆，其間變動枝葉，各宜依端緒以取之。

右本説如此。按今藥之所主，止説病之一名，假令中風，乃有數十種，傷寒證候，亦有二十餘條，更復就中求其類例，大體歸其始終，以本性爲根宗，然後配合諸證，以合藥爾。病之變狀，不可一概言之。所以醫方千卷，猶未盡其理。春秋已前，及和、緩之書蔑聞，而道經略載扁鵲數法，其用藥猶是本草家意。至漢·淳于意及華佗等方，今時有存者，亦皆條理藥性。惟張仲景一部，最爲衆方之祖，又悉依本草。但其善診脉，明氣候，以意消息之爾。至於刳腸、剖臆，刮骨、續筋之法，乃别術所得，非神農家事。自晋代已來，有張苗、宫泰、劉德、史脱、靳邵、趙泉、李

子豫等，一代良醫。其貴勝阮德如、張茂先、裴㉑逸民、皇甫士安，及江左葛洪、蔡謨、商仲堪諸名人等，并研精藥術。宋有羊欣、元徽、胡洽、秦承祖，齊有尚書褚澄、徐文伯、嗣伯群從兄弟，療病亦十愈其八九。凡此諸人，各有所撰用方，觀其指趣，莫非本草者乎？或時用別藥，亦循其性度，非相逾越。《范汪方》百餘卷，及葛洪《肘後》，其中有細碎單行經用者，或田舍試驗之法，或殊域異識之術。如藕皮散血，起自瘡所秘。此蓋天地間物，莫不爲天地庖人；牽牛逐水，近出野老。餅店蒜齏，乃是下蛇之藥；路邊地菘，而爲金間用，觸遇則會，非其主對矣。顏光禄亦云：詮三品藥性，以本草爲主。道經、仙方、服食、斷穀、延年、却老，乃至飛丹煉石之奇，雲騰羽化之妙，莫不以藥道爲先。用藥之理，一同本草，但制御之途，小異世法。猶如梁肉，主於濟命，華夷禽獸，皆共仰資。其爲主理即同，其爲性靈則異爾。大略所用不多，遠至二十餘物，或單行數種，便致大益，是其服食歲月深積。即本草所云久服之效，不如俗人微覺便止，故能臻其所極，以致遐齡，豈但充體愈疾而已哉。今庸醫處療，皆取㉕看本草，或倚約舊方，或聞人傳説，或遇其所憶，便攬筆疏之，俄然戴面㉕，以此表奇。其畏惡相反，故自寡昧，而藥類違僻，分兩參差，亦不以爲疑脱。或偶爾值差，則自信方驗；若旬月未瘳，則言病源深結。了不反求諸己，詳思得失，虚事。余祖世已來，務御諱㉖方藥，本有《范汪方》一部，斟酌詳用，多獲其效，内護家門，傍及親族。其有虚心告請者，不限貴賤，皆摩踵所救活數百千人㉕。自余投纓宅嶺，猶不忘此，日夜玩味，常覺欣欣。今亦撰方三卷，并《效驗方》五卷，又補葛氏《肘後方》三卷。蓋欲承嗣善業，令諸子侄，不敢失墜，可以輔身濟物者也。

圖經衍義本草上卷一

❶驅：原作『歐』，據晦明軒本改。

❷床：原作『木』，據晦明軒本改。
❸事：晦明軒本作『字』。
❹此：晦明軒本作『比』。
❺本同：晦明軒本作『同本』。
❻獨：晦明軒本作『毒』。
❼明：原脱，據文義補。
❽本：晦明軒本作『木』。
❾三：晦明軒本作『二』。
❿軫：晦明軒本作『診』。
⓫承：原作『又』，據晦明軒本改。
⓬損：原脱，據晦明軒本補。
⓭詔：晦明軒本作『銘』。
⓮過：原作『過』，據晦明軒本改。
⓯三：原作『二』，據晦明軒本改。
⓰人：晦明軒本作『大』。
⓱進：晦明軒本作『造』。
⓲謹：晦明軒本作『慎』。
⓳益：晦明軒本作『愈』。
㉓謹：晦明軒本作『慎』。下『謹』字仿此。
㉑裴：原作『輩』，據晦明軒本改。
㉒取：晦明軒本作『耻』。
㉓面：原作『西』，據晦明軒本改。
㉔駕：晦明軒本作『構』。
㉕謹：晦明軒本作『慎』。
㉖御諱：晦明軒本作『敦』。
㉗皆摩踵救活數百千人：晦明軒本作『皆摩踵救之，凡所救活，數百千人』。

圖經衍義本草上卷二

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

序例上

今按諸藥採造之法，既并用見成，非能自採，不復具論其事，惟合藥須解節度，列之如左。

按諸藥所生，皆的有境界。秦漢已前，當言列國。今郡縣之名，後人所改爾。江東已來，小小雜藥，多出近道，氣力性理，不及本邦。假令荆、益不通，則全用歷陽當歸，錢塘三建，豈得相似？所以療病不及往人，亦當緣此故也。蜀藥及北藥，雖有去來，亦非復精者。且市人不解藥性，惟問❶形飾。上黨人參，世不復言❷。華陰細辛，棄之如芥。且各隨俗相競，不能多備，諸族故往往遺漏。今之所存，二百許種爾。衆醫都不識藥，惟聽市人；市人又不辨究，皆委採送之家。採送之家，傳習造作，真僞好惡，并皆莫測。所以鍾乳醋煮令白，細辛水漬使直，黄耆蜜❸蒸爲甜，當歸酒灑取潤，蠐螬膠著桑枝，蜈蚣朱足令赤。諸有此等，皆非事實，俗用既久，轉以成法，非復可改，末如之何？又依方分藥，不量剥除。只如遠志、牡丹，纔不收半；地黄、門冬，三分耗一。凡去皮除心之屬，分兩皆不復相應，病家惟依此用，不知更秤取足。又王公貴勝，合藥之日，悉付群下。其中好藥貴石，無不竊換。乃有紫石英、丹砂吞出洗取，一片動經十數過賣。諸有此例，巧僞百端，雖復監檢，終不能覺。以此療病，固難即效，如斯并是藥家之盈虚，不得咎醫人之淺拙也。

凡採藥時月，皆是建寅歲首，則從漢太初後所記也。其根物多以二月、八月採者，謂春初津潤始萌，未衝枝葉，勢力淳濃故也。至秋枝葉乾枯，津潤歸流於下。今即事驗之，春寧宜早，秋寧宜晚，華、實、莖、葉，乃各隨其成熟爾。歲月亦有早晏，不必都依本文

也。

經説陰乾者，謂就六甲陰中乾之。又依遁甲法，甲子旬陰中在癸酉，以藥著酉地也。實謂不必然，正是不露日暴，於陰影處乾之爾。所以亦有云暴乾故也。若幸可兩用，益當爲善。今按本草採藥陰乾者，皆多惡。至如鹿茸，經稱陰乾，皆悉爛令壞。今火乾易得且良。草木根苗，陰之皆惡。九月已前採者，悉宜日乾；十月已後採者，陰乾乃好。

古秤惟有銖兩，而無分名。今則以十黍爲一銖，六銖爲一分，四分成一兩，十六兩爲一斤。雖有子穀秬黍之制，從來均之已久，正爾，依此用之。臣禹錫等謹按《唐本》又云：但古秤皆復，今南秤是也。晋秤始後漢末已來，分一斤爲二斤，一兩爲二兩耳。金銀絲綿，并與藥同，無輕重矣。古方惟有仲景而已，涉今秤若用古秤，作湯則水爲殊少，故知非復秤，悉用今者耳。今方家所云等分者，非分兩之分，謂諸藥斤兩多少皆同爾。先視病之大小，輕重所須，乃以意裁之。

凡此之類，皆是丸散；丸散竟依節度用之，湯酒之中，無等分也。

凡散藥，有云刀圭者，十分方寸匕之一，准如梧桐子大也。方寸匕者，作匕正方一寸，抄散取不落爲度。錢五匕者，今五銖錢邊五字者以抄之，亦令不落爲度。一撮者，四刀圭也。十撮爲一勺，十勺爲一合。以藥升分之者，謂藥有虚實、輕重，不得用斤兩，則以升平之。藥升方作，上徑一寸，下徑六分，深八分，内散藥勿按抑之，正爾微動令平調爾。今人分藥，不復用此。

凡丸藥，有云如細麻者，即胡麻也，不必扁扁，但令較略大小相稱者。如黍粟亦然，以十六黍爲一大豆也。如大麻子者，准三細麻也。如胡豆者，即今青斑豆是也，以二大麻子准之。如小豆者，今赤小豆也，粒有大小，以三大麻子准之。如大豆者，以二小豆准之。如梧子者，以二大豆准之。一方寸匕散，蜜和得如梧子，准十丸爲度。如彈丸及鷄子黄者，以十梧子准之。唐本注云：方寸匕散，爲丸如梧子，得十六丸，如彈丸；一枚若鷄子黄者，准四十丸。今彈丸同鷄子黄，此甚不等。

凡湯酒膏藥，舊方皆云㕮咀者，謂秤畢搗之如大豆，又使吹去細末，此於事殊不允當；藥有易碎、難碎，多末、少末，秤兩則不復均平，今皆細切之，較略令如㕮咀者。乃得無末，而片粒調和也。《唐本》注云：㕮咀，正謂商量斟酌之，餘解皆理外生情爾。臣禹錫等看詳㕮咀，即上文細切之義，非商量斟酌也。

凡丸散藥，亦先切細，暴燥，乃搗之。有各搗者，有合搗者，并隨方所言。其潤濕藥，如天門冬、乾地黄輩，皆先切，暴，獨搗令偏碎，更出細擘，暴乾。若逢陰雨，亦以微火烘之，既燥小停，冷乃搗之。

凡濕藥，燥皆大耗，當先增分兩，須得屑乃秤之爲正。其湯酒中，不須如此也。

凡篩丸藥，用重密絹令細，於蜜丸易熟。若篩散草藥，用輕疏絹，於酒中服即不泥。其石藥，亦用細絹篩令如丸者。凡篩丸散藥畢，皆更合於臼中，以杵搗之數百過，視其色理和同，爲佳也。

凡湯酒膏中用諸石，皆細搗之如粟米，亦可以葛布篩令調，并以新綿別裹内中。其雄黄、朱砂輩，細末如粉。

凡煮湯，用微火，令小沸。其水數依方多少，大略二十兩藥，用水一斗，煮取四升，以此爲准。然則利湯欲生，少水而多取汁；補湯欲熟，多水而少取汁。好詳視之，不得令水多少。用新布，兩人以尺木絞之，澄去垽濁，紙覆令密。温湯勿令鎗器中有水氣，於熟湯上煮，令暖亦好。服湯寧令小沸，熱易下，冷則嘔涌。

凡云分再服、三服者，要令勢力相及，并視人之强羸，病之輕重，以爲進退增減之，不必悉依方説也。

凡漬藥酒，皆須細切，生絹袋盛之，乃入酒密封，隨寒暑日數，視其濃烈，便可漉出，不必待至酒盡也。淬可暴燥微搗，更漬飲之，亦可散服。

凡建中、腎瀝諸補湯，淬合兩劑，加水煮竭飲之，亦敵一劑新藥，貧人可當依此用，皆應先暴令燥。

凡合膏，初以苦酒漬令淹浹，不用多汁，密覆勿泄。云晬時者，周時也，從今旦至明旦。亦有止一宿者。煮膏，當三上三下，以泄其熱勢，令藥味得出。上之使匝匝沸，乃下之，使沸静良久乃止，寧欲小小生。其中有薤白子、栝婁之類是也。用細核物，亦打破，山茱萸、五味子、薤核、決明子之類者，亦令小黄色爲度。猪肪皆勿令經水，臘月者彌佳。絞膏亦以新布絞之。若是可服之膏，膏淬亦可酒煮飲之。可摩之膏，膏淬則宜以傅病上，此蓋欲兼盡其藥力故也。

凡膏中有雄黄、朱砂輩，皆别搗細研如麵，須絞膏畢乃投中，以物疾攪，至於凝强，勿使沉聚在下不調也。有水銀者，於凝膏中研令消散。胡粉亦爾。

凡湯酒中用大黄，不須細剉。作湯者，先以水浸令淹浹，密覆一宿。明旦煮湯，臨熟乃内大黄，煮令人煩。麻黄皆折去節，令理通，寸剉之；小草、瞿麥五分剉之；細辛、白前三分剉之；丸散膏中，則細剉之，今不須爾。

凡湯中用完物，皆擘破，乾棗、梔子、栝樓之類是也。用細核物，亦打破，山茱萸、五味子、薤核、決明子之類是也。細花子物，正爾完用之，旋復是也。諸蟲，先微熬❹之，麥豆輩，亦完用之。米惟螵蛸當中破炙之。生薑、射干皆薄切之。芒硝、飴糖、阿膠，皆須絞湯畢，内汁中，更上火兩三沸，烊盡乃服之。

凡用麥門冬，皆微潤抽去心。杏人、桃人，湯柔撻去皮。巴豆打破，剥其皮，刮去心。不爾，令人悶。石韋刮去毛。辛夷去毛及心。鬼箭削取羽皮。藜蘆剔取根微炙。枳實去其瓤，亦炙之。椒去實，於鐺中微熬令汗出，則有勢力。礬石於瓦上若鐵物中，熬令沸，汁盡即止。礬石皆以黄土泥苞使燥，燒之半日，令熟而解散。犀角、羚羊角，皆鎊刮作屑。諸齒骨并炙搗

碎之。皂莢去皮、子，炙之。

凡湯并丸散，用天雄、附子、烏頭、烏喙、側子，皆煻灰中炮令微坼，削去黑皮，乃秤之。惟薑附湯及膏酒中生用，亦削皮乃秤之，直理破作七八片。隨其大小，但削除外黑尖處令盡。

凡湯酒丸散膏中，用半夏皆且完，用熱湯洗去上滑，以手挼之，皮釋隨剥去，更復易湯洗令滑盡。不爾，戟人咽喉。舊方云二十許過，今六七過便足。亦可煮之，一兩沸一易水，如此三四過，仍挼洗畢，便暴乾；隨其大小，破爲細片，乃秤之以入湯。若膏酒丸散，皆須暴燥，乃秤之。

凡丸散用阿膠，皆先炙，使通體沸起，燥，乃可搗。有不沸處，更炙之。

凡丸中用蠟，皆烊，投少蜜中，攪調以和藥。若用熟艾，先細擘，合諸藥搗，令散；不可篩者，則別搗內散中和之。

凡用蜜，皆先火煎，掠去其沫，令色微黃，則丸經久不壞。掠之多少，隨蜜精粗。

凡丸散用巴豆，去皮、心、膜，杏人、桃人、葶藶、胡麻諸有膏膩藥，皆先熬黃黑，別搗令如膏。指撚視泯泯爾，乃以向成散；稍稍下臼中，合研搗，令消散，仍復都以輕疏絹篩度之，須盡，又內臼中，依法搗數百杵也。湯膏中用，亦有熬之者，五兩爲正。菟絲子一升，九兩爲正。蜀椒一升者，三兩爲正。吳茱萸一升者，五兩爲正。蒴藋子一升，四兩爲正。蛇床子一升，三兩半爲正。地膚子一升，四兩爲正。此其不同也。云某子一升者，其子各有虛實、輕重，不可通以秤准，皆取平升爲正。

凡方云用桂一尺者，削去皮畢，重半兩爲正。甘草一尺者，重二兩爲正。云某草一束者，以重三兩爲正。云一把者，重二兩爲正。云蜜一斤者，有七合。猪膏一斤者，有一升二合也。

右合藥分劑料理法則。

臣禹錫等謹按徐之才《藥對》、孫思邈《千金方》、陳藏器《本草拾遺》序例如後。

夫衆病積聚，皆起於虛也。虛生百病。積者，五臟之所積；聚者，六腑之所聚。如斯等疾，多從舊方，不假增

損。虛而勞者，其弊萬端，宜應隨病增減。古之善爲醫者，皆自採藥，審其體性所主，取其時節早晚；早則藥勢未成，晚則盛勢已歇。今之爲醫，不自採藥，且不委節氣早晚，又不知冷熱消息，分兩多少，徒有療病之名，永無必愈之效，此實浮惑，聊復審其冷熱，記增損之主爾。虛勞而頭痛復熱，加枸杞、萎蕤。虛而欲吐，加人參。虛而多夢紛紜，加龍骨。虛而多熱，加地黄、牡蠣、地膚子、甘草。虛而冷，加當歸、芎藭、乾薑。若冷，則用龍齒、沙參、紫石英、小草。若客熱，即用沙參、龍齒；不冷不熱，皆用之。虛而口乾，加麥門冬、知母。虛而吸，加胡麻、覆盆子、柏子人。虛而多氣兼微咳，加五味子、大棗。虛而身强，腰中不利，加磁石、杜仲。虛而多冷，加桂心、吴茱萸、附子、烏頭。虛而勞，小便赤，加黄芩。虛而客熱，加地骨皮、白水黄耆。虛而痰，復有氣，用生薑、半夏、枳實。虛而小腸利，加桑螵蛸、龍骨、鷄胵胵。虛而小腸不利，加茯苓、澤瀉。虛而損，溺白，加厚朴。諸藥無有一一歷而用之，但據體性冷熱，的相主對，聊叙增損之一隅。夫處方者宜准此。

凡諸藥子人，皆去皮尖及雙人者，仍切之。

凡烏梅皆去核，入丸散，熬之。大棗擘去核。

凡用麥蘗、麪、大豆黄卷、澤蘭、蕪荑、蜂房，皆微炒。

凡石蟹，皆以槌極打令碎，乃入湯酒，拍碎用之。

凡蒐絲子，暖湯淘汰去沙土，乾，濾，暖酒漬，經一宿濾出，暴，微白，搗之；不盡者，更以酒漬，經❺三五日乃出，更曬微乾，搗之，須臾悉盡，極易碎。

凡斑猫等諸蟲，皆去足翅，微熬，用牡蠣熬令黄。

凡諸湯用酒者，皆臨熟下之。

凡用銀屑，以水銀和成泥。

凡用鍾乳等諸石，以玉槌水研三日三夜，漂煉，務令極細。

藥有宣、通、補、泄、輕、重、澀、滑、燥、濕，此十種者，是藥之大體，而《本經》都不言之，後人亦所未述，遂令調合湯丸，有昧於此者。至如宣可去壅，即薑、橘之屬是也。通可去滯，即通草、防己之屬是也。補可去弱，即人參、羊肉之屬是也。泄可去閉，即葶藶、大黄之屬是也。輕可去實，即麻黄、葛根之屬是也。重可去怯，即磁石、鐵粉之屬是也。澀可去脱，即牡蠣、龍骨之屬是也。滑可去著，即冬葵、榆皮之屬是也。燥可去濕，即桑白皮、赤小豆之屬是也。濕可去枯，即紫

石英、白石英之屬是也。只如此體，皆有所屬。用藥者，審而詳之，則無遺失矣。

凡五方之氣，俱能損人，人生其中，即隨氣受疾。雖習成其性，亦各有所資，乃天生萬物以與人，亦人窮急以致物。今嶺南多毒，足解毒藥之物，即金蛇、白藥之屬是也。江湖多氣，足破氣之物，即薑、橘、吳茱萸之屬是也。寒温不節，足療温之藥，即柴胡、麻黄之屬是也。涼氣多風，足理風之物，即防風、獨活之屬是也。濕氣多痹，足主痹之物，即魚、鱉、螺、蜆之屬是也。嶺氣多瘴，足主瘴之物，即常山、鹽麩、涪醋之屬是也。石氣多毒，足主毒之物，即犀角、麝香、羚羊角之屬是也。水氣多痢，足主痢之物，即黄連、黄檗之屬是也。野氣多蠱，足主蠱之物，即蘘荷、茜根之屬是也。沙氣多狐，足主短狐之物，即鸜鵒、瀏鶹之屬是也。中央氣交，兼有諸病，故醫人之療，亦隨方之所生。中央氣爲七，唐·蘇恭、李勣之徒，又附益爲二十卷，别圖藥形以爲經，其書略備矣。故古方或多補養，或多導泄，或衆味，或單行。補養即去風，導泄即去氣，衆味則貴要，單行乃貧下。豈前賢之偏有所好，或復用不遂其宜耳。

重廣補注神農本草并圖經序

良醫之不能以無兵勝敵也。不能以無藥愈疾，猶良將爲壽養生人之術，無一不具。然世之用者，能以其所以殺者生人；藥之性難窮，不善用者，返以其所以生者殺人。吁！可畏哉！寒、熱、温、涼、辛、甘、緩、急，品類萬殊，非一日而七十毒者，孰能辨之。彼《玉函》、《金匱》、《肘後》、《囊中》、《千金》之所傳，《外臺》之所秘，其爲方，不知其幾何。由是言醫者，習故守陋，妄意穿鑿，操數湯劑，殆虚文耳。況偏州下邑，雖有願見者，何所售之。閻中陳氏子承，少好學，尤喜於醫，該通諸家之説。嘗患二書傳者不博，而學者不兼有也。乃合爲一，又附以古今論説，與己所見聞，列爲二十三卷，名曰《重廣補注神農本草并圖經》。書著其説，圖見其形，一啓帙而兩得之。不待至乎殊方絶域，山巔水涯，而品類萬殊者，森在目前。譬夫談輿地者觀於職方，閲戰具者之入武庫也。承之先世爲將相，歐陽子所謂四世六公者，承其曾孫。少孤，奉其母江

淮間，閉門蔬食以爲養，君子稱其孝。間有奇疾，衆醫愕眙，不知所出，承徐❼察其脉，曰：當投某劑，某刻良愈，無不然者。然則承之學，雖出於圖書，而精識超絶茲二者，又安能域之哉？鬼臾區、岐伯遠矣，吾不得而知也，其視秦越人、淳于倉公、華佗輩爲何如？識者當能知之。元祐七年四月朔，左朝請大夫充天章閣待制知杭州軍州事兼管内勸農使充兩浙西路兵馬鈐轄兼提舉本路兵馬巡檢公事上輕車都尉賜紫金魚袋長樂林希序。

雷公炮炙論序

若夫世人使藥，豈知自有君臣？既辨君臣，寧分相制。也。霑溺，立銷班腫之毒；象膽揮黏，乃知藥有情異。鮭魚插樹，立便乾枯；用狗塗之，以犬膽灌之，插魚處，立如故。却當榮盛。無名無名異，形似玉柳面❽，又如石灰，味別止楚，截指而似去甲毛；聖石開盲，明目而如雲離日。當歸止血、破血，頭尾效各不同；頭止血，尾破血。薤子熟生，足睡不眠立據。弊箪淡鹵，常使者甑中箪，能淡鹽味。如酒霑交。今蜜枳繳枝，又云交加枝。鐵遇神破❾，如泥似粉；石經鶴糞，化作塵飛。枳見橘花似髓。斷弦折劍，遇鸞血而如初；以下⓳血煉作膠，粘折處，鐵物永不斷。海竭江枯，投仿⓫波燕子是也而立泛。令鉛拒火，須仗修天；今呼爲補天石。如要形堅，豈忘紫背。有紫背天葵，如常食葵菜，秖有背紫面青，能堅鉛形。數數，酒服熟雄；天雄炮過，以酒調一錢匕服，立定也。遍體疹風，冷調生側。附子傍生者曰側子，作末，冷酒服，立差。腸虛泄痢，留砒住鼎，全賴宗心。別有宗心草，今呼石竹，不是食者，必恐誤。其草出欽州，生處多蟲獸。雌得芹花⓬，其草名爲立起，其⓳形如芍藥，花色青，可長三尺已來，葉上黄斑色，味苦澀，堪用，煮雌黄立住火。立便成庚；硇遇赤鬚，其草名赤鬚，今呼爲虎鬚草是，用煮硇砂，即生火驗。水⓮中有獸名曰獝，以髓入在油中，其⓳油沾水，水中火生，不可救之，用酒噴之即延，切⓳於屋下收。長留金鼎。水中生火，非獝髓而莫能；海蛇亦能。强筋健骨，須⓭是蓯鱔；蓯蓉并鱔魚二味，作末，以黄精酒丸服之，可力倍常時也。齒生牙，賴雄鼠之骨末。其齒若折⓱，年多不生者，取雄鼠脊骨作末，揩折處，齒立生如故。髮眉墮落，塗半夏而立生；待⓲髮墮落者，以生半夏莖煉之，取涎塗髮落處，立生。目辟眼瞙，有五花而自正。五加皮是也。其葉有雄雌，三葉爲雄，五葉爲雌，須使五葉者，作末，酒浸飲⓳之，其目瞙者正。脚生肉柎，裩繫菅根；脚有肉柎者，取菅菅根，於裩帶上繫之，表感云交加枝。鐵遇神破❾，如泥似粉；石經鶴糞，化作塵飛。柎見橘花似髓。斷弦折劍，遇鸞血而如初；以下⓳血煉作膠，粘折處，鐵物永不斷。海竭江枯，投仿⓫波燕子是也而立泛。令鉛拒火，須仗修天；今呼爲補天石。如要形堅，豈忘紫背。有紫背天葵，如常食葵菜，秖有背紫面青，能堅鉛形。數數，酒服熟雄；天雄炮過，以酒調一錢匕服，立定也。遍體疹風，冷調生側。附子傍生者曰側子，作末，冷酒服，立差。腸虛泄痢，留砒住鼎，全賴宗心。別有宗心草，今呼石竹，不是食者，必恐誤。其草出欽州，生處多蟲獸。雌得芹花⓬，其草名爲立起，其⓳形如芍藥，花色青，可長三尺已來，葉上黄斑色，味苦澀，堪用，煮雌黄立住火。立便成庚；硇遇赤鬚，其草名赤鬚，今呼爲虎鬚草是，用煮硇砂，即生火驗。水⓮中有獸名曰獝，以髓入在油中，其⓳油沾水，水中火生，不可救之，用酒噴之即延，切⓳於屋下收。長留金鼎。水中生火，非獝髓而莫能；海蛇亦能。强筋健骨，須⓭是蓯鱔；蓯蓉并鱔魚二味，作末，以黄精酒丸服之，可力倍常時也。齒生牙，賴雄鼠之骨末。其齒若折⓱，年多不生者，取雄鼠脊骨作末，揩折處，齒立生如故。髮眉墮落，塗半夏而立生；待⓲髮墮落者，以生半夏莖煉之，取涎塗髮落處，立生。目辟眼瞙，有五花而自正。五加皮是也。其葉有雄雌，三葉爲雄，五葉爲雌，須使五葉者，作末，酒浸飲⓳之，其目瞙者正。脚生肉柎，裩繫菅根；脚有肉柎者，取菅菅根，於裩帶上繫之，表感㉑，去油，飲調服之，立絶。咳逆㉑，去油，飲調服之，立絶。咳逆感永痊⓴。囊皺旋多，夜煎竹木。多小便者，夜煎葦蘚一件服之，永不夜起也。體寒腹大，全賴鸕鷀；若患腹大如鼓，米飲調鸕鷀末服，立枯如故也。血泛經過，飲調瓜子。甜瓜子内仁搗作末㉑，去油，飲調服之，立絶。咳逆根；脚有肉柎者，取菅菅根，於裩帶上繫之，表感㉑，去油，飲調服之，立絶。咳逆感永痊⓴。囊皺旋多，夜煎竹木。多小便者，夜煎葦蘚一件服之，永不夜起也。體寒腹大，全賴鸕鷀；若患腹大如鼓，米飲調鸕鷀末服，立枯如故也。血泛經過，飲調瓜子。甜瓜子内仁搗作末㉑，去油，飲調服之，立絶。咳逆

亡，鼻投硝末；頭痛者，以硝石作末内鼻中，立止。心痛欲死，速覓延胡。以延胡索作散，酒服之，立愈也。如斯百種，是藥之功。某忝遇明時，謬看醫理；雖尋聖法，難可窮微。略陳藥食之功能，豈溺仙人之要術，其制藥炮、熬、煮、炙，不能記年月哉？欲審元由，須看海集。某不量短見，直録炮、熬、煮、炙，列藥制方，分爲上、中、下三卷，有三百件名，具陳於後。

凡方云丸如細麻子許者，取重四兩鯉魚目比之。

云如大麻子許者，取重六兩鯉魚目比之。

云如小豆許者，取重八兩鯉魚目比之。

云如大豆許者，取重十兩鯉魚目比之。

云如兔蕈俗云兔屎許者，取重十二兩鯉魚目比之。

云如梧桐子許者，取重十四兩鯉魚目比之。

云如彈子許者，取重十六兩鯉魚目比之。一十五個白珠爲准，是一彈丸也。

凡方中云以水一鎰，至二鎰，至十鎰者，每鎰秤之，重十二兩爲度。

凡云一兩、一分、一銖者，正用今絲綿秤也。勿得將四銖爲一分；有誤，必所損兼傷藥力也。

凡云散，衹作散；丸，衹作丸。或酒煮，或用醋，或乳煎，不得遺法。

凡方煉蜜，每一斤衹煉得十二兩半，或一分。是數若火少，若火過，并用不得云也。

凡膏煎中用脂，先須煉去革膜了，方可用之也。

凡修事諸藥物等，一一并須令專心，勿令交雜，使用或先熬後煮，或先煮後熬，不得改移，一依法則也。

凡修合丸藥，用蜜，衹用蜜；用餳，衹用餳；用糖，衹用糖。勿交雜用，必宣瀉人。

圖經衍義本草上卷二

❶問：晦明軒本作『尚』。
❷言：晦明軒本作『售』。
❸蜜：原作『密』，據晦明軒本改。
❹熬：晦明軒本作『炙』。
❺經：『經』上十七字原重出，據晦明軒本删。
❻掌：原作『劉』，據晦明軒本改。
❼徐：原作『除』，據晦明軒本改。
❽面：晦明軒本作『石』。
❾破：晦明軒本作『砂』。
⓯下：晦明軒本作『鸞』。
⓫仿：晦明軒本作『游』。
⓯花：原脱，據晦明軒本補。
⓳其：原作『貧』，據晦明軒本改。
⓮水：晦明軒本作『永』。
⓯其：原脱，據晦明軒本補。
⓳切：晦明軒本作『勿』。
⓱折：原作『黄』，據晦明軒本改。
⓲待：晦明軒本作『眉』。
⓳飲：原作『以』，據晦明軒本改。
㉓表感感永痊：晦明軒本作『感應永不痛』。
㉕末：原作『才』，據晦明軒本改。
㉓爲：晦明軒本作『以』。
㉓須：原作『酒』，據晦明軒本改。
㉔初：晦明軒本作『幼』。
㉕蒸：晦明軒本作『於』。
㉖枯：晦明軒本作『愈』。

圖經衍義本草上卷三

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

序例上

衍義總序

天地以生成爲德，有生所甚重者，身也。身以安樂爲本，樂❶所可致者，以保養爲本。世之人必本其本，則本必固；本既固，疾病何由而生？夭橫何由而至？此攝生之道無逮於此。夫草木無知，猶假灌溉，矧人爲萬物之靈，豈不資以保養？然保養之義，其理萬計，約而言之，其術有三：一養神，二惜氣，三隄疾。忘情去智，恬憺虛無，離事全真，內外無寄；如是則神不內耗，境不外惑，真一不雜，則神自寧矣。此養神也。抱一元之根本，固歸精之真氣，三焦定位，六賊忘形，識界既空，大同斯契，則氣自定矣。此惜氣也。飲食適時，温凉合度，出處無犯於八邪，寤寐不可以勉强，則身自安矣。此隄疾也。三者甚易行，然人自以謂難行而不肯行。如此雖有長生之法，人罕專尚，遂至永謝。是以疾病交攻，天和頓失，聖人憫之，故假以保救之術，輔以蠲疴之藥，俾有識無識，咸臻壽域。所以國家編撰《聖惠》，校正《素問》，重定《本草》，別爲《圖經》。至於張仲景《傷寒論》及《千金》、《金匱》、《外臺》之類，皆周盡。矧疾爲聖人所謹，無常不可以爲醫，豈容易言哉！宗奭常謂：疾病所可憑者醫也，醫可據者方也，方可恃者藥也。苟知病之虛實，方之可否，若不能達藥性之良毒，辨方宜之早晚，真僞相亂，新陳相錯，則曷由去道人陳宿之蠹，唐·甄立言仕爲太常丞，善醫術，有道人心腹懣煩，彌二歲，診日：腹有蠱，誤食髮而然。令餌雄黄一劑，少選，吐一蛇如拇指，無目，燒之有髮氣，乃愈。生張果召張果謂高力士曰：吾聞飲病❸。然《本草》二部，其間撰著之人，或執用己私❹，失❸於商較，致使學者撿據之間，不得無惑。今則❻併考諸家之説，參之實事，有未盡厥理都從之，以臻其理；如東壁土、倒流水、冬灰之類。隱避不斷者伸❼之，以見其情；如水自菊下過而水香，影❽鼠溯精墜地而生子。文簡誤脱者證補、新定之目，緣《本經》已著目録内，而易名者原之，以存其名。如山藥避宋朝諱，及唐避代宗諱。使是非歸一，治療有源，撿用之際，曉然無惑。是以搜求訪緝者十有餘年，採拾衆善，診療疾苦，和合收蓄之功，率皆周盡。矧疾爲聖人所謹，無常不可以爲醫，豈容易言哉！宗奭常謂：疾病所可憑者醫也，醫可據者方也，方可恃者藥也。苟知病之虛實，方之可否，若不能達藥性之良毒，辨方宜之早晚，真僞相亂，新陳相錯，則曷由去道人陳宿之蠹，唐·甄立言仕爲太常丞，善醫術，有道人心腹懣煩，彌二歲，診日：腹有蠱，誤食髮而然。令餌雄黄一劑，少選，吐一蛇如拇指，無目，燒之有髮氣，乃愈。生張果召張果謂高力士曰：吾聞飲駢潔之齒？唐玄宗召張果謂高力士曰：吾聞飲葷無苦者，奇士也。時天寒，取飲，果三進，頹然曰：非佳酒。乃寢。須⓫，視齒焦縮，顧左右取鐵如意，擊墮之，藏帶中，更出藥傅其齦。良久，齒已生，粲然駢潔，帝益神之。此書之意，於是乎作。今則編次成書，謹依二《經》類例，分門條析，仍衍序例爲三卷。内有名未用及意義已盡者，更不編入。其《神農本經》、《名醫別録》、唐本先附、今附、新

更不聲說，依舊作二十卷，及目録一卷，目之曰《本草衍義》。若博愛衛生之士，志意或同，則更爲詮修以稱聖朝好生之德。時政和六年丙申歲記。

本草之名，自黄帝、岐伯始。其《補注·總叙》言，舊説《本草經》者，神農之所作，而不經乎[11]。《帝紀》元始五年，舉天下通知方術、本草者，所在輶傳，遣詣京師。此但見本草之名，終不能斷自何代而作。又《樓護傳》稱，護少誦醫經、本草、方術，數十萬言。本草之名，蓋見於此。是尤不然也。《世本》曰：神農嘗百草，以和藥濟人，然亦不著本草之名，皆未臻厥理。嘗讀《帝王世紀》曰：黄帝使岐伯嘗味草木，定《本草經》，造醫方，以療衆疾。則知本草之名，自黄帝、岐伯始。其《淮南子》之言，神農嘗百草之滋味，一日七十毒。亦無本草之説。是知此書，乃上古聖賢具生知之智，故能辨天下品物之性味，合世人疾病之所宜。後之賢智之士，從而和之者，又增廣其品，至一千八十二名，《補注本草》稱一千八十二種，然一種有分兩用者，有三用者，其種[12]字爲名字，於義方允。可謂大備。然其間注説不盡，或捨理別趣者，往往多矣。是以不察也。是知人之生，須假保養；無衍摭餘義，期於必當，非足以發明聖賢之意，冀有補於闕疑。

夫天地既判，生萬物者，惟五氣爾。五氣定位，則五味生；五味生，則千變萬化，至於不可窮已。故曰：生物者氣也；成之者味也。以奇生，則成而奇。寒氣堅，成而耦；以耦生，則與不及之害。《經》曰：春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用。蓋不適其性，故其味可用以軟；熱氣軟，故其味可用以堅；風氣散，故其味可用以散。土者，冲氣而强云爲逐，强處即病生。五臟受氣，之所生，冲氣則無所不和，故其味可用以收；燥氣收，故其味可用以緩。氣堅則壯，故苦可以養氣。脉生者，既無過耗之弊，又能保守真元，何患乎外邪所中也。故善服藥，不若善保養；不善保養，不若善服藥。世有不善保養，又不善服藥，倉卒病生，而歸咎於神天。噫！是亦未嘗思也，可不謹[13]歟！

夫未聞道者，放逸其心，逆於生樂。以精神徇智巧，以憂畏徇得失，以勞苦徇禮節，以身世徇財利；四徇不置，心爲之疾矣。極力勞形，躁暴氣逆，當風縱酒，食嗜辛鹹，肝爲之病矣。古之養生治疾者，太過，太過亦病矣。不通乎此，而能已人之疾者，蓋寡矣。

飲食生冷，温凉失度，久坐久卧，大飽大饑，脾爲之病矣。呼叫過常，辨争陪答，冒犯寒暄，恣食鹹苦，肺爲之病矣。久坐濕地，强力入水，縱慾勞形，三田漏溢，腎爲之病矣。五病既作，故未老而羸，未羸而病，病至則重，重則必斃。嗚呼！是皆弗思而自取之也。衛生之士，須謹此五者，可致終身無苦。《經》曰：不治已病，治未病。正爲此矣。

夫善養生者養内，不善養生者養外。養外者實外，以充怏悦澤，貪欲恣情爲務。殊不知外實則内虚也。善養内者實内，使臟腑安和，三焦各守其位，飲食常適其宜。故莊周曰：人之可畏者，衽席飲食之間，而不知爲之戒者，過也。若能常如是畏謹，疾病何緣而起？壽考焉得不長？賢者造形而悟，愚者臨病不知，誠可畏也。

夫柔情難綰而不斷，不可不以智慧決也。故幃箔不可不遠。斯言至近易，其事至難行，蓋人之知能勝其貪欲也。故佛書曰：諸苦所因，貪欲爲本，若滅貪欲，何所依止。是知貪欲不滅，苦亦不滅；貪欲滅，苦亦滅。聖人言近而指遠，不可不思，不可不懼。善攝生者，不勞神，不苦形；神形既安，禍患何由而致也。

夫人之生，以氣血爲本；人之病，未有不先傷其氣血者。世有童男室女，積想在心，思慮過當，多致勞損。男則神色先散，女則月水先閉。何以致然？蓋愁憂思慮則傷心，心傷則血逆竭，血逆竭，故神色先散，而月水先閉也。火既受病，不能榮養其子，故不嗜食。脾既虚，則金氣虧，故發嗽，嗽既作，水氣絶，故四肢乾。木氣不充，故多怒，鬢髮焦，筋痿。俟五臟傳遍，故卒不能死，然終死矣。此一種於諸勞中最爲難治，蓋病起於五臟之中，無有已期，藥力不可及也。若或自能改易心志，用藥扶接，如此則可得九死一生。舉此爲例，其餘諸勞，可按脉與證而治之。

夫治病有八要。八要不審，病不能去。非病不去，無可去之術也。故須審辨八要，庶不違誤。其一曰虚，五虚是也。脉細、皮寒、氣少、泄利前後、飲食不入，此爲五虚。二曰實，五實是也。脉盛、皮熱、腹脹、前後不通、悶瞀，此五實也。三曰冷，臟腑受其積冷是也。四曰熱，臟腑正病也。五曰邪，非臟腑正病也。六曰正，非外邪所中也。七曰内，病不在外也。八曰外，病不在内也。既先審此八要，參之六脉，審度所起之源，繼以望、聞、問、切加諸病者，豈有不可治之疾也。夫不可治者有六失：失於不審，失於不信，失於過時，失於不擇醫，失於不識病，失於不知藥。六失之中，有一於此，即爲難治。非止醫家之罪，亦病家之罪也。矧又醫不慈仁，病者猜鄙，二理交馳，於病何益？由是言之，醫者不可不慈仁，不慈仁則招禍；病者不可猜鄙，猜鄙則招禍。惟賢者洞達物情，各就安樂，亦治病之一説耳。

合藥分劑料理法則中言，凡方云用桂一尺者，削去皮畢，重半兩爲正。既言廣而不言狹，如何便以半兩爲正？且桂即皮也，若言削去皮畢，即是

全無桂也。今定長一尺，闊一寸，削去皮上粗虛無味者，約爲半兩，然終不見當日用桂一尺之本意，亦前人之失也。

序例，藥有酸、鹹、甘、苦、辛五味，寒、熱、温、凉四氣。今詳之：凡稱氣者，即是香臭之氣；其寒、熱、温、凉，則是藥之性。且如鵝條中云：白鵝脂性冷，不可言其氣冷也。況自有藥性，論其四氣，則是香、臭、臊、腥，故不可以寒、熱、温、凉配之。如蒜、阿魏、鮑魚、汗臟，則其氣臭；鷄、魚、鴨、蛇，則其氣腥；腎、狐狸、白馬莖、裉近隱處、人中白，則其氣臊；沉、檀、龍、麝，則其氣香。如此則方可以氣言之。其序例中氣字，恐後世誤書，當改爲性字，則於義方允。

今人用巴豆，皆去油訖生用。茲必爲《本經》言生温、熟寒，故欲避寒而即温也。不知寒不足避，當避其大毒。矧《本經》全無去油之説。故陶隱居云：熬令黄黑，然亦太過矣。《日華子》云：炒不如去心膜，煮五度，换水，各煮一沸爲佳。其杏人、桃人、葶藶、胡麻，亦不須熬至黑，但慢火炒令赤黄色，斯可矣。

凡服藥多少，雖有所説一物一毒，今更合别論。緣人氣有虚實，年有老少，病有新久，藥有多毒少毒，更在逐事斟量，不可舉此爲例。但古人凡設例者，皆是假令，豈可執以爲定法。

《本草》第一序例言，犀角、羚羊角、鹿角，一概末如粉，臨服内湯中。然今昔藥法中，有生磨者，煎取汁者。且如丸藥中用蠟，取其能固護藥之氣味，勢力全備，以過關鬲而作效也。今更有上虚軟甲錯，可削之也？凡此之類，亦更加詳究。今人用麻黄，皆合搗諸藥中。張仲景方中，皆言去上沫。説。然云：折去節，令通理，寸剉之。不若碎剉如豆大爲佳，藥味易出，而無遺力也。

陶隱居云：藥有宣、通、補、泄、輕、重、澀、滑、燥、濕。此十種，今詳之，惟寒熱二種，何獨見遺？如寒可去熱，大黄、朴硝之屬是也。如熱可去寒，附子、桂之屬是也。今特補此二種，以盡厥旨。

序例中 ⑭

人之生，實陰陽之氣所聚耳。若不能調和陰陽之氣，則害其生。故《寶命全形篇》論曰：人以天地之氣生。又曰：天地合氣，命之曰人。是以陽化氣，陰成形也。夫遊魂爲變者，陽化氣也。精氣爲物者，陰成形也。陰陽氣合，神在其中矣。故《陰陽應象大論》曰：天地之動静，神明爲之綱紀。即知神明不可以陰陽攝也。《易》所以言陰陽不測之謂神，蓋爲此矣。故曰：神不可大用，大用即竭；形不可

大勞，大勞則斃。是知精、氣、神，人之大本，不可不謹養。智者養其神，惜其氣，以固其本。世有不謹衛生之經者，動皆觸犯。既以犯養生之禁，須假以外術保救，不可坐以待斃。《本草》之經，於是興焉。既知保救之理，不可不窮保救之事，《衍義》於是存焉。二者其名雖異，其理僅同。欲使有知無知盡臻壽域，率至安樂之鄉，適是意者，求其意而可矣。

養心之道，未可忽也。六欲七情，千變萬化，出没不定，其言至簡，其義無窮，而以一心對無窮之事，不亦勞乎？心苟不明，不爲物所病者，未之有也。故明達之士，遂至忘心，心既忘矣，則六欲七情，無能爲也。六欲七情無能爲，故内事不生，故外患不能入。外患不能入，則本草之用，寔世之芻狗耳。若未能達是意而至是地，則未有不緣六欲七情而起憂患者。憂患既作，則此書一日不可闕也。愚何人哉，必欲斯文絶人之憂患乎。

右隱居以謂凡篩丸散藥畢，皆更合於臼中，以杵搗數百過，如此恐乾末溜蕩不可搗，不若令力士合研爲佳。又曰：凡湯酒膏中用諸石，皆細搗之如粟，亦可以葛布篩令調匀，并以綿裹内中，其雄黄、朱砂輩，細末如粉。今詳之：凡諸石雖是湯酒中，亦須稍細，如粟米也？不合如此立例，當在臨時應用詳酌爾。又説：吮咀兩字，《唐本》注謂爲商量斟酌，非也。《嘉祐》復符陶隱居説爲細切，亦非也。儒家以謂有合⑮味之意，如人以口齒咀嚙，雖破而不塵，但使含味耳。吮咀，其義如此。

病人有既不洞曉醫藥，復自行臆度，如此則九死一生。或醫人未識其病，或以財勢所迫，占奪强治，如此之輩，醫家病家不可不察也。要在聰明賢達之士掌之，則病無不濟，醫無不功。世間如此之事甚多，故須一一該舉，以隄或然。

夫人有貴賤少長，病當别論；病有新久虚實，理當别藥。蓋人心如面，各各不同，惟其心不同，臟腑亦異。臟腑既異，乃以一藥治衆人之病，其可得乎？故張仲景曰：又有土地高下不同，物性剛柔，食居亦異。是故黄帝興四方之問，岐伯舉四治之能，臨病之功，宜須兩審。如是則依方合藥，一概而用，亦以疏矣。且如貴豪之家，形樂志苦者也。衣食足則形樂，心慮多則志苦。岐伯曰：病生於脉，形樂則外實，志苦則内虚，故病生於脉。所養既與貧下異，憂樂思慮不同，當各逐其人而治之。後世醫者，直委此一節，閉絶不行，所失甚矣。嘗有一醫官，暑月與貴人飲。貴人曰：我昨日飲食所傷，今日食減。醫曰：可餌消化藥，他人當服十丸，公當減其半。下咽未久，疏逐不已，幾致斃。以此較之，虚實相遼，不可不察，故曰病當别論。又一男子，暑月患血痢，醫妄以凉藥逆制，專用黄連、阿膠、木香藥治之。此藥始感便治則可，今病久腸虚，理不可服，逾

旬不已，幾致委頓，故曰理當別藥。如是論之，誠在醫之通變。又須經歷，則萬無一失。引此爲例，餘可效此。

凡用藥，必須擇州土所宜者，則藥力具，用之有據。如上黨人參、川蜀當歸、齊州半夏、華州細辛；又如東壁土、冬月灰、半天河水、熱湯、漿水之類，其物至微，其用至廣，蓋亦有理。若不推究厥理，治病徒費其功，終亦不能活人。聖賢之意不易盡知，然捨理何求哉？

凡人少、長、老，其氣血有盛、壯、衰三等。故岐伯曰：少火之氣壯，壯火之氣衰。蓋少火生氣，壯火散氣，況復衰火，不可不知也。故治法亦當分三等。其少，日服餌之藥，於壯老之時，皆須別處之，決不可忽也。世有不留心於此者，往往不信，遂致困危。哀哉！

今人使理中湯、丸，倉卒之間多不效者，何也？是不知仲景之意，爲必效藥，蓋用藥之人有差殊耳。如治胸痹，心中痞堅，氣結胸滿，脅下逆氣搶心，治中湯主之。人參、术、乾薑、甘草四物等，共一十二兩，水八升，煮取三升，每服一升，日三服，以知[16]爲度。或作丸，須鷄子黃大，皆奇效。今人以一丸如楊梅許，服之病既不去，乃曰藥不神。非藥之罪，用藥者之罪也。今引以爲例，他可效此。然年高及素虛寒人，當逐宜減甘草。

夫高醫以蓄藥爲能，倉卒之間，防不可售者所須也。若桑寄生、桑螵蛸、鹿角膠、天靈蓋、虎膽、蟾酥、野駝、螢、蓬藁、空青、婆娑石、石蟹、冬灰、臘雪水、松黃之類，如此者甚多，不能一一遍舉。唐元澹，字行冲，嘗謂狄仁杰曰：下之事上，譬富家儲積以自資也。補、腊、膜、胰，以供滋膳；參、术、芝、桂，以防疾病。門下充旨味者多矣，願以小人備一藥可乎？仁杰笑曰：公正吾藥籠中物，不可一日無也。然梁公因事而言，獨譬之以藥，則有以見天下萬物之中，尤不可闕者也。知斯道者，知斯意而已。

凡爲醫者，須略通古今，粗守仁義，絶馳騖能所之心，專博施救拔之意。如此則心識自明，神物來相，又何必戚戚沽名，齪齪求利也。如或不然，則曷以致姜撫沽譽之慚，逋華佗之矜能受戮乎？

嘗讀《唐·方技傳》有云：醫要在視脉，唯用一物攻之，氣純而愈速。一藥偶得，他藥相制，弗能專力，此難愈之驗也。今詳之：病有大小、新久、虛實，豈可止以一藥攻之？若初受病，小則庶幾；若病大多日，或虛或實，豈得不以他藥佐使？如人用硫黃，皆知此物大熱，然石性緩，倉卒之間，下咽不易便作效。故智者又以附子、乾薑、桂之類相佐使以發之，將併力攻疾，庶幾速效。若單用硫黃，其可得乎？故知許嗣宗之言，未可全信，賢者當審度之。

夫用藥如用刑，刑不可誤，誤即干人命。用藥亦然，一誤即便隔生死。然刑有鞫司，鞫成然後議定，議定然後書罪。蓋人命一死，不可復生，故須如此詳謹。今醫人纔到病家，便以所見

用藥。若高醫識病知脉，藥又相當，如此，即應手作效。或庸下之流，孟浪亂投湯劑，逡巡便致困危。如此殺人，何太容易！世間此事甚多，良由病家不擇醫，平日未嘗留心於醫術也，可不懼哉！

序例下

治婦人雖有別科，然亦有不能盡聖人之法者。今豪足之家，居奥室之中，處帷幔之内，復以帛幪手臂，既不能行望色之神，又不能殫切脉之巧，四者有二闕焉。黄帝有言曰：凡治病，察其形氣色澤，形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已。又曰：診病之道，觀人勇怯，骨肉、皮膚，能知其情，以爲診法。若患人脉病不相應，既不得見其形，醫人止據脉供藥，其可得乎？如此言之，烏能盡其術也。此醫家之公患，世不能革。醫者不免盡理質問。病家見所問繁，還爲醫業不精，往往得藥不肯服，似此甚多。扁鵲見齊侯之色，尚不肯信，況其不得見者乎⑰？嗚呼！可謂難也已！

又婦人病温已十二日，診之，其脉六七至而澀，寸稍大，尺稍小，發寒熱，煩赤、口乾，不了了，耳聾。問之，病後數日，經水乃行，此屬少陽熱入血室也。《經》曰：關則吐逆，格則不得小便。如此亦有不得大便也。若治不對病，則必死。乃按其證，與小柴胡湯服之。二日，又與小柴胡湯加桂枝乾薑湯，一日，寒熱遂已。又云：我臍下急痛，又與抵當丸，微利，了，乃復與小柴胡湯。次日云：我但胸中熱燥，口鼻乾。又少與調⑱胃承氣湯，不得利。次日又云：心下痛。又與大陷胸丸半服，利三行。而次日虚煩不寧，時妄有所見，時復狂言。雖知其尚有燥屎，以其極虚，不敢攻之。遂與竹葉湯，去其煩熱。其夜大便自通，至曉兩次，中有燥屎數枚。而狂言虚煩盡解。但咳嗽唾⑰，此肺虚也。若不治，恐乘虚而成肺痿，遂與小柴胡去人參、大棗、生薑，加乾薑、五味子湯。一日咳減，二日而病悉愈。以上皆用張仲景方。

有婦人病吐逆，大小便不通，煩亂、四肢冷，漸無脉，凡一日半，與大承氣湯兩劑，至夜半漸得大便通，脉漸生，翌日乃安。此關格之病，極難治，醫者當審審謹也。《經》曰：關則吐逆，格則不得小便。如此亦有不得大便者。

有小兒病虚滑，食略化，大便日十餘次，四肢柴瘦、腹大，食訖又饑。此疾正是大腸移熱於胃，善食而瘦。又謂之食侏者。時五六月間，脉洪大，按之則絶。今六脉既單洪，則夏之氣獨然，按之絶，則無胃氣也。《經》曰：夏脉洪，洪多胃氣，少曰病，但洪無胃氣曰死，夏以胃氣爲本。治療失於過時，後不逾旬，果卒。

有人病久嗽，肺虚生寒熱，以款冬花焚三兩芽，俟烟出，以筆管吸其烟，滿口則咽之，至倦則已。凡數日之間五七作，差。

有人病瘧月餘日，又以藥吐下之，

氣遂弱，疾未愈。觀其病與脉，乃夏傷暑，秋又傷風，乃與柴胡湯一劑。安後，又飲食不節，寒熱復作。此蓋前以傷暑，今以飲食不謹⑳，遂致吐逆不食，脅下牽急而痛，寒熱無時，病名痰瘧。以十棗湯一服，下痰水數升，明日又與理中散二錢，遂愈。

有人苦風痰、頭痛、顫掉、吐逆，飲食減。醫以爲傷冷物，遂以藥温之，不愈。又以丸藥下之，遂厥。復與金液丹後，譫言。吐逆，顫掉，不省人，狂若見鬼，循衣摸床，手足冷，脉伏。此胃中有結熱，故昏瞀不省人。以陽氣不能布於外，陰氣不持於内，即顫掉而厥。遂與大承氣湯，至一劑，乃愈。方見仲景。後服金箔丸，方見《删繁》。

有男子，年六十一，脚腫生瘡，忽食猪肉不安。醫以藥利之，稍愈，時出外中風，汗出後，頭面暴腫起，紫黑色，多睡，耳輪上有浮泡小瘡，出黄汁㉑出。乃與小續命湯中加羌活一倍，服之遂愈。

有人年五十四，素羸，多中寒，近服菟絲有效。小年常服生硫黄數斤，氣。舉斯爲例，餘可效此。

脉左上二部、右下二部弦緊有力。五七年來，病右手足筋急拘攣，言語稍遲，遂與仲景小續命湯，加薏苡人一兩，以治筋急。減黄芩、人參、芍藥各半，以避中寒，杏人只用一百五枚。後云尚覺大冷，因令盡去人參、芍藥、黄芩三物，却加當歸一兩半，遂安。今人用小續命湯者，比比皆是，既不能逐證加減，遂至危殆，人亦不知。今小續命湯，世所須也。故舉以爲例，可不謹哉！

夫八節之正氣，生活人者也；八節之虚邪，殺人者也。非正氣則爲邪，非真實則爲虚。所謂正氣者，春温、夏熱、秋凉、冬寒，此天之氣也。若春在經絡，夏在肌肉，秋在皮膚，冬在骨髓，此人之氣也。在處爲實，不在處爲虚。故曰，若以身之虚，逢時之虚邪不正之氣，兩虚相感，始以皮膚、經絡，次傳至臟腑；逮於骨髓，則藥力難及矣。如此則醫家治病，正宜用藥抵截散補，防其深固而不可救也。又嘗須保護胃

❶藥：晦明軒本『藥』上有『安』字。
❷天上：晦明軒本作『厚生』。
❸之病：原作『無乃』，據晦明軒本改。
❹私：原作『天』，據晦明軒本改。
❺失：原作『人』，據晦明軒本改。
❻今則：原作『應不』，據晦明軒本改。
❼伸：原作『神』，據晦明軒本改。
❽影：晦明軒本作『鼷』。
❾石：晦明軒本作『玉』。
❿須：晦明軒本作『頃』。
⓫乎：晦明軒本作『見』。
⓬種：原作『稱』，據晦明軒本改。
⓭謹：晦明軒本作『慎』。
⓮中：原脱，據晦明軒本補。
⓯合：晦明軒本作『含』。
⓰知：原作『和』，據晦明軒本改。
⓱乎：『乎』字原脱，據晦明軒本補。
⓲調：原作『謂』，據晦明軒本改。
⓳唾：晦明軒本『唾』下有『沫』字。
⓴謹：晦明軒本作『慎』。
㉑汁：原作『汗』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草上卷四

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

序例下

謹按諸藥，一種雖主數病，而性理亦有偏著。立方之日，或致疑混，復恐單行經用，赴急抄撮，不必皆得研究。今宜指抄病源所主藥名，便可於此處療，若欲的尋，亦兼易解。

其甘苦之味可略，有毒無毒易知，惟冷熱須明。今依《本經》、《別録》，注於本條之下。其有不宜入湯酒，宜入湯酒者，今亦條於後矣。

療風通用

防風温　防己平，温　秦艽平，微温　芎藭温　羌活平，微温　麻黄微温　鹿藥温　天麻平　海桐皮平　威靈仙温　楓香平。治疹癢毒。臣　薏苡人微寒。主風筋攣急，屈伸不得。君　萎蕤平。治中風，暴熱，不能轉動者。君　側子大熱。治濕風，大風，拘急。使　淡竹瀝及葉大寒。主風癘疾。臣　白薇大寒。治暴風身熱，四肢急滿，不知人。臣　桂心大熱。吹鼻中，主風痞。君　白鮮皮寒。治風，不得屈伸，風熱。臣　鱉頭血治口僻。臣　山茱萸平。治風氣。臣　牛膝平。主風攣急。君　菖蒲温。君　細辛温。主風攣急。君　葛根平。治暴中風。臣　枳殼　牡荆子微寒，平　天門冬平，大寒　附子温，大熱　杜若微温　麥門冬平，微寒❶　羚羊角温，微寒　犀角寒　藁本温，微寒　天雄大温　黄耆微温　蒺藜子温，微寒　菜耳實温　葉微寒　菊花平　狗脊平，微温　當歸温，大温　側子大熱　木防己平。治攣急。臣　獨活微温。主脚弱。君　松節温。治脚膝弱。君　辛夷温　小天蓼温　乾蝎温　烏蛇温　天南星温　烏頭温，大熱　白花蛇温　酸棗人平　牛黄平

風眩

菊花平　飛廉平　蹶蹏温　虎掌温，微寒　杜若微温　茯神平　茯苓平　白芷温　伏牛花平　芎藭温。臣　人參微温。主頭眩。君　兔頭骨平。臣　蔓荆實微寒　署預温，平　天雄温，大温　山茱萸平。治癘疾。臣　白薇大寒。治暴風身熱，四肢急滿，不知人。臣　桂心大熱。吹鼻中，主風痞。君　白鮮皮寒。治風，不得屈伸，風熱。臣　鱉頭血治口僻。臣　牛膝平。主風攣急。君　菖蒲温。君　細辛温。主風攣急。君　葛根平。治暴中風。臣　枳殼　牡荆子微寒，平　天門冬平，大寒　附子温，大熱　杜若微温　麥門冬平，微寒❶　羚羊角温，微寒　犀角寒　藁本温，微寒　天雄大温　黄耆微温　蒺藜子温，微寒　菜耳實温　葉微寒　菊花平　狗脊平，微温　當歸温，大温　側子大熱　木防己平。治攣急。臣　獨活微温。主脚弱。君　松節温。治脚膝弱。君　辛夷温　小天蓼温　乾蝎温　烏蛇温　天南星温　烏頭温，大熱　白花蛇温　酸棗人平　牛黄平

頭面風

芎藭温　署預温，平　天雄温，大温　山茱萸平　莽草温　辛夷温　牡荆子温　藁本温，微寒　蘼蕪温　菜耳温　何首烏微温　皂莢温。主風眩。使　巴戟天微温。　附子温，大熱　杜若微温　麥門冬平，微寒❶　羚羊角温，微寒　犀角寒　藁本温，微寒　菊花平　狗脊平，微温　當歸温，大温　側子大熱　木防己平。治攣急。臣　獨活微温。主脚弱。君　松節温。治脚膝弱。君　辛夷温　小天蓼温　乾蝎温　烏蛇温　天南星温　烏頭温，大熱　白花蛇温　酸棗人平　牛黄平

中風脚弱

石斛平　石鍾乳温　殷孽温　孔公孽温　石硫黄温，大熱　附子温，大熱　豉寒　丹參微寒　五加皮温，微寒　竹瀝大寒　大豆平　天雄温，大温　側子大熱　木防己平。治攣急。臣　獨活微温。主脚弱。君　松節温。治脚膝弱。君　牛膝平。

久風濕痺❸

菖蒲温，平　茵芋温，微温　天雄温，大熱　附子温，大熱　牛膝平　烏頭温，大熱　細辛　蜀椒温，大熱　石龍芮平　茵陳蒿平，微寒　松葉温　松節❹　側子大熱　柏子人平。治風濕痺。君　獨活微温。治風，四肢無力，拘急。君　蹶蹏温。治風。使　天門冬平，大寒　蔓荆子微寒　菜耳實温　葉微寒

賊風攣痛

菌芋溫，微溫　附子溫，大熱　側子大熱
麻黃溫，微溫　芎藭溫　杜仲平，溫　蕘薾平　狗脊平，微溫　白鮮皮寒　白及平，微寒　菜耳溫
猪椒溫　石斛平　漢防己平，溫

暴風瘙癢

蛇床子平　蒴藋溫　烏喙微溫　蒺藜子溫，微寒　景天平　茺蔚子微溫　青葙子微寒
楓香脂平　藜蘆寒，微寒　烏蛇平　葶藶寒。主中暴風。使　枳殼微寒　枳實微寒。主大風，在皮膚中癢。君　穀莖主身癮疹，煮水洗。臣

傷寒

麻黃溫，微溫　葛根平　杏人溫　前胡微寒　柴胡平，微寒　大青大寒　龍膽大寒　芍藥平，溫❺，寒　薰草平　升麻平，微寒　牡丹寒　虎掌溫，微寒　石膏微寒　牡蠣寒。主肝臟中熱。臣　蜣螂寒。主小兒熱癇，口不開。君　羚羊角微寒。主熱在肌膚，臣　景天平。主身熱，小兒發熱驚氣。君　龍齒角平。主小兒身熱。臣　藍葉實寒。主身大熱，熱暴頭痛，發表。臣　大黃大寒。使　雄黃平。君　白鮮皮寒。主時病，出汗。臣　梔子大寒。臣　射干微溫。治時氣病，鼻塞❻，喉痹，陰毒。使　茵陳蒿平，微寒。主發黃。臣　寒水石大寒。主五內大熱。臣　青竹茹微寒。主頭痛。臣　水牛角平。主温病。使　紫草寒。主骨內❼中痛。臣　菜耳微寒。臣　虎骨平　知母寒　半夏微寒

大熱

凝水石寒，大寒　石膏大寒　滑石寒，大寒　黃芩平，大寒　知母寒　白鮮皮寒　玄參微寒　大黃大寒　沙參微寒　苦參寒　茵陳蒿平，微寒　鼠李根皮寒　竹瀝大寒　梔子大寒　蛇莓大寒　人糞汁寒　白頭蚯蚓寒　芒硝大寒　梓白皮寒。除熱。使　地膚子寒　小麥微寒。主暴熱身癢　理石寒。君　羚羊角寒。主身大熱，熱暴頭痛，發表。臣　大黃大寒　沙參微寒　白頭翁溫　女青平　芫花溫　白薇平，大寒　天靈蓋平　蕘花寒　茵陳蒿平　龜甲平。臣　小麥微寒　躑躅溫。使　白斂微寒。主熱毒。君　石膽寒。主狂語，頭發熱。使　木蘭皮寒。主小兒熱癇，口不開。君　白薇大寒。臣　升麻微寒。主肝臟中熱。臣　蜣螂寒。主大熱。臣　青竹茹微寒。主頭痛。臣　水牛角平。主温病。使　紫草寒。主骨內❼中痛。臣　菜耳微寒。臣　虎骨平　知母寒　半夏微寒　牡蠣微寒　生薑微溫　芒硝大寒　鱉甲平　柴胡平，微寒　麥門冬平，微寒

瘧

常山寒，微寒　鱉甲平　麝香溫　麻黃溫　大青大寒　防葵寒　猪苓平　防己平，溫　茵芋溫　巴豆生溫，熟寒　白頭翁溫　女青平　芫花溫　白薇平，大寒　松蘿平　天靈蓋平　蕘花寒　茵陳蒿平　龜甲平。臣　小麥微寒　躑躅溫。使　蒴藋根溫。使　竹葉平。合常山煮，主孩子久瘧極良。雞子黃和常山爲丸，用竹葉湯下，主久瘧寒熱。君　桃人平　烏梅平　牡蠣微寒　生薑微溫　芒硝大寒　鱉甲平　柴胡平，微寒　麥門冬平，微寒　蜀漆平，微溫　麻黃溫　大青大寒　防葵　巴豆生溫，熟寒　白頭翁溫　女青平　芫花溫　白薇平，大寒　茵芋溫　巴豆生溫，熟寒　猪苓平　防己平，溫　茵芋溫　巴豆生溫，熟寒　白頭翁溫　女青平　芫花溫　白薇平，大寒　松蘿平　天靈蓋平　蕘花寒　茵陳蒿平　龜甲平。臣　小麥微寒　躑躅溫。使　白斂微寒。主熱毒。君　石膽寒。主狂語，頭發熱。使　木蘭皮寒。主小兒熱癇，口不開。君　白薇大寒。臣　升麻微寒。主肝臟中熱。臣　蜣螂寒。主大熱。臣　青竹茹微寒。主頭痛。臣　水牛角平。主温病。使　紫草寒。主骨內❼中痛。臣　菜耳微寒。臣　虎骨平　知母寒　半夏微寒　牡蠣微寒　生薑微溫　芒硝大寒　鱉甲平　柴胡平，微寒　麥門冬平，微寒

中惡

麝香溫　雄黃平，寒，大温　丹砂微寒　升麻微寒　乾薑溫，大熱　巴豆溫，生温熟寒　當歸温，大温　芍藥平，微温　吳茱萸温，大熱　鬼箭寒　桃皮平　桃膠微温　烏頭温，大温　桃梟微温　桃皮平　海桐皮平　肉豆蔻温　蓬莪茂温　牛黃平。君　芎藭温。臣　苦參寒。君　梔子大寒。臣　菜耳實温。臣　桔梗温。臣　桃花平。使

勞復

鼠屎微寒　豉寒　竹瀝大寒　人糞汁寒　犀角寒　防己　虎掌温　大黃大寒　葱白平

霍亂

人參微寒，微温　术温　附子温，大熱　桂心大熱　乾薑温，大熱　橘皮温　厚朴温，大温　香薷　麋舌微温　高良薑大温　木瓜温　小蒜温　鷄屎白微寒　藊豆葉　鷄舌香微温　豆蔻温　楠材微温　蓬莪茂温　肉豆蔻温　海桐皮平　吴茱萸大熱。臣　丁香

轉筋

小蒜温　木瓜温　橘皮温　鷄舌香温　楠材微温　豆蔻温　香薷微温　杉木微温　藊豆微温　薑微温

嘔啘

厚朴温，大温　香薷微温　麋舌微温　鷄舌香微温　附子温，大熱　小蒜温　楠材微温　高良薑大温　木瓜温　桂大熱　橘皮温　枇杷葉平　麝❽香温　肉豆蔻　蘆根寒。生主啘❾　通草平。主啘。臣　青竹茹微寒。主啘嘔。臣　生蘡薁藤汁寒　人參微寒，微温　丁香温　术温

大腹水腫

大戟寒，大寒　甘遂寒，大寒　澤漆微寒　葶藶寒，大寒　芫花温，微温　巴豆温，生温熟寒　猪苓平　防己平，温　澤蘭微温　桑根白皮寒　商陸平　澤瀉寒　郁李人平　海藻寒　昆布寒　苦瓠寒　小豆平　瓜蒂寒　蠡魚寒　鯉魚寒　大豆平　蕘花寒，微寒　黄牛溺寒　海松子小温　香薷微温。主水腫。臣　麥門冬微寒。臣　穀米微寒。主逐水腫，利小便。臣　柳花寒。主腹腫。使　椒目寒。主除風水滿。使　通草平。主利水腫及小便。臣　雄黄平。君　白术温。逐風水結腫。君　秦艽微温。主下大水。臣

腸澼❿下痢

赤石脂大温　龍骨平，微寒　牡蠣平，微寒　乾薑温，大熱　黄連寒，微寒　黄芩平，大寒　當歸温，大温　附子温，大熱　禹餘糧寒，平　藜蘆寒，微寒　檗木寒　雲實温　礬石寒　阿膠平，微温　熟艾微温　陟厘大温　石硫黄温，大熱　蠟微温　烏梅平　石榴皮平　枳實寒，微寒　使君子温　金櫻子平，温　白石脂平。主水利。臣　牛角鰓温。治痢。臣　滑石寒。主僻下。君　地榆微寒。止血痢　桂心大熱。主下䘌。君　吴茱萸大熱。君　鯽魚頭温。主下痢　厚朴温。主下泄腹痛。臣　白术温。主胃虚冷痢。君　蜜平。主赤白痢。君　龜甲平。主下泄。臣　薤白温。主下赤白痢。臣　白頭翁温。使　猬皮平。主赤白痢。臣　蚺蛇膽寒。主下䘌蟲。使　柏葉微温。主血痢。君　蒲黄平。主下血。臣　小豆花平。主下痢　麯温。主腹脹，冷積下痢。臣　猪懸蹄微寒。使　鷄子平。主下痢　貝子平。主下血　白蘘荷微温。臣　葛穀平。主赤白痢。臣　青羊脂温。主下血。臣　蓯蓉微温。主赤白下痢。臣　赤白花鼠尾草微寒。主赤白下痢。使　赤地利平　桃花石温

大便不通

大黄寒，大寒　巴豆温，生温熟寒　石蜜平，微温　麻子平　牛膽大寒　猪膽微寒⓫　朴硝寒，大寒　芒硝大寒　大戟寒，大寒　檳榔温　牽牛子寒　郁李人平

小便淋

滑石寒，大寒　冬葵子及根寒　白茅根寒　瞿麥寒　榆皮平　石韋平　葶藶寒，大寒　蒲黄平　麻子平　琥珀平　石蠶寒　蜥蜴寒　胡燕屎平　衣魚温　亂髮　淋石暖　車前子寒，主淋　茯苓平。主淋，利小便。君　黄芩大寒。主利小便。臣　敗鼓皮平。主利小便。臣　澤瀉寒。主淋，利三焦停水。君　桑螵蛸平。主五淋，利小便。臣　猪苓平　石燕平　海蛤平　木通平　貝齒平　冬瓜微寒。主淋，小便不通。君

小便利

牡蠣平，微寒　龍骨平，微寒　鹿茸溫，微寒　桑螵蛸平　漏蘆寒，大寒　土瓜根寒　鶏肫溫　桑白皮寒　鹿茸溫，微寒　莖微寒　鶏腸草微寒　菖蒲溫。止小便。君　蒟醬溫。主尿不節。臣　山茱萸平

溺血

戎鹽寒　蒲黃平　龍骨平，微寒　鹿茸溫，微溫　乾地黃寒　葱涕平　牛膝平　車前子寒　柏子并葉平，溫

消渴

白石英微溫　石膏微寒，大寒　茯神平　麥門冬平，大寒　黃連寒，微寒　知母寒　栝樓根寒　茅根寒　枸杞根大寒　小麥微寒　簟竹葉大寒　土瓜根寒　葛根平　李根大寒　蘆根寒　菰根大寒　冬瓜微寒　馬乳冷　牛乳微寒　羊乳溫　桑根白皮寒　茯苓平。主口乾。君　菟絲子平。主口⑫乾，消渴　芋汁寒。止渴。使　牛膽大寒。主渴，利中焦熱。君　兔骨平。治熱中消渴。臣　猪苓平。主消渴痢。使　古屋瓦苔寒。主消渴

黃疸

茵蔯蒿平，微寒　梔子寒，大寒　紫草寒，大寒　白鮮皮寒　生鼠微溫　大黃寒，大寒　猪屎寒　瓜蒂寒　栝樓寒　秦艽平　黃芩大寒　牡鼠微寒　鹿茸溫，微寒

上氣咳嗽

麻黃溫，微溫　杏人溫　白前微溫　橘皮溫　半夏平，生微寒，微溫　款冬花溫　五味子溫　紫苑溫　桂心大熱　威靈仙溫　射干微溫。主胸中結氣。主痰冷，腹內諸冷。臣　巴豆溫。主痰飲留結，利水穀，破腸中冷。　朴硝大寒。主痰滿停結。君　高良薑大溫　細辛溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫　枳實寒，微寒　橘皮溫　半夏平，生微寒，熟溫　生薑微溫　甘竹葉大寒　蕘花微寒　術溫　細辛溫　蜀椒溫，大熱　半夏平，生微寒熟溫　生薑微溫　款冬花溫　五味子溫　大熱。主心中寒冷，不下食。使　吳茱萸大熱。主痰冷，腹內諸冷。臣　巴豆溫。主痰飲留結，利水穀，破腸中冷。　朴硝大寒。主痰滿停結。君　高良薑大溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫　枳實寒，微寒　橘皮溫　人參微寒，微溫　白芷溫　鷄子微寒　薤白溫　附子大溫　橘皮溫　人參微寒，微溫　白芷溫　鷄子微寒　薤白溫　附子大溫　人參微寒，微溫　芍藥平，微寒　芫花溫，微溫　前胡微寒　甘遂寒，大寒　芒硝大寒　茯苓平　柴胡平，微寒　芫花溫，微溫　乾薑溫，大熱　桂心大熱　蜀椒溫，大熱　細辛溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫⑮　半夏平，生微寒，熟溫　麥門冬平，大寒　白芷溫　鷄子微寒　薤白溫　附子大溫　人參微寒，微溫　芍藥平，微寒　芫花溫，微溫　前胡微寒　甘遂寒，大寒　芒硝大寒　茯苓平　柴胡平，微寒　芫花溫，微溫　乾薑溫，大熱　桂心大熱　蜀椒溫，大熱　術溫　細辛溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫　枳實寒，微寒　橘皮溫　半夏平，生微寒，熟溫　生薑微溫　甘竹葉大寒　蕘花微寒　威靈仙溫　射干微溫。主胸中結氣。主痰冷，腹內諸冷。臣　巴豆溫。主痰飲留結，利水穀，破腸中冷。　朴硝大寒。主痰滿停結。君　高良薑大溫

痰飲

大黃寒，大寒　甘遂寒，大寒　芒硝大寒　茯苓平　柴胡平，微寒　芫花溫，微溫　乾薑溫，大熱　桂心大熱　蜀椒溫，大熱　術溫　細辛溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫　枳實寒，微寒　橘皮溫　半夏平，生微寒，熟溫　生薑微溫⑭　鉛丹微寒　甘竹葉大寒　旋復花溫　白豆蔻大溫　附子大熱。主嘔逆。臣　竹茹微寒。主乾嘔。臣　訶黎勒　草豆蔻

心腹冷痛

當歸溫，大溫　人參微寒，微溫　芍藥平，微寒　桔梗微溫　乾薑溫，大熱　桂心大熱　蜀椒溫，大熱　乾薑溫，大熱　細辛溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫　枳實寒，微寒　橘皮溫　人參微寒，微溫　白芷溫　鷄子微寒　薤白溫　附子大溫　人參微寒，微溫　芍藥平，微寒　芫花溫，微溫　前胡微寒　甘遂寒，大寒　芒硝大寒　茯苓平　柴胡平，微寒　芫花溫，微溫　乾薑溫，大熱　桂心大熱　蜀椒溫，大熱　術溫　細辛溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫　枳實寒，微寒　橘皮溫　半夏平，生微寒，熟溫　生薑微溫　甘竹葉大寒　蕘花微寒　威靈仙溫　射干微溫。主胸中結氣。主痰冷，腹內諸冷。臣　巴豆溫。主痰飲留結，利水穀，破腸中冷。　朴硝大寒。主痰滿停結。君　高良薑大溫

腹脹滿

麝香溫　甘草平　人參微寒，微溫　術溫　桔梗微溫　厚朴溫，大溫　百合平　厚朴溫，大溫　菴蕳子微寒　枳實寒，微寒　桑根白皮寒　皂莢溫　麴溫　蘗溫　檳榔溫

宿食

大黃寒，大寒　巴豆溫，生溫熟寒　朴硝寒，大寒　柴胡平，微寒　術溫　桔梗微溫　厚朴溫，大溫　皂莢溫　蜀椒溫，大熱　百部根微溫　乾薑溫，大熱　貝母平，微寒　皂莢溫　蛤蚧平　縮沙蜜溫　鍾乳溫。主上⑫氣。臣　獺肝平。主氣噦。使　烏頭大熱。主噦逆上氣。使　藜蘆微寒。主噦逆。使　鯉魚平。燒末，主咳噦。臣　海蛤平。主上氣。臣　皂莢溫　麴溫　蘗溫　檳榔溫

嘔吐

厚朴溫，大溫　橘皮溫　人參微寒，微溫　半夏平，生微寒，熟溫　麥門冬平，大寒　白芷溫　鷄子微寒　薤白溫　附子大溫　人參微寒，微溫　芍藥平，微寒　芫花溫，微溫　前胡微寒　甘遂寒，大寒　芒硝大寒　茯苓平　柴胡平，微寒　芫花溫，微溫　乾薑溫，大熱　桂心大熱　蜀椒溫，大熱　術溫　細辛溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫　枳實寒，微寒　橘皮溫　半夏平，生微寒，熟溫　生薑微溫　甘竹葉大寒　蕘花微寒　威靈仙溫　射干微溫。主胸中結氣。主痰冷，腹內諸冷。臣　巴豆溫。主痰飲留結，利水穀，破腸中冷。　朴硝大寒。主痰滿停結。君　高良薑大溫

腹脹滿

麝香溫　甘草平　人參微寒，微溫　術溫　桔梗微溫　厚朴溫，大溫　百合平　厚朴溫，大溫　菴蕳子微寒　枳實寒，微寒　桑根白皮寒　皂莢溫　麴溫　蘗溫　檳榔溫　乾薑溫，大熱　細辛溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫　枳實寒，微寒　橘皮溫　半夏平，生微寒，熟溫　麥門冬平，大寒　白芷溫　鷄子微寒　薤白溫　附子大溫　人參微寒，微溫　芍藥平，微寒　芫花溫，微溫　前胡微寒　甘遂寒，大寒　芒硝大寒　茯苓平　柴胡平，微寒　芫花溫，微溫　乾薑溫，大熱　桂心大熱　蜀椒溫，大熱　術溫　細辛溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫　枳實寒，微寒　橘皮溫　半夏平，生微寒，熟溫　生薑微溫　甘竹葉大寒　蕘花微寒　威靈仙溫　射干微溫。主胸中結氣。主痰冷，腹內諸冷。臣　巴豆溫。主痰飲留結，利水穀，破腸中冷。　朴硝大寒。主痰滿停結。君　高良薑大溫

心腹冷痛

當歸溫，大溫　人參微寒，微溫　芍藥平，微寒　桔梗微溫　乾薑溫，大熱　桂心大熱　蜀椒溫，大熱　乾薑溫，大熱　細辛溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫　枳實寒，微寒　橘皮溫　人參微寒，微溫　白芷溫　鷄子微寒　薤白溫　附子大溫　人參微寒，微溫　芍藥平，微寒　芫花溫，微溫　前胡微寒　甘遂寒，大寒　芒硝大寒　茯苓平　柴胡平，微寒　芫花溫，微溫　乾薑溫，大熱　桂心大熱　蜀椒溫，大熱　術溫　細辛溫　旋復花溫　厚朴溫，大溫　枳實寒，微寒　橘皮溫　半夏平，生微寒，熟溫　生薑微溫　甘竹葉大寒　蕘花微寒　威靈仙溫　射干微溫。主胸中結氣。主痰冷，腹內諸冷。臣　巴豆溫。主痰飲留結，利水穀，破腸中冷。　朴硝大寒。主痰滿停結。君　高良薑大溫

椒温，大熱 附子温，大熱 吴茱萸温，大熱 烏頭温，大熱 术温 甘草平 礬石大熱，生温熟熱 腽肭臍大熱 肉豆蔻温 零陵香平 紅豆蔻温 胡椒大温 芎藭温。臣 黄芩大寒。臣 戎鹽寒。臣 厚朴温。臣 葶藶平。臣 蒜温 高良薑大温 蜂子平，微寒 蓬莪茂温

腸鳴

丹參微寒 桔梗微温 海藻寒 昆布寒 半夏生微寒，熟温

心下滿急

茯苓平 枳實寒，微寒 半夏平，生微寒，熟温 橘皮温 石膏寒 术温 生薑微温 百合平 橘皮大温 石膏大熱，生温熟温 菴蔺子微寒。主心下堅。臣 杏人温。主心下急滿。臣

心煩

石膏微寒，大寒 滑石寒，大寒 梔子寒，大寒 茯苓平 貝母平，微寒 通草平 李根大寒 竹瀝大寒 烏梅平 鷄子微寒 豉寒 甘草平 知母寒 尿寒 盧會寒 天竺黄寒 胡黄連平 王不留行平。主心煩。君 石龍芮平。主心煩。君 玉屑平。主胃中熱，心煩。君 寒水石大寒。鷄胆胵微寒。除熱，主煩熱。臣 藍汁寒。主煩熱。君 楝實寒。主大熱，狂。使 廩米温。止煩熱。臣 敗醬微寒。主煩熱。臣 梅核人平。除煩熱。臣 蒺藜子微寒。主心煩。臣 酸棗平。主小兒癇熱，口不開，心煩。君 龍齒角平。主小兒身熱。臣

積聚癥瘕

空青寒，大寒 朴硝寒，大寒 芒硝 石硫黄温，大熱⑯ 粉錫寒 大黄寒，大寒 狼毒平 巴豆温，生温熟寒 附子温，大熱 烏頭温，大熱 紫苑温 羚羊角寒，微寒 鮀熱 苦參寒 柴胡平，微寒 鱉甲平 蜈蚣温 赭魁平 白馬溺微寒 鮀甲微温 丹雄鷄微温，微寒 犀角寒，微寒 羖羊角温，微寒 茯苓平 蚱蟬寒 縮砂蜜温 鬼臼温，微温 鰡魚微温 續隨子温 京芫花温，微温 威靈仙温 牡蒙平 三棱平 太陰玄精⑰ 威喜 貫衆微寒。主腸中邪氣積聚。使 甘遂寒。主散癥結積聚。使 理石寒。主破積聚堅結。使 蜀漆平。主癥結癖氣。使 豬肚微温 天雄大熱。主破癥結積聚。使 猪肪 金牙平 野狼肝平 芫青微温 徐長卿温 葛温 馬目毒公温，微温 女青平 虎骨平 狸骨温 鸛骨 獺肝平 芫青 白僵蠶平 鬼臼温，微温 白鹽寒 天靈蓋平 腽肭臍大熱 麝香温，君 卷柏温，臣 敗天公平，臣 蚱蟬寒 白鮮皮寒 牛黄平 龍齒平，微寒 雷丸寒，微寒 安息香平 代赭

驚邪

雄黄平，寒，大温 丹砂微寒 紫石英温 龍齒平 龍膽寒，大寒 防葵寒 馬目毒平 茯神平 龍齒平，微寒 雷丸寒，微寒 白鮮皮寒 牛黄平 龍齒平，微寒 毒公温，微温 升麻平，微寒 麝香温 人參微寒，微温 沙參微寒 桔梗微温 白薇平，大寒 遠志温 柏實平 鬼箭寒 鬼督郵平 小草温 卷柏温，平，微寒 紫苑温 羚羊角寒，微寒 鮀甲微温 丹雄鷄微温，微寒 犀角寒，微寒 羖羊角温，微寒 茯苓平 蚱蟬寒 縮砂蜜温 鬼臼温，微温 白僵蠶平 蛇床子平 蛇蜕平 蜣螂寒 白僵蠶平 蛇床子平 蛇蜕平 蜣螂寒 白斂平，微寒 龍齒角平 牛黄平 防葵寒 牡丹寒，微寒 藤微寒 白馬目平 鉛丹微寒 蚱蟬寒 白狗血温 豚卵温 猪、牛、犬齒平 熊膽寒 盧會寒 琇瑁寒 白馬懸蹄平 淡竹瀝大寒。臣 蛇衙微寒。主寒熱。臣 秦白皮微寒，大寒 頭髮温 鷄子平。主發熱 狗糞中骨平。臣 露蜂房平。使 白鮮皮寒。臣 雀瓮平。使 甘遂寒。使 升麻微寒。君 大黄大寒。使 銀屑

喉痹痛

升麻平，微寒　射干平，微温　杏人温　蒺藜子温，微寒　棘針寒　絡石温，微寒　百合平　篁竹葉大寒　苦竹葉大寒　細辛温　豉寒。治喉閉不通。使當歸温。切，酢熬，傅腫上。亦主喉閉不通。君

噎病

羚羊角寒，微寒　通草平　青竹茹微寒　頭垢微寒　蘆根寒　春杵頭細糠　鸕鷀頭微寒。主噎不通

鯁

鯉魚⑱頭骨温　獺骨平　鸕鷀骨微寒

齒痛

當歸温，大温　獨活平　細辛温　蜀椒温，大熱　茭蒿温　附子温，大熱　莽草温　礬石寒　蛇床子平　生地黄大寒　萇荂子寒　鷄舌香微温　車下李根寒。禹錫云：郁李根也　馬懸蹄平　雄雀屎温　楓香脂平　金釵火燒針齒痛即止　烏頭大熱。使　白頭翁温。使　酒漬枳根微寒

口瘡

黄連寒，微寒　檗木寒　龍膽寒，大寒　升麻平，微寒　苦竹葉大寒　石蜜平　酪寒　酥微寒　豉寒　乾地黄平

吐唾血

羚羊角寒，微寒　白膠平，温　戎鹽寒　柏葉微温　艾葉微温　水蘇微温　生地黄大寒　大小薊温　蠐螬微温，微寒　飴糖微温　伏龍肝微温　黄土平　鐺墨馬通微温。使　小麥微寒　栀子寒，大寒　曾青小寒　決明子平，微寒　檗木寒　白微寒　鯉魚膽寒　田中螺大寒　車前子寒　蒴藋子微温　細辛温。明目。君　銅青寒。主風爛泪出　秦皮微寒。主目赤熱泪出　石榴皮温。主目赤痛，泪下。使　白薇大寒。主目赤熱

鼻衄血

礬石寒　蒲黄平　蝦蟆藍寒。臣　鷄蘇微温。臣　大薊温　艾葉微温　桑耳平　竹茹微寒　猬皮平　溺垽平　麝香温　馬目毒公温，微温　伏藍寒　狗膽平　燒亂髮微温　生地黄大寒　熱馬通微温。傅頂止衄血　桂心大熱　薤核温，微寒　薰草平　瓜蒂寒

耳聾

磁石寒　菖蒲温，平　葱涕平　雀頭平　白鵝膏　鯉魚腦温　絡石温微寒　白頸蚯蚓寒，大寒　生油麻微寒，君　烏賊魚骨微温。臣　土瓜寒　烏鷄膏寒　龍腦微寒

鼻息肉

藜蘆寒，微寒　礬石寒　地膽寒　通草平　白狗膽平　桂心大熱　細辛温。君　瓜蒂寒。臣　雄黄平

目赤熱痛

黄連寒，微寒　薤核温，微寒　石膽寒　空葉微温　艾葉微温　生地黄大寒　曾青小寒　決明子平，微寒　檗木寒　青寒，大寒　栀子寒，大寒　鷄子白微寒　鯉魚膽寒　田中螺大寒　車前子寒　蒴藋子微温　細辛温。明目。君　銅青寒。主風爛泪出　石榴皮温。主目赤痛，泪下。使　白薇大寒。主目赤熱

目膚翳

秦皮微寒，大寒　細辛温　真珠寒　貝子平　石決明平　麝香温　馬目毒公温，微温　伏翼平　青羊膽平　蠐螬汁微温，微寒　菟絲子平　石蟹寒　丹砂微寒

聲喑啞

菖蒲温，平　石鍾乳温　孔公孽温　皂莢温　苦竹葉大寒　麻油微寒　通草平。利九竅，出聲。臣　菱平　藁本温，微寒　木蘭寒　栀子寒，大寒　紫草　白瓜子平，寒　蜂子微寒。君　白斂平。主

面皯皰

菟絲子平　麝香温　熊脂微寒，微温　女

光澤 白术温。君 山茱萸平。臣 冬瓜子平，寒 白僵蠶平 蜀葵花平 白附子平

髮禿落

桑上寄生平 秦椒温，生温熟寒 桑根白皮 麻子平 桐葉寒 猪膏微寒 雁肪平 馬鬐膏平 松葉温 棗根 鷄肪寒 荆子微寒，温。臣。蔓荆子也

滅瘢

鷹屎白平 白僵蠶平 衣魚温 白附子平 蜜陀僧平

金瘡

石膽寒 薔薇温，微寒 地榆微寒 艾葉微温 王不留行平 白頭翁温 鈎樟根 石灰温 狗頭骨平 薤白温。主金瘡，止痛，瘡中風，水腫。臣 車前子寒。止血 當歸温。君 蘆竹籜寒。生肉。使 桑灰湯平。臣 蛇銜微寒。臣 葛根平。臣 水楊花寒 突厥白寒

踒折

生鼠微温 生龜平 生地黄大寒 烏雄鷄血平 烏鷄骨平 李核人平 自然銅平 木鱉子温 骨碎補温 無名異平 續斷微温。臣

瘀血

蒲黄平 琥珀平 羚羊角寒，微寒 牛膝平 大黄寒，大寒 乾地黄寒 朴硝寒，大寒 紫參寒，微寒 桃人平 虎杖微温 茅根寒 䗪蟲寒 虻蟲微寒 水蛭平，微寒 蜚蠊寒 天南星 鮑魚温。主踒跌 飴糖微温。去血病。臣 神屋平。主⑲血 芍藥微寒。主逐賊血 菴蕳子微寒，臣 鹿茸温。主血流在腹。臣 車前子寒。主瘀血痛 牡丹微寒。主除留血。使 藕汁寒。主消血 天名精地菘是也。寒 射干微温。主除留血、老血。使

火灼

柏白皮微寒 生胡麻平 鹽寒。臣 豆醬 井底泥寒 醋温 黄芩平，大寒 牛膝 栀子寒，大寒

圖經衍義本草上卷四

❶寒：原作「悉」，據晦明軒本作改。
❷注：原作「上」，據晦明軒本作改。
❸痹：原脱，據晦明軒本補。
❹松節：晦明軒本「節」下有「温」字。
❺温：晦明軒本作「微」，連下讀。
❻塞：原作「寒」，據晦明軒本改。
❼内：晦明軒本作「肉」。
❽麝：原作「麋」，據晦明軒本改。
❾啘：原作「宛」，據晦明軒本改。
⑩僻：原作「僻」，據晦明軒本改。下同。
⑪寒：原作「温」，據晦明軒本改。
⑫口：原脱：據晦明軒本補。
⑬上：原作「止」，據晦明軒本改。
⑭温：原作「寒」，據晦明軒本改。
⑮温：原作「寒」，據晦明軒本改。
⑯熱：原作「寒」，據晦明軒本改。
⑰積：晦明軒本作「精」。
⑱鯉魚：晦明軒本作「狸頭」。
⑲主：原脱，據晦明軒本補。

圖經衍義本草上卷五

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

序例下

癰疽

絡石溫 黃耆微溫 白斂平，微寒 烏喙微溫 通草平 敗醬平，微寒 白及平，微寒 大黃寒，大寒 半夏平，生微寒熟溫 玄參微寒 薔蘼微寒 鹿角溫，微溫 蝦蟆寒 土蜂子平 礜石火燒，於苦酒中淬，杵破，醋和貼之，即消 烏賊魚骨微溫。臣 伏龍肝微溫 甘蕉根大寒 鹿茸溫。臣 升麻微寒。貼胃❶毒。君 側子大熱。主癰腫 赤小豆平。主下部瘡。臣 及己平 狼跋寒 桐葉寒 虎骨平 猪肚微溫 茼茹寒，微寒 黎蘆寒，微寒 石灰溫 狸骨溫 鐵漿平 野駝脂 苦參寒。主諸惡瘡軟癰❷。君 白石脂平。主疽痔 蘩蔞平。主積年惡瘡，煮洗立差。使 菖蒲溫。主風瘙。君 五加皮微寒。使 梓葉微寒。使 穀葉平。洗之令生肉。臣 萹竹平。主浸淫疥惡瘡。使 天麻平。主下部瘡。臣 黃耆微溫 五靈脂溫 五倍子平 龜甲平 赤石脂大溫。君 檗木寒。主瘡疽惡瘡，煮洗立差。使 葵根寒。君 五加皮微寒。使 萹蓄平 猬皮平 猪懸蹄肉。臣 萹竹平。主浸淫疥惡瘡。使 槐子寒。君 蛇蜕平 臘月鴿鴿平。作屑，主五痔 鱉甲平。主五痔。臣 腐木糯寒。臣 竹茹微寒。臣 菜耳微寒。臣 槐鵝微溫 柏葉平 艾葉微溫 芎根寒。主小兒赤丹。使 梔子平。主五痔。臣 紫草寒。主小兒面上瘡。臣 馬鞭草平。主下部瘡。臣 楡皮平。臣 艾葉微溫。苦酒煎，主除癬及下部瘡。臣 柳華寒。主馬疥惡瘡，煮洗立差。使 蝦蟆寒。臣 車前子寒 蛇銜微寒 常山寒，微寒 狼毒平 側子大熱 連翹平 昆布寒 狸骨溫 王不留行平 斑猫寒 地膽寒 鱉甲平 蟾蜍寒。臣 附子大熱。使 漏蘆寒。主諸癰 白礬寒。主癰惡瘡瘰癧。使 雄黃平，寒，大溫 礬石大熱，生溫熟熱 蒴茹寒，微寒 藜蘆寒，微寒 石灰溫 狸骨溫 鐵漿平 野駝脂 苦參寒。主諸惡瘡軟癰❷。君 白石脂平。主疽痔 蘩蔞平。主積年惡瘡。臣 菖蒲溫。主風瘙。君 五加皮微寒。使 穀葉平。洗之令生肉。臣 萹竹平。主浸淫疥惡瘡。使 槐子寒。君 蛇蜕平 臘月鴿鴿平。作屑，主五痔 鱉甲平。主五痔。臣 腐木糯寒。臣 竹茹微寒。臣 菜耳微寒。臣 槐鵝微溫 柏葉平 艾葉微溫 芎根寒。主小兒赤丹。使 梔子平。主五痔。臣 紫草寒。主小兒面上瘡。臣 馬鞭草平。主下部瘡。臣 楡皮平。臣 艾葉微溫。苦酒煎，主除癬及下部瘡。臣 柳華寒。主馬疥惡瘡，煮洗立差。使 蝦蟆寒。臣 車前子寒 蛇銜微寒 常山寒，微寒 狼毒平 側子大熱 連翹平 昆布寒 狸骨溫 王不留行平 斑猫寒 地膽寒 鱉甲平 蟾蜍寒。臣 附子大熱。使 漏蘆寒。主諸癰 白礬寒。主癰惡瘡瘰癧。使 雄黃平，寒，大溫 礬石大熱，生溫熟熱 蒴茹寒，微寒 藜蘆寒，微寒 石灰溫 狸骨溫 鐵漿平 野駝脂 苦參寒。主諸惡瘡軟癰❷。君 白石脂平。主疽痔 蘩蔞平。主積年惡瘡。臣 菖蒲溫。主風瘙。君 五加皮微寒。使 穀葉平。洗之令生肉。臣 萹竹平。主浸淫疥惡瘡。使 槐子寒。君 蛇蜕平 臘月鴿鴿平。作屑，主五痔 鱉甲平。主五痔。臣 腐木糯寒。臣 竹茹微寒。臣 菜耳微寒。臣 槐鵝微溫 柏葉平 艾葉微溫 芎根寒。主小兒赤丹。使 梔子平。主五痔。臣 紫草寒。主小兒面上瘡。臣 馬鞭草平。主下部瘡。臣 楡皮平。臣 艾葉微溫。苦酒煎，主除癬及下部瘡。臣 柳華寒。主馬疥惡瘡，煮洗立差。使 蝦蟆寒。臣 車前子寒 蛇銜微寒 常山寒，微寒 狼毒平 側子大熱 連翹平 昆布寒 狸骨溫 王不留行平 斑猫寒 地膽寒 鱉甲平 蟾蜍寒。臣 附子大熱。使 漏蘆寒。主諸癰 白礬寒。主癰惡瘡瘰癧。使 雄黃平，寒，大溫 礬石大熱，生溫熟熱 蒴茹寒，微寒 藜蘆寒，微寒 石灰溫 狸骨溫 鐵漿平 野駝脂 苦參寒。主諸惡瘡軟癰❷。君 白石脂平。主疽痔 蘩蔞平。主積年惡瘡。臣 菖蒲溫。主風瘙。君 五加皮微寒。使 穀葉平。洗之令生肉。臣 萹竹平。主浸淫疥惡瘡。使 槐子寒。君 蛇蜕平 臘月鴿鴿平。作屑，主五痔 鱉甲平。主五痔。臣 腐木糯寒。臣 竹茹微寒。臣 菜耳微寒。臣 槐鵝微溫 柏葉平 艾葉微溫 芎根寒。主小兒赤丹。使 梔子平。主五痔。臣 紫草寒。主小兒面上瘡。臣 馬鞭草平。主下部瘡。臣 楡皮平。臣 艾葉微溫。苦酒煎，主除癬及下部瘡。臣 柳華寒。主馬疥惡瘡，煮洗立差。使 蝦蟆寒。臣 車前子寒 蛇銜微寒 常山寒，微寒 狼毒平 側子大熱 連翹平 昆布寒 狸骨溫 王不留行平 斑猫寒 地膽寒 鱉甲平 蟾蜍寒。臣 附子大熱。使 漏蘆寒。主諸癰 白礬寒。主癰惡瘡瘰癧。使 雄黃平，寒，大溫 礬石大熱，生溫熟熱 蒴茹寒，微寒 藜蘆寒，微寒 石灰溫 狸骨溫 鐵漿平 野駝脂 苦參寒。主諸惡瘡軟癰❷。君 白石脂平。主疽痔 蘩蔞平。主積年惡瘡。臣 菖蒲溫。主風瘙。君 五加皮微寒。使 穀葉平。洗之令生肉。臣 萹竹平。主浸淫疥惡瘡。使 槐子寒。君 蛇蜕平 臘月鴿鴿平。作屑，主五痔 鱉甲平。主五痔。臣 腐木糯寒。臣 竹茹微寒。臣 菜耳微寒。臣 槐鵝微溫 柏葉平 艾葉微溫 芎根寒。主小兒赤丹。使 梔子平。主五痔。臣 紫草寒。主小兒面上瘡。臣 馬鞭草平。主下部瘡。臣 楡皮平。臣 艾葉微溫。苦酒煎，主除癬及下部瘡。臣 柳華寒。主馬疥惡瘡，煮洗立差。使 蝦蟆寒。臣 車前子寒 蛇銜微寒 常山寒，微寒 狼毒平 側子大熱 連翹平 昆布寒 狸骨溫 王不留行平 斑猫寒 地膽寒 鱉甲平 蟾蜍寒。臣 附子大熱。使 漏蘆寒。主諸癰 白礬寒。主癰惡瘡瘰癧。使 雄黃平，寒，大溫 礬石大熱，生溫熟熱 蒴茹寒，微寒 藜蘆寒，微寒 石灰溫 狸骨溫 鐵漿平 野駝脂 苦參寒。主諸惡瘡軟癰❷。君 白石脂平。主疽痔 蘩蔞平。主積年惡瘡。臣 菖蒲溫。主風瘙。君 五加皮微寒。使 穀葉平。洗之令生肉。臣 萹竹平。主浸淫疥惡瘡。使 槐子寒。君 蛇蜕平 臘月鴿鴿平。作屑，主五痔 鱉甲平。主五痔。臣 腐木糯寒。臣 竹茹微寒。臣 菜耳微寒。臣 槐鵝微溫 柏葉平 艾葉微溫 芎根寒。主小兒赤丹。使 梔子平。主五痔。臣 紫草寒。主小兒面上瘡。臣 馬鞭草平。主下部瘡。臣 楡皮平。臣 艾葉微溫。苦酒煎，主除癬及下部瘡。臣 柳華寒。主馬疥惡瘡，煮洗立差。使 蝦蟆寒。臣 車前子寒 蛇銜微寒 常山寒，微寒 狼毒平 側子大熱 連翹平 昆布寒 狸骨溫 王不留行平 斑猫寒 地膽寒 鱉甲平 蟾蜍寒。臣 附子大熱。使 漏蘆寒。主諸癰 白礬寒。主癰惡瘡瘰癧。使 雄黃平，寒，大溫 礬石大熱，生溫熟熱 蒴茹寒，微寒 藜蘆寒，微寒 石灰溫 狸骨溫 鐵漿平 野駝脂 苦參寒。主諸惡瘡軟癰❷。君 白石脂平。主疽痔 蘩蔞平。主積年惡瘡。臣 菖蒲溫。主風瘙。君 五加皮微寒。使 穀葉平。洗之令生肉。臣 萹竹平。主浸淫疥惡瘡。使 槐子寒。君 蛇蜕平 臘月鴿鴿平。作屑，主五痔 鱉甲平。主五痔。臣 腐木糯寒。臣 竹茹微寒。臣 菜耳微寒。臣 槐鵝微溫 柏葉平 艾葉微溫 芎根寒。主小兒赤丹。使 梔子平。主五痔。臣 紫草寒。主小兒面上瘡。臣 馬鞭草平。主下部瘡。臣 楡皮平。臣 艾葉微溫。苦酒煎，主除癬及下部瘡。臣 柳華寒。主馬疥惡瘡，煮洗立差。使 蝦蟆寒。臣 車前子寒 蛇銜微寒 常山寒，微寒 狼毒平 側子大熱 連翹平 昆布寒 狸骨溫 王不留行平 斑猫寒 地膽寒 鱉甲平 蟾蜍寒。臣 附子大熱。使 漏蘆寒。主諸癰 白礬寒。主癰惡瘡瘰癧。使 雄黃平，寒，大溫 礬石大熱，生溫熟熱

惡瘡

雄黃平，寒，大溫 雌黃平，大寒 粉錫寒 石硫黃溫，大熱 礬石寒 松脂溫 蛇床子平 地楡微寒 水銀寒 蛇銜微寒 白斂平，微寒 漏蘆寒，大寒 檗木寒 占斯溫 雚菌平，微溫 莽草溫 青葙子微寒 白及平，微寒 楝實寒

漆瘡

蟹寒 茱萸皮溫，大熱 苦芙微寒 鷄子白微寒 鼠查微溫 井中苔萍大寒 秫米微寒 杉材微溫 石蟹寒 漆姑葉微寒 芒硝大寒。傅漆瘡。君 黃櫨木寒

瘿瘤

小麥微寒 海藻寒 昆布寒 文蛤平 半夏平，生微寒熟溫 貝母平，微寒 通草平 松蘿平 連翹平 白頭翁溫 海蛤平 生薑微溫 玄參微寒。主散頸下腫核。臣 杜蘅溫。

瘿瘤

雄黃平，寒，大溫 礬石大熱，生溫熟熱 常山寒，微寒 狼毒平 側子大熱 連翹平 昆布寒 狸骨溫 王不留行平 斑猫寒 地膽寒 鱉甲平 蟾蜍寒。臣 附子大熱。使 漏蘆寒。主諸癰 白礬寒。主癰惡瘡瘰癧。使 蛇膽微寒 大蒜溫 戎鹽寒 艾葉煎微溫。

脫肛

鱉頭平 卷柏溫，平，微寒 鐵精微溫 東壁土平 蝸牛寒 生鐵微寒

蠱

青葙子微寒 苦參寒 蚺蛇膽寒 蝮蛇膽微寒 大蒜溫 戎鹽寒 艾葉煎微溫。

臣 馬鞭草平

蛔蟲

薏苡根微寒 藿菌平，微温 乾漆温 楝根微寒 茱萸根温，大熱 艾葉微温❸ 石榴根平。使 檳榔温。君 鶴虱平 龍膽寒，大寒

寸白

檳榔温 蕪荑平 貫衆微寒 狼牙寒 雷丸寒，微寒 青葙子微寒 橘皮温 茱萸根温，大熱 石榴根平 楮子平 桑根白皮寒。臣

虚勞

丹砂微寒 空青寒，大寒 石鍾乳温 紫石英温 白石英微温 磁石寒 龍骨平，微寒 茯苓平 黄耆微温 乾地黄寒 茯神平 天門冬平，大寒 署預温，平 石斛平 沙參微寒 人參微寒，微温 玄參微寒 蓉微温 續斷微温 澤瀉寒 牡丹寒，微寒 芍藥平，微寒 牡桂温 遠志温 當歸温，大温 牡蠣平，微寒 五加皮温，微寒 白棘寒 覆盆子平 巴戟天微温 牛膝平 杜仲平，温 菟絲子平 蛇床子平 枸杞子微寒 大棗平 枸杞根大寒 麻子平 胡麻平 葛根平 補骨脂大温 黄雌鷄平。臣 甘草平 補益五臟，下氣，長肌肉，制諸藥。君 萎蕤平 補不足，除虚勞客熱，頭痛。君 甘菊平。補中 益五臟。君 紫苑温 主勞氣。臣 藕實寒 補中養氣。君 蕪菁蘆菔温 益五臟，輕身。君 赤石脂大温 君 薔薇微寒 君 雲母平 主氣益精。君 枳實微寒 主虚羸少氣。君 防葵寒 君

陰痿

白石英微温 陽起石微温 巴戟天微温 肉蓯蓉微温 五味子温 蛇床子平 地膚子寒 鐵精微温 白馬莖平 菟絲子平 雀卵温 樗鷄平 原蠶蛾熱 狗陰莖平 五加皮微寒 主陰痿下濕。使 覆盆子平。長陰。臣 牛膝平 主陰濕。君 石南平，使 白及微寒 主陰痿，使 小豆花平 主陰痿不起。使 山茱萸平，微温 天雄温，大温

陰癪

海藻寒 鐵精微温 狸陰莖温 狐陰莖微寒 蜘蛛微寒 蒺藜温，微寒 鼠陰平 蝦蟆衣寒 主陰腫 地膚子寒 槐皮煮汁，主陰腫 杞子微寒 大棗平 枸杞根大寒 麻子平 胡麻平 葛根平 補骨脂大温 黄雌鷄平。臣 甘草平 補益五臟，下氣，長肌肉，制諸藥。君 萎蕤平 補不足，除虚勞客熱，頭痛。君 甘菊平。補中 益五臟。君 紫苑温 主勞氣。臣 藕實寒 補中養氣。君 蕪菁蘆菔温 益五臟，輕身。君 赤石脂大温 君 薔薇微寒 君 雲母平 主氣益精。君 枳實微寒 主虚羸少氣。君 防葵寒 君

陰痿

白石英微温 陽起石微温 巴戟天微温 肉蓯蓉微温 五味子温 蛇床子平 地膚子寒 鐵精微温 白馬莖平 菟絲子平 雀卵温 樗鷄平 原蠶蛾熱 狗陰莖平 五加皮微寒 主陰痿下濕。使 覆盆子平。長陰。臣 牛膝平 主陰濕。君 石南平，使 白及微寒 主陰痿，使 小豆花平 主陰痿不起。使 山茱萸平，微温 天雄温，大温

陰癪

海藻寒 鐵精微温 狸陰莖温 狐陰莖微寒 蜘蛛微寒 蒺藜温，微寒 鼠陰平 蝦蟆衣寒 主陰腫 地膚子寒 槐皮煮汁，主陰腫 杞子微寒 大棗平 枸杞根大寒 麻子平 胡麻平 葛根平 補骨脂大温 黄雌鷄平。臣 甘草平 補益五臟，下氣，長肌肉，制諸藥。君 萎蕤平 補不足，除虚勞客熱，頭痛。君 甘菊平。補中 益五臟。君 紫苑温 主勞氣。臣 藕實寒 補中養氣。君 蕪菁蘆菔温 益五臟，輕身。君 赤石脂大温 君 薔薇微寒 君 雲母平 主氣益精。君 枳實微寒 主虚羸少氣。君 防葵寒 君

囊濕

五加皮温，微寒 虎掌微温 菴蕳子微寒，微温 蛇床子平 牡蠣平，微寒 白龍骨平，微寒 鹿茸温，微温 桑螵蛸平 車前子葉寒 澤瀉寒 石榴皮平 獐骨微温 五味子温。主泄精 棘刺寒 薰草平。臣 石斛平。君 鍾乳温。臣 菟絲子平。主精自出。君 麥門冬微寒。臣

好眠

通草平

不得眠

酸棗人平 榆葉平 細辛温 沙參微寒

腰痛

杜仲平，温 蓐蘚 狗脊平，微温 梅實平 鱉甲平 五加皮温，微寒 菝葜平，温 爵床寒 木鱉子温 牡丹微寒。使 石斛平。君 附子大熱。使 鹿角膠 牛膝平 鹿茸温，微

温 烏喙微温 續斷微温

婦人崩中

石膽寒 禹餘糧寒，平 赤石脂大温 代赭寒 牡蠣平，微寒 龍骨平，微寒 蒲黄平 白僵蠶平 牛角鰓温 烏賊魚骨微温 紫葳微寒 桑耳平 生地黄大寒 檗木寒 白茅根寒 艾葉微温 鮀甲微温 鱉甲平 馬蹄平 白膠平，温 丹雄鷄微温，微寒 阿膠平，微温 大小薊根温 鬼箭寒 鹿茸微温 伏龍肝微温 乾地黄寒 柏葉微温。酒漬，主吐血及崩中赤白。君 地榆微寒。主漏下赤血 續斷温。臣 淡竹茹微寒 猬皮平。主漏下赤白。臣 飴糖微温。臣 白芷温。主

經閉

鼠婦微温，微寒 蜚蠊寒 虹蟲微寒 水蛭平，微寒 蟅蟲微温，微寒 桃人平 狸陰莖温 烏頭温，大熱 蜈蚣温 蛇膽寒 斑蝥寒，微寒 牡丹微寒 牛膝平 占斯温 土瓜根寒 牡丹微寒 桃毛平 白堊温 虎杖微温 陽起石微温 桃人平 銅鏡鼻平 白茅根寒。主血閉 射干微温，使 卷柏温。臣 生地黄大寒。君 乾漆温。治血閉。臣 鬼箭寒。破陳血。使 菴蕳子微寒。臣 朴硝大寒。君 大黄大寒。治月後不通。使

無子

紫石英温 石鍾乳温 陽起石微温 紫葳微寒 桑螵蛸平 艾葉微温 秦皮微寒，大寒 卷柏温，平，微寒 列當温 覆盆子平。臣 白膠温 白薇大寒。臣

安胎

紫葳微寒 白薇寒 鯉魚寒 烏雌鷄温 生地黄大寒 猪苓平 艾葉微温

墮胎

雄黄平，寒，大温 雌黄平，大寒 水銀寒 粉錫寒 朴硝寒，大寒 飛生蟲平 溲疏寒，微寒 大戟寒，大寒 甲巴豆温，生温熟寒 野葛微寒 牛黄平 藜蘆寒，微寒 牡丹寒，微寒 牛膝平 桂心大熱 皂莢温 蔺茹寒，微寒 蠷螋寒 槐子寒 薏苡人微寒 鼯麥寒 附子温，大熱 天雄温，大温 烏頭温，大熱 蜈蚣温 蛇膽寒 斑蝥寒 水蛭平，微寒 虹蟲微寒 水蛭寒 蟅蟲微温，微寒 猬皮平 蜥蜴寒 蛇蜕平 蟹爪寒 芒硝大寒 檽根大熱。使 茵草温。使 牽牛子寒。使 虎掌温，微寒 鬼臼 代赭寒 生鼠微温❹

難産

槐子寒 桂心大熱 滑石寒，大寒 貝母平，微寒 葵藜温，微寒 皂莢温 酸漿平，寒 鼷鼠微温 生鼠肝平 弓弩弦平 馬銜平 敗醬平，微寒 烏雄鷄冠血温 榆皮平 蛇蜕平 麻油微寒。治産難，胞不出。君 澤瀉寒。治胞不出 牛膝平 猪脂酒各隨多少服，主❺産難，衣不出 陳薑大熱 飛生蟲平 兔頭平 海馬寒 伏龍肝温 冬葵子

産後病

乾地黄寒 秦椒温，生温熟寒 敗醬平，微寒 澤蘭微温 地榆微寒 大豆平 大豆紫黑平 桂心大熱 皂莢温 蔺茹寒，微寒 蠷螋寒 槐子寒 薏苡人微寒 鼯麥寒 附子温，大熱 天雄温，大温 烏頭温，大熱 烏喙微温 側子大熱 猫寒 芫青微温 亭長微温 水蛭平，微寒 虹蟲微寒 蠷螋寒 蟅蟲微温，微寒 猬皮平 蜥蜴寒 蛇蜕平 蟹爪寒 芒硝大寒 檽根大熱。使 茵草温。使 牽牛子寒。使 虎掌温，微寒 鬼臼 代赭寒 生鼠微温❹

難産

槐子寒 桂心大熱 滑石寒，大寒 貝母平，微寒 葵藜温，微寒 皂莢温 酸漿平，寒 鼷鼠微温 生鼠肝平 弓弩弦平 馬銜平 敗醬平，微寒 烏雄鷄冠血温 榆皮平 蛇蜕平 麻油微寒。治産難，胞不出。君 澤瀉寒。治胞不出 牛膝平 猪脂酒各隨多少服，主❺産難，衣不出 陳薑大熱 飛生蟲平 兔頭平 海馬寒 伏龍肝温 冬葵子

産後病

乾地黄寒 秦椒温，生温熟寒 敗醬平，微寒 澤蘭微温 地榆微寒 大豆平 大豆紫黑平 桂心大熱 皂莢温 蔺茹寒，微寒 蠷螋寒 槐子寒 薏苡人微寒 鼯麥寒 附子温，大熱 天雄温，大温 烏頭温，大熱 烏喙微温 側子大熱 猫寒 芫青微温 亭長微温 水蛭平，微寒 虹蟲微寒 蠷螋寒 蟅蟲微温，微寒 猬皮平 蜥蜴寒 蛇蜕平 蟹爪寒 芒硝大寒 檽根大熱。使 茵草温。使 牽牛子寒。使 虎掌温，微寒 鬼臼 代赭寒 生鼠微温❹ 蚱蟬 麝香温 桃人平 薤花寒，微寒 狼牙寒 生鼠微温❹

難産

槐子寒 桂心大熱 滑石寒，大寒 貝母平，微寒 葵藜温，微寒 皂莢温 酸漿平，寒 鼷鼠微温 生鼠肝平 弓弩弦平 馬銜平 敗醬平，微寒 烏雄鷄冠血温 榆皮平 蛇蜕平 麻油微寒。治産難，胞不出。君 澤瀉寒。治胞不出 牛膝平 猪脂酒各隨多少服，主❺産難，衣不出 陳薑大熱 飛生蟲平 兔頭平 海馬寒 伏龍肝温 冬葵子

産後病

乾地黄寒 秦椒温，生温熟寒 敗醬平，微寒 澤蘭微温 地榆微寒 大豆平 大豆紫黑平 桂心大熱 皂莢温 蔺茹寒，微寒 蠷螋寒 槐子寒 薏苡人微寒 鼯麥寒 附子温，大熱 天雄温，大温 烏頭温，大熱 烏喙微温 側子大熱 猫寒 芫青微温 亭長微温 水蛭平，微寒 虹蟲微寒 蠷螋寒 蟅蟲微温，微寒 猬皮平 蜥蜴寒 蛇蜕平 蟹爪寒 芒硝大寒 檽根大熱。使 茵草温。使 牽牛子寒。使 虎掌温，微寒 鬼臼 代赭寒 生鼠微温❹

下乳汁

石鍾乳温 漏蘆寒，大寒 蟅蟲微温，小寒 栝樓寒 土瓜根寒 狗四足平 猪四足

小寒 葵子寒 猪胰平。臣 木通平

中蠱

桔梗微温 鬼臼温，微温 馬目毒公微温 犀角寒，微寒 斑猫寒 芫青微温 亭長微温 射罔大熱 鬼督郵平 白蘘荷微温 敗鼓皮平 藍實寒 赭魁平。使 徐長卿温。使 羖羊角微寒。臣 野葛温。使 羖羊皮平。使 獺肝平。使 露蜂房平。使 雄黄平。君 槲樹皮平

出汗

麻黄温。臣 杏人温。葱白平。臣 石膏大寒。臣 貝母微寒。臣 棗葉平。君 山茱萸平。臣 葛根平。臣 乾薑温，大熱 桂心大熱 附子温，大熱 生薑微温 薄荷温 蜀椒温，大熱 豉寒

止汗

乾薑大熱。臣 柏實平。故竹扇末臣 白朮温。君 半夏生微寒熟温。使 粱粉雜豆豉熬末 牡蠣微寒，雜杜仲平，水服 枳實寒，微寒 松蘿平 麥麩

驚悸心氣

人參微温。君 茯苓平。君 柏實平。君 絡石微寒。主大驚入腹。君 羖羊角微寒。臣 桔梗微温。君 龍膽大寒。主驚傷五内。君 小草温。君 遠志温。君 銀屑温。君 紫石英温。君

肺癆

人參微温。肺氣。君 茯苓平，君 蒺藜子微寒。治肺癆。臣 白石英微温。君 薏苡人微寒。主脚❼麥門冬微寒。治肺癆。臣

下氣

麻黄温。臣 半夏生微寒熟温。使 白前微温。臣 厚朴温。臣 橘皮温。臣 杏人温。臣 厚朴温。臣 生薑微温。臣 前胡微寒。臣 蘇子温。臣 白芥子温。臣 蒺藜子微寒。臣 李樹根白皮大寒。使

蝕膿

茼茹寒 雄黄平 桔梗微温 龍骨微寒 麝香温 白芷温 大黄大寒 芍藥微寒 當歸温 黎蘆寒 巴豆温 地榆微寒

女人血閉腹痛

芍藥微寒 紫參寒 桃人平 黄耆微温 紫石英温 乾薑大熱 桂心大熱 細辛温 茯苓平

女人血氣歷腰痛

人參微温。君 當歸温 甘草平 細辛温 柏實平 牡丹微寒 牡蠣微寒

女人腹堅脹

芍藥微寒 黄芩大寒 茯苓平 澤蘭微温

解百藥及金石等毒例

蛇虺百蟲毒

雄黄、巴豆、麝香、丹砂、乾薑

蜈蚣毒

桑汁及煮桑根汁

蜘蛛毒

藍青、麝香

蜂毒

蜂房、藍青汁

狗毒

杏人、礬石、韭根、人屎汁

惡氣瘴毒

羖羊角、雄黄、麝香

喉痹腫邪氣惡毒入腹

升麻、犀角、射干

風腫毒腫

沉香、木香、薰陸香、鷄舌香、紫檀香、麝香

百藥毒
甘草、薺苨、藍汁、大小豆汁、藍實
射罔毒
藍汁、大小豆汁、竹瀝、大麻子汁、
六畜血、貝齒屑、蕷根屑、蚯蚓屎、藕芰
汁
野葛毒
鷄子清、葛根汁、甘草汁、鴨頭熱
血、猪膏若已死口噤者，以大竹筒盛冷水，注兩脅
及臍上，暖輒易之。口須臾開則内藥，藥入口便
活矣。用薺苨汁解之
斑猫、芫青❾毒
猪膏、大豆汁、戎鹽、藍汁、巴豆、
鹽湯煮猪膏⓫
狼毒毒
杏人、藍汁、白斂、鹽汁、木占斯
雄黄毒
防己
甘遂毒
大豆汁
蜀椒毒
葵子汁、桔梗、桂汁、枝⓬汁、人溺、冷水、
土漿、食蒜鷄毛燒吸烟及水調服
半夏毒
生薑汁、煮乾薑汁
礬石毒
大豆汁、白鵝膏
芫花毒
防己、防風、甘草、桂汁
烏頭、天雄、附子毒
大豆汁、遠志、防風、棗肌、飴糖
莨菪毒
薺苨、甘草汁、犀角、蟹汁
杏人毒
藍子汁
諸菌毒
掘地作坑，以水沃中，攪令濁，俄
頃飲之名曰地漿
防葵毒
葵根汁按：防葵，《本經》無毒，試用亦無
毒。今用葵根汁，應是解狼毒浮者爾。臣禹錫等謹
按《蜀本》云：防葵傷火者不可服，令人恍惚，故以
解之
野芋毒
土漿、人糞汁
鷄子毒
淳醋
鐵毒
磁石
食諸肉馬肝漏脯中毒
生韭汁、韭根燒末、燒猪骨末、頭
垢燒犬屎酒服，豉汁亦佳
食金銀毒
鷄子汁服水銀數兩即出、水淋鷄屎汁
食諸魚中毒
煮橘皮、大豆汁、馬鞭草汁、生藘

葦根汁、大黄汁、煮朴硝汁、燒末鮫魚皮

食蟹中毒

生藕汁、煮乾蒜汁、冬瓜汁一云生紫蘇汁藕屑及乾蘇汁

食諸菜毒

甘草、貝齒、胡粉三種末水和服之，兒溺、乳汁服二升佳

飲食中毒心煩滿

煮苦參汁飲之，令吐出即止

服石藥中毒

白鴨屎汁、人參汁

服藥過劑悶亂者

吞鷄子黄、藍汁、水和胡粉、地漿、

蘘荷汁、粳米粉汁、豉汁、乾薑、黄連

屑、飴糖、水和葛粉飲

服藥食忌例

有术，勿食桃、李及雀肉、胡荽、大蒜、青魚鮓等。

有㉕藜蘆，勿食狸肉。

有黄連、桔梗，勿食猪肉。

有地黄，勿食蕪荑。

有細辛，勿食生菜。

有巴豆，勿食蘆笋羹及野猪肉。

有半夏、菖蒲，勿食飴糖及羊肉。

有甘草，勿食菘菜。臣禹錫謹按：《唐本》并《傷寒論》、《藥對》又云勿食海藻。

有牡丹，勿食生胡荽。

有商陸，勿食犬肉。

有常山，勿食生葱、生菜。

有鱉甲，勿食莧菜。

有茯苓，勿食醋物。

有天門冬，勿食鯉魚。

有空青、朱砂，勿食生血物。

服藥，不可多食生胡荽及蒜雜生菜。又不可食諸滑物果實等。又不可多食肥猪、犬肉、油膩、肥羹、魚膾、腥臊等物。

服藥，通忌見死尸及産婦淹穢事。

凡藥不宜入湯酒者

朱砂熟入湯　雄黄　雲母　陽起石入酒

鍾乳入酒　銀屑　孔公孽入酒　礬石入酒

礬石入酒　石硫黄入酒　銅鏡鼻　白堊　胡粉　鉛丹　鹵鹽入酒　石灰入酒　藜灰

右一十七種石類

野葛　狼毒　毒公　鬼臼　莽草　巴豆　蠷蠋　蘗菌　藜蘆　烏喙　附子　天雄　烏頭　莨菪子　曼陀羅花　白附子　半夏　南星　虎掌　枳實　虎杖入酒單用　蜀漆　羊踟躅　芫花　大戟　甘遂　蜀羊泉入酒　狼牙　蕪荑　雷丸　鳶尾　蒺藜入酒　女菀　菜耳　紫葳入酒　薇銜入酒　白及　牡蒙　飛廉　蛇銜　占斯　辛夷　石南入酒　虎掌　枳實　虎杖入酒單用　蘆根　羊桃入酒　麻勃　苦瓠　瓜蒂　陟厘　雲實　狼跋入酒　槐子入酒　地膚子　青葙子　蛇床子入酒　茺蔚子　薪蓂子　王不留行　菟絲子入酒

右四十八種草木類

蜂子　蜜蠟　白馬莖　狗陰莖　雀卵　鷄子　雄鵲　伏翼　鼠婦　樗鷄　螢火　蠐螬　蜥蜴　斑猫　芫菁　亭長　蝱蛸　地膽　虹蟲　蜚蠊　蝱蛸　馬刀　赭魁　蝦蟆　蝸牛　生鼠　生龜入酒　諸鳥獸入酒　蟲魚膏、骨、髓、膽、血、屎、溺

右二十九種蟲獸類

尋萬物之性，皆有離合，虎嘯風生，龍吟雲起，磁石引針，琥珀拾芥，漆得蟹而散，麻得漆而涌，桂得葱而軟，樹得桂而枯，戎鹽累卵，獺膽分杯。其氣爽有相關感，多如此類，其理不可得而思之。至於諸藥，尤能遞爲利害，先

聖既明有所説，何可不詳而避之。時人爲方，皆多漏略。若舊方已有，此病亦應改除。假如兩種相當，就其輕重，擇而除之。傷寒赤散，吾常不用藜蘆。斷下黄連丸，亦去其乾薑而施之，無不效。何忽强以相憎，苟令共事乎？相反爲害，深於相惡。相惡者，謂彼雖惡我，我無忿心，猶如牛黄惡龍骨，而龍骨得牛黄更良，此有以制伏故也。相反者，則彼我交讎，必不宜合。今畫家用雌黄、胡粉相近，使自黯妬。粉得黄即黑，黄得粉亦變，此蓋相反之證也。藥理既昧，所以不效，人多輕之。今按方處治，必恐卒難尋究本草，更復抄出其事在此，覽略看之，易可知驗。而《本經》有直云茱萸、門冬者，無以辨山、吴、天、麥之異，咸宜各題其條。又有亂誤處，譬如海蛤之與鮫甲，畏惡正同。又有諸芝使署預，署預復使紫芝。計無應如此，不知何者是非？亦且併記，當更廣驗正之。又《神農本經》相使，正各一種，兼以《藥對》參之，乃有兩三，於事亦無嫌。其有云相得共療某病者，既非妨避之禁，不復疏出。

圖經衍義本草上卷五

---

❶胃：晦明軒本作『諸』。
❷癥：原作『即』，據晦明軒本改。
❸温：原作『寒』，據晦明軒本改。
❹温：此下原有『附子，温，大熱。蛇蜕，平』八字，與上文重，據晦明軒本删。
❺主：原脱，據晦明軒本補。
❻産後：原誤竄在下『惡血』下，據晦明軒本乙正。
❼脚：晦明軒本作『肺』。
❽寒：晦明軒本作『熱』。
❾青：原脱，據晦明軒本補。
❿鹽湯煮猪膏：此五字原爲小字在『巴豆』文下，今據晦明軒本改爲大字別爲一條。
⓫毒：原脱，據晦明軒本補。
⓬枝：晦明軒本作『豉』。
⓭有：原作『大』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之一

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

玉石部上品

丹砂


州宜


州辰

五臟百病，養精神，安魂魄，益氣明目，通血脉，止煩滿，消渴，益精神，悦澤人面，殺精魅邪惡鬼，除中惡、腹痛、毒氣、疥瘙、諸瘡。久服通神明，不老，輕

身神仙，能化爲汞。作末名真珠，光色如雲母，可析者良。生符陵山谷。採無時。惡磁石，畏鹹水。

《圖經》曰：丹砂，生符陵山谷，今出辰州、宜州、階州，而辰州者最勝，謂之辰砂。生深山石崖間，土人採之，穴地數十尺，見其苗乃白石耳，謂之朱砂床。砂生石上，其塊大者如鷄子，小者如石榴顆，狀若芙蓉頭、箭鏃。連床者紫黯若鐵色，而光明瑩澈❶，碎之嶄岩作墻壁，又似雲母片可析者，真辰砂也。無石彌佳。過此，皆淘土石中得之，非生於石床者。陶隱居謂：出武陵西川諸蠻中。今辰州乃武陵故地，雖號辰砂，而本州境所出殊少，往往在蠻界中溪溆、錦州得之，此地蓋陶所謂武陵西川也。

陶隱居云：按此化爲汞及名真珠者，是今朱砂也。俗醫皆別取武都、仇池雄黄挾雌黄者，名爲丹砂。方家亦往往俱用，此爲謬矣。符陵是涪州，接巴郡南，今無復採者。乃出武陵、西川諸蠻夷中，皆通屬巴地，故謂之巴砂。越砂，即出廣州、臨漳者，是今朱砂也。俗醫皆別取武都、仇池雄黄挾雌黄者，名爲丹砂。方家亦往往俱用，此爲謬矣。符陵是涪州，接巴郡南，今無復採者。乃出武陵、西川諸蠻夷中，皆通屬巴地，故謂之巴砂。

《仙經》亦用。者，此二處并好，惟須光明瑩澈爲佳。如雲母片者，謂雲母砂。如樗蒲子，紫石英形者，謂馬齒砂，亦好。如大小豆鵝卵，形雖大，其雜土石，不如細明净及大塊圓滑者。《經》言末之名真朱，謬矣。豈有末砂。此二種粗，不入藥用，但可畫用一物而以全末爲殊名者也。

日華子云：凉，微毒。潤心肺，治瘡疥痂，息肉。服并塗用。

雷公云：凡使，宜須細認，取諸般上有百等，不可一一論之。有妙硫砂，如拳許大，或重一鎰，有十四面，如鏡，若遇陰沉大雨，即鏡面上有紅漿汁出。有梅柏砂，如梅子許大，夜有光生，照見一室。有白庭砂，如帝珠子許大，面上有小星現。有神座砂，又有金座砂、玉座砂，不經丹竈，服之而自延壽命。次有白金砂❷、澄小❸砂、陰成砂、辰錦砂、芙蓉砂、鏡面砂、箭鏃砂、曹末砂、土砂、金星砂、平面砂、神末砂，已上不可一一細述也。

禹錫云：謹按《藥性論》云：丹砂，君，有大毒。鎮心，主尸疰，抽風。

青霞子云：丹砂，自然不死，若以

氣衰，血散，體竭，骨枯，入石之功，稍能添益，若欲長生久視，保命安神，須餌丹砂，且入石見火，悉成灰燼，丹砂伏火，化爲黃銀，能重能輕，能靈能神，能黑能白，能暗能明，一斛人擎，力難昇舉，萬斤遇火，輕速上騰，鬼神尋求，莫知所在。

《外臺秘要》：傷寒、時氣、温疫、頭痛、壯熱、脉盛，始得一二日者。取真砂一兩，以水一斗，煮取一升，頓服，覆衣被取汗。忌生血物。又方：斷❹瘟疫。上等朱砂一兩細研，以白蜜和丸如麻子大，常以太歲日平旦，一家大小勿食諸物，面向東立，各吞三七丸，勿令近齒。

《斗門方》：治小兒未滿月驚着，似中風欲死者。用朱砂以新汲水濃磨汁，塗五心上，最有神驗。

《十全博救方》：療子死腹中不出。用朱砂一兩，以水煮數沸，末之，然後取酒服之，立出。

《衍義》曰：丹砂，今人謂之朱砂。辰州朱砂，多出蠻峒。錦州界猞猁洞老鴉井，其井深廣數十丈，先聚薪於井，滿則縱火焚之。其青石壁迸裂處，即有小龕，龕中自有白石床，其石如玉。床上乃生丹砂，小者如箭鏃，大者如芙蓉，其光明可鑒，研之鮮紅。砂泊❺床，大者重七八兩至十兩者。晁州亦有形如箭鏃帶石者，得自土中，非此之比也。此物鎮養心神，但宜生使。煉服少有不作疾者，亦不減硫黃輩。又一醫流服伏火者數粒，一旦大熱，數夕而斃。李善勝嘗煉朱砂爲丹，經歲餘，沐浴再入鼎，誤遺下一塊，其徒丸服之，遂發憒冒，一夕而斃。生朱砂，初生兒便可服。因火力所變，遂能殺人，可不謹也。

雲母　味甘，平，無毒。主身皮死肌、中風寒熱，如在車船上，除邪氣，安五臟，益子精，明目，下氣，堅肌，續絶，補中，療五勞七傷，虚損少氣，止痢。久服輕身延年，悦澤不老，耐寒暑，志高神仙。一名雲珠，色多赤；一名雲華，五色具；一名雲英，色多青；一名雲液，色多白；一名雲砂，色青黄；一名磷石，色正白。生太山山谷、齊廬山及琅玡北定山石間。二月採。澤瀉爲之使，畏鮀甲及流水。

《圖經》曰：雲母，生泰山山谷、齊廬山及琅玡北定山石間，今兖州雲夢山及江州、濠州、杭越間亦有之。生土石間，作片成層可析，明滑光白者爲上。江南生者多青黑色，不堪入藥。二月採其片，絶有大而瑩潔者，今人或


兖州


江州

雲母

以飾燈籠，亦古屏扇之遺事也。謹按：方書用雲母，皆以白澤者爲貴，惟中山衛叔卿，單服法雲母五色具者，蓋《本經》所謂一名雲華者是，一物中而種類有別耳。葛洪《抱朴子·内篇》云：雲母有五種，而人不能別也，當舉以向日看其色，詳占視之，乃可知正爾，於陰地視之，不見其雜色也。五色并具而多青者，名雲英，宜以春服之❻；五色并具而多赤者，名雲珠❼，宜以夏服之；五色并具而多黑者，名雲液，宜以秋服之；五色并具而多白者，名雲母，宜以冬服之；但有青黄二色者，名雲砂，宜以季夏服之；皛皛純白者，名磷石，四時可服也。然則，醫方所用正白者，乃磷石一種耳。古之服五雲法甚多，陶隱居所撰《太清諸石藥變化方》言之備矣。今道書中有之，然修煉節度，恐非文字可詳，誠不可輕餌也。又西南天竺等國出石，謂之火齊，亦雲母之類，色如紫金，離析之，如蟬翼，積之乃如紗穀重沓。又云琉璃類也，亦堪入藥。

陶隱居云：按《仙經》雲母乃有八種：向日視之，色青白多黑者，名❽雲母；色黄白多青，名雲英；色青黄多赤，名雲珠；如冰露，乍黄乍白，名雲砂；黄白皛，名雲液；皎然純白明澈，名磷石。此六種并好服，而各有時月。其黯黯純黑、有文斑斑如鐵者，名雲膽；色雜黑而强肥者，名地涿。此二種并不可服。入腹大害人。今虚勞家丸散用之。

《日華子》云：凡有數種，通透輕薄者，爲上也。

雷公云：凡使，色黄黑者，厚而頑，赤色者，經婦人手把者，并不用。須要光瑩如冰色者爲上。凡修事一斤，先用小地膽草、紫背天葵、生甘草、地黄汁各一鎰，乾者細剉，濕者取汁了，於瓷鍋中安雲母并諸藥了，下天池水三鎰，著火煮七日夜，水火勿令失度，其雲母自然成碧玉漿在鍋底❾，却以天池水猛投其中，將物攪之，浮如蝸涎者即去之。如此三度淘净了，取沉香一兩，搗作末，以天池水煎沉香湯三升已來，分爲三度，再淘雲母漿了，日中曬任用之。

禹錫云：謹按《藥性論》云：雲母粉，君，惡徐長卿，忌羊血。粉有六等，白色者上，有小毒，主下痢腸癖，補腎冷。楊損之云：青、赤、白、黄、紫者，并堪服餌，惟黑者不任服，害人。

《抱朴子》云：服五雲之法：或以桂、葱、水玉化之以爲水，或以露於鐵器中，以元水熬之爲水，或以消石合於筒中埋之爲水，或以蜜溲爲酪，或以秋露漬之百日，韋囊挺以爲粉，或以無巔草樗血合餌之。服之一年，百病除。三年老公反成童子，五年則役使鬼神。入火不燒，入水不濡，踐棘⓫而不傷膚，與仙人相見，他物埋之即朽，著火即焦，而五雲内猛火中，經時終不焦，埋之永不腐，故能令人長生也。服經十年，雲氣常覆其上，夫服其母，以致其子，理之自然也。

《神仙傳》：宫嵩服雲母，數百歲有童子顔色。

《食醫心鏡》云：治小兒赤白痢及水痢。雲母粉半大兩，研作粉，煮白粥調，空腹服之。

《聖惠方》：治火瘡敗壞。用雲母粉同生羊髓，和如泥塗之。

《千金方》：治風疹遍身，治不差者，煅雲母粉，以清水調服之，看人大小，以意酌量，與之多少服。

《千金翼方》：治熱風汗出，心悶。水和雲母服之，不過再服，立差。又方：治帶下。温水和服三方寸匕，立見神效。又方：治赤白痢，積年不差。飲調服方寸匕，兩服立見神效。

《經效方》：青城山丈人觀主康道豐傳，治百病，煅製雲母粉法：雲母一斤，拆開揉碎，入一大瓶内，築實，上澆水銀一兩，封固，以十斤頂火煅通赤，取出，却拌香葱、紫引翹草二件，合搗如泥，後以夾絹袋盛，於大水盆内摇取粉，餘滓未盡，再添草藥，重搗如前法，取粉。沉水乾以小木盤一面，於灰上印一淺坑，鋪紙傾粉在内，直候乾，移入火焙焙之，取出細研，以麵糊丸如梧桐子大。遇有病者，服之無不效。知成都府辛諫議，曾患大風，衆醫不效，遇此道士進得此方，服之有神驗。

《衍義》曰：雲母，古雖有服煉法，今人服者至少，謹之至也。市廛多折作花朵以售[11]之，今惟合雲母膏，治一切癰毒瘡等，惠民局別有法也。

玉屑　味甘，平，無毒。主除胃中熱、喘息、煩滿，止渴。屑如麻豆服之，久服輕身長年。生藍田。採無時。惡鹿角。

《圖經》曰：謹按《本經》玉泉生藍田山谷，玉屑生藍田。陶隱居注云：好玉出藍田及南陽徐善亭部界中，日南、盧容水中，外國于闐、疏勒諸處皆善。《仙方》善，今藍田、南陽、日南不聞有玉，禮器及乘輿服御多是于闐玉。

陶隱居云：此玉屑，亦是以玉爲屑，非應別一種物也。《仙經》服穀玉，有搗如米粒，乃以苦酒輩，消令如泥，亦有合爲漿者。凡服玉，皆不得用已所以燕石入筒，卞氏長號也。

《唐本注》云：餌玉，當以消作水







者爲佳。屑如麻豆服之，取其精潤臟府，滓穢當完出也。又爲粉服之者，即使人淋壅。屑如麻豆，其義殊深。

《日華子》云：玉，潤心肺、明目，滋毛髮，助聲喉。

禹錫云：謹按《抱朴子》云：玉屑服之與水餌之，俱令人不死。所以不及金者，令人數數發熱，似寒食散狀也。若服玉屑者，宜十日輒一服，雄黄、丹砂各一刀圭，散髮洗沐寒水，迎風而行，則不發熱。

《海藥》云：按《異物志》云：出崑崙。又《淮南子》云：出鍾山。又云：藍田出美玉，燕口出碧玉，味鹹，寒，無毒。主消渴，滋養五臟，止煩躁。宜共金、銀、麥門冬等同煎服之，甚有所益。《仙經》云：服玉如玉化水法，在淮南三十六水法中載。又《別寶經》云：凡石韞玉，但夜將石映燈看之，内有紅光，明如初出日，便知有玉。楚記卞和三獻玉，不鑒所以遭刖足，後有辨者，映燈驗之，方知玉在石内，乃爲玉璽，價可重連城也。

李預云：每羨古人食玉之法，乃採訪藍田，躬往掘得若環碧雜器形者，大小百餘枚，稍粗黑，皆光潤可玩，預乃捶七十枚成屑，日食之，經年云有效驗，而世事寢息，并不禁節。又加之以好酒損志，及疾篤，謂妻子曰：服玉當屏居山林，排棄嗜慾，或當有大神力，而吾酒色不絶，自致於死，非藥過也。人知餐服之驗。時七月中旬，長安毒熱，預停尸四宿，而體色不變，其妻常氏，以玉珠二枚，含之，口閉因囑，其口尸體必當有異於人，勿使速殯，令後都無穢氣。

《寶藏論》：玉玄真者餌之，其命無極，令人舉身輕飛，不但地仙而已。然其道遲成，服一二百斤乃可知也。

玉泉　味甘，平，無毒。主五臟百病，柔筋强骨，安魂魄，長肌肉，益氣，利血脉，療婦人帶下十二病，除氣癰，可以卞和玉，可以烏米酒及地榆酒化之爲水，亦可以葱漿水消之爲黏，亦可餌以爲丸，明耳目。久服耐寒暑，不饑渴，不老神仙，輕身長年。人臨死服五斤，死三年可燒爲粉，服一年已上，入水中不濡。色不變。一名玉札。生藍田山谷。採無時。畏款冬花。



《枕中記》：玉屑，味甘，惡鹿角。

馬明先生《金丹訣》：玉屑常服，令人精神不亂。

《天寶遺事》：唐貴妃含玉咽津，以解肺渴。

《圖經》曰：陶隱居云：玉泉是玉和，無毒。屑如麻豆，久服輕身長壽。

之精華，白者質色明澈[14]，可消之爲水，故名玉泉。世人無復的識者，惟通呼爲玉爾。

陶隱居云：藍田在長安東南，舊出美玉，此當是玉之精華，白者質色明澈，可消之爲水，故名玉泉。今人無復的識者，惟通呼爲玉爾。張華又云：服玉用藍田穀玉白色者，此物平常服之，則應神仙。有人臨死服五斤，死經三年，其色不變。古來發冢見尸如生者，其身腹内外，無不大有金玉。漢制，王公葬，皆用珠襦玉匣，是使不朽故也。煉服之法，亦應依《仙經》服玉法，水屑隨宜。雖曰性平，而服玉者亦多發熱，如寒食散狀。金玉既天地重寶，不比餘石，若未深解節度，勿輕用之。

《別本》注云：玉泉者，玉之泉液也。以仙室玉池中者爲上。今《仙經》三十六水法中，化玉爲玉漿，稱爲玉泉。服之長年不老，然功劣於自然泉液也。一名玉液，一名瓊漿。

禹錫云：謹按《日華子》云：玉泉治血塊。

《衍義》曰：玉泉，《經》云生藍田山谷，採無時。今藍田山谷無玉泉。泉水，古今不言採。又曰：服五斤。古今方，水不言斤。又曰：一名玉札。好顏色，不老，令人有子。不煉，服之令人淋。一名公乳，一名蘆石，一名夏石。生少室山谷及太山。採無時。蛇床爲之使，惡牡丹、玄石、牡蒙，畏紫石英、蘘草。

州道



石鍾乳

《圖經》曰：石鍾乳，生少室山谷及泰山，今道州江華縣及連、英、韶、階、峽州山中皆有之。生岩穴陰處，溜山下出泉蒙翳而成，空中相通，長者六七寸，如鵝翎管狀，碎之如爪甲，中無雁齒，光明者善，色白微紅。採無時。舊説乳有三種：有石鍾乳者，其山純石，以石津相滋，狀如蟬翼爲石乳，石乳性温。有竹乳者，其山多生篁竹，以竹津相滋，乳如竹狀，謂之竹乳，竹乳性平。有茅山之乳者，其山土石相雜，遍生茅草，以茅津相滋，乳色稍黑而滑潤，謂之茅山之乳，茅山之乳性微寒。凡此三種，尤難識別。而唐李補闕煉鍾乳

法云：取韶州鍾乳，無問厚薄，但令顏色明淨光澤者，即堪入煉。惟黃赤二色不任用。柳宗元《與崔連州論鍾乳書》亦云：取其色之美而已，不必惟土之信。是此藥所重，惟明白者，不必盡如上所説數種也。今醫家但以鵝管中空者爲最。又《本經》中品載殷孽云：鍾乳根也，生趙國山谷，又生梁山及南海。又云：孔公孽，殷孽根也。生梁山山谷。又云：石花、石床，并與殷孽同。陶隱居云：凡鍾乳之類，有三種，同一體，從石室上汁溜積久盤結者，爲鍾乳床，即此孔公孽也；其以次小龍窠者，爲殷孽，今人呼爲孔公孽。殷孽復溜輕好者爲鍾乳，雖同一類，而療體爲異。蘇恭云：二孽在上，床花在下。陶謂孔公孽爲乳床，非也。又有石腦，云亦鍾乳之類。凡此五種，今醫家稀復用之，但用鍾乳耳。

《藥性論》云：鍾乳亦名黃石砂，有大毒。主泄精，寒嗽，壯元氣，建益陽事，能通聲。忌羊血。

陶隱居云：第一出始興，而江陵及東境名山石洞亦皆有。惟通中輕薄如鵝翎管，碎之如爪甲，中無雁齒，光明者爲善。長挺乃有一二尺者。色黃，以苦酒洗刷則白。《仙經》用之少，而俗方所重。

《唐本注》云：鍾乳第一始興，其次廣、連、澧、朗、郴等州者，雖厚而光潤可愛，餌之并佳。今峽州、青溪、房州三洞出者，亞於始興。自餘其非土地，不可輕服，多發淋渴，止可搗篩，白子内收貯用。

禹錫云：謹按吴氏云：鍾乳，一名虚中。神農：辛。桐君、黄帝、醫和：甘。扁鵲：甘，無毒。生山谷陰處岸下。溜汁成如乳汁，黄白色，空中相通，二月、三月採，陰乾。

蕭炳云：如蟬翅者上，爪甲者次，鵝管者下。明白薄者可服。

雷公云：凡使，勿用頭粗厚并尾大者，爲孔公石，不用。色黑及經大火驚過并久在地上收者，曾經藥物制者，并不得用。須要鮮明，薄而有光潤者，似鵝翎筒子爲上，有長五六寸者。凡修事法，以五香水煮過一伏時，然後漉出，又别用甘草、紫背天葵汁漬，再煮一伏時，凡八兩鍾乳，用沉香、零香、藿香、白茅等各一兩，以水先煮過一度了，第二度方用甘草等二味各二兩再煮了，漉出拭乾，緩火焙之，然後入臼搗。如粉篩過，却入鉢中。令有力少壯者三兩人不住研，三日夜勿歇。然後用水飛澄了，以絹籠之，於日中曬令乾，又入鉢中，研二萬遍後，以瓷合子内收貯用。

《日華子》云：補五勞七傷，通亮名虚中。神農：辛。桐君、黄帝、醫和：甘。扁鵲：甘，無毒。生山谷陰處岸下。溜汁成如乳汁，黄白色，空中相通，二月、三月採，陰乾。

蕭炳云：如蟬翅者上，爪甲者次，鵝管者下。明白薄者可服。

雷公云：凡使，勿用頭粗厚并尾大者，爲孔公石，不用。色黑及經大火驚過并久在地上收者，曾經藥物制者，并不得用。須要鮮明，薄而有光潤者，似鵝翎筒子爲上，有長五六寸者。凡修事法，以五香水煮過一伏時，然後漉出，又别用甘草、紫背天葵汁漬，再煮一伏時，凡八兩鍾乳，用沉香、零香、藿香、白茅等各一兩，以水先煮過一度了，第二度方用甘草等二味各二兩再煮了，漉出拭乾，緩火焙之，然後入臼搗。如粉篩過，却入鉢中。令有力少壯者三兩人不住研，三日夜勿歇。然後用水飛澄了，以絹籠之，於日中曬令乾，又入鉢中，研二萬遍後，以瓷合子内收貯用。

《太清石壁記》：煉鍾乳法，《太清經》云：取好細末，置金銀甌器中，瓦甌上，勿令泄氣，蒸之自然化爲上，鵝管者下。《經》既言乳，今復不

取乳，此何義也？蓋乳取性下，不用如雁齒者，謂如烏頭、附子不用尖角之義同。但明白光潤輕鬆，色如煉消石者佳。

礬石

州晋



都、石門。採無時。甘草爲之使，惡牡蠣。

《圖經》曰：礬石，生河西山谷及隴西武都、石門，今白礬則晋州、慈州、無爲軍，緑礬則隰州温泉縣、池州銅陵縣，并煎礬處出焉。初生皆石也，採得碎之，煎煉乃成礬。凡有五種，其色各異，謂白礬、黄礬、黑礬、緑礬、絳礬也。白礬則入藥，及染人所用者。緑礬亦入⑮咽喉、口齒藥及染色。黄礬丹竈家所須，時亦入藥。黑礬惟出西戎，亦謂之皂礬，染鬚鬢藥或用之。絳礬本來緑色，亦謂之石膽，燒之赤色，故有絳名，今亦稀見。又有礬精、礬蝴蝶，皆煉白礬時，候其極沸，盤心有濺溢者，如物飛出，以鐵匕接之，作蟲飛⑯者，礬蝴蝶也。但成塊光瑩如水晶者，礬精也。此二種入藥，力緊於常礬也。又有一種柳絮礬，亦出礬處有之，煎煉而成，輕虚如綿絮，故以名之。今醫家用治痰壅及心肺煩熱，甚佳。

陶隱居云：今出益州北部西川，從河西來。色青白，生者名馬齒礬。已煉成絶白，蜀人又以當消石名白礬。其黄黑者名鷄屎礬，不入藥，惟堪鍍作以合熟銅，投苦酒中，塗鐵皆作銅色。外雖銅色，内質不變。《仙經》餌之，丹方亦用。俗中合藥，皆先火熬，令沸燥。以療齒痛，多即壞齒，是傷骨之證，而云堅骨齒，誠爲疑也。今注：陶云蜀人用白礬當消石，誤也。

《日華子》云：白礬，性凉。除風去勞，消痰止渴，暖水臟，治中風失音，疥癬。和桃人、葱湯浴，出汗。

雷公云：凡使，須以瓷瓶盛，於火中煆令内外通赤，用鉗揭起蓋，旋安石蜂窠於赤瓶子中，燒蜂窠盡爲度，將鉗夾出放冷，敲碎入鉢中研如粉後，於屋下掘一坑，可深五寸，却以紙裹留坑中一宿，取出再研。每修事十兩，用石蜂窠六兩，盡爲度。

禹錫云：謹按《藥性論》云：礬石，一名理石。畏麻黄，有小毒。能治鼠漏、瘰癧，療鼻衄，治鼈鼻，生含咽津，治急喉痹。

劉禹錫《傳信方》：治氣痢巴石

丸，取白礬一大斤，以炭火淨地，燒令汁盡，則其色如雪，謂之巴石。取一大兩細研，治以熟猪肝作丸，空腹飲下，丸數隨氣力加減，水牛肝更佳。

《崔氏方》：治甲疽，或因割甲傷肌，或因甲長侵肉，遂成瘡腫痛，復緣窄靴研損四邊，腫煞黄水出，浸淫相染，五指俱爛，漸漸引上，脚趺泡漿，四邊起如火燒瘡，日夜倍增，醫方所不能療者。緑礬石五兩，形色似朴消而緑色。取此一物置於鐵板上，聚炭封之，囊袋吹令火熾，其礬即沸，流出色赤如融金汁者，是真也。看沸定汁盡，去火待冷，取出挼爲末，色似黄丹，收之。先以鹽湯洗瘡，拭乾，用散傅。

《聖惠方》：治小兒臍中汁出不止并赤腫，用礬燒灰，細研傅之。

《外臺秘要》：主目翳及胬⑰肉。用礬最白者，内一黍米大於翳上及胬肉上，即令泪出，綿拭之，令惡汁盡，日一，其疾日日減，翳自消薄便差。礬石須真白好者，方可使用。

《千金方》：治小兒口瘡，飲乳不得。以白礬如鷄子大置醋中，塗兒足底，一匕⑱即愈。又方：治鼻中息肉。燒礬石末，面脂和，綿裹塞鼻中，數日息肉自隨藥消落。又方：治齒齦間津液血出不止。以礬石一兩，燒灰，鹽花一兩，二味細研，以箸頭點藥。

《子母秘録》：治小兒風疹不止。白礬十二分，暖熱酒投化，用馬尾搵⑲散。每用二錢，水一中盞，煎十餘沸，熱漬牙，冷吐之。

《孫用和方》：治懸癰垂長，咽中妨悶。白礬一兩，燒灰，鹽花一兩，二味細研，以箸頭點藥。

《千金翼方》：治陰瘡脱方。燒礬石一味，研爲末，每日空心酒調方寸匕服，日三。又方：治脚氣衝心。白礬二兩，以水一斗五升，煎三五沸，浸洗脚良。

《肘後方》：療耳内卒腫痛，出膿水不止方。礬石燒末，以筆管吹耳内，日三四度，或以綿裹塞耳中，立差。又方：療人陰生瘡，膿出作臼。取高昌白礬、麻仁等分，研煉猪脂相和成膏，槐白皮作湯，洗瘡，拭令乾即塗膏，然後以楸葉貼其上，不過三度差。

王氏《博濟方》：治驢涎、馬汗毒所傷。白礬飛過，黄丹炒令紫色，各等分，相衮合，以貼患處。

《簡要濟衆方》：治牙齒腫痛。白礬一兩燒灰，大露蜂房一兩微炙，爲散。每用熱漬牙，冷吐之。

消石

味苦、辛，寒、大寒，無毒。主五臟積熱，胃脹閉，滌去蓄結飲食，推陳致新，除邪氣，療五臟十二經脉中

消石



消渴，利小便及瘿蝕瘡。煉之如膏。久服輕身。天地至神之物，能化成十二種石。一名芒消。生益州山谷及武都、隴西、西羌。採無時。火爲之使，惡苦參、苦菜，畏女菀。

《圖經》曰：文具朴消條下。

《藥性論》云：消石，君，惡曾青，畏粥。味鹹，有小毒。主項下瘰癧，瀉，得根出破血。一名芒消。燒之即成消石矣。主破積，散堅結。一作苦消。甚治腹脹。其消石、芒消，多川原人製，多㉒問之詳其理。

陶隱居云：療病亦與朴消相似，《仙經》多用此消化諸石，今無正識別此者。須求㉓尋訪，猶云與朴消同山，所以朴消名消石朴也，如此則非一種物。先時有人得一種物，其色理與朴消大同小異，朏朏如掘㉔鹽雪不冰，强燒之，紫青烟起，仍成灰，不停沸如朴消，云是真消石也。今芒消乃是煉朴消作之。與後皇甫説同，并未得核研其驗，須試效，當更證記爾。化消石法，在三十六水方中。

隴西屬秦州，在長安西羌中。今宕昌以北諸山有鹹土處皆有之。

《唐本》注云：此即芒消是也。朴消一名消石朴，今煉粗惡朴消，淋取汁煎，煉作芒消，即是消石。《本經》一名芒消，後人更出芒消條，謬矣。今注：此即地霜也。所在山澤，冬月地上有霜，掃取以水淋汁後，乃煎煉而成，蓋以能消化諸石，故名消石。非與朴消、芒消同類，而有消名也。一名芒消者，以其初煉時有細芒，狀若消，故有芒消之號，與後條芒消全別。舊經陶注引證多端，蓋不的識，今不取焉。

《日華子》云：消石畏杏人、竹葉。含之治喉閉，真者火上伏法，用柳枝湯煎三周時，如湯減少即入熱者，伏火即止也。

雷公云：凡使，先研如粉，以瓷瓶子於五斤火斗㉕，煅令通赤，鷄腸菜、柏仁共十五個帝珠子，盡爲度。

禹錫云：謹按《蜀本》云：大黄爲使。按今消石是煉朴消，或地霜爲之，狀如釵脚，好者長五分已來，能化七十二種石爲水，故名消石。吕㉖氏云：消石，神農：苦。扁鵲：甘。

《寶藏論》：消石，若草伏而斤兩不折，軟一切金、銀、銅、鐵硬物，立軟。

《史記》：淳于意云：菑川王美人懷子而不乳，來召意，意往。飲以莨菪藥一撮，以酒飲之，旋乳。意復診其脉而脉躁，躁者有餘病，即飲以消石一劑，出血如豆，比五六枚。

《聖惠方》：治眼赤痛。用消石研令極細，臨卧，以銅箸取黍米大，點目

眦頭，至明旦，以鹽漿水洗。

《外臺秘要》：療惡寒齊齊，似欲發背，或已生瘡腫。癮疹起方。消石三兩，以暖水一升和令消，待冷，取故青布揲三重，於赤處方圓，濕布搨㉗之，熱即頻易，立差。

《靈苑方》：治五種淋疾，勞淋、血淋、氣淋、熱淋、石淋、及小便不通至甚者。透格散：用消石一兩，不夾泥土雪白者，亦㉘研爲細末。每服二錢，諸淋各依湯使如後。勞淋㉙，勞倦虛損，小便不出，小腹急痛，葵子末煎湯下，通後，便須服補虛丸散。血淋，小便不出，時下血疼痛滿急；熱淋，小便熱，赤色，淋瀝不快，臍下急痛，并用冷水調下。氣淋，小腹滿急，尿後常有餘瀝，木通煎湯下。石淋，莖內痛，尿不能出，內引淋㉘腹膨脹急痛，尿下砂石，令人悶絶，將藥末先入銚子內，隔紙炒至紙焦爲度，再研令細，用温水調下。諸淋，并只小便不通，小麥湯下。卒患諸淋，未效者，服此立愈。

《衍義》曰：消石，是再煎煉時已取訖芒消，凝結在下如石者。精英既去，但餘滓而已。故功力亦緩，惟能發時疾壅熱，能散惡血。

陶隱居云：按《神農本經》無芒消，只有消石，名芒消爾。後名醫別載此説，其療與消石正同，疑此即是消石。舊出寧州，黄白粒大，味極辛、苦，消，只有消石，名芒消爾。後名醫別載此説，其療與消石正同，疑此即是消石。舊出寧州，黄白粒大，味極辛、苦，烟火。《唐本》注蓋以能消諸石，故曰耗，即又添柳枝湯煮三周時即伏火，湯頃來寧州道斷都絶。今醫家多用煮煉作者，色全白，粒細，而味不甚烈。此云生於朴消，則作者亦好。

陳藏器云：石脾、芒消、消石，并出於西戎鹵地，鹹水結成，所主亦以類相次。

《唐本》注云：晋宋古方，多用消石，少用芒消，近代諸醫但用芒消，豈古人昧於芒消也。《本經》言消石，一名芒消，理既明白，不合重出之。

《聖惠方》：治伐指。用芒消煎湯淋漬之。

《千金方》：療漆瘡方。用湯漬芒消令濃，洗之。又礬石亦可。

《子母秘録》：小兒赤遊，行於體

芒消

味辛、苦，大寒。主五臟積聚，久熱、胃閉，除邪氣，破留血，腹中痰實結搏㉛，通經脉，利大小便及月水，破五淋，推陳致新。生於朴消。石韋



上，下至心即死。以芒消内湯中，取濃汁以拭丹上。

《百一方》：療關膈，大小便不通，脹滿欲死，兩三日則殺人。芒消三兩，紙裹三四重，炭火燒之，令内一升湯中，盡服，當先以湯一升漱口，乃服之。

《孫真人食忌方》：主眼有翳，取芒消一大兩，置銅器中，急火上煉之，放冷後，以生絹細羅，點眼角中，每夜欲卧時二度點，妙。

雷公云：凡使，先以水飛過，用五重紙滴過去脚，於鐺中乾之，方入乳鉢研如粉任用。芒消是朴消中煉出形似麥芒者，曰芒消。

《衍義》曰：芒消，《經》云：生於朴消。乃是朴消以水淋汁，澄清，再經熬煉減半，傾木盆中，經宿，遂結芒有廉棱者。故其性和緩，古今多用以治傷寒。

朴消

味苦、辛，寒、大寒，無毒。主百病，除寒熱邪氣，逐六腑積聚，結固留癖，胃中食飲熱結，破留血閉絶，停痰痞滿，推陳致新，能化七十二種石。煉餌服之，輕身神仙。煉之白如銀，能寒能熱，能滑能澀，能辛能苦，能鹹能酸，入地千歲不變，色青白者佳，黄者傷人，赤者殺人。一名消石朴。生益州山谷有鹹水之陽。採無時。畏《肘後方》傷寒、時氣、温病亦多用芒消，惟治食鱠胸膈中不化，方用朴消。云無朴消者，以芒消代皆可用也。又下生消條云：生茂州西山岩石間，其形塊大小不常，色青白，鮮見用者。而今醫家又用一種甜消，彌更精好，或疑是此，乃云出於英消。煉治之法未聞。又南方醫人論消或小異。有著其説於其中。又煉朴消或地霜而成，堅白如石者，乃消石也，一名芒消。又取朴消，以暖水淋汁，煉之減半，投於盆中，經宿而有細芒生，乃芒消也。雖一體而修煉之法既殊，則主治之功別矣。然《本經》各載所出，疑是二種。而今醫方家所用，亦不復能究其所來，但以未煉成塊，微青色者，爲朴消。煉成盆中上有芒者，爲芒消，亦謂之盆緊，芒消底澄凝者，爲消石。朴消力消次之，消石更緩，未知孰爲真者。又按：蘇恭謂晉宋古方，多用消石，少用芒消。近代諸醫但用芒消，鮮言消石，是不然也。張仲景《傷寒方》承氣湯、陷胸丸之類，皆用芒消。葛洪《肘後方》傷寒、時氣、温病亦多用芒消，惟治食鱠胸膈中不化，方用朴消。云無朴消者，以芒消代皆可用也。又下生消條云：生茂州西山岩石間，其形塊大小不常，色青白，鮮見用者。而今醫家又用一種甜消，彌更精好，或疑是此，乃云出於英消。煉治之法未聞。又南方醫人論消或小異。有著其説



云：《本草》有朴消、消石、芒消，而無馬牙消，諸家所注本草三種，竟無堅訣，或言芒消、消石本是一物，不合重出。又言煎煉朴消，投於盆中經宿乃有細芒，既如是，自當爲馬牙消。又云：馬牙消亦名英消，自是一物，既以芒消爲朴消，所出不應更有英消。今諸消之體各異，理亦易明，而至若此之惑也。朴消味苦而微鹹，《本經》言苦，《名醫別録》以爲辛，蓋誤謂消石也。出蜀郡者，瑩白如冰雪，内池[32]者小黑，皆蘇脆易碎，風吹之則結霜，泯泯如粉，熬之烊沸，亦可鎔鑄。以水合甘草，猪膽煮之減半，投之大盆中，又下凝水石屑同漬一宿，則凝結如白石英者，芒消也。掃地霜煎煉而成如解鹽，而味辛苦，燒之成焰都盡，則消石也。能化金石，又性畏火而能制諸石使拒火，亦天地之神物也。牙消則芒消是也。又有生消，不因煮煉而成，亦出蜀道，類朴消而小堅也。其論雖辯，然與古人所説殊別，亦未可全信也。

陶隱居云：今出益州北部故汶山郡、西川、蠶陵二縣界。生山崖上，色多青白，亦雜黑斑。俗人擇取白軟者，以當消石用之，當燒令汁沸出，狀如礬石也。《仙經》惟云：消石能化他石。今此亦云能化石，疑必相似，可試之。

《唐本》注云：此藥有二種，有縱理、縵理，用之無別。白軟者，朴消苗也，虚軟少力，煉爲消石，所得不多，以當消石，功力大劣也。

《日華子》云：主通泄五臟百病及癥結，治天行熱疾，消腫毒及頭痛，排膿，潤毛髮。凡入飲藥，先安於盞内，攪熱藥澆服。

禹錫云：謹按《藥性論》云：朴消，君，味苦，鹹，有小毒。能治腹脹，大小便不通，女子月候不通。

《聖惠方》：治時氣頭痛不止。用朴消二兩，搗羅爲散，用生油調，塗於頂上。又方：治乳石發動煩悶及諸風熱。用朴消煉成者半兩，細研如粉，每服以蜜水調下一錢匕。日三四服。

《外臺秘要》：療喉痹神驗。朴消一兩，細細含咽汁，頃刻立差。

《簡要濟衆》：治小便不通，膀胱熱。白花散：朴消不以多少，研爲末，每服二錢[32]，温茴香酒調下。

《衍義》曰：朴消，是初採掃得，一煎而成者，未經再煉治，故曰朴消。其味酷澀，所以力堅急而不和，可以熟生牛、馬皮，及治金銀有僞。葛洪治食鱠不化，取此以蕩逐之。臘月中以新瓦罐，滿注熱水，用朴消二升，投湯中，攪散，掛北檐[34]下，俟消滲出罐外，却收之。以人乳汁調半錢，掃一切風熱毒氣攻注目瞼外，及發於頭面、四肢腫痛，應手神驗。

玄明粉

味辛、甘，冷，無毒。治心熱煩躁，并五臟宿滯、癥結。明目，退膈上虚熱，消腫毒。此即朴消煉成者。

《仙經》云：以朴消製伏爲玄明粉。朴消是太陰之精華，水之子也。陰中有陽之藥。太陰號曰玄明粉，内搜衆疾，功莫大焉。治一切熱毒風邪，令疫癖氣脹滿，五勞七傷，骨蒸傳尸，

頭痛煩熱，搜除惡疾，五臟秘澀，大小腸不通，三焦熱淋，疰忤疾，咳嗽嘔逆，口苦乾澀，咽喉閉塞，心、肝、脾、肺臟胃積熱，驚悸，健忘，榮衛不調，中酒中膾，飲食過度，腰膝冷痛，手脚痠，久冷久熱，四肢壅塞，背膊拘急，眼昏目眩，久視無力，腸風痔病，血癖不調，婦人產後，小兒疳氣，陰毒傷寒，表裏疫癘等疾，并悉治之。久服令人身輕目明，駐顏延壽。急解毒藥，補益，妙。

唐明皇帝聞説終南山有道士劉玄真服食此藥，遂詔而問曰：朕聞卿壽約三百歲，服食何藥，得住世間，充悦如此？玄真答曰：臣按《仙經》修煉朴消，號玄明粉，止服此藥，遂無病長生。其藥無滓，性温，能除衆疾。生餌尚能救急難性命，何況修煉長服？益精壯氣，助陽證陰。

馬牙消　味甘，大寒，無毒。能除五臟積熱伏氣。末篩點眼及點眼藥中用，甚去赤腫障翳澀泪痛。

《圖經》曰：文具朴消條下。

《經驗方》：治食物過飽不消，遂成痞鬲。馬牙消一兩，碎之，吴茱萸半斤陳者，煎取茱萸濃汁投消，乘熱服，良久未轉㉟，更進一服，立愈。寶群在常州，此方得效。又方：退翳明目，白龍散：馬牙消光淨者，用厚紙裹，令按實，安在懷内著肉處。養一百二十日取出，研如粉，入少龍腦同研細，不計年歲深遠，眼内生翳膜，漸漸昏暗，遠視不明，但瞳人不破散并醫得，每點用藥末兩米許，點目中。

《簡要濟衆方》：治小兒鵝口。細研馬牙消，於舌上摻大豆許，日三五度。

《姚和衆方》：治小兒重舌。馬牙消塗舌下，日三度。

太清伏煉靈砂法：馬牙消，陰極之精，能制伏陽精，消化火石之氣。

生消　味苦，大寒，無毒。主風熱癲癇，小兒驚邪，癡瘂，風眩頭痛，肺壅，耳聾，口瘡，喉痹咽塞，牙頷腫痛，目赤熱痛，多眵泪。生茂州西山岩石

---

❶澈：原作『徹』，據晦明軒本改。下仿此。
❷砂：原作『碎』，據晦明軒本改。
❸小：晦明軒本作『水』。
❹斷：晦明軒本作『辟』。
❺洎：晦明軒本作『泊』。
❻五色并具而多青者，名雲英，宜以春服之：此十六字原脱，據晦明軒本補。
❼珠：原作『母』，據晦明軒本改。
❽名：原脱，據晦明軒本補。
❾底：此下原衍『却漿在鍋底』五字，據晦明軒本删。
❿棘：原作『踈』，據晦明軒本改。
⓫售：原作『集』，據晦明軒本改。
⓬紅：原作『經』，據晦明軒本改。
⓭尸：原作『口』，據晦明軒本改。
⓮澈：原作『徹』，據晦明軒本改。下仿此。
⓯入：晦明軒本作『主』。
⓰飛：晦明軒本作『形』。
⓱弩：原作『弩』，據晦明軒本改。
⓲一匕：晦明軒本作『二七』，屬下讀。
⓳温：原作『温』，據晦明軒本改。
⓴産：原作『産』，據晦明軒本改。

㉝嵌：晦明軒本作『嵌』。
㉝多：晦明軒本作『作』，屬上讀。
㉝須求：晦明軒本作『頃來』。
㉞掘：晦明軒本作『握』。
㉝斗：晦明軒本作『中』。
㉖吕：晦明軒本作『吴』。
㉝搦：原作『榻』，據晦明軒本改。
㉝亦：晦明軒本作『生』。
㉙勞淋：原脱，據晦明軒本補。
㉝晦明軒本作『小』。
㉝搏：原作『博』，據晦明軒本改。
㉜池：晦明軒本作『地』。
㉝錢：晦明軒本『錢』下有『匕』字。
㉞檐：原作『蒼』，據晦明軒本改。
㉟轉：原作『輔』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之二

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

玉石部上品

滑石

州道



滑石　味甘，寒、大寒，無毒。主身熱、泄澼，女子乳難，癃閉，利小便，蕩胃中積聚寒熱，益精氣，通九竅六腑津液，去留結，止渴，令人利中。久服輕身，耐饑，長年。一名液石，一名共石，一名脱石，一名番石。生赭陽山谷及太山之陰，或掖北白山，或卷羌權切山。採無時。石韋爲之使，惡曾青。

《圖經》曰：滑石，生赭陽山谷及太山之陰，或掖北白山、或卷山，今道、永、萊、濠州皆有之。此有二種，道、永州出者，白滑如凝脂。《南越志》云：臯城縣出膏石，膏石即滑石也。土人以爲燒器，用以烹魚是也。萊、濠州出者，理粗質青，有白黑點，亦謂之斑石。二種皆可作器用，甚精好。初出軟爛如泥，久漸堅强，彼人皆就穴中乘其軟時制作，用力殊少，不然堅强費功。《本經》所載土地，皆是北方，而今醫家所用，多是色白者，乃自南方來。又按《雷敦炮炙方》滑石有五色，當用白色如方解石者。其緑色者，性寒有毒，不入藥。又云：滑石似冰，白青色，畫石上有白膩文者爲真。如此説，則與今南中來者又皆相類，用之無疑矣。然雷敦雖名隋人，觀其書乃有言唐以後藥名者，或是後人增損之歟。

陶隱居云：滑石，色正白，《仙經》用之以爲泥。又有冷石，小青黄，性并冷利，亦能熨油污衣物。今出湘州、始

安郡諸處。初取軟如泥，久漸堅强，人多以作冢中明器物，并散熱人用之，不正入方藥。赭陽縣先屬南陽，漢哀帝置，明《本經》所注郡縣，必是後漢時也。掖縣，屬青州東萊；卷縣，屬司州滎陽。

陳藏器云：按始安及掖縣所出二石，形質既異，所用又殊。陶云不知今北方有之否，當陶之時北方阻絶，不知之者，曷足怪焉？蘇恭引爲一物，深可嗟訝。其始安者，軟滑而白，是滑石。東萊者，硬澀而清，乃作器石也。

《唐本》注曰：此石所在皆有。嶺南始安出者，白如凝脂，極軟滑。其出掖縣者，理粗質青，白黑點，惟可爲器，不堪入藥。齊州南山神通寺南谷亦大有，色青白不佳，至於滑膩，猶勝掖縣者。

《日華子》云：滑石治乳癰，利津液。

雷公云：凡使，有多般，勿誤使之。有白滑石、緑滑石、烏滑石、冷滑石、黄滑石。其白滑石如方解石，色白，於石上畫有白膩文，方使得。滑石中用。烏滑緑者，性寒，有毒，不入藥中用。

石似鱉色❶，畫石上有青黑色者，勿用，殺人。冷滑石青蒼色，畫石上作白膩文，亦勿用。若滑石色似冰，白青色，畫石上有白膩文者，真也。凡使，先以刀刮，研如粉，以牡丹參、蜜❷、猪脂爲出，去牡丹皮取滑石，却用東流水淘過，於日中曬乾方用。

禹錫云：謹按《藥性論》云：滑石，臣。一名夕冷。能療五淋，主難産。服其末，又末與丹參、蜜❸、猪脂爲膏，入其月即空心酒下彈丸大，臨産倍服，令滑胎易生。除煩熱心躁，偏主石淋。

《聖惠方》：治乳石發動，躁熱煩渴不止。滑石半兩，細研如粉，以水一中盞，絞如白飲，頓服之，未差再服。

又方：治婦人過忍小便致胞轉。滑石末，葱湯調下二錢❸。

《外臺秘要》：療妊娠不得小便，滑石末水和，泥臍下二寸。

《楊氏産乳》云：療小便不通。滑石末，以車前汁和塗臍四畔，方四寸，熱即易之，水和亦得。

《丹房鏡源》云：滑石能制雄、雌黄爲外匱。

《廣利方》：治氣壅，關格不通，小便淋結，臍下妨悶兼痛。以滑石八分，研如麵，水五大合和，頓服。

《衍義》曰：滑石，今謂之畫石，以其軟滑可寫畫，淋家多用。若暴得吐逆不下食，以生細末二錢匕，温水服。仍急以熱麵半盞，壓定。

信州

石膽



石膽　味酸、辛，寒，有毒。主明目、目痛，金瘡，諸癇痙巨郢切，女子陰蝕痛，石淋寒熱，崩中下血，諸邪毒氣，令人有子，散癥積，咳逆上氣，及鼠瘻惡瘡。煉餌服之，不老，久服增壽神仙。能化鐵爲銅，成金銀。一名畢石，一名

黑石，一名棋石，一名銅勒。生羌道山谷、羌里句青山。二月庚子、辛丑日採。水英爲之使，畏牡丹❹桂、菌桂、芫花、辛夷、白薇。

陶隱居云：《仙經》有用此處，俗方甚少，此藥殆絶。今人時有採者，其色青緑，狀如琉璃而有白文，易破折。梁州、信都無復有，俗用乃以青色礬石當之，殊無仿佛。《仙經》一名立制石。

《圖經》曰❺：石膽，生羌道山谷羌里句青山，今惟信州鉛山縣有之。生於銅坑中，採得煎煉而成。又有自内生者，尤爲珍貴。并深碧色。入吐風痰藥用最快。二月庚子、辛丑日採。

蘇恭云：真者，出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中，有塊如鷄卵者爲真。今南方醫人多使之。

禹錫按：吴氏云：石膽，神農：酸，小寒。季氏：大寒。桐君：辛，有毒。扁鵲：苦，無毒。《藥性論》云：破熱毒，陸英爲使。石膽，君，有大毒。療齒痛及落盡。細研石膽，以人乳汁和如膏，搽所痛齒上或孔中，日三四度。止痛，復生齒，百日復生齒。每日以新汲水漱令净。

《梅師方》：治甲疽。以石膽一兩，於火上燒令烟盡，碎研末，傅瘡上。不過四五度立差。

《勝金方》：治一切毒。以膽子礬爲末，用糯米糊丸如鷄頭實大，以朱砂衣，常以朱砂養之，冷水化一丸，亦❻無時。

《圖經》曰：空青，生益州山谷及越嶲山有銅處，銅精熏則生空青，今信州亦時有之。狀若楊梅，故别名楊梅青。其腹中空，破之有漿者絶難得。亦有大者如鷄子，小者如豆子，正❽月中旬採，亦無時。古方雖稀用，而今治眼翳障，爲最要之物。

《藥性論》云：空青，君，畏菟絲子。能治頭風，鎮肝，瞳人破者，再得見物。蕭炳云：空❾，如楊梅者勝。

陶隱居云：越嶲屬益州。今出銅官者，色最鮮深，出始興者弗如，益州諸郡無復有，恐久不採之故也。涼州西平郡有空青山，亦甚多。今空青但圓實如鐵珠，無空腹者，皆鑿土石中取



空青





味甘、酸，寒、大寒，無毒。

之。又以合丹成，則化鉛爲金矣。諸石藥中，惟此最貴。醫方乃稀用之，而多充畫色，殊爲可惜。

《日華子》云：空青大者如鷄子，小者如相思子，其青厚如荔枝殼，內有漿酸甜，能點多年青盲內障翳膜，養精氣，其殼又可摩翳也。

《千金方》：治眼瞎瞎不明。以空青少許，漬露一宿，以水點之。

《肘後方》：治中風，手臂不仁，口喎僻。取空青末一豆許，著口中，漸入咽，即愈。

《衍義》曰：空青，功長於治眼。宋仁宗朝，嘗詔御藥院，須中空有水者，將賜近戚，久而方得。其楊梅青，治翳極有功。中亦或有水者，其用與空青同，第有優劣。今信州穴山而取，世謂之楊梅青，極難得。

曾青　味酸，小寒，無毒。主目痛，止淚出，風痹，利關節，通九竅，破癥堅積聚，養肝膽，除寒熱，殺白蟲，療頭風、腦中寒，止煩渴，補不足，盛陰氣，久服輕身不老。能化金、銅。生蜀中山谷及越巂採無時。畏菟絲子。



曾青

《圖經》曰：文具空青條下。

陶隱居云：此説與空青同山，療體亦相似。今銅官更無曾青，惟出始興。形累累如黃連相綴，色理小類空青，甚難得而貴。《仙經》少用之。化金之法，事同空青。

雷公云：凡使，勿用夾石及銅青。若修事一兩，要紫背天葵、甘草、青芝草三件，乾、濕各一鎰，并細剉，放於一瓷堝內，將曾青於中。東流水二鎰并諸藥等，緩緩煮之，五晝夜，勿令水火失時，足取出，以東流水浴過，却入乳鉢中，研如粉用。



禹餘糧

《丹房鏡源》云：曾青結汞製丹砂，金氣之所生。

《寶藏論》：曾青若住火成膏者，可立制汞成銀，轉得八石。

禹餘糧　味甘，寒、平，無毒。主咳逆，寒熱，煩滿，下赤白，血閉，癥瘕，大熱，療小腹痛結煩疼。煉餌服之，不饑，輕身延年。一名白餘糧。生東海池澤及山島中，或池澤中。

《圖經》曰：禹餘糧，生東海池澤及山島中、或池澤中，今惟澤、潞州有之。舊説形如鵝鴨卵，外有殼重疊，中

有黃，細末如蒲黃。今圖上者，全是山石之形，都不作卵狀，與舊説小異。採無時。《本經》又有太一餘糧。謹按：陶隱居《登真隱訣》載長生四鎮丸云：太一禹餘糧，定六腑，鎮五臟。注云：按本草有太一餘糧、禹餘糧兩種。治體猶同。而今世惟有禹餘糧，不復識太一。此方所用，遂合其二名，莫辨何者的是。而後小鎮直云：禹餘糧，便當用之耳。餘糧多出東陽山岸間，茅山甚有，好者狀如牛黃，重重甲錯，其佳處乃紫色，泯泯如麵，嚙之無復碜。雖然用之，宜細研，以水洮取汁澄之，勿令有沙土也。

陶隱居云：今多出東陽，形如鵝鴨卵，外有殼重疊，中有黃細末如蒲黃，無沙者爲佳。近年茅山鑿地大得之，極精好，乃有紫華靡靡。《仙經》服食用之。南人又呼平澤中有一種藤，葉如菝葜，根作塊有節，似菝葜而色赤，根形似薯預，謂爲禹餘糧。言昔禹行山乏食，採此以充糧，而棄其餘，此云白餘糧也。生池澤復有仿佛。或疑今石者，即是太一也。

張華云：地多蓼者，必有餘糧，今廬江之間便是也。適有人於銅官採空不饑，輕身，飛行千里，神仙。一名石青於石坎，大得黃赤色石，極似今之餘糧，而色過赤好，疑此是太一也。彼人呼爲雌黃，試塗物，正如雄黃色爾。

《日華子》云：治邪氣及骨節疼，四肢不仁，痔瘻等疾。久服耐寒暑。

陶隱居云：今人惟總呼爲太一禹餘糧，自專是禹餘糧爾，無復識太一者，然療體亦相似，《仙經》多用之，四鎮丸亦總名太一禹餘糧。

《經驗方》：治產後煩躁。禹餘糧一枚，狀如酸餡者，入地埋一半，四面緊築，用炭一秤，發頂火一斤煅，去火三分耗二爲度，用濕砂土罨一宿方取，打去外面一重，只使裏面細研水淘澄五七度，將紙襯乾再研數千遍。患者用甘草煎湯調二錢匕，只一服立效。

《勝金方》：治婦人帶下。白下：禹餘糧，皆以精粗爲名。餘糧中黃子，年多變赤，從赤入紫。俱名太一餘糧。雜色者即禹餘糧。按蘇云禹餘糧及太一禹餘糧，紫色爲名，都無按據。且太一者，道之宗源，太者大也，一者道也，大道之師，即禹之理化。神君，禹之師也。師常服之，故有太一之名。兼服混然。張司空云：還魂石中黃子，鬼物禽獸守之，不可妄得，即其神物也。會稽有地名蓼，出餘糧，土人掘之，以物請買，所請有數，依數必得，不可妄求，此猶有神，豈非太一也。

太一餘糧　味甘，平，無毒。主咳逆上氣，癥瘕，血閉，漏下，除邪氣，肢節不利，大飽絶力身重。久服耐寒暑，不饑，輕身，飛行千里，神仙。一名石腦。生太山山谷。九月採。杜仲爲之使，畏貝母、菖蒲、鐵落。

《圖經》文具禹餘糧下。

陶隱居云：今人惟總呼爲太一禹餘糧，自專是禹餘糧爾，無復識太一者，然療體亦相似，《仙經》多用之，四鎮丸亦總名太一禹餘糧。

陳藏器云：蘇云禹餘糧及太一禹餘糧，皆以精粗爲名。餘糧中黃子，年多變赤，從赤入紫。俱名太一餘糧。雜色者即禹餘糧。按蘇欽[11]此談，直以紫色爲名，都無按據。且太一者，道之宗源，太者大也，一者道也，大道之師，即禹之理化。神君，禹之師也。師常服之，故有太一之名。兼服混然。張司空云：還魂石中黃子，鬼物禽獸守之，不可妄得，即其神物也。會稽有地名蓼，出餘糧，土人掘之，以物請買，所請有數，依數必得，不可妄求，此猶有神，豈非太一也。

雷公云：凡使，勿誤用石中黃并卵石黃，此二名石，真似禹餘糧也。太一禹餘糧，看即如石，輕敲便碎，可如粉也。凡修事四兩，先用黑豆五合，黃精五合，水二斗，煮取五升，置於瓷鍋中，下禹餘糧，著火煮，旋添，汁盡爲度。其藥氣自然香如新米，搗了又研一萬杵方用。

禹錫云：太一禹餘糧，一名禹哀。神農、岐伯、雷公：甘，平。季氏：小寒。扁鵲：甘，無毒。生太山上，有甲，甲中有白，白中有黃，如鷄子黃色。九月採，或無時。惡馬目毒公。

白石英



味甘、辛，微温，無毒。主消渴，陰痿不足，咳逆，胸膈間久寒，一禹餘糧也。《仙經》大小并有用，惟須益氣，除風濕痹，療肺痿，下氣，利小便，補五臟，通日月光。久服輕身長年，耐寒熱。生華陰山谷及太山。大二月採，亦無時。

《圖經》曰：白石英，生華陰山谷及太山。陶隱居以新安出者佳。蘇恭以澤州者爲勝。今亦澤州出焉。大抵極細長白澈者。壽陽八公山多大者，不正用之。《仙經》大小并有用，惟須精白無瑕雜者。如此説，則大者爲佳。其四色英，今不復用。

禹錫云：按吴氏云：白石英，神農：甘。岐伯、黄帝、雷公、扁鵲：無毒。生太山，形如紫石英。

《日華子》云：五色石英，平。治心腹邪氣，女人心腹痛，鎮心，療胃中冷氣，益毛髮，悦顔色，治驚悸，安魂定魄，壯陽道，下乳，通亮者爲上。其補石英，青端名青石英，黑端名黑石英。

《聖惠方》：治腹堅脹滿，號石水方：用白石英十兩，槌如大豆大，以瓷瓶盛，用好酒二斗浸，以泥重封瓶口，用馬糞及糠火燒之，長令酒小沸，從卯至午即住火，候次日暖一中盞飲，日可三度。如吃酒少，隨性飲之。其白石英，可更一度燒之。

《簡要濟衆方》：治心不安，驚悸，肺癰吐膿，治嗽逆上氣，疸黄。

陶隱居云：今醫家用新安所出，

夜卧，金銀湯調下。

《衍義》曰：白石英，狀如紫石英，但差大而六棱，白色如水精。紫、白二石英，當攻疾，可暫煮汁用，未聞久服之益。張仲景之意，只令吹咀，不爲細末者，豈無意焉。其久服，更宜詳審。

紫石英

味甘、辛，温，無毒。主心腹咳逆邪氣，補不足，女子風寒在子宫，絶孕十年無子，療上氣心腹痛，寒熱邪氣結氣，補心氣不足，定驚悸，安魂魄，填下焦，止消渴，除胃中久寒，散癰腫，令人悦澤。久服温中，輕身延年。生太山山谷。採無時。長石爲之使，得茯苓、人參、芍藥共療心中結氣；得天雄、菖蒲，共療霍亂，畏扁青、附子，不欲鮀甲、黄連、麥句薑。

《圖經》曰：紫石英，生太山山谷，今嶺南及會稽山中亦有之。謹按：《吴普本草》云：紫石英，生太山及會稽，欲令如削，紫色達頭如椵蒲者。

陶隱居云：今第一用太山石，色重澈[14]，下有根。次出雹零山，亦好。又有南城石，無根。重黑，不明澈。又有青綿石，色亦一物如眼。吴興石四面纔有紫色，無光澤。會稽諸暨石，形色如石燕[15]子。最勝，餘處者，可作丸散家採擇，惟太山先時并雜用。今丸散家採擇，惟太山正用，而爲俗方所重也。

《日華子》云：紫石英，治癰腫毒等，醋淬搗爲末，生薑、米醋煎，傅之。摩亦得。

《衍義》曰：紫石英，明澈如水精，其色紫而不勻。張仲景治風熱瘈瘲及驚癎瘈瘲風引湯：紫石英、白石英、寒水石、石膏、乾薑、大黄、龍齒、牡蠣、甘草、滑石等分，混合吹咀，以水一升，煎去三分，食後量多少温呷，不用滓，服之無不效者。

青石、赤石、黄石、白石、黑石脂等

味甘，平。主黄疸，泄痢，腸澼，膿血，陰蝕，下血，赤白，邪氣，癰腫，疽痔，惡瘡，疥瘙。久服補髓，益氣，肥健，不饑，輕身，延年。五石脂各隨五色補五臟。生南山之陽山谷中。

禹錫云：按《蜀本》云：今義陽山甚有之，一本南陽山谷中也。

青石脂

味酸，平，無毒。主養肝膽氣，明目，療黄疸，泄痢腸[16]澼，女子帶下百病，及疽痔，惡瘡。久服補髓，益氣，不饑，延年。生齊區山及海崖。採無時。

赤石脂

味甘、酸、辛，大温，無毒。主養心氣，明目益精，療腹痛，泄澼，下痢赤白，小便利，及癰疽瘡痔，女

赤石脂





子崩中漏下，産難，胞衣不出。久服補髓，好顔色，益智，不饑，輕身延年。生濟南、射陽及太山之陰。採無時。惡大黄，畏芫花。

《圖經》曰：赤石脂，生濟南、射陽及太山之陰。蘇恭云：濟南太山不聞出者，惟虢州盧氏縣、澤州陵川縣、慈州吕鄉縣并有，及宜州諸山亦出，今出潞州。以色理鮮膩者爲勝，採無時。

《唐本》注云：此石濟南太山不聞出者，今虢州盧氏縣、澤州陵川縣及慈州吕鄉縣并有，色理鮮膩，宜州諸山亦有。此五石脂中，又有石骨，似骨，如玉堅潤，服之力勝鍾乳。

禹錫云：按《藥性論》云：赤石脂，君，惡松脂，補五臟虚乏。

《千金翼》論曰：治痰飲吐水無時節者，其源以冷飲過度，遂令脾胃氣羸，不能消於飲食，飲食入胃，則皆變成冷水，反吐不停，皆赤石脂散主之。赤石脂一斤，搗篩，服方寸匕，酒飲自任，稍稍加至三匕。服盡一斤，終身不吐淡水。又不下痢，補五臟，令人肥健。有人痰飲，服諸藥不效，用此方丸，終四劑，遂愈。

白石脂





味甘、酸，平，無毒。主養肺氣，厚腸，補骨髓，療五臟驚悸不足，心下煩，止腹痛下水，小腸澼熱溏，便膿血，女子崩中漏下，赤白沃，排疽癰瘡痔。久服安心，不饑，輕身長年。生太山之陰。採無時。得厚朴并米汁飲，止便膿。燕屎爲之使，惡松脂，畏黄芩。

《圖經》曰：白石脂，生太山之陰。蘇恭云：出慈州諸山，泰山左側，不聞有之。今惟潞州有焉，潞與慈相近，此亦應可用。古斷下方多用，而今醫家亦稀使，採無時。五色石脂舊經同一條，并生南山之陽山谷中，主治并同，後人各分之，所出既殊，功用亦別，用

之當依後條。今惟用赤、白二種，餘不復識。

《藥性論》云：白石脂，一名白符。惡馬目毒公。味甘、辛。澀大腸。

《唐本》注云：白石脂，今出慈州諸山，勝於餘處者。太山左側不聞有之。

唐·韋宙《獨行方》：治小兒臍中汁出不止兼赤腫，以白石脂細末，熬温，撲臍中，日三良。

《斗門方》：治瀉痢。用白石脂、乾薑二物停搗，以百沸湯和麵爲稀糊，搜匀，併手丸如梧子，暴乾，飲下三十丸。霍亂，煎漿水爲使。

《子母秘録》：治小兒水痢，形羸不勝大湯藥。白石脂半大兩研如粉，和白粥空服與食。

緑青

味酸，寒，無毒。主益氣，療胤音求鼻，止泄痢。生山之陰穴中，色青白。

陶隱居云：此即用畫緑色者，亦出空青中，相帶挾。畫工呼爲碧青，呼空青作緑青，已[20]反矣。



《唐本》注云：緑青即扁青也，畫工呼爲石緑。其碧青即白青也，不入畫用。

《衍義》曰：緑青，即石緑是也。其石黑緑色者佳，大者[20]刻爲物形，或作器用。又同硇砂，作吐風涎藥，驗則驗矣，亦損心肺。

石中黄子

味甘，平，無毒。久服輕身，延年不老。此禹餘糧黄濁水也。出餘糧處有之。陶云：芝品中有石中黄子，非也。



《圖經》曰：石中黄子，《本經》不載所生州土，云出禹餘糧處處[22]有之，今惟出河中府中條山谷内。舊説是餘糧殼中未成餘糧黄濁水。今云其石形如麵劑，紫黑色，石皮内黄色者，謂之中黄。兩説小異。謹按：葛洪《抱朴子》云：石中黄子所在有之，近水之山尤多，在大石中，其石常潤濕不燥，打石，石有數十重，見之赤黄，溶溶如鷄子之在殼，得時即當飲之，不爾，便堅凝成石，不中服也。

《衍義》曰：石中黄子，此又字誤也。子當作水，況當條目言未成餘糧黄濁水，焉得却名之子也？若言未乾者，亦不得謂之子也。子字乃水字無疑。又曰：太一餘糧者，則是兼石言

之者也。今醫家用石中黃，只石中乾者及細末者，即便是。若用禹餘糧石，即用其殼故㉓。故本條言一名石腦，須火燒醋淬。如此即是石中黃水爲一等，石中黃爲一等，太一餘糧爲一等，斷無疑焉。

無名異



無名異　味甘，平。主金瘡折傷內損，止痛，生肌肉。出大食國。生於石上。狀如黑石炭，蕃人以油煉如黶，調中，大人、小兒泄痢腸癖，下膿血，去白蟲，除黃疸，癰疽蟲。石，嚼之如餳。

《圖經》曰：無名異，出大食國，生於石上。今廣州山石中，及宜州南八里龍濟山中亦有之。黑褐色，大者如彈丸，小者如墨石子。採無時。《本經》云：味甘，平。主金瘡折傷內損，生肌肉。今云味鹹，寒。消腫毒癰疣，與《本經》所說不同，疑別是一種。又嶺南人云：有石無名異，絶難得。有草無名異，彼人不甚貴重。豈《本經》說者爲石，而今所有者爲草乎？用時以醋磨塗傅所苦處。

禹錫云：按《日華子》云：無名異，今《圖經》無名異，無毒。

《衍義》曰：無名異，味甘，平。治金瘡折傷，生肌肉。今云味鹹，寒。消腫毒癰疽，與《本經》所說不同，疑別是一種。今詳上文三十六字，未審今云字下，即不知是何處云也。

黃石脂　味苦，平，無毒。主養脾氣，安五臟，調中，大人、小兒泄痢腸澼，下膿血，去白蟲，除黃疸，癰疽蟲。久服輕身延年。生嵩高山。色如鶩雛。採無時。曾青爲之使，惡細辛，畏蜚蠊。

雷公云：凡使，須研如粉，用新汲水投於器中，攪不住手，了，傾作一盆。如此飛過三度。澄者去之，取飛過者，任入藥中使用，服之不問多少，不得食卵味。

黑石脂　味鹹，平，無毒。主養腎氣，强陰，主陰蝕瘡，止腸澼泄痢，療口瘡咽痛。久服益氣，不饑延年。一名石涅，一名石墨。出潁川陽城。採無時。

陶隱居云：此五石脂如《本經》，療體亦相似，《別録》各條，所以具載，今俗用赤石、白石二脂爾。

《日華子》云：五色石脂，并温，無毒。畏黃芩、大黃。

白青　味甘、鹹、酸，平，無毒。主

明目，利九竅，耳聾，心下邪氣，令人吐，殺諸毒三蟲。久服通神明，輕身，延年不老。可消爲銅劍，辟五兵。生豫章山谷。採無時。

陶隱居云：此醫方不復用，市人亦無賣者，惟《仙經》三十六水方中時有須處。銅劍之法，具在《九元子術》中。

《唐本》注云：陶所云，今空青，圓如鐵珠，色白而腹不空者是也。研之色有如碧色，謂之碧青，不入畫用。無空青時，亦用之，名魚目青，以形似魚目故也。今出簡州、梓州者好。

菩薩石　平，無毒。解藥毒、蠱毒，及金石藥發動作癰疽渴疾，消撲損瘀血，止熱狂驚癇，通月經，解風腫，除淋，并水磨服。蛇蟲、蜂蝎、狼犬、毒箭等所傷，并末傅之，良。新補。見《日華子》。

《衍義》曰：菩薩石，出峨嵋山中，如水晶明澈，日中照出五色光，如峨嵋普賢菩薩圓光，因以名之。今醫家鮮用。

婆娑石　主解一切藥毒，瘴疫熱悶頭痛。生南海。胡人採得之，無斑點，有金星，磨成乳汁者爲上。又有豆斑石，雖亦解毒，功力不及，復有鄂綠，有文理，磨點鷄熱血，當化成水是也。

陶隱居云：《仙經》俗方都無用此即俗謂之摩娑石。今則轉爲摩娑石，如淡色石綠間微有金星者佳，磨之色如淡乳汁，其味淡。又有豆斑石，亦如此石，但於石上有黑斑點，無金星。

《衍義》曰：婆娑石，如淡色石綠間微有金星者佳，磨之色如淡乳汁，其味淡。又有豆斑石，亦如此石，但於石上有黑斑點，無金星。

綠礬　涼，無毒。治喉痹，蚵牙，口瘡及惡瘡疥癬。醸鯽魚燒灰和服，療腸風瀉血。新補。見《日華子》。

《圖經》曰：文具附礬石條下。

柳絮礬　冷，無毒。消痰，治渴，潤心肺。新補。見《日華子》。

《圖經》曰：文具附礬石條下。

扁青　上音褊　味甘，平，無毒。主目痛、明目，折跌，癰腫，金瘡不瘳，破積聚，解毒氣，利精神，去寒熱風痹，及丈夫莖中百病，益精。久服輕身不老。生朱崖山谷、武都、朱音殊提音持。採無時。

陶隱居云：《仙經》俗方都無用者。朱崖郡先屬交州，在南海中，晉代省之。朱提郡今屬寧州。

禹錫云：按吴氏云：扁青，神農、雷公：小寒，無毒。生蜀郡。治丈夫內絶，令人有子。

金綫礬　《廣州志》云：生波斯國。味鹹、酸、澁，有毒。主野鷄癆痔，惡瘡疥癬等疾。打破内有金綫文者爲上。多入燒家用。

波斯白礬　《廣州記》云：出大秦國。其色白而瑩淨，内有棘針紋。味酸、澁，温，無毒。主赤白漏下，陰蝕泄痢，瘡疥，解一切蟲蛇等毒。去目赤暴腫，齒痛。火煉之良。惡牡礪。多入丹竈家，功力逾於河西石門者，近日文州諸番往往亦有，可用也。

古鏡　味辛，無毒。主驚癇邪氣，小兒諸惡。煮取汁和諸藥煮服之。文字彌古者佳爾。

金漿　味辛，平，無毒。主長生神仙。久服腸中盡爲金色也。

鐵銹　主惡瘡疥癬，和油塗之。蜘蛛蟲等咬，和蒜磨傅之。此鐵上衣也。銹生鐵上者堪用。

銅盆　主熨霍亂。可盛灰厚二寸許，以炭火安其上，令微熱，下以衣籍㉔患者腹，漸漸熨之。腹中通熱差。

黃銀　銀注中蘇云：作器辟惡，瑞物也。按瑞物即黃銀載於《圖經》。銀瓮丹甑，非人所爲，既堪爲器，明非瑞物。今烏銀辟惡，煮之，工人以爲器物，養生者爲器，以煮藥。兼於庭中，高一丈，夜承得醴，投別器中，飲長年。今人作烏銀以硫黃熏之，再宿，瀉之出，即其銀黑矣。此是假，非真也。

石黃　雄黃注中陶云：通名黃石。按石黃，今人敲取精明者爲雄黃，外黑者爲熏黃。主惡瘡，殺蟲，熏瘡疥蟣虱，和諸藥熏嗽。其武都雄黃，燒不臭。熏黃中者，燒則臭。以此分別之，蘇云通名，未知是也。

玄黃石　味甘，平，温，無毒。主驚恐身熱邪氣，鎮心。久服令人眼明，令人悦澤。出淄川北海山谷土中。如赤土，代赭之類。又有一名零陵，極細，研服之，如代赭。土人用以當朱，呼爲赤石，恐是代赭之類也。人未用之。

石欄杆　味辛，平，無毒。主石淋，破血，産後惡血。磨服，亦煮汁服，亦火燒投酒中服。生大海底，高尺餘，如樹，有眼、莖，莖上有孔，如物點之，漁人以網罟得之，初從水出，微紅，後漸青。

石髓　味甘，温，無毒。主寒熱

玉膏　味甘，平，無毒。玉石。主延年神仙。術家取蟾蜍膏軟玉如泥，以苦酒消之成水，此則爲膏之法。未試。赤土，代赭之類。又有一名零陵，極細，研服之，如代赭。土人用以當朱，玉石間水，飲之長生，令人體潤，以玉投朱草汁中，化成醴，朱草瑞物，已出金水卷中。《十洲仙記》瀛洲有玉膏泉如酒，飲之數杯輒醉，令人長生。洲上多有仙家似吴兒，雖仙境之事，有可憑者，故以引爲證也。

❶色：晦明軒本此下有『畫石上有青白膩文，入用妙也。黃滑石色似金，顆顆圓』二十一字。

❷蜜：原作『密』，據晦明軒本改。

❽錢：晦明軒本『錢』下有『匕』字。
❹丹：晦明軒本無此字。
❺圖經曰：原作『日華子云』，據晦明軒本改。
❻亦：晦明軒本作『立』。
❼亦：原脱，據晦明軒本補。
❽正：晦明軒本作『三』。
❾空：晦明軒本『空』上有『腹中』二字。
❿乾：原作『石』，據晦明軒本改。
⓫欽：晦明軒本作『恭』。
⓬澈：原作『徹』，據晦明軒本改。下仿此。
⓭驚：晦明軒本『驚』下有『悸』字。
⓮澈：原作『徹』，據晦明軒本改。下仿此。
⓯燕：晦明軒本作『榴』。
⓰腸：原脱，據晦明軒本補。
⓱杵：原作『杆』，據晦明軒本改。
⓲槐：晦明軒本作『桃』。
⓳滓：晦明軒本作『飲』。
⓴已：晦明軒本作『正』。
㉑者：原作『也』，據晦明軒本改。
㉒處處：晦明軒本『處』下不疊『處』字。
㉓故：晦明軒本無『故』字。
㉔籍：晦明軒本作『藉』。

圖經衍義本草卷之三

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

玉石部中品

雄黃



雄黃　味苦、甘，平、寒、大温，有毒。主寒熱，鼠瘻，惡瘡，疽痔，死肌，療疥蟲，蜚瘡，目痛，鼻中息肉及絶筋破骨，百節中大風，積聚，癖氣中惡，腹痛，鬼疰，殺精物惡鬼，邪氣，百蟲毒，勝五兵，殺諸蛇虺毒，解藜蘆毒，悦澤人面。煉食之，輕身神仙。餌服之，皆飛入人腦中，勝鬼神，延年益壽，保中不饑。得銅可作金。一名黃食石。生武都山谷、熯煌山之陽。採無時。

《圖經》曰：雄黃，生武都山谷熯煌山之陽，今階州山中有之。形塊如丹砂，明澈不挾石，其色如鷄冠者爲真。有青黑色而堅者名熏黃，有形色似真而氣臭者名臭黃，并不入服食藥，只可療瘡疥耳。其臭以醋洗之便可斷氣，足以亂真，用之尤宜細辨。又階州接西戎界，出一種水窟雄黃，生於山岩中有水泉流處。其石名青烟石、白鮮石。雄黃出其中，其塊大者如胡桃，小者如栗豆，上有孔竅，其色深紅而微紫，體極輕虚，而功用勝於常雄黃，丹竈家尤所貴重。或云雄黃，金之苗也，故南方近金坑冶處時或有之，但不及西來者真好耳。

《唐本》注云：出石門名石黃者，

亦是雄黃，而通名黃食石。而石門者最爲劣爾，岩❶昌、武都者爲佳，塊方數寸，明澈如鷄冠，或以爲枕，服之辟惡。其青黑堅者，不入藥用。若火飛之而療瘡亦無嫌。又云：惡者名熏黃也。正❷觀熏瘡疥，故名之，無別熏黃也。用年中，以宕州新出有得方數尺者，但重脆不可全致之爾。

《日華子》云：雄黃，微毒。治疥癬，風邪，癲癇，嵐瘴，一切蛇蟲犬獸傷咬。久服不饑。通赤亮者爲上，驗之，可以煬❸蟲死者爲真，臭氣少，細嚼口中含湯不激辣者，通用。

雷公云：凡使，勿用黑鷄黃、自死黃、夾膩黃。其臭黃真似雄黃，只是臭不堪用，時用以醋洗之三兩度，便無臭氣，勿誤用也。次有夾膩黃，亦似雄黃，其內一重黃一重石，不堪用。次有黑鷄黃，亦似雄黃，如烏鷄頭上冠也。凡使，要似鷓鴣鳥肝色爲上。

《抱朴子》云：雄黃當得武都山所出者，純而無雜，其赤如鷄冠，光明曄曄者，乃可用耳，其但純黃似雄黃色無光者，不任作仙藥，可以合理病藥耳。

《抱朴子》又云：餌之法，或以蒸煮，或以酒服，或以消石化爲水乃凝之，或以猪胴❹裹蒸之於赤土下，或以松脂和之，或以三物煉之，引之如布，去滓，松脂十斤，以和柏子、雄黃各二斤，色如赤李，合藥臼中復搗如蒸藥一日。如餌，正坐北向，平旦頓服五丸，百日之後，與神人交見。

《明皇雜録》：有黃門奉使交廣回，周顧謂曰：此人腹中有蛟龍。上驚問之，立吐一物，長數寸，大如指，視之鱗甲具，投之水中，俄頃長數尺，復以苦酒沃之如故，以器覆之，明日生一龍矣。

《唐書》：甄立言究習方書，仕唐爲太常丞。有道人心腹滿煩，彌二歲，立言診曰：腹有蟲，誤食髮而然。令餌雄黃一劑，少選吐一蛇，如人小指，惟無目，燒之有髮氣，乃愈。

《寶藏論》：雄黃，若以草藥伏住者，熟煉成汁，胎色不移；若將制諸藥成汁并添得者，上可服食，中可點銅成金，下可變銀成金。治婦人始覺有妊，養胎，轉女爲男。以一兩絳囊盛帶之。

《千金方》：治

又方：治耳聾，以雄黄、硫黄等分爲末，綿裹塞耳中。又方：治癥瘕積聚，去三尸，益氣延年却老。以雄黄二兩，細研爲末，九度水飛過，却入新浄竹筒中盛，以蒸餅一塊塞筒口，蒸七度，用好粉脂一兩爲丸如緑豆大。日三服，酒下七丸、十丸。三年後道成，益力不饑，玉女來侍。

《聖惠方》：治傷寒、狐惑毒，蝕下部皮❻外如蜇，痛癢不止。以雄黄半兩，先用瓮子一個口稍大者，内入灰上，如裝香火將雄黄燒之，候烟出當病處熏之。

《外臺秘要》：治骨蒸極熱。以一兩和小便一升，研如粉。乃取黄理石一枚，方圓可一尺，以炭火燒之三食頃，極熱，灌雄黄汁於石上。恐大熱不可近，宜著一片薄氈置石上，令患人脱衣坐石上。冷停，以衣被圍繞身，勿令藥氣泄出，經三五度差。

《肘後方》：金瘡血内漏，以雄黄末如大豆，内瘡中。又服五錢匕，血皆化爲水，卒以小便服之。

《經驗方》：治馬汗入肉。雄黄、白礬等分，更用烏梅三個，捶碎，巴豆一個，合研爲細末。以半錢匕油，調傅患處。

《博濟方》：治遍身風二靈散❼：雄黄、細辛等分，研令細，每服分作兩下，左邊疼嗅入右鼻，右邊疼嗅入左鼻，立效。

《續十全方》：治纏喉風。雄黄一塊，新汲水磨，急灌，吐下，差。

《集驗方》：治卒魘。雄黄搗爲末細篩，以管吹入鼻孔中。

《傷寒類要》：治小腹痛滿，不得小便及療天行病。雄黄細研，蜜丸如棗核，内溺孔中。又方：殺齒蟲，以末如棗塞牙間。

《衍義》曰：雄黄非金苗。今有金❽窟處無雄黄。金條中言，金之所生，處處皆有雄黄，豈處處皆得也。别有髮氣，乃愈。此殺毒蟲之驗也。

法，治蛇咬，焚之熏蛇遠去。又武都者，鐫磨成物形，終不免其臭。唐·甄立言仕太常丞，有道人病心腹懣煩，彌二歲。診曰：腹有蟲，誤食髮而然，令餌雄黄一劑，少選吐一蛇如拇指，無目，燒之有髮氣，乃愈。此殺毒蟲之驗也。

食鹽





食鹽　味鹹，温，無毒。主殺鬼蠱邪疰毒氣，下部蟨瘡，傷寒寒熱，吐胸中痰癖，止心腹卒痛，堅肌骨。多食傷肺，喜咳。

《圖經》曰：食鹽，舊不著所出州郡。陶隱居云：有東海、北海鹽，及河東鹽池，梁、益有鹽井，交、廣有南海鹽，西羌有山鹽，胡中有木鹽，而色類不同，以河東者爲勝。河東鹽，今解州、安邑兩池所種鹽最爲精好，是也。河東鹽池又有并州兩監末鹽，乃刮鹹煎煉，不甚佳，其鹹蓋下品所著鹵鹹，生河東鹽池者，謂此也。下品又有大鹽，生邯鄲及河東池澤。蘇恭云：大鹽即河東印鹽，人之常食者，刑❾粗於末鹽，乃似今解鹽也。解人取鹽，於池傍耕地，沃以池水，每鹽❿南風急，則宿昔成鹽滿畦，彼人謂之種鹽。東海、北海、南海鹽者，今滄、密、楚、秀、温、台、明、泉、福、廣、瓊、化諸州官場煮海水作之，以給民食者，又謂之澤鹽，醫方所謂海鹽是也。其煮鹽之器，漢謂之牢盆，今或鼓鐵爲之，或編竹爲之，上下周以蜃灰，廣丈深尺，平底，置於竈，背⓫謂之鹽盤。《南越志》謂編篾爲鼎，和以牡蠣是也。然後於海濱掘地爲坑，上布竹木，覆以蓬茅，又積沙於其上。每潮汐衝沙，鹵鹹淋於坑。水中⓬退即以火炬照之，鹵氣衝火皆滅，因取海鹵注盤中煎之，頃刻而就。

《藥性論》云：鹽，有小毒。能殺一切毒氣，鬼疰氣。主心痛中惡，或連腰膝者。鹽如鷄子大，青布裹燒赤，内酒中頓服，當吐惡物。主小兒卒不尿，安鹽於臍中灸之。面上五色瘡，鹽湯綿浸榻⓭瘡上，日五六度易，差。又和槐白皮切蒸，治脚氣。又空心揩齒，少時吐水中洗眼，夜見小字，良。治婦人隱處疼痛者，鹽青布裹熨。主鬼疰，尸疰，下部蝕瘡，炒鹽布裹坐熨之，兼主火灼瘡。

陶隱居云：五味之中，惟此不可闕。有東海、北海鹽，及河東者爲勝。東海鹽、官鹽白，草粒細。北海鹽黄，草粒篦⓮。以作魚鮓及鹹菹，乃曰北勝。而藏蘸以用鹽官者，蜀中鹽小淡，廣州鹽鹹苦。不知其爲療體復有優劣否？西方、北方人，食不耐鹹，而多壽少病，好顏色。東方、南方人，食

絶欲鹹，而少壽多病，便是損人，則傷肺之效矣。然以浸魚肉，用⑰能經久不敗；以沾布帛則易致朽爛。所施處各有所宜也。

陳藏器云：按鹽本功外，除風邪，吐下惡物，殺蟲，明目，去皮膚風毒，調和腑臟，消宿物，令人壯健。人卒小便不通，炒鹽内臍中即下。陶公以爲損人，斯言不當。且五味之中，以鹽爲主，四海之内，何處無之。惟西南諸夷稍少，人皆燒竹及木鹽當之。

《日華子》云：暖水臟及霍亂心痛，金瘡，明目，止風泪，邪氣，一切蟲傷瘡腫，消食，滋五味，長肉，補皮膚，通大小便。小兒疝氣并内腎氣，以葛袋盛於户口懸之，父母用手捻⑯科盡，即疾立愈。

禹錫云：按《蜀本》云：多食令人衣⑰色膚黑，損筋力。

《食療》云：蠼螋尿瘡，鹽三升，水一斗，煮取六升，以綿浸湯，淹瘡上。又治一切氣及脚氣，取鹽三升，蒸，候熱分裹，近壁脚踏之，令脚心熱。又和槐白皮蒸用，亦治脚氣。夜夜與之良。又以皂莢兩挺⑱，鹽半兩，同燒令通赤，細研。夜夜用揩齒。一月後有動者齒及血齲齒，并差，其齒牢固。

《聖惠方》：治小兒臍風濕。以鹽一兩，豉二合，相和爛搗，捏作餅子如錢大，安新瓦上炙令熱，以熨臍上差。亦用黄檗末傅之。

《外臺秘要》：治胸心痰飲，傷寒熱病，瘴瘧須吐者。以鹽末一大匙，以水或暖湯送下，須臾則吐。吐不快，明旦更服，甚良。

《千金方》：治齒齦宣露。每旦捻鹽内口中，以熱水含遍齒百遍，不過五日齒即牢密。。

《千金翼方》：治諸瘡癬初生，或始痛時，以單方救不效，嚼鹽塗之妙。

《傅信⑲方》：治蚯蚓咬。濃作鹽湯，浸身數遍差。浙西軍將張韶爲此蟲所咬，其形如大風，眉鬚皆落。每夕蚯蚓鳴於體，有僧教以此方愈。

《食醫心鏡》云：鹽，主殺鬼蠱氣，下部蟨瘡，傷寒寒熱，吐胸中痰癖，止心腹卒痛，堅肌骨。黄帝云：食甜瓜竟食鹽成霍亂。又主大小腸不通。取鹽和苦酒，傅臍中，乾即易，差。

《産寶方》：治妊娠心腹痛，不可忍。以一斤鹽，燒令赤，以三指取一撮，酒服，差。

《衍義》曰：食鹽，《素問》曰：鹹走血。故東方食魚鹽之人多黑色，走血之驗，故可知矣。病嗽及水者，宜全禁之。北狄用以淹尸，取其不壞也，至今如此。若中蚯蚓毒，當以鹽洗沃，亦宜湯化飲汁。其燒剥金銀，熔汁作藥，仍須解州池鹽爲佳。齒縫中多出血，常以鹽湯嗽⑳，即已。益齒走血之驗也。

石硫黄　味酸，温、大熱，有毒。主婦人陰蝕，疽痔，惡血，堅筋骨，除頭禿，療心腹積聚，邪氣冷癖在脅，咳逆上氣，脚冷疼弱無力，及鼻衄，惡瘡，下部蟨瘡，止血，殺疥蟲。能化金、銀、銅、鐵奇物。生東海牧羊山谷中，及太山、河西山，礬石液也。

石硫黃

廣州

榮州土硫黃



《圖經》曰：石硫黃，生東海牧羊山谷中，及太山、河西山，礬石液也。嶺外州郡或有，而今惟出南海諸蕃。以色如鵝子初出殼者爲真，不甚佳。以色如鵝子初出殼，名崑崙黃。俗方用之療脚謂之崑崙黃。其赤色者，名石亭脂，曾青爲使，色者號冬結石，半白半黑名神驚石，并不堪入藥。又有一種土硫黃，出廣南及榮州，溪澗水中流出。其味辛，性熱腥臭。主治疥瘡，殺蟲毒。又可煎煉成汁，以模鎔作器，亦如鵝子黃色。

《藥性論》云：石硫黃，君。有大毒。以黑錫煎湯解之，及食宿冷猪肉。味甘，太陽之精，鬼焰居焉，伏煉數般皆傳於作者。能下氣，治脚弱，腰腎久冷，除冷風頑痹。又云：生用治疥癬，及療寒熱咳逆。煉服主虛損，泄精。

陶隱居云：東海郡屬北徐州，而箕山亦有。今第一出扶南林邑。色如鵝子初出殼，名崑崙黃。次出外國，從名石留黃。神農、黃帝、雷公：鹹，有毒。醫和、扁鵲：苦，無毒。或生易蜀中來，色深而煌煌。俗方用之療脚弱及痼冷，甚良。《仙經》頗用之。所化奇物并是黃白术及合丹法。此云礬石液，今南方則無礬石，恐不必爾。

《日華子》云：石亭脂、曾青爲使，畏細辛、飛廉、鐵。壯陽道，治痃癖冷氣，補筋骨勞損，風勞氣，止嗽上氣，及下部痔瘻，惡瘡疥癬，殺腹藏蟲，邪魅等。并宜燒煉服。仙方謂之黃硇砂，能壞五金，亦能造作金色，人能制伏歸本色，服而能除萬病。如有發動，宜以猪肉、鴨羹、餘甘子湯并解之。蜀中雅州亦㉑出，光膩甚好，功力不及舶上來者。

《藥性論》云：石硫黃，君。有大毒。以黑錫煎湯解之，及食宿冷猪肉。味甘，太陽之精，鬼焰居焉，伏煉數般皆傳於作者。能下氣，治脚弱，腰腎久冷，除冷風頑痹。又云：生用治疥癬，及療寒熱咳逆。煉服主虛損，泄精。

陶隱居云：東海郡屬北徐州，而箕山亦有。今第一出扶南林邑。色如鵝子初出殼，名崑崙黃。次出外國，從名石留黃。神農、黃帝、雷公：鹹，有毒。醫和、扁鵲：苦，無毒。或生易蜀中來，色深而煌煌。俗方用之療脚弱及痼冷，甚良。《仙經》頗用之。所化奇物并是黃白术及合丹法。此云礬石液，今南方則無礬石，恐不必爾。

《海藥》云：謹按《廣州記》云：生崑崙日脚下，顆塊瑩淨，無夾石者良。主風冷虛憊，腎冷，止㉒氣，腿膝虛羸，長肌膚，益氣力，遺精，痔漏，老人風秘下部痔瘻，惡瘡疥癬，殺腹藏蟲，邪魅等。并宜燒煉服。仙方謂之黃硇砂，能壞五金，亦能造作金色，人能制伏歸本色，服而能除萬病。如有發動，宜以猪肉、鴨羹、餘甘子湯并解之。蜀中雅州亦㉑出，光膩甚好，功力不及舶上來者。

攪令勻，一埚堝用六一泥固濟底下，將硫黃碎之入於堝中，以前件藥汁旋旋添入，火煮之汁盡爲度，了，再以百部末十兩，柳蚋末二斤，一簇草二斤，細剉之，以東流水并藥等同煮硫黃末一伏時，日滿去諸藥，取出用熟甘草湯洗了，入鉢中研二萬匝方用。

禹錫云：謹按吳氏云：硫黃，一名石留黃。神農、黃帝、雷公：鹹，有毒。醫和、扁鵲：苦，無毒。或生易蜀中來，色深而煌煌。俗方用之療脚弱及痼冷，甚良。《仙經》頗用之。所陽，或河西，或五色。黃是潘水石液也，燒令有紫焰者。八月、九月採。治婦人血結。

《丹房鏡源》云：石硫黄，可乾汞，訣曰：此硫黄見五金而黑，得水銀而赤。又曰黄牙。

孫尚藥云：治氣虚傷冷，暴作水瀉，日夜三二十行，腹痛不止，夏月路行備急。朝真丹：硫黄二兩，牛角研令極細，枯白礬半兩，同細研匀水浸，蒸餅去水脉了，和丸如梧桐子大，朱砂爲衣。每服十五丸至二十丸，温米飲、鹽湯下。

《經驗方》：大治元臟，氣發久冷，腹痛虚瀉，應急大效。玉粉丹：生硫黄五兩，青鹽一兩，已上衮細研，以蒸餅爲丸如緑豆大。每服五丸，熱酒空心服，以食壓之。

《梅師方》：治陰生濕疱瘡。取石硫黄研如粉，傅瘡上，日三度。

《聖惠方》：治諸瘡弩肉如蛇出數寸。用硫黄一兩細研，於肉上薄塗之，即便消。

《外臺秘要》：《千金》療小兒聤耳。硫黄末㉔以粉耳中，日一夜一，差止。

《太清服煉靈砂法》：石硫黄本出波斯國，南明之境，禀純陽火石之精氣而結成，質性通流，含其猛毒。藥品之中，號爲將軍。功能破邪歸正，返滯還清，挺立陽精，消陰化魄。

《衍義》曰：石硫黄，今人用治下元虚冷，元氣將絶，久患寒泄，脾胃虚弱，垂命欲盡，服之無不效。中病當便已，不可盡劑。世人蓋知用而爲福，不知用久爲禍。此物損益兼行，若俱棄生。其陰山有金，金精熏則生雌黄，採無時。

雌黄

階州



味辛、甘，平、大寒，有毒。主惡瘡，頭禿，痂疥，殺毒蟲、虱，身癢，邪氣，諸毒，蝕鼻中息肉，下部蟨瘡，身面白駁，散皮膚死肌，及恍惚邪氣，殺蜂蛇毒。煉之，久服輕身、增年、不老，

《圖經》曰：雌黄，生武都山谷，與雄黄同山，其陰山有金，金精熏則生雌黄。今出階州，以其色如金，又似雲母甲錯可析者爲佳。其夾石及黑如鐵色者不可用。或云一塊重四兩者，析之可得千重，此尤奇好也。採無時。

陶隱居云：今雌黄出武都仇池黄，色小赤。扶南林邑者，謂武都仇池黄，色如金而似雲母甲錯，者，謂崑崙黄，色如金而似雲母甲錯，畫家所重。依此言，既有雌雄之名，又同山之陰陽，於合藥便當以武都爲勝，用之既稀，又賤於崑崙者。《仙經》無

單服法，惟以合丹砂、雄黃共飛煉爲丹爾。

雷公云：雌黃，凡使，勿誤用夾石黃、黑黃、珀熟等。雌黃一塊，重四兩。按《乾寧記》云：指開析得千重，軟如爛金者上。凡修事，勿令婦人、鷄、犬、新犯淫人、有患人、不男人、非形人、曾是刑獄地臭穢，已上并忌。若犯觸者，雌黃黑如鐵，不堪用也，及損人壽。

《寶藏論》：雌黃伏住火，胎色不移，鞴熔成汁者，點銀成金，點銅成銀。

《丹房鏡源》云：黃，背陰者雌也，純柔者亦可乾汞，舶上撰㉕血者上，湖南者次。青者本性，葉子上者可轉硫黃，伏粉霜，記之，不可誤使。

《青霞子》云：雌黃，辟邪去惡。

《聖惠方》：治烏癩瘡，殺蟲。用雌黃研如粉，以醋并用鷄子黃打令匀，塗於瘡上，乾即更塗。又方：治久心痛，時發不定，多吐清水，不下飲食。以雌黃二兩，好醋二升，慢火煎成膏，每服七丸，用乾蒸餅丸如梧桐子大。每服十丸，薑湯下。

《百一方》：治小腹滿，不得小便。細末雌黃蜜丸，如棗核大，內一丸溺孔中，令入半寸許，以竹管注陰令緊，朔㉖氣通之。

《經驗方》：縮小便。以顆塊雌黃一兩半，研如粉，乾薑半兩切碎，入鹽四大錢同炒，令乾薑色黃，同爲末，乾蒸餅入水，爲丸如綠豆大。每服十丸至二十丸，空心鹽湯下。

《斗門方》：治肺勞咳嗽。以雌黃一兩，入瓦合內，不固濟，坐合子於地上，用灰焙之，周匝令實，可厚二寸。以炭一斤簇定，頂以火煅之，三分去一，退火待冷，出，研如麵，用蟾酥爲丸如粟大。每日空心杏人湯下三丸，差。

《衍義》曰：入藥最釋㉕，服石者宜審諦。治外功多，方士點化術多用，亦未聞終始如何。畫工用之。

水銀

味辛，寒，有毒。主疥瘙，痂瘍白禿，殺皮膚中虱，墮胎，除熱。以傅男子陰，陰消無氣。殺金、銀、銅、錫毒，熔化還復爲丹。久服神仙不死。

一名汞。生符陵平土，出於丹砂。畏磁石。

《藥性論》云：水銀，君，殺金、銅毒，姹女也。有大毒。朱砂中液也，此還丹之元母，神仙不死之藥。伏煉五金爲泥，生能墮胎。主療瘡疥等，緣殺





蟲。

陶隱居云：今水銀有生熟。此云生符陵平土者是，出朱砂腹中，亦別出砂地，皆青白色，最勝。出於丹砂者，是今燒粗末朱砂所得，色小白濁，不及生者。甚能消化金銀，使成泥，人以鍍物是也。還復爲丹，事出《仙經》。酒和日暴，服之長生。燒時飛著釜上灰，名汞粉，俗呼爲水銀灰，最能去虱。

《唐本》注云：水銀出於朱砂，皆因熱氣，未聞朱砂腹中自出之者。火燒飛取，人皆解法。南人蒸取之，得水銀雖少，而朱砂不損，但色少變黑爾。

陳藏器云：水銀本功外，利水道，去熱毒。入耳能食腦至盡，入肉令百節攣縮，倒陰絶陽，人患瘡疥，多以水銀塗之，性滑重，直入肉，宜慎之。昔北齊徐王療攣躄，以金物火炙熨之。水銀得金當出蝕金，候金色白者是也，如此數度，并差也。

《日華子》云：水銀，無毒。治天行熱疾，催生，下死胎，治惡瘡，除風，安神鎮心。鍍金燒粉人多患風，或大段使作須飲酒，并肥猪肉及服鐵漿，可禦其毒。

雷公云：凡使，勿用草中取者，并舊朱漆中者，勿用經別藥制過者，勿用在尸過者、半生半死者。其水銀若在朱砂中産出者，其水銀色微紅，收得後用胡蘆收之，免遺失。若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味，同煮一伏時，其毒自退。若修十兩，用前二味汁各七鎰，和合煮足爲度。

《漢武帝内傳》曰：封君達，隴西人。初服黄連五十餘年。入烏峰山，服水銀百餘年，還鄉里如二十者，常乘青牛，故號青牛道士。

《太清服煉靈砂法》：承稟五陽神之靈，精會符合爲一體，故能輕飛玄化，感遇萬靈。

《聖惠方》：誤吞銀鐶子、釵子。以半兩服之，再服即出。

《經驗後方》：治心風秘。水銀一兩，藕節八個，先研藕節令細，次入水銀同研成砂子，丸如鷄頭大。每服二丸，磨刀水下，一二服差。

《梅師方》：治胎死腹中不出，其母氣絶。以水銀二兩吞之，立出。又方：治痔，穀道中蟲癢不止。以水銀、棗膏各二兩，同研相和，拈如棗形狀，薄綿片裹，内下部，明日蟲出。若痛者，加粉三大分作丸。

《衍義》曰：水銀，入藥雖各有法，極須審謹，有毒故也。婦人多服絶脈。今人治小兒驚熱涎潮，往往多用。《經》中無一字及此，亦宜詳諦。得鉛則凝，得硫黄則結，并棗肉研之則散。別法煅爲膩粉，粉霜唾研斃虱。銅得之則明，灌尸中，則令尸後腐。以金、銀、銅、鐵置其上則浮，得紫河車則伏。

石膏

味辛、甘，微寒、大寒，無毒。主中風寒熱，心下逆氣驚喘，口乾舌焦，不能息，腹中堅痛，除邪鬼，産乳，金瘡，除時氣，頭痛身熱，三焦大熱，皮膚熱，腸胃中隔氣，解肌發汗，止消渴，煩逆，嘔吐，腹脹，暴氣喘息，咽熱，亦可作浴湯。一名細石，細理白澤者良，黄者令人淋。生齊山山谷及齊盧山、

石膏



魯蒙山。採無時。鷄子爲之使。惡莽草、馬目毒公。

《圖經》曰：石膏，生齊山山谷及齊盧山、魯蒙山，今汾、孟、虢、耀州，興元府亦有之。生於山石上，色至瑩白，其黃者不堪。此石與方解石絶相類，今難得真者，用時惟取未破者以別之。其方解石不附石而生，端然獨處，外皮有土及水苔色，破之皆作方棱。石膏自然明瑩如玉石，此爲異也。採無時，方解石舊出下品，《本經》云：生方山。陶隱居以爲長石，一名方石，療體相似，疑是一物。

陶隱居云：二郡之山，即青州、徐州也。今出錢塘縣，皆在地中，雨後時時自出，取之皆如棋子，白澈最佳。彭城者亦好。近道多有而大塊，用之不及彼。《仙經》不須此。

《唐本》云：石膏、方解石，大體相似，而以未破爲異。今市人皆以方解石代石膏，未見有真石膏也。石膏生於石傍，其方解石不因石而生，端然獨處，大者如升，小者若拳，或在土中，或生溪水，其上皮隨土及水苔色，破之方解，大者方尺。今以此爲石膏，療風去熱雖同，而解肌發汗不如真者。

陳藏器云：陶云出錢塘縣中。按錢塘在平地，無石膏，陶爲錯注。蘇又注五石脂云：五石脂中又有石膏，似骨如玉堅潤，服之勝鐘乳。與此石膏，乃是二物同名耳，不可混而用之。

《日華子》云：治天行熱狂，下乳，頭風旋，心煩躁，揩齒益齒。通亮，理解石雖白，不透明，其性燥，若石膏出剡州茗山縣義情山，其色瑩淨如水精，性良善也。凡使之，先於石臼搗成粉，以密物羅過，生甘草水飛過，水澄令乾，重研用之。

禹錫云：謹按《藥性論》云：石膏，使，惡巴豆，畏鐵。能治傷寒頭痛如裂，壯熱皮如火燥，煩渴，解肌，出毒汗。主通胃中結，煩悶，心下急，煩躁。治唇口乾焦。和葱煎茶去頭痛。

《別説》云：謹按：陶説出錢塘山中，雨後時時自出。今錢塘人乃鑿山以取之，甚多，搗爲末，作齒藥貨用。

《外臺秘要》：蒸病五日内蒸，所以言内者，必外寒内熱，把汗附骨而熱也。其根在五臟六腑之中，必因患後得之。骨肉自消，食飲無味，或皮燥，面無光。蒸盛之時，四肢漸細，足趺腫起。石膏十兩，研如乳粉法，水和服方寸匕，日再，以體涼爲度。

《肘後方》：葛氏療小便卒大數非淋，令人瘦。以石膏半斤搗碎，水一斗，煮取五升，稍飲五合。

《梅師方》：治熱油、湯、火燒瘡，痛不可忍。取石膏搗末細研，用粉瘡。

《衍義》曰：石膏，二書紛辨不決，未悉厥理。詳《本經》元無方解石之文，止緣《唐本》注：石膏、方解石大體相似。因此一説，後人遂惑。《經》曰：生齊山山谷及齊盧山、魯蒙山，採無時，即知他處者爲非。今《圖經》中又以汾州者編入，前後人都不詳。《經》中所言細理白澤者良，故知不如是，則非石膏也。下有理石，條中《經》云：如石膏順理而細，又可明矣。今之所言石膏、方解石，上者何等有順理細文又白澤者。有是，則石膏也；無是，則非石膏也。仍須是《經》中所言州土者，方可入藥，餘皆偏見，可略不取。仲景白虎湯中，服之如神。新校正仲景《傷寒論》後言，四月已後，天氣熱時，用白虎者是也。然四方氣候不齊，又歲中氣運不一，方所既異，雖其説甚雅，當此之時，亦宜兩審。若傷寒熱病，或大汗後，脉洪大，口舌燥，頭痛，大渴不已；或著暑熱，身痛倦怠，白虎湯服之無不效。

金屑

益州



信州



金屑　味辛，平，有毒。主鎮精神，堅骨髓，通利五臟，除邪毒氣，服之神仙。生益州。採無時。

《圖經》曰：金屑，生益州。銀屑，生永昌。陶隱居注云：金之所生，處處皆有，梁、益、寧三州多有，出水沙中，作屑，謂之生金。而銀所出處，亦以金同，但皆生石中耳。蘇恭以爲銀之與金，生不同處。金又出水中。今饒、信、南、劍、登州出金處，採得金亦在礦中，則與銅相雜，土人採得之，必以鉛再三煎煉方成，故不得爲生銀也。故下別有生銀條云：出饒州、樂平諸坑生銀礦中，狀如硬錫，方理粗錯，自然者真。今坑中所得乃在土石中，滲溜成條，若絲髮狀，土人謂之老翁鬚，似此者極難得。方書用生銀，必得此乃真耳。金屑，古方不見者㉕。銀屑，惟葛洪治癰腫五石湯用之。今人多不用，惟作金銀薄入藥甚便。又金石凌、紅雪、紫雪輩，皆取金銀取汁，此亦通用經煉者耳。

陶隱居云：金之所生，處處皆有，梁、益、寧三州多有，出水沙中，作屑，謂之生金。辟惡而有毒，不煉服之殺人。建平、晉安亦有金砂，出石中，燒

熔鼓鑄爲鍋，雖被火亦未熟，猶須更煉。高麗、扶南及西域外國成器皆煉熟，可服。《仙經》以醯、蜜及猪肪、牡荆、酒輩，煉餌柔軟，服之神仙。亦以合水銀作丹砂外，醫方都無用者，當是慮其有毒故也。《仙方》名金爲太真。

《日華子》云：金，平，無毒。畏水銀。鎮心，益五臟，添精補髓，調利血脉。

禹錫謹按：《藥性論》云：黄金屑，金薄亦同。主小兒驚，傷五臟，風癇失志，鎮心安魂魄。楊損之云：百煉者堪，生者殺人。水飲合膏，飲之即不煉。

今注：醫家所用皆煉熟，金薄及以水煎金器取汁用之，固無毒矣。按陳藏器《拾遺》云，嶺南人云生金是毒蛇屎，此有毒。常見人取金掘地，深丈餘，至紛子石，石皆一頭黑焦，石下有金，大者如指，小猶麻豆，色如桑黄，咬時極軟，即是真金。夫匠竊而吞者，不見有毒。其麩金出水沙中，氈上淘取，或鵝、鴨腹中得之，即便打成器物，亦不重煉。煎取金汁，便堪鎮心。此乃藏器傳聞之言，全非。按據宋朝收復嶺表，詢其事於彼人，殊無蛇屎之事，入藥當必用熟金，恐後人覽藏器之言惑之，故此明辨。

《海藥》云：按《海[30]州記》云出大食國，彼方出金最多，凡是貨易并使金。錢[30]性多寒，生者有毒，熟者無毒，主癲癇，風熱上氣，咳嗽，傷寒，肺損吐血，骨蒸勞極渴，主利五藏邪氣，補心，并入薄於丸散服。《異志》云：金生麗水。《山海經》説：諸山出金極多，不能備録。蔡州出瓜子金，雲南山出顆塊金，在山石間採之。黔南、遂府、吉州水中并産麩金。又《嶺表録此》[31]云：廣州治涯縣有金池，彼中居人忽有養鵝鴨常於屎中見麩金片，遂多養收屎淘之，日得一兩或半兩，因而至富矣。

《寶藏論》：凡金有二十件：雄黄金、雌黄金、曾青金、硫黄金、土中金、黑鉛金、朱砂金，已上十五件，惟只有還丹金、水中金、瓜子金、青麩金、草砂金等五件是真金，餘外并皆是假。

《衍義》曰：金屑，不曰金，而更加屑字者，是已經磨屑可用之義，如玉漿之義同。二經不解屑爲末盡，蓋須烹煉，鍛屑爲薄，方可研屑入藥。陶隱居云：凡用銀屑，以水銀和成泥，若非鍛屑成薄，焉能以水銀和成泥也？獨不言金屑，亦其闕也。生金有毒，至於殺人，仍爲難解。有中其毒者，惟鷓鴣肉可解，若不經鍛屑，則不可用。顆塊金即穴山，或至百十尺，見伴金石，其石褐色，一頭如火燒黑之狀。

信州

銀屑



味辛，平，有毒。主安五

臟，定心神，止驚悸，除邪氣。久服輕身長年。生永昌。採無時。

《圖經》曰：文具金屑條下。

陶隱居云：銀之所出處，亦與金同，但皆是生石中，煉餌法亦相似。今醫方合鎮心丸用之，不可正服爾。爲屑，當以水銀研令消也。永昌本屬益州，今屬寧州。《仙經》又有服煉法，此當無正主療，故不爲本草所載。古者名金爲黄金，銀爲白金，銅爲赤金。今銅有生熟，煉熟者柔赤，而本草并無用。今銅青及大錢皆入方用，并是生銅，應在下品之例也。

《唐本》注云：銀之與金，生不同處，金又兼出水中。方家用銀屑，當取見成銀薄，以水銀消之爲泥。合消石及鹽研爲粉，燒出水銀，淘去鹽石，爲粉極細，用之乃佳。不得已磨取屑爾。且銀所在皆有，而以虢州者爲勝，此外多錫穢爲劣。高麗作帖者云，非銀礦所出，然色妬[32]不如虢州者。又有黄銀，《本經》不載，俗云：爲器辟惡，乃爲瑞物。

禹錫云：謹按《藥性論》云：銀屑，君。銀薄同。主定志，去驚癇，小兒癲疾狂走之病。

《子母秘録》：妊娠卒腰背痛如折。銀一兩，水三升，煎取二升，飲之。

青霞子云：《金液還丹論》：銀破冷除風。

《衍義》曰：銀屑金條中已解屑義，銀本出於礦，須煎煉而成，故名熟銀，所以於後別立生銀條也。其用與熟銀大同。世有術士，能以朱砂而成文理粗錯，自然者真。

生銀



州饒

《圖經》曰：文具金屑條下。

禹錫云：謹按陳藏器云：生銀味辛。

《日華子》云：冷，微毒。畏石亭脂、磁石。治小兒衝惡，熱毒煩悶。并毒，生銀經言無毒。水磨服，忌生血。又云：朱砂銀，冷，無毒。畏石亭脂、磁石、鐵。延年益蓋生銀已生發於外，無蘊鬱之氣，故無毒。礦銀尚蘊蓄於石中，鬱結之氣，全未敷暢，故言有毒。亦惡錫。

靈砂

味甘，性温，無毒。主五臟癲恍惚，夜卧不安，讖音詹語，邪氣，鬼崇。服之明目，鎮心，安神定志。小兒諸熱丹毒，并以水磨服，功勝紫雪。出饒州、樂平諸坑生銀礦中，狀如硬錫，文理粗錯，自然者真。

百病，養神安魂魄，益氣，明目，通血脉，止煩滿，益精神，殺精魅惡鬼氣。久服通神明，不老輕身神仙，令人心靈。一名二氣砂。水銀一兩，硫黄六銖，細研，先炒作青砂頭，後入水火既濟爐，抽之如束針絞者，成就也。惡磁石，畏鹹水。

水銀粉　味辛，冷，無毒。畏磁石、石黄。通大腸，轉小兒疳，并瘰癧，殺瘡疥癬蟲，及鼻上酒皶，風瘡燥㊳痒。又名汞粉、輕粉、峭粉，忌一切血。新補。見陳藏器及《日華子》。

《經驗方》：治小兒吃泥及臟肚。腻粉一分，用沙糖溲丸如麻子大。空心米飲下一丸，瀉出土，差。

《孫用和方》：治虚風。不二散：腻粉一兩，用湯煎五度如茶脚，熳火上焙乾，麝香半兩，細研如粉，每服一字，温水調。但是風，臨時服半錢或一錢匕，看虚實加減。又方：治血痢。腻粉五錢，定粉三錢，同研，用水浸蒸餅心少許，和丸如緑豆大。每服七元或十元。艾一枝，水一盞，煎湯下，艾湯多亦妙。

《衍義》曰：水銀粉，下涎藥，并小兒涎潮、癒癍多用。然不可常服及過多，多則有損兼行。若兼驚，則尤須審謹。蓋驚爲心氣不足，不可下，下之裏虚，驚氣入心不可治。若其人本虚，便須禁此一物，謹之至也。

❶岩：晦明軒本作『宕』。
❷正：晦明軒本作『貞』。
❺焟：原作『協』，據晦明軒本改。
❹胴：晦明軒本作『脂』。
❺杯：晦明軒本作『石』。
❻皮：晦明軒本作『肛』。
❼治遍身風二靈散：晦明軒本作『治偏頭痛至靈散』。
❽金：『金』下原衍『苗今有』三字，據晦明軒本删。
❾刑：晦明軒本作『形』。
❿鹽：疑當作『臨』。
⓫背：晦明軒本作『皆』。
⓬水中：晦明軒本作『中水』。
㉝榻：晦明軒本作『搨』。
⓮篦：晦明軒本作『粗』。
⓯用：晦明軒本作『則』。
⓯捻：晦明軒本作『抖』。
㉝衣：晦明軒本作『頭』。
㉝挺：晦明軒本作『梃』
㉝傅信：晦明軒本作『經驗』。
㉝嗽：晦明軒本作『漱』。
㉑一鎰：此二字原脱，據晦明軒本補。
㉒止：晦明軒本作『上』。
㉝亦：原作『赤』，據晦明軒本改。
㉔末：原作『木』，據晦明軒本改。
㉝撰：晦明軒本作『噗』。
㉖朔：晦明軒本作『嗍』。
㉝釋：晦明軒本作『稀』。
㉝者：晦明軒本『者』上有『用』字。
㉝海：晦明軒本作『廣』。
㉚錢：晦明軒本作『金』。
⓫此：晦明軒本作『異』。
⓬妬：晦明軒本作『青』。
㉝燥：晦明軒本作『瘙』。

圖經衍義本草卷之四

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

玉石部中品

磁石



磁石　味辛、鹹，寒，無毒。主周痹。禹錫等按：《蜀本》注云：凡痹，隨血脉上下，不能左右去者，爲周痹。風濕肢節中痛，不可持物，洗❶酸痟，除大熱，煩滿及耳聾，養腎臟，强骨氣，益精，除煩，通關節，消癰腫，鼠瘻，頸核，喉痛，小兒驚癇。煉水飲之，亦令人有子。一名玄石，一名處石，生太山川谷及慈山山陰，有鐵處則生其陽。採無時。柴胡爲之使。殺鐵毒，惡牡丹、莽草，畏黄石脂。

《圖經》曰：磁石，生太山山谷及慈山山陰，有鐵處則生其陽。今慈州、徐州及南海傍山中皆有之。慈州者，歲貢最佳，能吸鐵虚連十數針，或一二斤刀器回轉不落者尤真。採無時。其石中有孔，孔中黄赤色，其上有細毛，毛、石功狀殊也。又言磁石寒，此殊誤也。

《日華子》云：磁石，味甘、澀，平。治眼昏，筋骨羸弱，補五勞七傷，除煩燥❹，消腫毒，小兒誤吞鐵針等。即細末，筋肉莫令斷，與磁石同下之。

雷公云：凡使，勿誤用玄中石并中麻石。此石之二真相似磁石，只是吸鐵不得。中麻石心有赤，皮粗，是鐵山石也。誤服之，令人有惡瘡，不可療。夫欲驗者，一斤磁石，四面只吸鐵一斤者，此名延年沙；四面只吸得鐵八兩者，號曰續末石；四面只吸得五兩已來者，號曰磁石。

《藥性論》云：磁石，臣。味鹹，有小毒。能補男子腎虚，風虚，身强，腰中不利，丹方❸用之。

陶隱居云：今南方有好者，能懸吸針，虚連三四爲佳。殺鐵毒，消金。

《仙經》丹方黄白術用之。

陳藏器云：磁石毛，味鹹，温，無毒。主補絶傷，益陽道，止小便白數，治腰脚，去瘡瘻，長肌膚，令人有子，宜入酒。出相州北山。磁石毛，鐵之母也。取鐵如母之招子焉。《本經》有磁石，不言毛。毛、石功狀殊也。又言磁石寒，此殊誤也。

《聖惠方》：治小兒誤吞針。用磁石如棗核大，磨令光，鑽作竅，絲穿，令含針自出。

《外臺秘要》：療丁腫。取磁石搗爲粉，醞醋和，封之，根即立出，差。

《鬼遺方》：治金瘡腸出，欲入之。磁石、滑石各三兩爲末，以白米飲調方寸匕服，日再服。

《衍義》曰：磁石，色輕紫，石上皺澀，可吸連針鐵，俗謂之熁鐵石。養益腎氣，補填精髓，腎虛耳聾目昏皆用之。入藥，須燒赤醋焠。其玄石，即磁石之黑色者也，多滑淨。其治體大同小異，不可不分而爲二也。磨其石則能指南，然常偏東不全南也。其法取新纊中獨縷，以半芥子許蠟，綴于針腰，無風處垂之，則針常指南。以針橫貫燈心，浮水上，亦指南，然常偏東❺位。蓋丙爲大火，庚辛金受其制，故如是，物理相感爾。

玄石　味鹹，温，無毒。主大人小兒驚癇，女子絶孕，小腹冷痛，少精，身重，服之令人有子。一名玄水石，一名處石。生太山之陽。山陰有銅，銅者雌，黑者雄。惡松脂、柏實、菌桂。



玄石

《圖經》具磁石下。

陶隱居云：《本經》磁石，一名玄石。《別録》各一種。今按其一名處石既同，療體又相似，而寒温銅鐵及畏惡有異。俗方既不復用之，亦無識其形者，不知與磁石相類否。

《唐本》注云：此物鐵液也，但不能拾針，療體如經，劣於磁石。磁石中有細孔，孔中黄赤色，初破好者，能連十針，一斤鐵刀亦被迴轉。其無孔，光澤純黑者，玄石也，不能吸針。

凝水石　味辛、甘，寒、大寒，無毒。主身熱，腹中積聚邪氣，皮中如火燒，煩滿，水飲之。除時氣熱盛，五臟伏熱，胃中熱，煩滿，止渴，水腫，小腹痹。久服不饑。一名白水石，一名寒水石。《別録》各一種。今按其一名凌水石。色如雲母可析者良，鹽之精也。生常山山谷，又中水縣及邯鄲。解巴豆毒。畏地榆。



凝水石

《藥性論》云：寒水石，能壓丹石毒風，去心煩渴悶，解傷寒復勞。

陶隱居云：常山屬并州；中水縣屬河間郡；邯鄲即趙郡，并屬冀州域。此處地皆鹹鹵，故云鹽精，而碎之亦似朴消。此石未置水中，夏月能爲冰者佳。

《唐本》注云：此石有兩種，有縱理、横理，色清明者爲佳。或云縱理爲寒水石，横理爲凝水石。今出同州韓城，色青黄，理如雲母爲良；出澄城者，斜理文，色白，爲劣也。

禹錫云：按吴氏云：神農：辛。岐伯、醫和、扁鵲：甘，無毒。季氏：大寒。或生邯鄲，採無時。如雲母色。

雷公云：凡使，先須用生薑自然汁煮，汁盡爲度，細研如粉用。每修十兩，用薑汁一鎰。

《傷寒類要》：治肉癗，其人小便白。以凝水石主之也。

《丹房鏡源》云：凝水石可作油衣，可食，制丹砂爲匱伏玄精。

《經驗方》：治小兒丹毒，皮膚熱赤。用寒水石半兩，白土二分，搗羅爲末，用米醋調傅之愈。

《集驗方》：治風熱心躁，口乾狂言，渾身壯熱，及中諸毒。龍腦甘露丸：寒水石半斤，燒半日，浄地坑内盆合，四面濕土擁起，候經宿取出，入甘草末、天竺黄各二兩，龍腦二分，糯米膏丸彈大，蜜水下。

《衍義》曰：凝水石，紋理通徹❻，人或磨刻爲材❼，以備暑月之用。入藥須燒過，或市人燒入膩粉中以亂真，不可不察也。陶隱居言：夏月能爲冰者佳。如此則舉世不能得，似乎失言。

陽起石　味鹹，微温，無毒。主崩中漏下，破子臟中血，癥瘕結氣，寒熱，腹痛，無子，陰痿不起，補不足，療男子莖頭寒，陰下濕癢，去臭汗，消水腫。久服不饑，令人有子。一名白石，一名石生，一名羊起石，雲母根也。生齊山谷及琅琊或雲山、陽起山。採無時。惡澤瀉、菌桂、雷丸、桑螵蛸爲之使。畏菟絲。

《圖經》曰：陽起石，生齊山山谷及琅琊或雲山、陽起山。今惟出齊州，他處不復有，或云邢州鵲山亦有之，然不甚好。今齊州城西惟一土山，石出其中，彼人謂之陽起山，其山常有温暖氣，雖盛冬大雪遍境，獨此山無積白，蓋石氣熏蒸使然也。山惟一穴，官中常禁閉。至初冬，則州發丁夫，遣人監視取之。歲月積久，其穴益深，鑱鑿他石得之甚難。以色白、肌理瑩明若狼牙者爲上。亦有夾他石作塊者不堪。每歲採擇上供之，餘州中貨之，不爾，



陽起石

市賈無由得也。貨者雖多，而精好者亦難得。

《藥性論》云：陽起石，惡石葵，忌羊血，味甘，平。主補腎氣，精乏腰疼，膝冷濕痹，能暖女子宮久冷，冷癥寒瘕，止月水不定。

陶隱居云：此所出即與雲母同，而甚似雲母，但厚實爾。今用乃出益州與礬石同處，色小黃黑即礬石。雲母根未知何者是？俗用乃稀。《仙經》亦服之。

《唐本》注云：此石以白色、肌理似殷孽，仍夾帶雲母綠潤者爲良，故《本經》一名白石。今有用純黑如炭者，誤矣。雲母條中既云黑者名雲膽，又名地涿，服之損人，黑陽起石必爲惡矣。經言生齊山，齊山在齊州歷城西北五六里，採訪無陽起石。齊山西北六七里盧山出之。《本經》云或雲山，雲、盧字訛矣。今太山、沂州惟有黑者，其白者獨出齊州也。

禹錫云：陽起石，神農、扁鵲：酸，無毒。桐君、雷公、岐伯：鹹，無毒。季氏：小寒。或生太山。

《南海藥譜》云：陽起石惟太山所出黃者絶佳，邢州鵲山出白者亦好。

《衍義》曰：陽起石，如狼牙者佳。其外色不白，如薑石。其大塊者，亦內白。治男子婦人下部虛冷，腎氣乏絶，子臟久寒，須水飛研用。凡石藥，冷熱皆有毒，宜斟酌。

孔公孽　味辛，温，無毒。主傷食不化，邪氣結惡，瘡疽瘦痔，利九竅，下乳汁，男子陰瘡，女子陰蝕，及傷食病常欲眠睡。一名通石，殷孽根也。青黃色。生梁山山谷。木蘭爲之使。惡細辛。

《圖經》曰：文具石鍾乳條下。

《藥性論》云：孔公孽，忌羊血，味甘，有小毒。主治腰冷，膝痹，毒風，男女陰蝕瘡。治人常欲多睡，能使喉聲圓亮。

陶隱居云：梁山屬馮翊郡，此即今鍾乳床也，亦出始興，皆大塊打破之。凡鍾乳之類，三種同一體，從石室上汁溜積久盤結者，爲鍾乳床，即此孔公孽也。其次以小龍窠者，爲殷孽，今人呼爲孔公孽。殷孽復溜輕好者爲鍾乳。雖同一類，而療體爲異，賤❽相殊，此二孽不堪丸散，人皆搗末酒漬飲之，甚療脚弱。其前諸療，恐宜水煮爲湯也。按今三種同根，而所生各處，當是隨其土地爲勝爾。

《日華子》云：孔公孽，味甘，暖。治癥結。此即殷孽床也。

禹錫云：按《蜀本》云：凡鍾乳之類有五種：一鍾乳、二殷孽、三孔公孽、四石床、五石花，雖同一體而主療有異。此二孽止可酒浸，不堪入丸散藥用，然甚療脚弱、脚氣。石花，石床顯在後條。

《圖經》曰：文具石鍾乳條下。

《藥性論》云：孔公孽，輕身充饑。

青霞子云：孽，輕身充饑。

殷孽　味辛，温，無毒。主爛傷瘀血，泄痢，寒熱，鼠瘻，癥瘕結氣，脚冷疼弱。一名薑石，鍾乳根也。生趙國山谷，又梁山及南海。採無時。惡防

己，畏术。

《圖經》曰：文具石鍾乳條下。

陶隱居云：趙國屬冀州，此即今人所呼孔公孽，大如牛羊角，長一二尺左右，亦出始興。

《唐本》注云：此名石室下孔公孽根也，盤結如薑，故名薑石。俗人乃以孔公孽爲之，誤爾。

禹錫云：按《日華子》云：殷孽，治筋骨弱，并痔瘻等疾及下乳汁。

蜜陀僧　味鹹、辛、平，有小毒。主久痢，五痔，金瘡，面上瘢皯，面齇。用之。

《圖經》曰：蜜陀僧，所出州土。注云出波斯國。今嶺南、閩中銀銅冶處亦有之，是銀鉛脚。其初採礦時，銀銅相雜，先以鉛銅煎煉，銀隨鉛出。又採山木葉燒灰，開地作爐，填灰其中，謂之灰池。置銀鉛於灰上，更加火大鍛，鉛滲灰下，銀住灰上，罷火候冷出銀。其灰池感鉛銀氣，置之積久成此物。今之用者，往往是此，未必胡中來也。形似黃龍齒而堅重者佳。



蜜陀僧

《日華子》云：味甘，平，無毒。鎮心，補五臟，治驚癇，嗽嘔，及吐痰等。

雷公云：製用蜜陀僧，凡使，搗令細，於瓷堝中安置了，用重紙袋盛柳蚡末，焙蜜陀僧堝中，次下東流水浸令滿，著火煮一伏時足，去柳末、紙袋，取蜜陀僧用。

禹錫云：按《蜀本》注云：五痔，謂牡痔、酒痔、腸痔、血痔、氣痔。

《聖惠方》：治黑黯斑點方。用蜜陀僧二兩，細研，以人乳調，塗面，每夜用之。又方：赤白痢，所下不多，遍數不減。用蜜陀僧三兩，燒令黃色，研如粉，每服醋茶調下一錢匕，日三服。

《外臺秘要》：冷❾面生光方：以蜜陀僧用人乳煎，塗面佳，兼治瘡鼻皰。

《譚氏小兒方》：療豆瘡瘢，面黶。以蜜陀僧細研，水調，夜塗之，明旦洗去，平復矣。

《衍義》曰：蜜陀僧，堅重，椎破如金色者佳。

鐵精　平、微温，主明目，化銅。療驚悸，定心氣，小兒風癇，陰癀，脱肛。

《圖經》曰：文具鐵條下。

陶隱居云：鐵落是染皂鐵漿。生

鐵是不破鐳鎗、釜之類，鋼鐵是雜煉生鍒作刀鐮者。鐵精出鍛竈中，如塵，紫色輕者爲佳。亦以摩瑩鋼器用之。

陳藏器云：針砂，性平，無毒。堪染白爲皂，及和没食子染鬚至黑。飛爲粉，功用如鐵粉。煉鐵粉中亦別須之。針是其真鋼砂堪用，人多以雜和之，謬也。又云：鍛鑽下鐵屑，味辛，平，無毒。主鬼打，鬼疰，邪氣。水漬攪令沫出，澄清去滓，及暖飲一二盞。

《日華子》云：鐵屑，治驚邪癲癎，小兒客忤，消食及冷氣，并煎汁服之也。一云：犁鑱尖浸水，名爲鐵精，可制朱砂、石亭脂、水銀毒。

《聖惠方》：陰脫。鐵精、羊脂二味，攪令稠，布裹炙熱，熨推内之差。又方：食中有蠱毒，令人腹内堅痛，兩目青黄，淋露骨立，病變無常。用鐵精細研，搗鷄肝和爲丸如梧桐子大。食前後酒下五丸。

生鐵　微寒。主療下部及脱肛。

《圖經》曰：文具鐵條下。



生鐵

禹錫云：按《日華子》云：生鐵鍛後，飛，淘去粗赤汁，烘乾用。治癖及惡瘡疥，蜘蛛咬，蒜摩，生油傅并得。今注：解在鐵精條。

《圖經》曰：文具鐵條下。



柔鐵

柔鐵　味甘，無毒。主金瘡，煩滿，熱中，胸膈氣寒，食不化。一名跳。

鐵　主堅肌耐痛。

《圖經》曰：諸鐵不著所出州郡，亦當同處耳。今江南、西蜀有爐，冶處皆有之。鐵落者，鍛家燒鐵赤沸，砧上打落細皮屑，俗呼爲鐵花是也。初煉以生鐵三斤，水一斗，煮取五升，出鐵，以汁洗，日再。

《子母秘録》：治小兒卒得熛瘡，一名爛瘡。燒鐵淬水中三七遍，以浴兒三二遍，起作熛瘡漿。

鍛竈中飛出如塵，紫色而

輕虛，可以瑩磨銅器者，爲鐵精。作針家磨鑪細末，謂之針砂。取諸鐵於器中，水浸之，經久色青沫出，可以染單者爲鐵漿。以鐵拍作片段，置醋糟中，積久衣生刮取之，爲鐵華粉。入火飛煉者，爲鐵粉。作鐵華粉自有法，文多不載，諸鐵無正入丸散者，惟煮汁用之，華粉則研治極細，合和諸藥。及馬銜、秤錘、車轄及杵、鋸等，皆燒以淬酒用之，刀斧刃磨水作藥使，并俗用有效，故載之。

珊瑚



珊瑚　味甘，平，無毒。主宿血，去目中翳，鼻衄，末吹鼻中。生南海。

《圖經》曰：珊瑚，生南海。注云：又從波斯國及師子國來。今廣州亦有，云生海底，作枝柯狀，明潤如紅玉，中多有孔，亦有無孔者，枝柯多者更難得。採無時。謹按《海中經》曰：鐵相公《箋中方》：治七八歲小兒取珊瑚，先作鐵網沉水底，珊瑚貫中而生，歲高三二尺，有枝無葉，因絞網出眼有麩翳，未堅，不可妄傅藥。宜點珊之，故難得完好者。不瑚散，細研如粉，細爛，用少點目中即愈。

《衍義》曰：珊瑚，治翳目，今人用爲點眼箸。有一等紅油色，有細縱紋可愛；又一種如鉛丹色，無縱紋爲下。入藥用紅油色者。嘗見一本高尺許，兩枝直上，分十餘歧，將至其顛，則交合連理，仍紅潤有縱紋，亦一異也。波斯國海中，有珊瑚洲。海人乘大舶，墮鐵網水底，珊瑚初生磐石上，白極⓫菌，一歲而黃，三歲赤，枝榦交錯，高三四尺。鐵發其根，繫網舶上，絞而出之，失時不取即腐。

石蟹　味鹹，寒，無毒。主青盲，目中膚翳及丁翳，漆瘡，生南海。又云是尋常蟹爾，年月深久，水沫相著，因化成石，每遇海潮即飄出。又一般入洞穴，年深者亦然。皆細研水飛過，入

石蟹



諸藥相佐用之，點目良。

《圖經》曰：出南海，今嶺南近海州郡皆有。體質石也，都與蟹相似。或云是海蟹多年水沫相著，化而爲石，每海潮風飄出，爲人所得。又一種入洞穴，年深者亦然。醋磨傅癰腫，亦解金石毒。採無時。

禹錫云：按《日華子》云：石蟹，味辛、苦，寒，無毒。主身熱，胃中結氣，四肢寒厥，利小便，通血脉，明目，去翳眇，下三蟲，殺蟲毒，止消渴，下氣，除脅肋肺間邪氣。久服不饑。一名方石，一名土石，一名直石。療血運，消癰，治天行熱疾等。并熟水磨服也。又云：浮石，平，無毒。止渴，治淋，殺野獸毒。

《衍義》曰：石蟹，直是今之生蟹，更無異處，但有泥與粗石相著。凡用，須去其泥粗石，止用蟹，磨合他藥，點目中，須水飛過。

長石



大，縱理而長，文似馬齒，今均州遼坂山有之，土人以爲理石者，長石也。

桃花石



味甘，温，無毒。主大腸中冷，膿血痢。久服令人肌熱，能食。

《唐本》注云：出申州鍾山縣，似赤石脂，但舐之不著舌者爲真。唐本先附。

《南海藥譜》云：其狀亦似紫石英，若桃花，其潤且光而重，目之可愛是也。

《衍義》曰：桃花石，有赤白兩等。有赤地淡白點，如桃花片者，有淡白地有淡赤點，如桃花片者。人往往鐫磨

爲器用，今人亦罕服食。

馬瑙　味辛，寒，無毒。主辟惡，熨目赤爛。紅色似馬瑙，亦美石之類，重寶也。生西國玉石間，來中國者皆以爲器，亦云馬瑙珠。是馬口中吐出，多是胡人謬言，以貴之耳。

陳藏器云：：馬瑙出日本國，用砑木不熱爲上，砑木熱非真也。

《衍義》曰：馬瑙，非石、非玉，自是一類。有紅、白、黑色三種，亦有其紋如纏絲者，出西裔者佳。彼土人以小者碾爲好玩之物，大者碾爲器。今古方入藥，絶可用。此物，西方重之，故佛經多言之。其馬口吐出，既知謬言，不合編入。

太陰玄精　味鹹，温，無毒。主除風冷，邪氣濕痹，益精氣，婦人痼冷、漏下，心腹積聚冷氣，止頭痛，解肌。其色青白、龜背者良，出解縣。

《圖經》曰：太陰玄精，出解縣，今解池及通、泰州積鹽倉中亦有之。其色青白、龜背者佳。採無時。解池又有鹽精，味更鹹苦，青黑色，大者三二寸，形似鐵鏵觜，三月四月採。亦主除風冷，無毒。古方不見用者，近世補藥及治傷寒多用之。其著者，治傷寒三日，頭痛壯熱，四肢不利。正陽用⑫：太陰玄精、滑石、硫黄各二兩，硇砂一兩，四物都細研，入瓦瓶子中，固濟，以火半斤，於瓶子周一寸翳⑬之，約近半日，今⑭藥青紫色，住火。待冷取出，用臘月雪水拌令匀，灌入瓷瓶子中，屋後北陰下陰乾。又入地埋二七日，取出細研，以麵糊和爲丸，如鷄頭實大。先用鹽⑮水浴後，以艾湯研下一丸。以衣蓋，汗出爲差。



太陰玄精

《衍義》曰：太陰玄精石，合他藥，塗大風疾，別有法。陰證傷寒，指甲面色青黑，六脉沉細而疾，心下脹滿，結硬，躁渴，虚汗不止，或時狂言，四肢逆冷，咽喉不利，腹疼，亦須佐他藥兼之。《圖經本草》已有法，惟出解州者良。

緑鹽　味鹹、苦、辛，平，無毒。主目赤泪出，虚翳眵暗。

《唐本》注云：：以光明鹽、硇砂、赤銅屑釀之成塊，緑色。真者出焉耆國，水中石下取之，狀若扁青、空青，爲

眼藥之要。唐本先附。

鐵漿　鐵法中，陶爲鐵落是鐵漿，蘇云非也。按鐵漿取諸鐵於器中，以水浸之，經久色青沫出，即堪染皂，兼解諸毒入腹，服之亦鎮心。主癲癎發熱，急狂走，六畜癲狂。人爲蛇犬虎狼毒刺，惡蟲等嚙。服之毒不入內。見陳藏器。

秤錘　主賊風，止産後血瘕復痛及喉痹熱塞。并燒令赤，投酒中，及熱飲之。時人呼血瘕爲兒枕，産後即起，痛不可忍，無錘用斧。今附。

禹錫云：按陳藏器云：秤錘，味辛，温，無毒。

鐵華粉　味鹹，平，無毒。主安心神，堅骨髓，强志力，除風邪，養血氣，延年變白，去百病，隨所冷熱，合和諸藥，用棗膏爲丸。作鐵華粉法：取鐵鍛作葉，如笏或團，平面磨錯令光净，以鹽水⑯水灑之，於醋瓮中，陰處埋之一百日，鐵上衣生鐵華成矣。刮取，更細搗篩，入乳鉢研如麵，和合諸藥爲丸散。此鐵之精華，功用强於鐵粉也。今附。

禹錫云：按《日華子》云：鐵胤粉，止驚悸，虚癲，鎮五臟，去邪氣，强志，壯筋骨，治健忘，冷氣，心痛，痃癖癥結，脱肛痔瘻，宿食等。

鐵粉　味鹹，平，無毒。主安心神，堅骨髓，除百病，變白，潤肌膚，令人不老體健，能食。久服令人身重肥黑，合和諸藥各有所主。其造作粉，飛煉有法，文多不載。人多取雜鐵作屑飛之，令體重，真鋼則不爾。其針砂，市人錯鍒鐵爲屑，和砂飛爲粉賣之，飛煉家亦莫辨也。取鋼鐵爲粉勝之。今附。

鐵落　味辛、甘，平，無毒。主風熱，惡瘡瘍疽，瘡痂疥，氣在皮膚中，除胸膈中熱氣，食不下，止煩，去黑子。一名鐵液。可以染皂。生牧羊平澤及枋音俘城或析城。採無時。

禹錫云：按《了⑰華子》云：鐵液，治心驚邪，一切毒蛇蟲及蠶、漆咬瘡，腸風痔瘻，脱肛，時疾熱狂，并染鬚髮。今注：解在鐵精條。

石腦　味甘，温，無毒。主風寒虚損，腰脚疼痹，安五臟益氣。一名石飴餅。生名山土石中。採無時。

陶隱居云：此亦鍾乳之類，形如曾青而白色黑斑，軟易破。今茅山東及西平山并有，鑿土龕取之。俗方不見用，《仙經》有劉君導仙散用之。又《真誥》曰李整採服，療風痹虚損而得長生。

理石　味辛、甘，寒、大寒，無毒。主身熱，利胃，解煩，益精明目，破積聚，去三蟲，除榮衛中去來大熱，結熱，解煩毒，止消渴及中風痿痹。一名立制石，一名肌石，如石膏，順理而細。生漢中山谷及盧山。採無時。滑石爲之使。惡麻董⑱。

陶隱居云：漢中屬梁州，盧山屬

青州，今出寧州。俗用亦稀。

《衍義》曰：理石如長石，但理石如石膏，順理而細，其非順理而細者爲長石，治療亦不相遼。

馬衙　無毒。主難産，小兒癇，産婦臨産時手持之，亦煮汁服一盞，此馬勒口鐵也。《本經》馬條注中，已略言之。今附

禹錫云：按《本經》難産通用藥云：馬銜，平。

礪石　無毒。主破宿血，下石淋，除癥結，伏鬼物惡氣。一名磨石。燒赤熱投酒中，飲之。即今磨刀石，取堊，傅蠷螋溺瘡，有效。又不欲人蹋之，令人患帶下，未知所由。又有越砥石，極細，磨汁滴目，除障闇，燒赤投酒中，破血瘕痛。功狀極同，名又相近，應是礪矣。《禹貢》法⑲云：砥細於礪，皆磨石也。新補。見陳藏器。酒漬服。

石花　味甘，温，無毒。主腰脚風冷，與殷孽同。一名乳花。

《唐本》注云：三月九月採之。乳水滴水上，散如霜雪者，出乳穴堂中。唐本先附。

《衍義》曰：石花，白色，圓如覆大馬杓，上有百十枝，每枝各槎牙，分歧如鹿角，上有細文起，以指撩之，錚錚然有聲。此石花也，多生海中石上，世亦難得，家中有一本，後又於大相國宮中見一本，其體甚脆，不禁觸擊。本條所注皆非。

光明鹽　味鹹、甘，平，無毒。主喉痹及喉中熱頭面諸風，目赤痛，多眵泪，生鹽州五原鹽池下，鑿取之，大者如升，皆正方光徹。一名石鹽。唐本先附。

禹錫云：謹按《蜀本》注云：亦呼爲聖石。

石床　味甘，温，無毒。酒漬服，與殷孽同。一名乳床，一名逆石。

《唐本》注云：陶謂孔公孽即乳床，非也。二孽在上，床花在下，性體雖同，上下有別，鍾乳水下凝積，生如笋狀，漸長，久與上乳相接爲柱也。出鍾乳堂中，採無時。唐本先附。

膚青　味辛、鹹，平，無毒。主蠱毒及蛇、菜、肉諸毒，惡瘡。不可久服，令人瘦。一名推青，一名推石。生益州川谷。

陶隱居云：……俗方及《仙經》并無用此者，亦相與不復識。

車轄　無毒。主喉痹及喉中熱寒。燒令赤，投酒中，及熱飲之。今附。

天子藉田三推犁下土　無毒。主驚悸癲邪，安神定魄，强志。入官不懼，利見大官，宜婚市。王者所封五色土亦其次焉。已前主病正爾，水服，餘皆藏寶。

社壇四角土　牧宰臨官，自取以塗門户，主盜不入境，今郡縣皆有社壇也。

鑄鐘黃土　無毒。主卒心痛，疰忤惡氣。置酒中温服之，彌佳也。

土蜂窠上細土　主腫毒，醋和爲泥傅之。亦主蜘蛛咬。土蜂者，在地土中作窠者是。

舂牛角上土　收置户上，令人宜田。

桑根下土　搜成泥餅，傅風腫上，仍灸二三十壯，取熱通瘡中。又人中惡風水，肉腫一個差，以土碗灸二百壯，當下黃水，即差也。

胡燕窠内土　無毒。主風瘙癮疹，末，以水和傅之。又巢中草，主卒溺血，燒爲灰，飲服。又主惡刺瘡，及浸淫瘡繞身至心者死，亦用之。

柱下土　無毒。主腹痛暴卒者，末，服方寸匕。

蟻穴中出土　搽狐刺瘡。

故茅屋上塵　無毒。主老嗽。取多年烟火者，拂取上塵，和石黃、款冬花、婦人月經衣帶爲末，以水和塗於茅上，待乾内竹筒子中，燒一頭，以口吸之入咽喉，數數咽之，無不差也。

❶洗：晦明軒本作『洗洗』。
❷銅：晦明軒本作『鋼』。
❸丹方：晦明軒本作『加而』。
❹燥：晦明軒本作『躁』。
❺東：晦明軒本作『丙』。
❻徹：晦明軒本作『澈』。
❼材：晦明軒本作『枕』。
❽賤：晦明軒本『賤』上有『貴』字。
❾冷：晦明軒本作『令』。
❿及斯國：晦明軒本無此三字。
⓫極：晦明軒本作『如』。
⓬用：晦明軒本作『丹』。
⓭翳：晦明軒本作『煬』。
⓮今：晦明軒本作『候』。
⓯鹽：晦明軒本作『熱』。
⓯水：晦明軒本『水』下不疊『水』字。
⓯了：晦明軒本作『日』。
⓯董：晦明軒本作『黃』。
⓯法：晦明軒本作『注』。

圖經衍義本草卷之五

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

玉石部下品

伏龍肝　味辛，微温。主婦人崩中，吐下❶血，止血，消癰腫毒氣。

《圖經》曰：文具石灰條下。

陶隱居云：此竈中封釜月下黄土也，取搗篩，合葫塗癰，甚效。以竈有神，故號爲伏龍肝，并以遷❷隱其名爾。今人又用廣州鹽城屑，以療漏血、瘀血，亦是近耳之上❸，兼得火燒之義也。

陳藏器云：竈中土及四交道土，合末以飲兒，辟夜啼。

《日華子》云：伏龍肝，熱，微毒。治鼻洪，腸風，帶下，血崩，泄精，尿血，催生下胞及小兒夜啼。

雷公云：凡使，勿誤用竈下土。其伏龍肝，是十年已來竈額内火氣積，自結如赤色石，中黄，其形貌八棱，取得後細研，以滑石水飛過兩遍，令乾，用熟絹裹却，取子時安於舊額内一伏時，重研用。

禹錫云：按《藥性論》云：伏龍肝，單用亦可。味鹹，無毒。末與醋調，塗癰腫。

《外臺秘要》：救急治心痛，冷熱。伏龍肝末，煮水服方寸匕。若冷，以酒服。又方：治癰腫。伏龍肝以蒜和作泥塗，用布上貼之，如乾，則再易。

《千金方》：治風痱者，卒不能語，口噤，手足不隨而强直。伏龍肝五升，以水八升，和攪取汁飲之。

《廣利方》：治吐血，鼻衄不止。伏龍肝半升，以新汲水一大升淘取汁，和蜜頓服。

《十全博濟方》：治子死腹中，其母氣欲絶。伏龍肝二錢匕，以水調下，其土當兒頭上戴出。

《産寶方》：胞衣不出。取竈下土一寸，研碎，用好醋調令相得，内於臍中，續取甘草湯三四合服之，出。

《衍義》曰：伏龍肝，婦人血露，蠶沙一兩炒，伏龍肝半兩，阿膠一兩，同爲末，温酒調，空心服二三錢，以知爲度。本條中有東壁土，陳藏器云：取其東壁土，久乾也。今詳之：南壁土，亦向陽久乾也，何不取？蓋東壁常先得曉日烘炙。日者太陽真火，故治瘟癀。或曰：何不取午盛之時南壁上❹，而取日初出東壁土者，何也？火生之時，其氣壯。故《素問》云：少火之氣壯。及其當午之時，則壯火之氣衰，故不取，實用此義。或曰：何以知日者太陽真火？以水精珠，或心凹銅鑒，向日射之，以艾承接其光聚處，火出。

石灰　味辛，温。主疽瘍，疥瘙，熱氣，惡瘡，癩疾，死肌，墮眉，殺痔蟲，去黑子息肉，療髓骨疽。一名惡灰，一名希灰。生中山川谷。

《圖經》曰：石灰，生中山川谷，今

石灰



所在近山處皆有之。此燒青石爲灰也，又名石鍛。有兩種：風化，水化。風化者，取鍛了石，置風中自解，此爲有力；水化者，以水沃之，則熱蒸而解，力差劣。古方多用合百草團末，治金瘡殊勝。今醫家或以臘月黃牛膽，取汁漉和，却内膽中，掛之當風百日，研之更勝草葉者。又敗船茹灰刮取用亦同。

陶隱居云：中山屬代郡。今近山生石，青白色，作竈燒竟，以水沃之，即熱蒸而解末矣。性至烈，人以度酒飲之，則腹痛下痢，療金瘡亦甚良。俗名石堊。古今多以結冢，用捍水而辟蟲。故古冢中水，洗諸瘡，皆即瘥。

《唐本》注云：《別録》及今人用療金瘡，止血，大效。若五月五日採蘩蔞、葛葉、鹿活草、槲葉、芍藥、地黃葉❺、蒼耳葉、青蒿葉合石灰，搗爲團如鷄卵，暴乾末，以療瘡生肌，大神驗。

《日華子》云：味甘，無毒。生肌長肉，止血，并主白癜、癮瘕、瘻瘡、癜疵等。療冷，婦人粉刺，痔瘻疽瘡，瘿贅疣子。又治産後陰不能合，濃煎汁熏洗。解酒味酸，令不壞，治酒毒，暖水臟，倍勝爐灰。又名鍛石。

雷公云：凡使，用醋浸一宿，漉出待乾，下火鍛，令腥穢氣出，用瓶盛，密蓋，放❻冷，拭上灰，令净用。

《別本》注云：燒青石爲灰也，有兩種：風化，水化。取石灰一斗，熬令黃，出，玉門不閉。取灰一斗，熬令黃，石灰一斗熬之，令可燒草，以水二斗投灰中，適寒温，入水中坐。

《梅師方》：治産後陰腫，下脱腸不閉。取石灰一斗，熬令黃，以水三斗投灰中，放冷澄清，取一斗二升暖洗。

《孫用和方》：治誤吞金銀，或錢肉，不入湯服。止金瘡血，和鷄子白、石灰一杏核大，硫黃一皂子大，同研爲末，酒調下。

《斗門方》：治刀斧傷。用石灰上敗船茹，甚良。

《抱朴子·内篇》：古大墓中多石灰汁，夏月行人有瘡者，見墓中清水，因自洗浴，瘡偶愈。於是諸病者聞之，悉往洗之，轉❼有飲以治腹内疾者。

《丹房鏡源》云：石灰伏硫黃，去錫上暈，制雄黃，制硇砂可用之。

《聖惠方》：治螻蛄咬人，用石灰醋和塗之。

《外臺秘要》：元希聲侍郎治卒發疹秘驗方。石灰隨多少，和❽醋、漿水令熱，故帛裹，坐其上，冷即易之。

《肘後方》：治産後陰道開不閉。每因大便脱肛，收不能入方。炒石灰調塗，隨手即減。

《梅師方》：治産後陰腫，下脱腸不閉。取石灰一斗，熬令黃，以水三斗投灰中，放冷澄清，取一斗二升暖洗。

《孫用和方》：治誤吞金銀，或錢在腹内。石灰一杏核大，硫黃一皂子大，同研爲末，酒調下。

《斗門方》：治刀斧傷。用石灰上

包，定痛止血，立差。

《崔氏方》：治血痢十年方。石灰三升，熬令黄，以水一斗，攪令清澄，一服一升，日三服。

《衍義》曰：石灰，水調一盞，如稠粥，揀好糯米粒全者，半置灰中，半灰外。經宿，灰中米色變如水精。若人手面上有黑黶子及紋刺，先微微以針頭撥動，置少許如水精者於其上，經半日許，黶汁自出，剔去藥不用，且不得着水，三二日愈。又取新硬石灰一合，以醋炒，調如泥，於患偏風牽口喎邪人口唇上，不患處一邊塗之，立便牽正。

礬石





礬石　味辛、甘，大熱、生温熟熱，有毒。主寒熱，鼠瘻，蝕瘡，死肌，風痹，腹中堅，癖邪氣，除熱，明目，下氣，除腸中熱，止消渴，益肝氣，破積聚，痼冷腹痛，去鼻中息肉。久服令人筋攣。不煉服，則殺人。經宿，灰中米色變如水精。生漢中山谷及百獸。一名青分石，一名固羊石，一名白礬石，一名立制石，一名太白石，一名澤乳，一名食鹽。生漢中山谷及少室。採無時。得火良，棘針爲之使，惡馬目毒公、鷲屎、虎掌、細辛，畏水。

《圖經》曰：礬石，生漢中山谷及少室，今潞州亦有焉。此物堅而拒火，燒之一日夕，令水不冰，又堅而拒火，但解散而不奪其堅。市人多取潔白石礬石煉、乾薑、桂心、皂莢、桔梗各三兩，附子二兩，六物搗篩，蜜丸。服如梧子五丸，日三，漸增，以知爲度。又有匈奴露宿丸，主寒冷百病方。硫黄丸，并主積聚及飲食不下，心腹堅實，皆用礬石。近世乃少用者。

胡洽：大露宿丸，主寒冷之病爲良，用之須真者乃佳。又有中礬石爲真也。

《衍義》曰：礬石并特生礬石，《博物志》及陶隱居皆言此二石，鸛取之以擁卵，如此則是一物也。今補經》不云特生，則止是前白礬石。今注但隨文解義，不見特生之意。蓋二條止是一物，但以特生不特生爲異耳。所謂特生者，不附著他石爲特耳。今出南康南野溪及彭城界中、洛陽城南

用者絶少，惟兩字礬石入藥。然極須謹❾用，其毒至甚。及論鸛巢中者，皆無此石，乃曰：鸛常入水，冷，故取以擁卵。如此則鸕鷀、雁鶩之類，皆食於水，亦自繁息生化，復不用此二石。其説往往取俗士之言，未嘗究其實而窮其理也。

砒霜



砒霜　味苦、酸而有毒。主諸瘧，風痰在胸膈。可作吐藥，不可久服，能傷人。飛煉砒黄而成，造作別有法。

《圖經》曰：砒霜，舊不著所出郡縣，今近銅山處亦有之，惟信州者佳。其塊甚有大者，色如鵝子黄，明澈不雜。此類本處自是難得之物，每一兩大塊真者，人競珍之，市之不啻金價。古方并不入藥，唯是❿燒煉丹石家用。近人多以治瘧，然大⓬意本以生者能解熱毒。蓋瘧本傷暑故用。今俗醫乃不究其理，即以所燒霜用，服之⓭必吐下，因此幸有安者，遂爲定法，爾後所損極則《圖經》所謂如鵝子色明澈者，此也。古方并不入藥，唯是⓫燒煉丹石家用。近人多以治瘧，然大⓬意本以生者能解熱毒。蓋瘧本傷暑故用。今俗醫乃不究其理，即以所燒霜用，服之⓭必吐下，因此幸有安者，遂爲定法，爾後所損極者亦死，其毒過於射罔遠矣，可不察之。

《聖惠方》：治卒中風，昏憒若醉，痰涎壅盛，四肢不收。方用砒霜如緑豆大，研，以新汲水調下少許，用熟水投，大吐即愈。若未吐，再服。

《博濟方》：小兒牙宣，常有鮮血不止，牙齦臭爛。砒黄抄一錢，麝香抄半錢，同研細末，用紙條子以生油塗之，後摻藥末在上，少用末，剪作小片紙棋子大，看大小用，插在爛動處。

《簡要濟衆方》：治瘧神聖丹：砒霜半錢，研黑豆麵一錢，右件二味細研，滴水丸小豆大，雄黄爲衣。未發時

空心面東，新水下三丸。

青霞子云：《寶藏論》云：砒霜，若草伏住火胎[18]，色不變移，溶成汁，添得者，點銅成銀。若見質枯折者，不堪用。

《衍義》曰：砒霜，瘧家或用，纔過劑，則吐瀉兼作，須濃研緑豆汁，仍兼冷水飲，得石腦油即伏。今信州鑿坑井，下取之。其坑[19]常封鎖，坑中有濁緑水，先絞水盡，然後下鑿取。生砒謂之砒黄，其色如牛肉，或有淡白路，謂石非石，謂土非土，磨研酒飲，治癖積氣有功。纔見火，便有毒，不可造次服也。取砒之法：將生砒就置火上，以器覆之，令砒烟上飛，着覆器，遂凝結，累然下垂如乳。尖長者爲勝，平短者次之。《圖經[20]》言大塊者，其大塊者以是下等，片如細屑者極下也。入藥當用如乳尖長者，直須詳謹。

硇砂　味鹹、苦、辛，温，有毒。不宜多服。主積聚，破結血，爛胎，止痛下氣，療咳嗽宿冷，去惡肉，生好肌。



硇砂

柔金銀，可爲焊音旱藥。出西戎，形如牙消，光净者良。驢馬藥亦用。

《圖經》曰：硇砂，出西戎，今西涼夏國及河東、陝西近邊州郡亦有之。然西戎來者，顆塊光明，大者有如拳，重三五兩，小者如指面，入藥最緊。邊界出者，雜碎如麻豆粒，又挾砂石，用之須飛澄去土石訖，亦無力，彼人謂之氣砂。此藥近出唐世，而方書著古人單服一味，伏火作丸子，亦有兼硫黄、馬牙消輩合餌者，不知方出何時？殊非古法。此本攻積聚之物，熱而有毒，多食腐壞人腸胃，生用又能化人心爲血，固非平居可餌者。

陳藏器云：硇砂，主婦人、丈夫羸瘦積病，血氣不調，腸鳴，食飲不消，腰脚疼冷，痃癖痰飲，喉中結氣，反胃吐水。令人能食，肥健。一飛爲酸砂，二飛爲伏翼，三飛爲定精，色如鵝兒黄，和諸補藥爲丸，服之有暴熱。飛煉有法，亦能變鐵。

《日華子》云：北庭砂，味辛、酸，暖，無毒。畏一切酸。補水臟，暖子宫，消冷癖瘀血，宿食不消，氣塊痃癖，及血崩帶下，惡瘡息肉。食肉飽脹，夜多小便，女人血氣心疼，丈夫腰胯酸重，四肢不任。凡修制，用黄丹、石灰作櫃，煅赤使無毒。世人自疑爛肉，如人被刃傷，以北庭署傅定，當時生痂。亦名狄鹽者。

禹錫云：謹按《藥性論》云：硇砂，有大毒。畏漿水，忌羊血。味酸、鹹。能銷五金八石，腐壞人腸胃。生食之，化人心爲血。中者，研生緑豆汁，飲一二升解之。道門中有伏煉法。能除冷病，大益陽事。

蕭炳云：硇砂，使。生不宜多服，光净者良，今生北庭爲上。

《外臺秘要》：救急治魚骨鯁在喉中。以少⑲硇砂，口中咀嚼，咽之立下。

《經驗方》：硇砂丸方：硇砂不計多少，用罐子內著硇砂，上面更坐罐子一個，用紙筋、白土和上下俱泥了。窖乾後，從辰初時便用蒼耳自在落下葉，將來搗羅爲末，藥上鋪頭蓋底，上面罐子內用水坐著，水旋添，火燒從罐子外五寸已來圍繞，欲盡更添火，移向前罐子周迴，火盡更旋燒促向前，計一伏時爲度，更不移火，即⑳閑雜人及婦人不得見，一伏時住。取來搗羅爲末，醋、麵糊爲丸如桐子大。每服逐日十丸至十五丸，温酒或米飲下，并無忌，若燒吃三二斤，進食無病。

《陳巽方》：治元臟虛冷，氣攻臍㉑腹疼痛。硇砂一兩，川烏頭生去皮臍，杵爲末一二兩，硇砂生研，用纖霞草末二兩，與硇砂同研匀，用一小砂罐子，將拌了者硇不固濟，慢火燒，候罐熱，將拌了者硇砂入罐子內，不蓋口，燒炭火一秤，候火盡爐寒取出研，與烏頭生㉒同研匀，湯浸蒸餅丸如桐子大。每服三丸，或木香湯、醋湯任下。

青霞子云：《寶藏論》硇砂，若草伏住火不碎，可轉制得諸石藥，并引諸藥，可治婦人久冷。硇砂爲五金賊也，若石藥并灰霜伏得，不堪用也。

《太清服煉靈砂法》：北庭砂所禀陰石之氣，性含陽毒之精，功能消敗去穢益陽。

禹錫《丹房鏡源》云：謹按《藥性論》云：鉛或沉冷之疾可服則愈，久服有癰腫。出北庭白黄者，訣曰爲之金賊，能制合群藥。藥中之使，自制雄、雌黄。

《衍義》曰：硇砂，金銀有僞，投鎔窩中，其僞物盡消散。矧人腹中有久積，故可潰腐也。合他藥治目中翳，用之須水飛過，入瓷器中，於重湯中煮其器，使自乾，殺其毒及去其塵穢。

鉛丹　味辛，微寒，主吐逆胃反，驚癇疾，除熱下氣，止小便利，除毒熱臍攣，金瘡溢血。煉化還成九光，久服通神明。一名鉛華，生於鉛。生蜀郡

《圖經》曰：文具鉛錫條下。

陶隱居云：即今熬鉛所作黄丹也。畫用者，俗方亦稀用，惟㉒《仙經》塗丹釜所須，云化成九光者，當謂九光丹以爲釜爾，無別變煉法。

《日華子》云：凉，無毒。鎮心安神，療反胃，止吐血及嗽，傅金瘡長肉，及湯火瘡，染鬚髮。可煎膏。

禹錫《丹房鏡源》云：謹按《藥性論》云：鉛丹，君。主治驚悸狂走，嘔逆，煩渴。煎膏用，止痛生肌。

今注云：此即今黄丹也，與粉錫二物，俱是化鉛爲之。按李含光《音義》云：黄丹、胡粉皆化鉛，未聞用錫者，故《參同契》云：若胡粉投炭中，色壞還隱鉛。《抱朴子·内篇》云：愚人乃不信黄丹及胡粉是化鉛所作，今唐注以二物俱炒錫，大誤矣。

《肘後方》：客忤，中惡之類，多於道間門外得之，令人心腹疼痛，脹滿，氣衝心胸，不即治亦害人。救之方：真丹方寸匕，蜜三合和服之，口噤者折齒灌。

《經驗方》：碧霞丹：治吐逆立效。北來黃丹四兩篩過，用好米醋半斤，同藥入銚内煎令乾，却用炭火三稱，就銚内煅透紅，冷，取研細爲末，用粟米飯丸如梧子大。煎酵湯下七丸，不嚼，只一服。

《王氏博濟方》：治風癇驅風散：鉛丹二兩，白礬二兩，爲末。用磚相鬥，以紙鋪磚上，先以丹鋪紙上，次以礬鋪丹上，然後用紙掩，却將十斤柳木柴燒過爲度，取出細研。每服一錢，温酒下。

《劉氏方》：治小兒癗方：黄丹兩錢匕，以蜜水和與服，冷即以酒和，令服之良。

《治癗方》：百草霜：黄丹等分細研。每服二錢匕，於發日空心米飲調服，不過兩服愈。

《衍義》曰：鉛丹，本謂之黄丹，化鉛而成。別有法，《唐本》注：炒錫作，然《經》稱鉛丹，則炒錫之説誤矣。亦不爲難辨，蓋錫則色黯暗，鉛則明白，以此爲異。治癗及久積皆用。



鉛　味甘，無毒。鎮心安神，治傷寒毒氣，反胃嘔噦，蛇蝎所咬，炙熨之。

《圖經》曰：鉛，生蜀郡平澤；錫，生桂楊㉔山谷。今有銀坑處皆有之。而臨賀出錫尤盛，亦謂之白鑞。鉛丹，黄丹也。粉錫，胡粉也。二物并是化鉛所作，故附於鉛。鏡雖銅而皆用錫雜之，乃能明白，故鏡鼻附於錫。謹按《字書》：謂錫似而入用殊別也。又有鉛霜，亦出於鉛。其法以鉛雜水銀十五分之一，合煉作片，置錯㉕瓮中密封，經久成霜，亦謂之鉛白霜。性極冷，入治風痰及嬰孺驚滯藥。今之醫家用之尤多。

《經驗方》：治發背及諸般癰毒瘡。黑鉛一片，甘草三兩，微炙剉，用酒一斗，著空瓶在傍，先以甘草置在酒瓶内，然後熔鉛投在酒瓶中，却出酒，在空瓶内取出鉛，依前熔後投，如此者九度，并甘草去之，只留酒，令病者飲，醉寢即愈。

《勝金方》：烏髭鬢，明目，牢齒牙。黑鉛半斤，大鍋内熔成汁，旋入桑條灰，柳木攪令成沙，右以熟絹羅爲末。每日早晨揩齒後，用温水漱在盂内，取用其水洗眼，治諸般眼疾。髭黄白者，用之皆變黑。

青霞子云：《寶藏論》云：黑鉛草伏得成實㉖，可點銅爲銀，并鑄作鼎，養朱砂住得火，養水銀住火，斷粉霜住火。



錫　**粉錫**　味辛，寒，無毒。主伏尸毒瘡。黑錫一片，甘草三兩，微炙剉，用酒一斗，著空瓶在傍，先以甘草置在酒

㉔楊　疑爲「陽」。

㉕錯　音釋，殺三蟲，去鼾痕，療惡瘡，墮胎，

止小便利。一名解錫。

《圖經》曰：文具鉛條下。

陶隱居云：即今化鉛所作胡粉也。其有金色者，療尸蟲甚良，而謂之粉錫，事與經乖。

《唐本》注云：鉛丹、胡粉，實用錫造。陶今言化鉛作之，《經》云粉錫，亦爲深誤矣。

陳藏器云：胡粉，本功外，主久痢成疳。和水及鷄子白服，以糞黑爲度，爲其殺蟲而止痢也。

《日華子》云：光粉，涼，無毒。治癰腫瘻爛，嘔逆，療癥瘕，小兒疳氣。

今注：按《本經》呼爲粉錫，然其實鉛粉也。故英公序云：鉛、錫莫辨者，蓋謂此也。

禹錫云：按《藥性論》云：胡粉，使，又名定粉。味甘、辛，無毒。能治積聚不消，焦炒，止小兒疳痢。

《外臺秘要》：誤吞錢并金銀物。以胡粉一兩，搗調之，分再服。食水下。銀金，如吞金銀物在腹中，服之令消洋出之。

《千金方》：治瘡中水。胡粉、炭灰白等分，脂和塗孔上，水即止。

《肘後方》：治篤病新起早勞，食飲多致復欲死方：水服胡粉少許。《傷寒類要》同。

《張文仲方》：治反胃吐逆，內陰下恒濕且臭，或作瘡。又方：治寸白粉之即差，常用大驗。

蟲。熬胡粉令速燥，平旦作肉臛，以藥方寸匕內臛中，服之有大效。又方：小兒疳瘡。胡粉熬八分，猪脂和塗之，差爲度，油亦得。

《子母秘録》：小兒夜啼。胡粉服水調三豆大，日三服。

《衍義》曰：粉錫，胡粉也，又名定粉。止泄痢，積聚久痢。

銅青　平，微毒。治婦人血氣心痛，合金瘡，止血，明目，去膚赤息肉。生銅皆有青，青則銅之精華，銅器上緑色是，北庭署者最佳。治目時淘洗用。

陳藏器云：陶云青銅不入方用。按青銅明目，去膚赤，合金瘡，止血，入水不爛，令瘡青黑。生熟銅皆有青，即是銅之精華，大者即空緑，以次空青也。銅青獨在銅器上緑色者是。



代赭



代赭　味苦、甘，寒，無毒。主鬼疰，賊風，蠱毒，殺精物惡鬼，腹中毒邪氣，女子赤沃漏下，帶下百病，産難，胞衣不出，墮胎，養血氣，除五臟血脉中

熱，血痹血瘀，大人、小兒驚氣入腹及陰痿不起。一名須丸。出姑幕者名須丸，出代郡者名代赭。一名血師。生齊國山谷。赤紅青色如鷄冠有澤，染爪甲不渝者良。採無時。畏天雄。

《圖經》曰：代赭，生齊國山谷，今河東、京東山中亦有之，以赤紅赤[28]色如鷄冠有澤，染爪甲不渝者良。古方云無真者，以左顧牡蠣代使，乃知真者難得。今醫家所用，多擇取大塊，其上文頭如浮漚染[29]丸治小兒用代赭，採無時。下[30]者爲勝，謂之丁頭代赭，採無時。次條又有白堊，生邯鄲山谷，即畫家所用者，多而且賤，一名白善土。胡居士云：始興小桂縣鄉有白善，俗方稀用。今處處皆有，人家往往用以浣衣。《山海經·西山經》石郁之山[31]，其陰灌水出焉，而北流於愚水，其中有流赭，以塗牛馬無病。郭璞注云：代赭，赤土也[32]。又《北山經》：今人以朱塗牛角，云以辟惡。又云：大次之山，其陽多堊。又《中山天池之山，其中多黄堊。又《中山經》：葱聾[33]之山，其中有大谷，多白、黑、青、黄堊。注云：言有雜色之堊也。然則赭以西土者爲貴，堊有五色，入藥惟白者取[34]。

陶隱居云：舊説云是代郡城門下土。江東久[35]絶，頃魏國所獻，猶是彼間赤土爾，非復真物，此於俗用乃疏，而爲仙方之要，并與戎鹽、鹵鹹皆是急須。

《唐本》注云：此石多從代州來，云山中採得，非城門下土，又言生齊地山谷。今齊州亭山出赤石，其色有赤、紅、青者。其赤者，亦如鷄冠且潤澤，土人惟採以丹楹柱，而紫色且暗，此物與代州出者相似，古來用之。今靈州鳴沙縣界河北，平地掘深五尺得者，皮上赤滑，中紫如鷄肝，大勝齊、代者[36]。

《日華子》云：代赭，畏附子。止吐血，鼻衄，腸風，痔瘻，月經不止，小兒驚癇，疳疾，反胃，止瀉痢，脱精，尿血，遺溺，金瘡長肉，安胎，健脾，又治婦人難産，兩手各把一枚，立驗。出零陵。

石燕



以水煮汁飲之，主淋有效。

《圖經》曰：石燕，出零陵郡，今永州祁陽縣江傍沙灘上有之。形似蚶而

小，其實石也。或云生山洞中，因雷雨則飛出，墮於沙上而化爲石，未審的否。今人催生，令產婦兩手各握一枚，須臾子則下。

《唐本》注云：俗云因雷雨則從石穴中出，隨雨飛墮者，妄也。永州祁陽縣西北百一十五里土岡上，掘深丈餘取之。形似蚶而小，堅重如石也。

陳藏器云：石燕，主消渴，取水牛鼻和煮飲之。自死者鼻，不如落崖死者良。唐本先附。

《日華子》云：石燕，凉，無毒。出南土穴中，凝强㊳似石者佳。

禹錫云：謹按《蜀本》作蛹，注云：《爾雅》云：螺，小者蛹音含。

禹錫等謹按：蕭炳云：別有乳洞中食乳有命者，亦名石燕，似蝙蝠口方，生氣物也。

《食療》云：在乳穴石洞中者，冬月採之堪食。餘月採者，只堪治病，不堪食也。又，治法：取石燕一十㊴枚，和五味炒令熟，以酒一斗，浸三日，即每夜卧時飲一兩盞，隨性也。甚能補益，進飲食，令人健力。

《聖惠方》：治傷寒，小腹脹滿，小便不通。用石燕搗羅爲末，不計時候，葱白湯調半錢，得通爲度。

《簡要濟衆方》：治淋疾。石燕子七個，搗如黍米粒大，新桑根白皮三兩，剉如豆粒，同拌㊶令匀，分作七貼。用水一盞煎一貼，取半盞去滓，温服，空心、午前、至夜各一服。

《衍義》曰：石燕，今人用者如蜆蛤之狀，色如土，堅重則石也。既無羽翼，焉能自石穴中飛出，何故只墮沙灘上？此説近妄。《唐本》注：永州土岡上，掘深丈餘取之。形似蚶而小，重如石，則此自是二物，餘説不可取。治虚積藥中多用。

鐺墨　主蠱毒中惡，血暈吐血。以酒或水細研，温服之。亦塗金瘡，生肌止血。瘡在面，切勿塗之，黑入肉如印，此鐺下墨是也。

禹錫云：謹按《蜀本》云：鐺墨無毒。

東壁土　主下部瘡，脱肛。

陶隱居云：此屋之東壁上土爾，當取東壁之東邊，謂當先見日光，刮取用之。亦療小兒風臍，又可除油污衣，勝石灰、滑石。

《日華子》云：東壁土，温，無毒。

赤銅屑　以醋和如麥飯，袋盛，先刺腕下脉，去血，封之，攻腕臭神效。又熬使極熱，投酒中，服五合，日三，主賊風反折。又燒赤銅五斤，内酒二斗中百遍，服同前，主賊風甚驗。

禹錫云：謹按《日華子》云：銅屑，味苦，平，微毒。明目，治風眼，接骨焊齒，療女人血氣及心痛。

錫銅鏡鼻　臣禹錫等謹按月閉通用藥云：錫銅鏡鼻，平。　主女子血閉，癥瘕，伏腸，絶孕及伏尸邪氣。生桂陽山谷。

陶隱居云：此物與胡粉異類，而今共條，當以其非止成一藥，故云附見錫品中也。古無純銅作鏡者，皆用錫雜之。《別録》用銅鏡鼻，即是今破古

銅鏡鼻爾。用之當燒令赤，内酒中飲之。若置醯中出入百過，亦可搗也。鉛與錫，《本經》云生桂陽，今則乃出臨賀，猶是分桂陽所置。鉛與錫相似，而入用大異。

《日華子》云：古鑒，平，微毒㊷。

井底砂　至冷，治湯火燒瘡用之。

《千金方》蝎螯人，以井底泥塗傅之，温則易之。

戎鹽　味鹹，寒，無毒。主明目、目痛，益氣，堅㊸肌骨，去毒蠱，心腹痛，溺血吐血，齒舌血出。一名胡鹽。生胡鹽山及西羌北地酒泉福禄城東南角。北海青、南海赤。十月採。

陶隱居云：今俗中不復見鹵鹹，惟魏國所獻虜鹽即是。河東大鹽，形如結冰圓强，味鹹、苦。

《日華子》云：戎鹽，平。助水藏，益精氣，除五臟癥結，心腹積聚，痛瘡疥癬等。即西蕃所出。

《衍義》曰：戎鹽，枕，細白，味甘、鹹。亦功在却血。入腎，治目中瘀赤、澀昏。

大鹽　味甘、鹹，寒，無毒。主腸胃結熱，喘逆，胸中病。令人吐。生邯鄲及河東池澤。漏蘆爲之使。

禹錫云：按蕭炳云：大鹽，臣。

《衍義》曰：大鹽，新者不苦，久則鹹苦。今解州鹽池所出者，皆成斗子，其形大小不等，久亦苦。海水煎成者，但味和。二鹽互有得失。入藥及金銀作，多用大鹽及解鹽。傍海之人多黑色，蓋日食魚鹽，此走血之驗也。齒縫中血出，鹽湯嗽之，及接藥入腎。北虜以鹽淹尸，使不腐。

鹵鹹　味苦、鹹，寒，無毒。主大熱、消渴、狂煩，除邪及下蠱毒，柔肌膚，去五臟腸胃留熱結氣，心下堅，食已嘔逆喘滿，明目目痛。生河東鹽池。

陶隱居云：是煎鹽釜下凝滓。

《唐本》注云：鹵鹹既生河東，河東鹽不釜煎，明非凝滓。此是鹼土名鹵鹹，今人熟皮用之。

漿水　味甘、酸，微温，無毒。主調中，引氣宣和，强力通關，開胃止渴，霍亂泄痢，消宿食。宜作粥，薄暮啜之，解煩去睡，調理腑臟。粟米新熟白花者佳。煎令醋止嘔噦，白人膚體如繒帛。爲其常用，故人不齒其功。冰漿至冷，婦人懷妊，不可食之，食譜所忌也。

《衍義》曰：漿水，不可同李實飲，令人霍亂吐利。

井華水　味甘，平，無毒。主人九竅大驚出血，以水噀面。亦主口臭，正朝含之，吐棄厠下，數度即差。又令好顏色，和朱砂服之。又堪煉諸藥石，投酒醋令不腐。洗目膚翳，及酒後熱痢，與諸水有異，其功極廣。此水井中平旦第一汲者，《本經》注井苔條中略言之，今此重細解也。新補。

菊華水　味甘，温，無毒。除風補

衰，久服不老，令人好顏色，肥健，益陽道，温中，去痼疾。出南陽酈縣北潭水，其源悉芳。菊生被崖，水爲菊味。盛洪之《荆州記》云：酈縣菊水，太尉胡廣，久患風羸，常飲此水，後疾遂瘳。此菊甘美，廣後收此菊實播之京師，處處傳植。《抱朴子》云：南陽酈縣山中，有甘谷水，所以甘者，谷上左右皆生甘菊，菊花墮其中，歷世彌久，故水味爲變。其臨此谷中居民，皆不穿井，悉食甘谷水，食無不壽考。故司空王暢、太尉劉寬、太傅袁隗皆爲南陽太守，每到官，常使酈縣月送甘谷水四十斛，以爲飲食。此諸公多患風痹及眩冒，皆得愈。新補。

《衍義》曰：菊花水，本條言南陽酈縣北潭水，其源悉芳。菊生被崖，水爲菊味，此甚怪。且菊生於浮土上，根深者不過尺，百花之中，此特淺露，水泉莫非深遠而來。況菊根亦無香，其花當九月十月間，止三兩旬中，焉得香入水也？若因花而香，其無花之月合如何也？殊不詳。水自有甘、淡、鹹、苦，焉知無有菊味者？宜細詳之。

地漿　寒，主解中毒煩悶。

陶隱居云：此掘地作坎，以水沃其中，攪令濁，俄頃取之，以解中諸毒。山中有毒菌，人不識，煮食之，無不死。又楓樹菌食之，令人笑不止，唯飲土漿皆差，餘藥不能救矣。新補。

臘雪　味甘，冷，無毒。解一切毒，治天行時氣温疫，小兒熱癇狂啼，大人丹石發動，酒後暴熱，黄疸，仍小温服之。藏淹一切果實良。春雪有蟲，水亦便敗，所以不堪收之。新補。見陳藏器及《日華子》。

半天河　微寒。主鬼疰，狂，邪氣，惡毒。

陶隱居云：此竹籬頭水也，及空樹中水，皆可飲，并洗諸瘡用之。

《衍義》曰：半天河水，一水也。然用水之義有數種，種各有理。如半天河水，在上天澤水也，故治心病、鬼疰、狂、邪氣、惡毒。

泉水　味甘，平，無毒。主消渴，反胃，熱痢熱淋，小便赤澀。兼洗漆瘡，射癰腫。令散，久服却温，調中，下熱氣，利小便，并多飲之。又新汲水，《百一方》云：患心腹冷病者。若男子病，令女人以一杯與飲；女子病，令男子以一杯與飲。又解合口椒毒。又主食魚肉，爲骨所鯁。取一杯水，合口向水，張口取水氣，鯁當自下。又主人忽被墜損腸出，以冷水噴之，令身噤，腸自入也。又臘日夜，令人持椒井傍，無與人語，内椒井中，服此水去温氣。《博物志》云：凡諸飲水，療疾皆取新汲清泉，不用停污濁暖，非直無效，固亦損人。新補。

熱湯　主忤死。先以衣三種[44]，著衣上，湯冷者去衣，大冷者換湯，即愈。又霍亂，手足轉筋。以銅器若瓦器盛湯熨之，亦可令踢器使脚底熱徹，

亦可以湯捋之，冷則易，用醋煮湯更良，煮蓼子及吴茱萸汁亦好。以綿絮及破氈角脚，以湯淋之，貴在熱徹。又繰絲湯，無毒，主蛔蟲。熱取一盞服之，此煮繭汁，爲其殺蟲故也。又煑猪湯，無毒，主産後血刺心痛欲死，取一盞温服之。新補。見《抱朴子》、陳藏器。

《衍義》曰：熱湯，助陽氣，行經絡。患風冷氣痹人，多以湯漬脚至膝上，厚覆使汗出周身。然别有藥，亦終假湯氣而行也。四時暴泄利，四肢冷，臍腹疼，深湯中坐，浸至腹上，頻頻作，生陽佐藥，無速於此。虚寒人始坐湯中必戰，仍常令人伺守之。

圖經衍義本草卷之五

❶下：原脱，據晦明軒本補。
❷遷：晦明軒本作「迂」。
❸上：晦明軒本作「土」。
❹上：晦明軒本作「土」。
❺葉：原作「藥」，據晦明軒本改。
❻放：原作「於」，據晦明軒本改。
❼轉：晦明軒本作「傳」。
❽和：原作「秘」，據晦明軒本改。
❾謹：晦明軒本作「慎」。
❿蟲：晦明軒本作「虱」。
⓫是：晦明軒本作「見」。
⓬大：原作「火」，據晦明軒本改。
⓭服之：此下原有「其坑常封鎖，坑中有濁緑水，先絞水盡，然後下鑿取。生砒謂之砒黄，其色如牛肉，或有淡白青、黄堊。注云：言有雜色之堊也。然則赭以西土者爲貴，堊有五色，入藥惟白者取」八十四字，乃《圖經》文錯簡於此，據晦明軒本删移。
⓮長：晦明軒本作「多」。
⓯謹：晦明軒本作「慎」。
⓰胎：晦明軒本作「鍛」。
⓱其坑：此下四十六字原錯簡在《别説》文内，據晦明軒本移正。
⓲經：原脱，據晦明軒本補。
⓳少：晦明軒本「少」下有「許」字。
⓴即：晦明軒本作「却」。
㉑臍：原作「劑」，據晦明軒本改。
㉒生：晦明軒本作「末」。
㉓惟：原作「帷」，據晦明軒本改。
㉔楊：晦明軒本作「陽」。
㉕錯：晦明軒本作「醋」。
㉖實：晦明軒本作「寶」。
㉗水：晦明軒本無「水」字。
㉘赤：晦明軒本作「青」。
㉙染：晦明軒本作「紫」。
㉚下：晦明軒本作「丁」。
㉛山：原脱，據晦明軒本補。
㉜赤土也：此下八十四字原錯簡在「《唐本》注」中，據晦明軒本移正。
㉝襲：晦明軒本作「聾」。
㉞取：晦明軒本作「耳」。
㉟久：原作「九」，據晦明軒本改。
㊱者：此下原有「赤土也。今人以朱塗牛角，云以辟惡。又云：大次之山，其陽多堊。又《北山經》天池之山，其中多黄堊。又《中山經》襲之山，其中有大谷，多白、黑、青、黄堊。注云：言有雜色之堊也。然則赭以西土者爲貴，堊有五色，入藥惟白者取」八十四字，乃《圖經》文錯簡於此，據晦明軒本删移。
㊲味温：晦明軒本「味」作「末」，「温」字屬下讀。
㊳强：原作「薑」，據晦明軒本改。
㊴一十：晦明軒本作「二七」。
㊵拌：原作「伴」，據晦明軒本改。
㊶二：晦明軒本作「一」。
㊷毒：原脱，據晦明軒本補。
㊸堅：原作「緊」，據晦明軒本改。
㊹種：晦明軒本作「重」。
㊺籍：晦明軒本作「藉」。

圖經衍義本草卷之六

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

玉石部下品

白垔



白垔　味苦、辛，温，無毒。主女子寒熱，癥瘕，月閉，積聚，陰腫痛，漏下，無子，泄痢。不可久服，傷五臟，令人羸瘦。一名白善。生邯鄲山谷。採無時。

《圖經》曰：文具代赭條下。

《藥性論》云：白垔，使，味甘，平。主女子血結，月候不通，能澀腸止痢，温暖。

陶隱居云：此即今畫用者，甚多而賤，俗方亦稀，《仙經》不須。

《日華子》云：白善，味甘。治瀉痢，痔瘻，泄精，女子宫冷，男子水臟冷，鼻洪，吐血。名白垔，入藥燒用。

雷公云：凡使，勿用色青并底白者，先單搗令細，三度篩過了，又入鉢中研之。然後將鹽湯飛過，浪乾。每修事白垔一兩，白鹽一分，投於清❶水中，用銅器物内，沸十餘沸了，然後用此沸了水飛過白垔，免結澀人腸也。

禹錫云：按《唐本》云：胡居士言，始興小桂縣晉陽鄉有白善。

青琅玕



青琅玕　味辛，平，無毒。主身癢，火瘡，癰傷，白禿，疥瘙，死肌，浸淫在皮膚中。煮煉服之，起陰氣，可化爲丹。一名石珠，一名青珠。生蜀郡平澤。採無時。殺錫毒，得水銀良，畏鷄骨。

《圖經》曰：青琅玕，生蜀郡平澤。黄環也。族爲乖。琅玕五色，具❷以青者真經》中大丹名也。此石今亦無用，惟

以療手足逆臚。化丹之事，未的見其術。

《唐本》注云：琅玕乃有數種色，是琉璃之類，火齊寶也。且琅玕五色，具以青者入藥爲勝。今出嵩州以西烏白蠻中及于闐國也。

《日華子》云：玻璃，冷，無毒。安心，止驚悸，明目，摩翳障。

禹錫云：按陳藏器云：琉璃，主身熱目赤，以水浸令冷熨之。《韻集》曰：火齊珠也。《南州異物志》云：琉璃本是石，以自然灰理之可爲器，硨磲、碼碯并玉石類，是西國重寶。《佛經》云：七寶者，謂金、銀、琉璃、硨磲、碼碯、玻璃、真珠是也。或云珊瑚、琥珀。今碼碯碗上刻鏤爲奇工者，皆以自然灰又昆吾刀治之，自然灰，今時以生❸皮膠作假者，非也。

《衍義》曰：青琅玕，《書》曰：三危既宅。三危，西裔之山也，厥貢推❹球琳琅玕。孔穎達以謂琅玕石似玉。《新書》亦謂三苗、西戎。《西域記》云：天竺國山❺出此物。陶隱居謂爲本❻，名大丹名。既是大丹名，則《本經》豈可更言煮煉服之。又曰：可化爲丹。陶不合遠引，非此琅玕也。

自然銅



自然銅　味辛，平，無毒。療折傷，散血止痛，破積聚。生邕州山岩中出銅處，於坑中及石間採得，方圓不定，其色青黃如銅，生邕州山岩中出銅處，今信州、火山軍皆有之。於銅坑中及石間採之，方圓不定，其色青黃如銅，不從礦煉，故號自然銅。今信州出一種，如亂銅絲狀，云在銅礦中，山氣熏蒸，自然流出，亦若生銀，如老翁鬚之類，入藥最好。火山軍出者，顆塊如銅，而堅重如石，醫家謂之鉛石，用之力薄。採無時。今南方醫者說，自然銅有兩三體：一體大如麻黍，或多方解，纍纍相綴，至如斗大者，色煌煌明爛如黃金、砢石，最上；一體成塊，大小不定，亦光明而赤；一體如薑、鐵矢之類。又云：今市人多以鉛石爲自然銅，燒之皆成青焰如硫黃者是也。此亦有二三種：一種有殼如餘糧，擊破其中光明如鑒，色黃類砢石也；一種青黃而有墻壁，或文如束針；一種碎理如團砂者，皆光明如銅，色多青白而赤少者，燒之皆成烟焰，頃刻都盡。今藥家多誤以此爲自然銅，市中所貨往往是此。自然銅用多須鍛，此乃畏火，不必形色，只此可辨也。

雷公云：石髓鉛即自然銅也。凡使，勿用方金牙，其方金牙真似石髓

鉛，若誤餌，吐煞人。其石髓鉛，色似乾銀泥，味微甘。如採得，先捶碎，同甘草湯煮一伏時，至明漉出，攤令乾，入臼中搗了，重篩過，以醋浸一宿，至明，用六一泥泥瓷合子，約盛得二升已來，於文武火中養三日夜，才乾便用蓋蓋了，泥用火鍛兩伏時，去土抉蓋，研如粉用。若修事五兩，以醋兩鎰爲度。

禹錫云：按《日華子》云：自然銅，有人飼折翅銅，凉。排膿消瘀血，續筋骨，治産後血邪，安心，止驚悸，以酒磨服。

《衍義》曰：自然銅，有人飼折翅雁，後遂飛去。今人打撲損，研極細，水飛過，同當歸、没藥各半錢，以酒調，頻服，仍以手摩痛處。



金牙

味鹹，無毒。主鬼疰，毒蠱，諸疰。生蜀郡，如金色者良。

《圖經》曰：金牙，生蜀郡，今雍州亦有之。《本經》以如金色者良，而此物出於溪谷，在蜀漢江岸石間打出者，内即金色，岸摧入水，年久者多黑。葛洪治風毒厥，有大小金牙酒，但浸其汁而飲之。古方亦有燒淬去毒入藥者。孫思邈治風毒及鬼疰，南方瘴氣，傳尸等，各有大小金牙散之類是也。

陶隱居云：今出蜀漢，似粗金，大小如棋子而方。又有銅牙亦相似，但外色黑，内色小淺，不入藥。金牙惟合酒、散。

唐本❼注：打出者，内即金色，岸摧入水，久者皆黑。近南山溪谷、茂州、維❽州者皆勝。

《日華子》云：味甘，平。治一切冷風氣，暖腰膝，補水臟，驚悸，小兒驚癇。入藥并燒淬去粗汁用。

禹錫云：謹按《藥性論》云：金牙石，君。治一切風，筋骨攣急，腰脚不遂。燒浸服之良。

《衍義》曰：金牙，今方家絶不用。以此故，商客無利不販賣，醫者由是委而不用，兼所出惟蜀郡有之，蓋亦不度也。餘如《經》。





金星石

寒，無毒。主脾肺壅毒，及主肺損吐血、嗽血，下熱涎，解衆毒。今多出濠州。又有銀星石，主療與金星石大體相似。

《圖經》曰：金星石，生并州、濠州。寒，無毒。主脾、肺壅毒及肺損出血，嗽血，下熱涎，解衆毒。又有一種銀星石，體性亦相似，採無時。

《衍義》曰：金星石、銀星石，治大風疾。別有法，須燒用。金星石於蒼石内，外有金色麩片，銀星石有銀色麩片。又一種深青色，堅潤中有金色如麩片，不入藥，玉人碾爲器，或婦人首飾。餘如《經》。

礞石　治食積不消，留滯在臟腑，宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦，婦人積年食癥，攻刺心腹。得硇砂、巴豆、大黄、荆三棱等良。可作丸服用之，細研爲粉。一名青礞石。新定。

薑石　味鹹，寒，無毒。主熱豌豆瘡，丁毒等腫。生土石間，狀如薑，有五種色，白者最良，所在有之，以爛不疹者好，齊州歷城東者佳。

《外臺秘要》：《救急》治乳癰腫如碗大，痛甚。取白薑石搗末一二升，用鷄子白和如錫傅腫上，乾易之，此方頻試驗。如雞子慮罪，取榆白皮和搗傅。立差。

《衍義》曰：薑石，所在皆有，須不見日色，旋取微白者佳。治丁[9]腫殊效。



井泉石



薑石

井泉石　大寒，無毒。主諸熱，治眼腫痛，解心臟熱結，消去腫毒及療小兒熱疳，眼瞼腫。得決明、菊花，療小兒眼疳生翳膜，甚良。亦治熱嗽。近道處處有之，以出饒陽郡者爲勝，生田野間地中，穿地深丈餘得之。形如土色，圓方、長短、大小不等，内實而外則重重相疊，採無時。用之當細研爲粉。不爾使人淋。又有一種如薑石，時人多指以爲井泉石者，非是。

《圖經》曰：井泉石，生深州城西二十里劇家村地泉内，深一丈許。其石如土色，圓方、長短、大小不等，内實外圓，作層重疊相交。其性大寒，無毒。解心臟熱結，消去腫毒及療小兒熱疳。不拘時月採。

花乳石　主金瘡止血，又療産婦血暈惡血。出陝華諸郡。色正黄，形之大小、方圓無定。欲服者，當以大火燒之。金瘡止血，正爾刮末傅之即合，仍不作膿潰。或名花蕊石。採無時。

花乳石



《圖經》曰：花蕊石，出陝州閿鄉縣。體至堅重，色如硫黃，形塊有極大者，人用琢器。古方未有用者，近世以合硫黃同鍛，研末傅金瘡，其效如神。又人倉卒中金刃，不及鍛合，但刮石上取細末傅之。

《別説》云：《圖經》玉石中品有花蕊石一種，主治與此同，是一物。

《衍義》曰：花乳石，其色如硫黃，《本經》第五卷中已著。今出陝、華間，於黃石中，間有淡白點，以此得花之名。今惠民局花乳石散者皆是此物。陝人又能鐫爲器。《圖經》第二卷中，易其名爲花蕊石，是却取其色黃也。更無花乳之名，慮歲久爲世所惑，故書之。

不灰木



不灰木　大寒。主熱痱瘡，和棗葉、石灰爲粉，傅身。出上黨。如爛木，燒之不然，石類也。

《圖經》曰：不灰木，出上黨，今澤、潞山中皆有之，蓋石類也。其色青白如爛木，燒之不然，以此得名。或云滑石之根也，出滑石處皆有，亦名無灰木。採無時。今處州山中出一種松石，如松榦而實石也，或云松久化爲石，人家多取以飾山亭，及琢爲枕。雖不入藥，然與不灰木相類，故附之。

陳藏器云：不灰木要燒成灰，即斫破，以牛乳煮了便燒，黃牛糞燒之成灰。中和二年，於李宗處見傳。

《丹房鏡源》云：不灰木煮汞。

禹錫云：大寒，無毒。

蓬砂



蓬砂　味苦、辛，暖，無毒。消痰止嗽，破癥結，喉痹。及焊金銀用。或名鵬砂。新補。見《日華子》。

《圖經》曰：文具硇砂條下。

《衍義》曰：蓬砂，含化咽津，治喉中腫痛，膈上痰熱，初覺便治，不能成喉痹，亦緩取效可也。南番者，色重褐，其味和，其效速；西戎者，其色白，其味焦，其功緩，亦不堪作焊。

鉛霜　冷，無毒。消痰，止驚悸，解酒毒，療胸膈煩悶，中風痰實，止渴。新補。見《日華子》。

《圖經》曰：文具鉛條下。

《十全博救方》治鼻衄方。鉛白霜爲末，取新汲水調二⓫字。

《簡要濟衆方》：治室女月露滯澀，心煩恍惚。鉛白霜細研爲末，每服一錢，温地黄汁一合調下。生乾地黄煎湯調下亦得。

《衍義》曰：鉛霜，《圖經》已著其法，治上膈熱涎塞。塗木瓜失酸味，金剋木也。

蛇黄　主心痛，疰忤，石淋，産難，小兒驚癇，以水煮研服汁。出嶺南，蛇腹中得之，圓重如錫，黄黑青雜色。









《圖經》曰：文具鉛條下。

《本經》云：是蛇腹中得之，圓重如錫，黄黑青雜色。注云多赤色，有吐出者，野人或得之。今醫家用者，大如彈丸，堅如石，外黄内黑色，二月採。云是蛇冬蟄時所含土，到春發蟄，吐之而去。與舊説不同，未知孰是？

今注：蛇黄多赤色，有吐出者，野人或得之。唐本先附。

禹錫云：謹按《日華子》云：冷，無毒。鎮心。如入藥，燒赤三四次，醋淬，飛研用之。

古文錢　平。治翳障，明目，療風赤眼，鹽滷浸用。婦人横逆産，心腹痛，月隔，五淋，燒以醋淬用。新補。見《日華子》。

《圖經》曰：文具鉛條下。

陳藏器云：大錢，錢⓬注中陶云不入用。按錢青者是大錢，煮汁服，主五淋。磨入目，主盲瘴膚赤。和薏苡根煮服，主心腹痛。煮比輪錢以新汲水投服之，又主時氣。含青錢，又主口内熱瘡。以二十文燒令赤，投酒中服之，立差。又主婦人横産。

《衍義》曰：古文錢，古銅焦赤有毒，治目中瘴瘀，腐蝕壞肉。婦人横逆産，五淋多用。非特爲有錫也，此説非是。今但取景王時大泉五十及寶貨，秦半兩，漢莢錢、大小五銖，吴大泉五百、大泉當千，宋四銖、二銖，及梁四柱，北齊常平五銖。爾後，其品尚多，如此之類方可用。少時常自患暴赤目腫痛，數日不能開。客有教以生薑一塊，洗净去皮，以古青銅錢刮取薑汁，就錢棱上點。初甚苦熱，泪蔑面，然終

無損。後有患者，教如此點，往往疑惑。信士點之，無不獲驗，一點遂愈，更不可再作。有瘡者不可用。

冬灰　味辛，微温。主黑子，去疣音尤息肉，疽蝕疥瘙。一名藜灰。生方谷川澤。

陶隱居云：此即今浣衣黄灰爾，燒諸蒿、藜，積聚煉作之，性亦烈，又荻灰尤烈。欲銷黑痣、疣贅，取此三種灰和水蒸以點之即去，不可廣用，爛人皮肉。

《衍義》曰：冬灰，諸家止解灰而不解冬，亦其闕也。諸灰一烘而成，惟冬灰，則經三四月方徹爐。灰既曉夕燒灼，其力得不全燥烈乎？而又體益重。今一蘗而成者體輕，蓋火力劣，故不及冬灰耳。

銅礦石　味酸，寒，有小毒。主丁腫惡瘡，驢馬脊瘡，臭腋，石上水磨取汁塗之。其丁腫，末之傅瘡上，良。今按《別本》注云：狀如薑石而有銅星，熔取銅也。唐本先附。

銅弩牙　主婦人産難，血閉，月水不通，陰陽隔塞。唐本先附。

陶隱居云：即今人所用射者爾，取燒赤内酒中，飲汁，得古者彌勝。

禹錫云：按《日華子》云：平，無毒。

梁上塵　主腹痛，噎，中惡，鼻衄，小兒軟瘡。唐本先附。

《日華子》云：平，無毒。

禹錫云：按《藥對》云：梁上塵，微寒。

土陰蘗　味鹹，無毒。主婦人陰蝕，大熱，乾痂。生高山崖上之陰，色白如脂。採無時。

陶隱居云：此猶似鍾乳、孔公蘗之類，故亦有蘗名，但在崖上爾，今時有之，但不復採用。

車脂　主卒心痛，中惡氣，以温酒調及熱攪服之。又主婦人妒乳，乳癰，取脂熬令熱塗，亦和熱酒服。今附。

禹錫云：謹按陳藏器云：車脂，味辛，無毒。主鬼氣，温酒烊令熱服之。

握雪礜石　味甘，温，無毒。主痼冷，積聚，輕身延年，多食令人熱。

《唐本》注云：出徐州西宋里山。入土丈餘於爛土石間，黄白色，細軟如麵。一名化公石，一名石腦。煉服別有法。唐本先附。

釭中膏音工　主逆産，以膏畫兒脚底即正。又主中風，發狂。取膏如鷄子大，以熱醋攪令消，服之。今附。

《千金方》：治妊娠腹中痛。燒車釭脂末，内酒中服。亦治咳嗽。

煆竈灰　主癥瘕堅積，去邪惡氣。陶隱居云：即今鍛鐵竈中灰爾，兼得鐵力。以治暴癥，大有效也。

陳藏器云：竈突後黑土，無毒。主産後胎衣不下。末服三指撮，暖水及酒服之。天未明時取驗。

淋石　無毒，主石淋。此是患石淋人或於溺中出者，如小石，水磨服之，當得碎石隨溺出。今附。

禹錫云：《日華子》云：淋石，暖。

方解石　味苦、辛，大寒，無毒。主胸中留熱，結氣，黄疸，通血脉，去蠱毒。一名黄石。生方山。採無時。惡巴豆。

陶隱居云：按《本經》長石一名方石，療體亦相似，疑是此也。

《唐本》注云：此石性冷，療熱不減石膏也。

蒼石　味甘，平，有毒。主寒熱，下氣，癭蝕，殺禽獸。生西域。採無時。

陶隱居云：俗中不復用，莫識其狀。

石蠶　無毒。主金瘡，止血，生肌，破石淋，血結。摩服之，當下碎石。今附。

禹錫云：謹按《藥訣》云：石蠶，生海岸石傍，狀如蠶，其實石也。

石腦油　主小兒驚風，化涎，可和諸藥作丸服。宜以瓷器貯之，不可近金銀器，雖至完密，直爾透之。道家多用，俗方亦不甚須。新定。

白瓷瓦屑

平，無毒，主婦人帶下白崩，止嘔吐，破血，止血。水摩，塗瘡瘕瘢。定州者良，餘皆不如。唐本先附。

烏古瓦

寒，無毒。以水煮及漬汁飲，止消渴。取屋上年深者良。唐本先附。

禹錫云：按《藥性論》云：烏古瓦，亦可單用。煎湯服，解人中大熱。

玉井水

味甘，平，無毒。久服神仙，令人體潤，毛髮不白。出諸有玉處，山谷水泉皆有。猶潤於草木，何況於人乎。夫人有髮毛，如山之草木，故山有玉而草木潤，身有玉而毛髮黑。《異類》云：崑崙山有一石柱，柱上露盤，盤上有玉水溜下，土人得一合服之，與天地同年。又太華山有玉水，人得服之長生。玉既重寶，水又靈長，故能延生之望。今人近山多壽者，豈非玉石之津乎？故引水爲玉證。

秋露水

味甘，平，無毒。在百草頭者愈百疾，止消渴，令人身輕不饑，

肌肉悅澤。亦有化雲母成粉，朝露未晞時拂取之。柏葉上露，主明目。百花上露，令人好顏色。露即一般所在有異，主療不同。

甘露水　味甘美，無毒。食之潤五臟，長年不饑神仙，緣是感應天降祐兆人也。

梅雨水　洗瘡疥，滅瘢痕。入醬令易熱⑮，沾衣便腐，浣垢如灰汁，有異他水。江淮已南，地氣卑濕，五月上旬連下旬尤甚。月令土潤溽暑是五月中氣，過此節已後，皆須曝書。漢·崔寔七夕曝書，阮咸焉能免俗，蓋此謂也。梅沾衣，皆以梅葉湯洗之脫也，餘并不脫。

醴泉　味甘，平，無毒。主心腹痛，疰忤鬼氣邪穢之屬，并就泉空腹飲之。時代升平，則醴泉涌出，讀古史大有此水，亦以新汲者佳。止熱消渴及反胃，腹痛，霍亂爲上。

甘露蜜　味甘，平，無毒。主胸膈諸熱，明目止渴。生巴西絶域中，如餳也。

漢武帝立金莖，作仙人掌承露盤，取雲表之露，服食以求仙。

水花　平，無毒。主渴。遠行山無水處，和苦栝蔞爲丸，朝預服二十丸，永無渴。亦入殺野獸藥，和狼毒、皂莢、礬石爲散，揩安獸食餘肉中，當令不渴，渴恐飲水藥解，名水沫。江海中間，久沫成乳石，故如石水沫，猶軟者是也。

生熟湯　味鹹，無毒。熬鹽投中飲之，吐宿食毒惡物之氣，臚脹欲爲霍亂者，覺腹内不穩，即進一二升，令吐得盡，便愈。亦主痰瘧，皆須吐出痰及宿食，調中消食。又人大醉及食瓜果過度，以生熟湯浸身，湯皆爲酒及菰味。《博物志》云：浸至腰，食菰可五十枚，至脛頸則無限。

屋漏水　主洗犬咬瘡，以水澆屋檐承取用之，以水滴檐下令土濕，取土以傅犬咬處瘡上，中大有毒，能消瘡毒惡疾。

圖經衍義本草卷之六

---

❶清：晦明軒本作『斗』。

❷具：晦明軒本作『其』。下《唐本》注中仿此。

❸生：晦明軒本作『牛』。

❹推：晦明軒本作『惟』。

❺山：晦明軒本作『正』。

❻本：晦明軒本作『木』。

❼本：原脱，據晦明軒本補。

❽維：晦明軒本作『雍』。

❾丁：原作『下』，據晦明軒本改。

❿蕊：晦明軒本作『乳』。

⓫二：晦明軒本作『一』。

⓬錢：晦明軒本作『銀』。

⓭主：原作『生』，據晦明軒本改。

⓮不：原脱，據晦明軒本補。

⓯熱：晦明軒本作『熟』。

圖經衍義本草卷之七

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部上品之上

黃精





















黃精　味甘，平，無毒。主補中益

氣，除風濕，安五臟。久服輕身延年，不饑。一名重樓，一名菟竹，一名鷄格，一名救窮，一名鹿竹。一名萎蕤，一名仙人餘糧，一名垂珠，一名馬箭，一名白及。生山谷。今南北皆有之，以嵩山、茅山者爲佳。二月三月採根，陰乾。

《圖經》曰：黄精，舊不載所出州郡，二月採根。蒸過，暴乾用。今通八月採，山中人九蒸九暴，作果賣，甚甜美而黄黑色。《博物志》云：天老謂黄帝曰：太陽之草名黄精，餌之可以長生。

陶隱居云：今處處有。二月始生，葉狀似竹，根似萎蕤。根如鬼臼。俗方無用，《仙經》所貴。根、葉、華、實皆可餌服，酒散隨宜，具在斷穀方中。黄精葉乃與鈎吻相似，惟莖不紫、花不黄爲異，而人多惑。

《唐本》注云：黄精肥地生者，即大如拳；薄地生者，猶如拇指。

《日華子》云：補五勞七傷，助筋骨，止饑，耐寒暑，益脾胃，潤心肺。單服九蒸九暴，食之駐顔。

雷公云：凡使，勿用鈎吻，真似黄精，只是葉有毛鈎子二個，是别認處，若誤服害人。黄精葉似竹葉。凡採得，以溪水洗净後蒸，從巳至子，刀薄切，曝乾用。

《抱朴子》云：服其花，勝其實，其實勝其根。但花難得。服黄精十年，乃可大得其益耳。斷穀不及术，术餌令人肥健，可以負重涉險，但不及黄精甘美易食。凶年可以與老小休❶糧。

《食療》云：餌黄精，能老不饑。其法：可取瓮子去底，釜上安置令得所，盛黄精令滿。密蓋蒸之，令氣溜，即曝之。第二遍蒸之亦如此。九蒸九曝。凡生時有一石，熟有三四斗。蒸之若生，則刺人咽喉；暴使乾，不爾朽壞。其生者，若初服，只可一寸半，漸漸增之。十日不食，能長服之，止三尺五寸❷。服三百日後，盡見鬼神，餌必升天。根、葉、花、實皆可食之。但相對者是，不對者名扁❸精。

《稽神録》：臨川有士人虐所使婢，婢乃逃入山中，久之見野草枝葉可愛，即拔取根食之甚美，自是常食，久而遂不饑，輕健。夜息大樹下，聞草中動，以爲虎，懼而上樹避之。及曉下平地，其身欻然凌空而去，或自一峰之頂，若飛鳥焉。數歲，其家人採薪見之，告其主，使捕之不得，一日遇絶壁下，以網三面圍之，俄而騰上山頂。其主異之，或曰此婢宿❹有仙骨，不過靈藥服食。遂以酒饌五味香美，置往來之路，觀其食否，果來食，食訖不能遠去，擒之，具述其故。指所食之草，即黄精也。

《道藏神仙芝草經》：黄精，寬中益氣，五臟調良，肌肉充盛，骨體堅强，其力倍，多年不老，顔色鮮明，髮白更黑，齒落更生。

《博物志》：昔黄帝問天老曰：天地所生，豈有食之令人不死乎？天老曰：太陽之草，名曰黄精，餌之可以長生；太陰之草，名曰鈎吻，不可食，入口立死。人信鈎吻之殺人，不信黄精之益壽，不亦甚乎？

《聖惠方》：神仙，服黃精成地仙，根莖不限多少，細剉陰乾搗末，每日淨水調服，服一年變老爲少。



菖蒲

菖蒲　味辛，温，無毒。主風寒濕痹，咳逆上氣，開心孔，補五臟，通九竅，明耳目，出音聲，主耳聾，癰瘡，温腸胃，止小便利，四肢濕痹，不得屈伸，小兒温瘧，身積熱不解，可作浴湯。久服輕身，聰耳目，不忘，不迷惑，延年，益心智，高志不老。一名昌陽。生上洛池澤及蜀郡嚴道。一寸九節者良，露根不可用。一名堯韭，今處處有之，生石磧上，五月、十二月採根，陰乾。秦皮、秦艽爲之使，惡地膽、麻黄。

《圖經》曰：菖蒲，其根盤屈有節，狀如馬齲❺大，一根傍引三四根，傍根節尤密，一寸九節者佳，亦有十二節者。蜀人用治心腹冷氣搦痛者，取一二寸，熱湯或酒送亦效。

《別説》云：其池澤所生，肥大節疏粗慢，恐不可入藥，唯可作果盤，蓋氣味不烈而和淡爾。

《千金方》：日月未足而欲産者。不堪服食。此藥甚去貴賤，都不言之。真菖蒲葉有脊，一如劍刃，四月、五月亦小薑華也。東澗溪側又有名溪蓀者，根形氣色極似石上菖蒲，而葉正如蒲，無脊。俗人多呼此爲石上菖蒲者，謬矣。此止主咳逆，亦斷蚤虱爾，不入服。

《日華子》云：除風下氣，丈夫水臟、女人血海冷敗，多忘長智，除煩悶，止心腹痛，霍亂轉筋，治客風瘡疥，澼小便，殺腹臟蟲及蚤虱。耳痛作末炒，承熱裹署❻甚驗。忌飴糖、羊肉。

《抱朴子》云：韓檗❼服之十三年，身生毛，日誦書萬言，冬❽不寒。又須得石上，寸九節，紫花尤善。

《漢武帝内傳》：武帝上嵩山，見仙，長二丈。問❾曰：吾九嶷山人也，聞中嶽有石上菖蒲，一寸九節，食之長生，故來採之。忽然不見。

《肘後方》：扁鵲云：中惡與卒

死、鬼擊亦相類，爲治皆參取而用之。已死，搗菖蒲生根，絞汁灌之，立瘥。又方：耳聾。菖蒲根一寸，巴豆一粒去心，二物合搗，分作七丸。綿裹塞耳，日著一丸，效。又方：卒胎動不安，或腰痛胎轉搶心，下血不止。菖蒲根汁三升服之。

《衍義》曰：菖蒲，世又謂之蘭蓀，生水次，失水則枯，根節密者氣味足。有人患遍身生熱毒瘡，痛而不癢，手足尤甚，然至頸而止⑩，黏著衣被，曉夕不得睡，痛不可任。有下俚教以菖蒲三斗，剉，日乾之，春羅爲末，布蓆上，使病瘡人恣卧其間，仍以被衣覆之。既不黏著衣被，又復得睡，不五七日至⑪，其瘡如失。後自患此瘡，亦如此用，應手神驗。其石菖蒲根絡石而生者，節乃密，入藥須此等。

菊花　味苦、甘，平，無毒。主風頭頭眩、腫痛，目欲脫，泪出，皮膚死肌，惡風，濕痹，療腰痛去來陶陶，除胸中煩熱，安腸胃，利五脉，調四肢。久服利血氣，輕身，耐老，延年。一名節花，一名日精，一名女節，一名女花，一名女莖，一名更生，一名周盈，一名傅延年，一名陰成。生雍州川澤及田野。正月採根，三月採葉，五月採莖，九月採花，十一月採實，皆陰乾。术、枸根、桑根白皮爲之使。



菊花

《圖經》曰：菊花，紫莖而氣香，葉厚至柔嫩可食者，其爲真。主丈夫、婦人久患頭風眩悶，頭髮乾落，胸中痰結，每風發即頭旋，眼昏暗，不覺欲倒者，是其候也。

《藥性論》云：甘菊花，使。能治熱頭風旋倒地，腦骨疼痛，身上諸風令消散。

陶隱居云：菊有兩種：一種莖紫，氣香而味甘，葉可作羹食者，爲真；一種青莖而大，作蒿苦⑫氣，味苦不堪食者名苦薏，非真。其花正相似，唯以甘、苦別之爾。

《日華子》云：治四肢遊風，利血脉，心煩，胸膈壅悶，并癰毒，頭痛，作枕明目，葉亦明目，生熟可食。

楊損之云：甘者入藥，苦者不任。

《食療》云：甘菊可作羹，主頭風，目眩，泪出，去煩熱，利五臟。

《肘後方》：犯丁腫垂死。菊葉一握，搗絞汁一升，入口即活，此神驗。

《衍義》曰：菊花，近世有二十餘

種，惟單葉花小而黃綠，葉色深小而薄，應候而開者是也。《月令》所謂菊有黃花者也。又鄧州白菊，單葉者亦入藥，餘依⑬經不用。專治頭目風熱，今多收之作枕。



人參

人參　味甘，微寒、微温，無毒。主補五臟，安精神，定魂魄，止驚悸，除邪氣，明目，開心，益智，療腸胃中冷，心腹鼓痛，胸脅逆滿，霍亂吐逆，調中，止消渴，通血脉，破堅積，令人不忘。一名人銜，一名鬼蓋，一名人微，一名土精，一名血參。如人形者有神。生上黨山谷及遼東。高麗、潞州、澤、易、檀、箕、幽、嬀等州并出，蓋以其山相連接，故皆有之。次出海東新羅國，又出渤海，今河東諸州及泰州皆有之。又河北閩中來者，俱不及上黨者佳。二月、四月、八月上旬採根，竹刀刮，暴乾，無令見風。茯苓爲之使，惡溲疏，反藜蘆。又云：惡鹵鹹。

《圖經》曰：試上黨人參者，當使二人同走，一與人參含之，一不與人參，俱走三五里許，其不含人參者必大喘，含者氣息自如，此乃人參之力也。李絳《兵部手集方》療反胃，嘔吐無常，粥飲入口即吐，困弱無力，垂死者，以上黨人參三大兩擘破，水一大升，煮取四合，熱頓服。唐名醫治心腹病。《藥性論》云：人參，主五臟氣不足，五勞七傷，虛損痰⑭弱，吐逆不下食，止霍亂煩悶，嘔噦，補五臟六腑，保中守神。

陶隱居云：上黨郡在冀州西南。今魏國所獻即是，形長而黃，狀如防風，多潤實而甘。俗用不入服乃重百濟者，形細而堅白，氣味薄於上黨。次用高麗，高麗即是遼東。形大而虛軟，不及百濟。百濟今以屬高麗，高麗所獻，兼有兩種，止應擇取之爾。實用并不及上黨者。高麗人讚曰：三椏五葉，背陽向陰，欲來求我，椵樹相尋。椵音賈。今注：高⑮麗、百濟者。太行山所出，謂之紫團參。

《日華子》云：殺金石藥毒，調中治氣，消食開胃，食之無忌。

《外臺秘要》：治蜂、蝎螫人方。人參嚼以封之。

《千金方》：開心，肥健。大人參一分，猪肘⑯十分，酒拌，服百日，滿體髓溢，日誦千言，肌膚潤，去熱風痰。

《經驗後方》：治大人、小兒不進

乳食，和氣去痰。人參四兩，半夏一兩，生薑汁熬一宿，曝乾爲末，麵糊丸，如緑豆大。每服十丸，食後生薑湯吞下。又方：治狗咬破傷風。以人參不計多少，桑柴火燒令烟絶，用盞子合研爲末，糝在瘡上，立效。

《勝金方》：治吐血。以人參一味爲末，鷄子清投新汲水調下一錢服之。又治咳嗽上氣，喘急。

《衍義》曰：人參，今之用者，皆河北榷場博易到，盡是高麗所出，率虚軟味薄，不若潞州上黨者味厚體實，用之有據。

天門冬　味苦、甘，平、大寒，無毒。主諸暴風濕偏痹，强骨髓，殺三蟲，去伏尸，保定肺氣，去寒熱，養肌膚，益氣力，利小便，冷而能補，久服輕身，益氣延年，不饑。一名顛勒。生奉高山谷。二月、三月、七月、八月採根，暴乾。垣衣、地黄爲之使，畏曾青。





天門冬

《圖經》曰：今處處有之。春生藤蔓，大如釵股，高至丈餘，葉如茴香，極尖細而疏滑，有逆刺，亦有澀而無刺者。其葉如絲杉而細散，皆名天門冬。秋結黑子，在夏生白花，亦有黄色者。秋結黑子，在其根枝傍。入伏後無花，暗結子。其根白或黄紫色，大如手指，長二三寸，大者爲勝，頗與百部根相類。

《藥性論》云：主肺氣咳逆，喘息促急，除熱，通腎氣。療肺痿，生癰吐膿，治濕疥，止消渴，去熱中風，宜久服。煮食之，令人肌體滑澤，除身中一切惡氣，不潔之疾。

《唐本》注云：此有二種，苗有刺而澀者，無刺而滑者，俱是門冬。俗云顛刺、浣草者，形貌詺之。雖作數名，終是一物。一根浣垢俱净，門冬、浣草，互名之也。詺，音暝。

《日華子》云：貝母爲使。鎮心，潤五臟，益皮膚，悦顔色，補五勞七傷。治肺氣并嗽，消痰，風痹，熱毒遊風，煩悶吐血，去心用。

楊損之云：服天門冬，誤食鯉魚中毒，浮萍解之。

《抱朴子》云：或名地門冬，或名筵門冬，或名巔棘，或名淫羊食，或名管松。其生水側下地者，葉細似蘊而微黄，根長而味多苦氣臭者下。亦可服食，然喜令人下氣，爲益又遲也。服之百日，皆丁壯兼倍，快於术及黄精也。杜紫微服之，御八十妾，有男一百四十人[17]。

《食療》云：補虚勞，治肺勞，止

渴，去熱風。可去皮、心，入蜜煮之，食後服之。若曝乾，入蜜丸尤佳。

《外臺秘要》：治風癲引脊牽痛，發作則吐，耳如蟬鳴。天門冬去心、皮，曝乾搗篩，酒服方寸匕。

孫真人⑱《枕中記》：天門冬，釀酒服之，去癥瘕積聚，風痰癲狂，三蟲伏尸，除瘟痹，輕身益氣，令人不饑，百日還年却老。

《道書》云：欲不畏寒，取天門冬、茯苓等分爲末，服方寸匕，日再服。大寒時，單衣汗出。

《列仙傳》：赤頂子食天門冬，齒落更生，細髮復出。

《神仙傳》：甘始者，太原人，服天門冬門冬，在人間二百餘年。

《修真秘旨方》：神仙，服天門冬三十斤，細切，陰乾，搗末。每服三錢，酒調下，日五六服。二百日後怡泰，拘急者緩，羸劣者强；三百日身輕；三年走及奔馬。

《衍義》曰：天門冬、麥門冬之類，雖曰去心，不可浸出脂液。其不知者，乃以湯浸一二時，柔即柔矣，然氣味都盡。用之不效。治肺熱之功爲多，其味苦，但專泄而不專收，寒多人禁服。餘如二經。







甘草

甘草國老　味甘，平，無毒。主五臟六腑寒熱邪氣，堅筋骨，長肌肉，倍力，金瘡腫，解毒，温中下氣，煩滿短氣，傷臟咳嗽，止渴，通經脉，利血氣，解百藥毒。爲九土之精，安和七十二種石，一千二百種草。久服輕身延年。一名蜜甘，一名美草，一名蜜草，一名潞草。生河西川谷積沙山及上郡。二月、八月除日採根，暴乾十日成。术、乾漆、苦參爲之使，惡遠志、反大戟、芫花、甘遂、海藻四物。

《圖經》曰：有人中烏頭、巴豆毒⑲，甘草入腹即定。崔元亮《海上方》治發背秘法，李北海云此方神授，極奇秘。以甘草三大兩，生搗，別篩末，大麥麵九兩，於一大盤中相和攪令勻，取之⑳好酥少許，別捻入藥，令勻，百沸水漉如餅劑，方圓大於瘡一分，熱傅腫上，以油斤㉑及故紙隔令通風，冷則換之。已成膿水自出，未成腫便内消。

《藥性論》云：主腹中冷痛，治驚癎，除腹脹滿，補益五臟，制諸藥毒，養腎氣内傷，令人陰痿。主婦人血瀝，腰

痛，虛而多熱，加而用之。

陶隱居云：河西、上郡不復通市，今出蜀漢中，悉從汶山諸夷中來。赤皮斷理，看之堅實者，是抱罕草，最佳。抱罕，羌地名。亦有火炙乾者，理多虛疏。又有如鯉魚腸者，被刀破不復好。青州間亦有，不如。又有紫甘草，細而實，乏時可用。此草最爲衆藥之主，經方少不用者，猶如香中有沉香也。國老，即帝師之稱，雖非君，爲君所宗，是以能安和草石而解諸毒也。

《日華子》云：安魂定魄，補五勞七傷，一切虛損，驚悸，煩悶，健忘，通九竅，利百脉，益養精氣，壯筋骨，解冷熱，入藥炙用。

雷公云：凡使，甘草須去頭尾尖處，其頭尾吐人。

孫真人云：主一切傷寒。甘草如指長，炙，細剉，童子小便一升，煎取七合，以纏綿點兒口中，可㉔一合，空心服，日再服之。

《金匱玉函》云：治誤飲饌中毒者。未審中何毒，只急煎甘草、薺苨湯服之，入口便活。又方：治小兒中蠱欲死。甘草半兩剉，以水一盞，煎五分，去滓，作二服，當吐蠱出。

《傷寒類要》：治傷寒三二日咽痛者。與甘草二兩炙，水三升，煮取一升半，服五合，日三。又方：傷寒脉結代，心悸動方。甘草一尺，炙擘破，以淡漿水醮三度，又以慢火炙之，後用生薑去皮半兩，二味以漿水一升半，煎取八合，服之立效。

《梅師方》：治初得痢，冷熱赤白及霍亂。甘草一兩炙，豆蔻七個剉，以水三升，煎取一升，分服。

《衍義》曰：甘草，枝葉悉如槐，高五六尺，但葉端微尖而糙澀，似有白毛。實作角生，如相思角，作一本生，子如小扁豆，褐齒嚙不破。今出河東西界，入藥須微炙；不爾，亦微涼。生則味不佳。

乾地黃

味甘、苦，寒，無毒。主折跌絶筋，傷中，逐血痹，填骨髓，長肌肉。作湯除寒熱，積聚，除痹。主男子五勞七傷，女子傷中，胞漏，下血，破惡

生乾地黃





血，溺血，利大小腸，去胃中宿食，飽力斷絶，補五臟内傷不足，通血脉，益氣力，利耳目。生者尤良。

生地黃　大寒。

主婦人崩中血不止及産後血上薄心悶絶，傷身胎動下血，胎不落，墮墜蹉折，瘀血，留血，衄鼻，吐血，皆搗飲之。久服輕身不老。一名地髓，一名苄，一名芑。生咸陽川澤黃土地者佳。二月、八月採根，陰乾。得麥門冬、清酒良，惡貝母，畏蕪荑。

《圖經》曰：崔元亮《海上方》治一切心痛，無問新久，以生地黃一味，隨人所食多少，搗絞取汁，搜麵作餅飪，或冷淘食，良久當利，出蟲長一尺許，頭似壁宮，後不復患矣。昔有人患此病，三年不瘥，深以爲恨，臨終戒其家人，吾死後，當剖去病本，果得。以置於竹節中，每所食皆飼之，因食地黃餅飪，亦與之，隨即壞爛，由此得方。劉禹錫《傳信方》亦紀其事云：正元十年，通事舍人崔抗女患心痛垂氣絶，遂作地黃冷淘食之，便吐一物，可方一寸已來，如蝦蟆狀，無目、足，微似有口，蓋謂此物所食，自此遂愈，食冷淘不用著鹽。

《藥性論》云：乾地黃，君。能補虚損，温中下氣，通血脉。久服變白延年。治産後腹痛，上吐血不止。又云：生地黃一升，搗取汁，三度搗絞汁盡，或浸食，或煎湯，或酒飲，并炒[27]。生則寒，主齒痛，唾血，折傷。葉可以羹。

《外臺秘要》：張文仲治骨蒸方。生地黃一升，搗取汁，三度搗絞汁盡，分再服。若利即減之，以身體涼爲度。

《千金方》：治牙齒根欲動脱。生地黃細剉，綿裹着齒上咂之，漬齒根，

日三四，并咽汁，十日，大佳。

《肘後方》：治耳中常鳴。生地黃截塞耳，數易之，以瘥爲度。一云以紙裹微灰火中煨之用，良。

《百一方》：妊娠漏胎。生地黃汁一升，漬酒四合，煮三五沸服之，不止又服。又方：治猘犬咬人，搗地黃汁飲之并塗瘡口，百度止。

《梅師方》：治墮損筋骨，蹉跌骨碎破。搗生地黃熨熱，裹三日夜，數易。若血聚，以針決之。又方：治吐血神效方。生地黃汁一升二合，白膠香二兩，以瓷器盛入甑蒸，令膠消服。又方：治乳癰。搗生地黃汁傅之，熱即易之，無不見效也。

《孫兆方》：治鼻衄及膈上盛熱。乾地黃、龍腦、薄荷等分爲末，冷水調下。

《產寶方》：妊娠下血如月信，通恐胎乾㉘方。乾地黃、乾薑等分爲末，用酒調方寸匕。

《衍義》曰：地黃，葉如甘露子，花如脂麻花，但有細斑點，北人謂之牛奶子花。莖有微細短白毛。《經》只言乾、生二種，不言熟者。如血虛勞熱，產後虛熱，老人中虛燥熱，須地黃者，生與生乾，常慮太寒，如此之類，故後世改用熟者。



朮

味苦、甘，温，無毒。主風寒濕痹，死肌痙疸，止汗除熱，消食。主大風在身面，風眩頭痛，目淚出，消痰水，逐皮間風水結腫，除心下急滿及霍亂吐下不止，利腰臍間血，益津液，暖胃，消穀，嗜食。作煎餌，久服輕身、延年、不饑。一名山薊，一名山蘭，一名山連。生鄭山山谷、漢中、南鄭。二月、三月、八月、九月採根，曝乾。防風、地榆爲之使。

《圖經》曰：以嵩山、茅山者爲佳。春生苗，青色無椏。一名山薊，以其葉似薊也。莖作蒿蘇狀，青㉙色，長三二尺以來。夏開花，紫碧色，亦似刺薊花，或有黃白花者。入伏後結子，至秋而苗枯。今白朮生杭、越、舒、宣州高山崗上，葉葉相對，上有毛，方莖，莖端生花，淡紫碧紅數色，根作椏生。二月、三月、八月、九月採根，暴乾。以大塊紫花者爲勝。

《藥性論》云：白朮，君，忌桃、李、雀肉、菘菜、青魚。味甘、辛，無毒。能主大風痛痹，多年氣痢，心腹脹痛，破

消宿食，開胃，去痰涎，除寒熱，止下泄，主面光悦，治水腫脹滿，止嘔逆，腹内冷痛，及胃氣虚冷痢。

陶隱居云：今處處有，以蔣山、白山、茅山者勝。《仙經》云：亦能除惡氣，弭灾沴。丸散煎餌并有法。其苗又可作飲，甚香美，去水。术乃有兩種：白术，葉大有毛而作椏。東境术大而無氣烈，而不任用。今市人賣者，皆以米粉塗令白，非自然，用時宜刮去之。

《日華子》云：术，治一切風疾，五勞七傷，冷氣腹脹，補腰膝，消痰，治水氣，利小便，止反胃嘔逆及筋骨弱軟，痃癖氣塊，婦人冷癥瘕，温疾，山嵐瘴氣，除煩，長肌。用米泔浸一宿，入藥。

《抱朴子》云：术，一名山精，故《神農藥經》曰：必欲長生，常服山精。

《聖惠方》：治雀目，不計時月。用蒼术一兩，搗羅爲散，每服一錢，不計時候。

《千金方》：療煩悶。白术末，水調服方寸匕。

《梅師方》：治心下有水。白术三兩，澤瀉五兩剉，以水三升，煎取一升半，分服。

《衍義》曰：蒼术，其長如大小指，肥實，皮色褐，氣味辛烈，須米泔浸洗，再换泔，浸二日，去上粗皮。白术粗促，色微褐，氣味亦微辛、苦而不烈。古方及《本經》止言术，未見分其蒼、白二種也。只緣陶隱居言术有兩種，自此人多貴白者。今人但貴其難得，惟用白者，往往將蒼术置而不用。如古方平弱[30]散之類，蒼术爲最要藥，功尤速。殊不計[31]本草元無白术之名，近世多用，亦宜兩審。嵇康曰：聞道人遺言，餌术、黄精，令人久壽，亦無白字。



菟絲子

味辛、甘，平，無毒。主續絶傷，補不足，益氣力，肥健。汁去面黑，養肌，强陰，堅筋骨，主莖中寒，精自出，溺有餘瀝，口苦燥渴，寒血爲積。久服明目，輕身延年。一名菟蘆，一名赤網，一名菟縷，一名蔄蒙，一名玉女，一名延草木之上，色黄而細爲赤網，色淺而大爲菟纍，九月採實，曝乾。得酒良，署預、松脂爲之使，惡雚菌。

《圖經》曰：按《爾雅》云：唐，蒙，女蘿，菟絲。釋曰：唐也，蒙也，女蘿也，菟絲也，一物四名。而《本經》并以《毛傳》云：女蘿，菟絲也。仙方多單服者，取實酒浸，曝乾再浸，又暴，令酒盡，篩末，酒服，久而彌佳，兼明目。其苗生研汁，塗面斑神效。

《藥性論》云：菟絲子，君。能治男子、女人虚冷，添精益髓，去腰疼膝冷。久服延年，駐悦顔色。

陶隱居云：宜丸不宜煮，田野虚[32]落中甚多，皆浮生藍紵、麻蒿上。舊言

下有茯苓，上㉝菟絲，今不必爾。其莖掇以浴小兒，療熱瘥用。其實，先須酒浸之一宿，《仙經》、俗方并以爲補藥。

雷公云：勿用天碧草子，其樣真相似，只是天碧草子味酸澀并黏，不入藥。

《抱朴子》云：菟絲之草，下有伏菟之根，無此菟，則絲不得生於上，然實不屬也。又《內篇》云：菟絲初生之根，其形似菟，掘取割其血，以和丹，服之立變化。

《產書》云：治橫生。菟絲子爲末，酒調下一錢匕，米飲調下亦得。

《肘後方》：治卒腫，滿身面皆洪大。菟絲子一升，酒五升，漬二三宿，每服一升，日三服。又方：治面上粉刺。搗菟絲子絞取汁，塗之夫腰膝積冷痛，或頑麻無力。菟絲子洗秤一兩，牛膝一兩，同浸於銀器內，五日曝乾爲末，將元浸酒再入少醇酒，作糊，搜和丸如梧桐子大，空心酒下二十丸。又方：固陽丹，菟絲子二兩，酒浸十日，水淘焙乾爲末，更入杜仲一兩，蜜炙搗，用薯蕷末酒煮爲糊，丸如梧桐子大，空心用酒下五十丸。

《修真方》神仙方云：服之令人光澤，三年老變爲少，此藥治腰膝去風，久服延年。

《衍義》曰：菟絲子，附叢木中，即便蔓延，花實，無緑葉，此爲草本之異。其上有菟絲，下有茯苓，條中具言之。已於茯苓之說未必耳。

❶休：晦明軒本作『代』。
❷寸：原作『升』，據晦明軒本改。
❸扁：晦明軒本作『偏』。
❹宿：晦明軒本作『安』。
❺齦：晦明軒本作『鞭』。
❻署：原作『署』，據晦明軒本改。
❼藂：晦明軒本作『叢』。
❽冬：晦明軒本『冬』下有『袒』字。
❾問：晦明軒本『問』下有『之』字。
❿止：原作『正』，據晦明軒本改。
⓫至：晦明軒本作『間』。
⓬苦：晦明軒本作『艾』。
⓭依：晦明軒本作『醫』。
⓮痰：疑當作『痿』。
⓯高：晦明軒本『高』上有『見用多』三字。
⓰肘：晦明軒本作『肪』。
⓱人：原作『歲』，據晦明軒本改。
⓲人：原脱，據晦明軒本補。
⓳毒：原脱，據晦明軒本補。
⓴之：晦明軒本作『上』。
㉑斤：晦明軒本作『片』。
㉒蜜：原作『密』，據晦明軒本改。
㉓指：原作『分』，據晦明軒本改。
㉔可：晦明軒本『可』下有『得』字。
㉕止：原作『上』，據晦明軒本改。
㉖疾：晦明軒本作『痰』。
㉗炒：晦明軒本作『妙』。
㉘乾：晦明軒本作『漏』。
㉙青：晦明軒本『青』下有『赤』字。
㉚弱：晦明軒本作『胃』。
㉛計：晦明軒本作『詳』。
㉜虛：晦明軒本作『墟』。
㉝上：晦明軒本『上』下有『生』字。

圖經衍義本草卷之八

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部上品之上

牛膝

懷州



單州



牛膝　爲君。味苦、酸，平，無毒。主寒濕痿痹，四肢拘攣，膝痛不可屈伸，逐血氣，傷熱火爛，墮胎，療傷中少氣，男子陰消，老人失溺，補中續絶，填骨髓，除腦中痛及腰脊痛，婦人月水不通，血結，益精，利陰氣，止髮白。久服輕身耐老。一名百倍。生河内川谷及臨朐。二月、八月採根，陰乾。惡螢火、陸英、龜甲，畏白前。

《圖經》曰：今江、淮、閩、粤、關中亦有之，然不及懷州者爲真。春生苗，莖高二三尺，青紫色，有節如鶴膝，又如牛膝狀，以此名之。唐·崔元亮《海上方》治瘧用水煮牛膝根，未發前服。今福州人單用土牛膝根，净洗，切，焙乾，搗，下篩，酒煎，温服，云治婦人血塊，立效。

陶隱居云：今出近道蔡州者最長大，柔潤，其莖有節似牛膝，故以爲名也。乃云有雌雄，雄者莖紫色而節大爲勝爾。

《日華子》云：懷州者長白，近道蘇州者色紫。

《外臺秘要》：治久勞瘧不斷者。牛膝一握，切，以水六升，煮取二升，分二服，未發前服，臨發又服。

《聖惠方》：治氣濕痹腰膝痛。用牛膝葉一斤切，米三合，於豉汁中相和，煮作粥，和鹽、醬，空心食。

《千金方》：治婦人小便澀痛。牛膝五兩，酒三升，煮取一升半，去滓，分作三服。

《肘後方》：口舌生瘡。牛膝酒漬，含漱之，又治小便不利，莖中痛欲死，兼治婦人血結腹堅痛。牛膝一大把并葉，不以多少，酒煮飲之，立愈。

《經驗後方》：治消渴不止，下元虚損。牛膝五兩，細剉爲末，生地黄汁五升浸，晝暴夜浸，汁盡爲度，蜜丸如梧桐子大，空心温酒下三十丸。久服壯筋骨，駐顔色，黑髮，津液自生。

《梅師方》：治胞衣不出。牛膝八兩，葵子一兩，以水九升，煎取三升，分三服。

《孫真人食忌》云：治牙齒疼痛，燒牛膝根灰致牙齒間。又方：治卒得惡瘡，人不識者。以牛膝根搗傅之。

《衍義》曰：今西京作畦種，有長三尺者最佳。與蓯蓉浸酒服，益腎。牛膝葉一斤切，米三合，於豉汁中相和，煮作粥，和鹽、醬，空心食。

柴胡

淄州



壽州



江寧府



柴胡　爲君。味苦，平、微寒，無毒。主心腹，去腸胃中結氣，飲食積聚，寒熱邪氣，推陳致新，除傷寒心下煩熱，諸痰熱結實，胸中邪逆，五臟間遊氣，大腸停積水脹，及濕痹拘攣，亦可作浴湯。久服輕身，明目，益精。一名地薰，一名山菜，一名茹草。葉一名芸蒿，辛香可食。生洪農川谷及冤句。二月、八月採根，暴乾。半夏爲之使，惡皂莢，畏女菀、藜蘆。

《圖經》曰：柴胡，生洪農山谷及冤句，今關陝、江湖間近道皆有之，以銀州者爲勝。二月生苗，甚香。莖青紫，葉似竹葉，稍緊，亦有似斜蒿，亦有似麥門冬而短者。七月開黃花。生丹州，結青子，與他處者不類。根赤色，似前胡而强，蘆頭有赤毛如鼠尾，獨窠長者好。

《藥性論》云：柴胡，能治熱勞，骨節煩痛，熱氣，肩背疼痛，宣暢血氣，勞乏羸瘦，主下氣消食，主時疾內外熱不解，單煮服食。

陶隱居云：《博物志》云：芸蒿，葉似邪蒿，春秋有白蒨，長四五寸，香美可食，長安及河內并有之。此柴胡療傷寒第一用。

《孫尚藥方》：治黃疸。柴胡一兩去苗，甘草一分，右都細剉，作一劑，以水一碗，白茅根一握，同煎至七分，絞去滓，任意時時服，一日盡。

《衍義》曰：柴胡，《本經》并無一字治勞，方中鮮有不用者。嗚呼！凡此誤世甚多。嘗原病勞，有一種真臟虛損，復受邪熱，邪因虛而致勞，故曰勞者牢也。當須斟的❶用之。如《經驗方》中，治勞熱青蒿煎丸，用柴胡正合宜耳，服之無不效，熱去即須急已。若或無熱，得此愈甚，雖至死，人亦不怨，目擊甚多。

麥門冬

隨州



陸州



麥門冬　爲君。味甘，平、微寒，無毒。主心腹結氣，腸中傷飽，胃絡脈絕，羸瘦短氣，身重目黃，心下支滿，虛勞客熱，口乾燥渴，止嘔吐，愈痿蹶，强陰益精，消穀調中，保神，定肺氣，安五臟，令人肥健，美顏色，有子。久服輕身，不老不饑。秦名羊韭，齊名愛韭，楚名馬韭，越名羊蓍，一名禹葭，一名

禹餘糧。葉如韭，冬夏長生。生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處。二月、三月、八月、十月採，陰乾。地黄、車前爲之使，惡款冬、苦瓠，畏苦參、青囊。

《圖經》曰：崔元亮《海上方》治消渴丸云：偶於野人處得，神驗不可言。

《藥性論》云：麥門冬，使。惡苦芙，畏木耳。能治熱毒，止煩渴，主大水，面、目、支節浮腫，下水，治肺痿吐膿，主泄精，療心腹結氣，身黑目黄，心下苦支滿，虚勞客熱。

《日華子》云：治五勞七傷，安魂定魄，止渴，肥人，時疾熱狂，頭痛，止嗽。

陶隱居云：函谷即秦關。而麥門冬異於羊韭之名矣。處處有，以四月採，冬月作實如青珠，根似穬麥，故謂麥門冬，以肥大者爲好。用之湯澤抽去心，不爾，令人煩。

陳藏器云：《本經》方家自有分別。出江寧小潤，出新安大白，其大者苗如鹿葱。小者如韭葉。大小有三四種，功用相似，其子圓碧。久服輕身明目。和車前子、乾地黄爲丸，食後服之，去温瘴，變白，明目，夜中見光。

《衍義》曰：麥門冬，根上子也。治心肺虚熱，并虚勞客熱，亦可取苗作熟水飲。

獨活

文州



寧化軍羌活



鳳翔府



獨活　味苦、甘，平、微温，無毒。主風寒所擊，金瘡止痛，賁豚，癇痙，女子疝瘕。療諸賊風，百節痛風無久新者。久服輕身耐老。一名羌活，一名羌青，一名護羌使者，一名胡王使者，一名獨搖草。此草得風不搖，無風自搖動。生雍州川谷，或隴西南安。二月、八月採根，暴乾。豚實爲之使。

《圖經》曰：獨活、羌活，出雍州川谷，或隴西南安，今用蜀漢出者佳。春生苗，葉如青麻。六月開花作叢，或黄或紫。結實時葉黄者是夾石上生，葉青者是土脉中生。《本經》云：二物同一類，今人以紫色而節密者爲羌活，黄色而作塊者爲獨活。

《藥性論》云：羌活，君，味苦、辛，無毒。能治賊風，失音不語，多癢，血癩，手足不遂，口面喎邪，遍身痛痹。

陶隱居云：羌活形細而多節軟潤，氣息極猛烈。出益州北部、西川爲獨活，色微白，形虚大，爲用亦相似而小不如。其一莖直上，不爲風摇，故名獨活。至易蛀，宜密器藏之。

《唐本》注云：療風宜用獨活，兼水宜用羌活。

《日華子》云：羌活，治一切風并氣，筋骨拳攣，四肢羸劣，頭旋，明目，

赤目疼及伏梁水氣，五勞七傷，虛損冷❷氣，骨節酸疼，通利五臟。獨活即是羌活母類也。

《千金方》：治中風通身冷❸，口噤不知人。獨活四兩，好酒一升，煎取半升，分温再服。

《必效方》：治産後腹中絞刺疼痛。羌活二兩，酒二升，煎取一升去滓，爲二服。

《小品方》：治産後風虛，獨活湯主之。又白癬皮湯主之，亦可與獨活合白癬皮各三兩，水三升，煮取一升半，分三服。又方：治産後中風語澀，四肢拘急。羌活三兩，爲末。每服五錢，水、酒各半盞煎，去滓温服。

文潞公云：治牙齒風上攻腫痛。獨活、地黄各三兩，末。每服三錢，水一盞煎，温服。

升麻

味甘、苦，平、微寒，無毒。主解百毒，殺百精老物殃鬼，辟温疫，瘴氣，邪氣，蠱毒。入口皆吐出，中惡腹痛，時氣毒癘，頭痛寒熱，風腫諸毒，喉痛口瘡。久服不夭，輕身長年。一名周麻。生益州山谷。二月、八月採根，日乾。



《圖經》曰：今蜀漢、陝西、淮南州郡皆有之，以蜀川者爲勝。春生苗，高三尺以來。葉似麻葉，并青色。四月、五月著花似粟穗，白色。六月以後結實，黑色。根紫如蒿根，多鬚。今醫家以治咽喉腫痛，口舌生瘡，解傷寒頭痛，凡腫毒之屬，細剉一兩，水一升，煎煉取濃汁服之，入口即止，止❹毒氣，蜀人多用之。

《藥性論》云：蜀升麻，主治小兒風，驚癇，時氣，熱疾，能治口齒風蜃腫疼，牙根浮爛惡臭，熱毒膿血，除心肺風毒熱，壅閉不通，口瘡，煩悶。療癰腫，豌豆瘡，水煎綿沾拭瘡上。主百邪鬼魅。

陶隱居云：舊出寧州者第一，形細而黑，極堅實，頃無復有。今惟出益州，好者細削，皮青緑色，謂之鷄骨升麻。北部間亦有，形又虛大，黄色。建平間亦有，形狀❺味薄，不堪用。

雷公云：採得了，刀刮上面粗皮，熏了，用黄精自然汁浸一宿，出，暴乾，細剉，蒸了，暴乾用之。

《日華子》云：安魂定魄并鬼附啼泣，遊風腫毒，口氣疳蜃。又名落新婦。

《聖惠方》：治小兒斑瘡及豆瘡，心躁眠卧不安，用川升麻一味，不計多少，細剉，水一盞煎，去滓取汁，以綿沾汁洗拭瘡瘢上。

《千金翼方》：治産後惡血不盡，或經月半歲。升麻三兩，清酒五升，煮取二升半，分温再服。

《梅師方》：治時行病發瘡。升麻

五兩，以水和蜜，二味同煎三沸，半服、半傅瘡。

《姚和衆方》：小兒屎尿血。蜀升麻五分，水五合，煎取一合，去滓，一歲兒，一日服盡。

《肘後方》：喉痹。升麻剉含之，喉塞亦然。

車前子


滁州

車前子　味甘、鹹，寒，無毒。主氣癃，止痛，利水道小便，除濕痹，男子傷中，女子淋瀝，不欲食，養肺，强陰益精，令人有子，明目，療赤痛。久服輕身耐老。葉及根，味甘，寒。主金瘡，止血，衄鼻，瘀血，血瘕，下血，小便赤，止煩下氣，除小蟲。一名當道，一名芣苢，一名勝舄。生真定平澤丘陵阪道中。五月五日採，陰乾。

《圖經》曰：今江湖、淮甸、近京、北地處處有之。春初生苗，葉布地如匙面，累年者長及尺餘如鼠尾。花甚細，青色微赤。結實如葶藶，赤累❻色。駐景丸用車前、菟絲二物，蜜丸，食下服方❼，今以爲奇方。

《藥性論》云：車前子，君，味甘，平。能去風毒，肝中風熱，毒風衝眼，目赤痛，障翳，腦痛淚出，壓丹石毒，去心胸煩熱。葉主泄精病，治尿血，能補五臟，明目，利小便，通五淋。

《日華子》云：常山爲使，通小便，車前子末，酒服二錢匕。

《梅師方》：治妊娠患淋，水道熱不通。車前子五兩，葵根切一升，同以水五升，煎取升半，作二服。

《子母秘録》：治橫生不得出，車前子末，酒服二錢匕。

《治瀉方》：歐陽文忠公嘗得暴下，國醫不能愈。夫人云：市人有此藥，三文一貼甚效。夫人買之，以國醫其方，但用車前子一味爲末，米飲下二錢匕。

禹錫云：謹按《爾雅》云：芣苢，馬舄。馬舄，車前。注：今車前草，大葉長穗，好生道邊，江東呼爲蝦蟆衣。疏引陸機疏云：馬舄，一名車前，一名當道，喜在牛迹中生，故曰車前、當道也。幽州人謂之牛❽舌草，可鬻作茹，大滑。其子治婦人産難。

《外臺秘要》：治尿血。車前草搗絞取汁五合，空心服之。

《聖惠方》：治久患内障眼。車前葉搗取汁服，療泄精。大誤矣。此藥甘滑，利小便，走泄精氣。《經》云主小便赤，下氣。有人作菜食，小便不禁，幾爲所誤。

木香



木香　味辛，温，無毒。主邪氣，辟毒疫温鬼，强志，主淋露，瘴氣，中偏寒，主氣不足，消毒，殺鬼精物，温瘧蠱毒，行藥之精。久服不夢寤魘寐，輕身致神仙。一名蜜香。生永昌山谷。

《圖經》曰：惟廣州舶上有來者，他無所出。陶隱居云：江淮間亦有此種，名上青木香，不堪入藥用。《修養書》云：正月一日取五木煮湯以浴，令人至老鬚髮黑。

《藥性論》云：木香，君。治女人血氣刺心，心痛不可忍，末，酒服之，治九種心痛，積年冷氣，痃癖癥塊脹痛，逐諸擁氣上衝，煩悶，治霍亂吐瀉，心腹疝刺。

《唐本》注云：此有二種，當以崑崙來者爲佳，出西胡來者不善。葉似羊蹄而長大，花如菊花，其實黄黑，所在亦有之。今按《别本》注云：葉似署蕷而根大，花紫色，功多，爲藥之要用。陶云不入藥，非。

《日華子》云：治心腹一切氣，止瀉，霍亂，痢疾，安胎，健脾消食，療羸瘦，膀胱冷痛，嘔逆反胃。

蕭炳云：崑崙船上來，形如枯骨者良。

禹錫云：謹按《蜀本》云：今苑中種之，花黄，苗高三四尺，葉長八九寸，黑斑如瘡。青木香二兩，水二升，煮取一升，頓服之效。

《衍義》曰：木香，專泄決胸腹間滯塞冷氣，他則次之。得橘皮、肉豆蔻、生薑相佐使絶佳，效尤速。又一種，嘗自岷州出塞，得生青木香，特❾歸西洛。葉如牛蒡，但狹長，莖高三四尺，花黄，一如金錢，其根則青木香也。生嚼之，極辛香，尤行氣。

薏苡人



薏苡人　味甘，微寒，無毒。主筋急拘攣，不可屈伸，風濕痹，下氣，除筋骨邪氣不仁，利腸胃，消水腫，令人能食。久服輕身益氣。其根，下三❿蟲。一名解蠱，一名屋菱，一名起實，一名贛。生真定平澤及田野。八月採實，採根無時。

《圖經》曰：薏苡人，生真定平澤

及田野，今所在有之。春生苗，莖高三四尺。葉如黍。開紅白花作穗子。五月、六月結實，青白色，形如珠子而稍長，故名薏珠子。小兒多以綫⓫穿如貫珠爲戲。古方大抵心肺藥多用之。葛洪治卒心腹煩滿，又胸脅痛者，剉根濃煮汁，服三升乃定。今人多取葉爲飲，香。張仲景治風濕身煩疼，日晡劇者，與麻黄杏人薏苡人湯：麻黄三兩，杏人三十枚，甘草、薏苡人各一兩，四物以水四升，煮取二升，分温再服。

陶隱居云：真定縣屬常山郡，近道在處有，多生人家。交阯者子最大，彼土呼爲幹珠。馬援大取將還，人讒以爲真珠也。實重累者爲良。用之取中人。今小兒病蛔蟲，取根煮汁作糜食之，甚香，而去蛔蟲大驗。

陳藏器餘云：主消渴，煞蛔蟲。根煮服，墮胎。

雷公曰：凡使，物⓬用薏米，顆大無味。其薏米，時人呼爲粳薏是也。若薏苡人，顆小色青，味甘，咬着粘人齒。大⓭用一兩，以糯米二兩同熬，令糯米熟，去糯米取使，若更以鹽湯煮，別是一般修制亦得。

禹錫云：謹按《藥性論》云：能治熱風，筋脉攣急，能令人食。主肺痿肺氣，吐膿血，咳嗽涕唾，上氣。

孟詵云：性平，去乾濕脚氣，大驗。

《食醫心鏡》云：治筋脉拘攣，久風濕痹，下氣，除骨中邪氣，利腸胃，消水腫，久服輕身，益氣力。薏苡人一升，搗爲散。每服以水二升煮兩匙末作粥，空腹食之。

《梅師方》：肺疾唾膿血，取薏苡人十兩杵碎，以水三升，煎取一升，入酒少許服之。

《衍義》曰：意苡人，此李商隱《太倉銘》中所謂薏苡似珠，不可不虞者也。取人用。《本經》云：微寒，主筋急拘攣。拘攣有兩等，《素問》注中，大筋受熱，則縮而短，縮短故攣急不伸。此是因熱而拘攣也，故可用薏苡人。若《素問》言因寒即筋急者，不可更用此也。

澤瀉





澤瀉　州齊

味甘、鹹，寒，無毒。主風寒濕痹，乳難，消水，養五臟，益氣力，肥健，補虛損五勞，除五臟痞滿，起陰氣，止泄精、消渴、淋瀝，逐膀胱三焦停水。久服耳目聰明，不饑，延年，輕身，面生光，能行水上。扁鵲云：多服病人眼。一名水瀉，一名及瀉，一名芒芋，一名鵠瀉。生汝南池澤。五月、六月採根，陰乾。畏海蛤、文蛤。

陰，補不足，除邪濕。久服面生光，令人無子。九月採。

《圖經》云：澤瀉，生汝南池澤，今山東、河、陝、江、淮亦有之，以漢中者爲佳。春生苗，多有淺水中，葉似牛舌草，獨莖而長。秋開白花，作叢似穀精草。五月、六月採根，陰乾。《素問》身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，名曰酒風。治之以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以二指撮，爲後飯。後飯者，飯後藥先，謂之後飯。張仲景治雜病，心下有支飲，苦冒，澤瀉湯主之。澤瀉五兩，朮二兩，水二升，煎取半升，分温再服。治傷寒有大、小澤瀉湯，五苓散輩，皆用澤瀉，行利停水爲最。

《藥性論》云：澤瀉，君，味苦。能主腎虛精自出，治五淋，利膀胱熱，宣通水道。

陶隱居云：汝南郡屬豫州。近道亦有，不堪用，惟用漢中、南鄭、青弋，形大而長，尾間必有兩歧爲好。此物易朽蠹，常須密藏之。葉狹長，叢生諸淺水中。《仙經》服食斷穀皆用之。身輕，能步行水上。

《日華子》云：治五勞七傷，主頭旋，耳虛鳴，筋骨攣縮，通小腸，止遺瀝，尿血，催生，難産，補女人血海，令人有子。葉，壯水臟，下乳，通血脉。

《經驗方》：常服澤瀉，皂莢水煮爛，焙乾爲末，煉蜜爲丸如桐子大。空心以温酒下十五丸至二十丸，甚妙。治腎臟風，生瘡尤良。

《衍義》曰：澤瀉，其功尤長於行水。張仲景八味丸用之者，亦不過引接桂、附等歸就腎經，別無他意。凡服澤瀉散人，未有不小便多者，小便既多，腎氣焉得復實？今人止泄精，多不敢用。

薯蕷　味甘，温，平，無毒。主傷中，補虛羸，除寒熱邪氣，補中，益氣力，長肌肉，主頭面遊風，風頭眼眩，下氣，止腰痛，補虛勞羸瘦，充五臟，除煩熱，强陰。久服耳目聰明，輕身，不饑，延年。一名山芋，秦、楚名玉延，鄭、越名土諸。生嵩高山谷。二月、八月採根，暴乾。紫芝爲之使，惡甘遂。





《圖經》曰：北都、四明者爲佳。春生苗，蔓延籬援。莖紫色葉青，有三尖角似牽牛更厚而光澤。郭璞注云：根似芋可食。今江南人單呼諸，語或有輕重耳。據此注，則薯蕷與諸乃一種。南北之産或有不同，故其形類差別。然字音殊、儲不同，蓋相傳之訛也。一名山芋。

《藥性論》云：薯蕷，臣。能補五勞七傷，去冷風，止腰疼，鎮心神，安魂魄，開達心孔，多記事，補心氣不足，患人體虛羸，加而用。

陶隱居云：今近道在處有，東山、南江皆多掘取食之以充糧。南康間最大而美，服食亦用。

禹錫云：謹按吴氏云：薯蕷，一名諸薯，齊、越名山芋，一名修脆，一名兒草。神農：甘，小温。桐君、雷公：甘，無毒。或生臨朐鍾山，始生赤莖細蔓，五月華白，七月實青黄，八月熟落，根中白，皮黄，類芋也。

《食醫心鏡》云：主下焦虚冷，小便數，瘦損無力。生芋藥半斤，刮去皮，以刀切碎，研令細爛，於鐺中著酒，酒沸下薯蕷，不得攪，待熟著鹽、葱白，更添酒，空腹飲三二盞，妙。

《聖惠方》：補虚損，益顔色。用薯蕷於砂盆中細研，然後下於銚中，先以酥一大匙熬令香，次旋添酒一盞煎，攪令匀，空心飲之。

芜蔚子



芜蔚子

味辛，甘，微温、微寒，無毒。主明目益精，除水氣，療血逆大熱，頭痛心煩。久服輕身。芜莖，主癮疹癢，可作浴湯。一名益母，一名大札，一名貞蔚。生海濱池澤。五月採。

《圖經》曰：皆云蓷，益母也。故曾子見之感恩。劉歆亦謂：蓷，臭穢。臭穢即芜蔚也。《廣濟方》療小兒疳痢困垂死者，取益母草煮食之，取足，差止，甚佳。又主難産，搗取汁七大合煎半，頓服，立下。無新者，以乾者一大握，水七合煎服。

陶隱居云：今處處有。葉如荏，方莖，子形細長、三棱。方用亦稀。

《唐本》注云：搗芜蔚莖傅丁腫，服汁使丁腫毒内消。又下子死腹中，主産後血脹悶[14]，諸雜毒腫、丹油等腫。取汁如豆滴耳中，主聤耳。中虺蛇毒，傅之良。

陳藏器云：此草，田野間人呼爲鬱臭草。又按《别本》注云：其子狀如析蓂子而稍粗大，微有寒蒸[15]，作煎及搗絞取汁服之，下死胎也。

《日華子》云：治産後血脹，苗、葉同功。乃益母草子也。作節，節生花如鷄冠，子黑色，九月採。

《聖惠方》：治婦人勒乳痛成癰。益母爲末，水調塗乳上一宿，自差。生搗爛用之亦得。

下。益母搗絞汁，每服一小盞，入酒一合，温攪匀服。

《肘後方》：治婦人一切血病，産婦一切傷損。益母草不限多少，竹刀切，洗净，銀器内煉成膏，瓷器内封之，并以酒服之。

《孫真人方》：治馬咬方，益母草細切，和醋炒，封之。

《集驗方》：治婦人帶下赤白色。益母草花開時，採搗爲末。每服二錢，食前温湯調下。

《丹房鏡源》云：燒益母灰，用麵湯漫，燒之偏[16]，治面上風刺，亦制硫黄。

《衍義》曰：芜蔚子，葉至初春，亦可煮作菜食，凌冬不凋悴。唐武后曾⑰燒此灰，入緊面藥。

女萎亦名萎蕤

舒州



滁州



女萎、萎蕤　味甘，平，無毒。主中風暴熱，不能動搖，跌筋結肉，諸不足，心腹結氣，虛熱濕毒，腰痛，莖中寒及目痛眦爛泪出。久服去面黑黯，好顏色，潤澤，輕身不老。一名熒，一名地節，一名玉竹，一名馬薰。生太山山谷及丘陵。立春後採，陰乾。畏鹵鹹。

《圖經》曰：郭璞注云：藥草也。亦無女萎之別名，疑別是一物，且《本經》中品，又別有女萎條。蘇恭云：即此女萎，今《本經》朱書是女萎能效，黑字是萎蕤之功，觀古方書所用則似差別。

《藥性論》云：萎蕤，君。主時疾寒熱，内補不足，去虛勞客熱，頭痛不安，加而用之良。

陶隱居云：按《本經》有女萎，無萎蕤，《别録》無女萎，有萎蕤，而爲用正同，惟名異爾。如此，女萎即應是萎蕤也。今處處有，其根似黄精而小異，服食家亦用之。

《日華子》云：除煩悶，止渴，潤心肺，補五勞七傷虛損，腰脚疼痛，天行熱狂，服食無忌。

雷公云：凡使，勿用鈎吻并黄精，其二物相似。萎蕤只是不同，有誤疾人，萎蕤節上有毛，莖斑，葉尖處有小黄點，採得先用竹刀刮上節皮了，洗净，却以蜜水浸一宿，蒸了焙乾用。

蕭炳云：萎蕤，補中益氣，出均州。

《楊氏産乳方》：療久痢脱肛不止。取女萎切一升，燒薰之。

防葵

襄州



防葵　味辛，甘、苦，寒，無毒。主疝瘕，腸泄，膀胱熱結，溺不下，咳逆，温癉，癲癎，驚邪狂走，療五臟虛氣，小腹支滿，臚脹，口乾，除腎邪，强志。久服堅骨髓，益氣輕身。中火者不可服，令人恍惚見鬼。一名爵離，一名農果，一名梨蓋，一名房慈，一名利茹，一名方蓋。生臨淄川谷及嵩高、太山、少室。三月三日採根，暴乾。

《圖經》曰：陶隱居云：與狼毒同根，但置水不沉耳。今乃用枯朽狼毒當之，極爲謬矣。三月三日採，六月開花即結實，採根爲藥。

《唐本》注云：此藥上品，無毒，久服主邪氣驚狂之病。其根葉似葵花子根，香味似防風，故名防葵。採依時

者，亦能沉水，今乃用枯朽狼毒當之，極爲謬矣。

陳藏器云：按此二物，一是上品，而陶云防葵與狼毒根同，但置水中不沉爾。然此二物，善惡不同，形質又別，陶既爲此説，後人因而用之。防葵將以破堅積爲下品之物，與狼毒同功，今古因循，遂無甄別，此殊誤也。

雷公云：凡使，勿誤用狼毒，緣真似防葵，而驗之有異，效又不同，切須審之，恐誤疾人。

禹錫云：謹按《藥性論》云：防葵，君，有小毒。能治疝氣，痃癖氣塊，膀胱宿水，血氣瘤大如碗，悉能消散。治鬼瘧，主百邪鬼魅精怪，通氣。《肘後方》：治癲狂疾。防葵末，温酒服一刀圭，至二三服，身潤又小不仁爲候。

圖經衍義本草卷之八

---

❶的：晦明軒本作『酌』。

❷冷：原作『令』，據晦明軒本改。

❹止：晦明軒本作『吐出』。

❺狀：晦明軒本作『大』。

❻累：晦明軒本作『黑』。

❼方：晦明軒本作『古』，屬下讀。

❽牛：原作『一』，據晦明軒本改。

❾特：晦明軒本作『持』。

❿三：原作『二』，據晦明軒本改。

⓫綫：原作『綿』，據晦明軒本改。

⓬物：晦明軒本作『勿』。

⓭大：晦明軒本作『夫』。

⓮悶：原作『門』，據晦明軒本改。

⓯寒蒸：晦明軒本作『陳氣』。

⓰偏：晦明軒本作『遍』。

⓱曾：晦明軒本作『九』。

圖經衍義本草卷之九

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部上品之上

遠志







齊州　威勝軍　商州

遠志　爲君。味苦，温，無毒。主咳逆傷中，補不足，除邪氣，利九竅，益智慧，耳目聰明，不忘，强志，倍力，利丈夫，定心氣，止驚悸，益精，去心下膈氣，皮膚中熱，面目黄。久服輕身不

老，好顏色，延年。葉名小草，主益精，補陰氣，止虛損，夢泄。一名棘菀，一名蕘繞，一名細草。生太山及冤句川谷。四月採根、葉陰乾。得茯苓、冬葵子、龍骨良，殺天雄、附子毒，畏真珠、黎蘆、蜚蠊、齊蛤。

《圖經》曰：今河、陝、京西州郡亦有之。根黃色形如蒿根。苗名小草，似麻黃而青，又如藁豆。葉亦有似大青而小者。三月開花白色，根長及一尺。四月採根、葉，陰乾。泗州出者花紅，根、葉俱大於他處。商州者根又黑色，俗傳夷門遠志最佳。商州者根又黑胸痹心痛，逆氣，膈中飲不下。

《藥性論》云：遠志畏曋蟟。治心神健忘，安魂魄，令人不迷，堅壯陽道，主夢邪。

陶隱居云：按藥名無齊蛤，恐是百合。冤句縣屬兗州濟陰郡，今猶從彭城北蘭陵來。用之打去心取皮，今用一斤止得三兩皮。或云：陶云恐是百合，非也。

《日華子》云：主膈氣，驚魘，長肌肉，助筋骨，婦人血噤失音，小兒客忤。服無忌。

《抱朴子·內篇》云：陵陽仲子服遠志三十年，有子三十七人，開書所視，便記而不忘。

雷公云：遠志，凡使，先須去心，若不去心，服之令人悶。去心了，用熟甘草湯浸一宿，漉出，暴乾用之也。

《肘後方》：云：治人心孔惛塞，多忘喜誤。丁酉日密自至市買遠志，著巾角中，還爲末服之，勿令人知。杜蘅吐人，用時須細辨耳。蘅當之。江淮俗呼爲馬蹄香，以人多誤用，故此詳述之。

《藥性論》云：細辛，臣，忌生菜，味苦、辛。治咳逆上氣，惡風風頭，手足拘急，安五臟六腑，添膽氣，去皮風濕癢，能止眼風泪下，明目，開胸中滯，除齒痛，主血閉，婦人血瀝腰痛。

雷公云：凡使，一一揀去雙葉，服之害人，須去頭土了，用瓜水浸一宿，至明漉出，曝乾用之。

禹錫云：按范子云：細辛出華陰，色白者苦❷。

《外臺秘要》：治卒客忤，停口❸不



細辛

味辛，温，無毒。主咳逆，頭痛腦動，百節拘攣，風濕痹痛，死肌，温中下氣，破痰，利水道，開胸中，除痹❶，齆鼻，風癇癲疾，下乳結，汗不出，安五臟，益肝膽，通精氣。久服明目，利九竅，輕身長年。一名小辛。生華陰山谷。二月及八月採根，陰乾。曾青、棗根爲之使，惡狼毒、山茱萸、黃耆，畏消石、滑石，反藜蘆。

《圖經》云：今處處有之，然他處所出者，不及華州者真。其根細而其味極辛，故名之曰細辛。今人多以杜蘅當之。杜蘅吐人，用時須細辨耳。江淮俗呼爲馬蹄香，以人多誤用，故此詳述之。

能言。細辛、桂心等分内口中。

《別説》云：謹按細辛非華陰者，不得爲細辛用。若杜蘅之類，自應依本性於用爾。又細辛若單用末，不可過半錢匕，多即氣悶塞不通者死。

《聖惠方》云：治口臭及齧齒腫痛。細辛煮取濃汁熱含令❹吐，差。

《衍義》曰：細辛，用根，今惟華州者佳，柔韌，極細直，深紫色，味極辛，嚼之習習如椒。治頭面❺風痛不可闕也。葉如葵葉，亦黑，非此則杜蘅也。杜蘅葉，形如馬蹄下，故俗云馬蹄香。蓋根似白前，又似細辛。襄、漢間一種細辛，極細而直，色黄白，乃是鬼督郵，不可用。

石斛

味甘，平，無毒。

除痹，下氣，補五臟，虚勞羸瘦，强陰，益精，補内絶不足，平胃氣，長肌肉，逐皮膚邪熱痱氣，脚膝疼冷痹弱。久服厚腸胃，輕身延年，定志除驚。一名林蘭，一名禁生，一名杜蘭，一名石遂。生六安山谷水傍石上。七月、八月採莖，陰乾。陸英爲之使，惡凝水石、巴豆，畏僵蠶、雷丸。



《圖經》曰：今荆、湖、川、廣州郡及温、台州亦有之，以廣南者爲佳。在山谷中。五月生苗，莖似竹節，節間出碎葉。七月開花，十月結實，其根細長，黄色。或云採莖以酒洗，捋蒸炙成，不用灰湯。其江南生者有二種：一種似大麥，累累相連，頭生一葉❻，一名麥斛；一種大如雀髀，名雀髀斛，惟生石上，細實，桑灰湯沃之，色如金，形似蚱蜢髀者爲佳。近道亦有，次宣城間生櫟樹上者，名木斛。其莖形長大而色淺。六安屬廬江，今始安亦出木斛，至虚長，不入丸散，惟可爲酒漬、煮湯用爾❽。俗方最以補虚，療脚膝。

《日華子》云：治虚損劣弱，壯筋骨，暖水臟，輕身益智，平胃氣，逐虚邪。

雷公云：凡使，先去頭土，用酒浸一宿，漉出，於日中曝乾，却用酥蒸，從巳至酉，却徐徐焙乾用。

禹錫云：謹按《藥性論》云：石斛，君。益氣除熱，主治男子腰脚軟弱，健陽，逐皮肌風痹，骨中久冷虚損，補腎，積精，腰痛，養腎氣，益力。

《衍義》曰：石斛，細若小草，長三四寸，柔韌，折之如肉而實。今人多以木斛渾行，醫工亦不能明辨。世又謂之金釵石斛，蓋後人取象而言之，然其木斛折之中虚，如禾草，長尺餘，但色深若光澤而已。真石斛，治胃中虚熱有功。

巴戟天



巴戟天　味辛、甘，微温，無毒。主大風邪氣，陰痿不起，强筋骨，安五臟，補中，增志，益氣，療頭面遊風，小腹及陰中相引痛，下氣，補五勞，益精，利男子。生巴郡及下邳山谷。二月、八月採根，陰乾。覆盆子爲之使，惡朝生、雷丸、丹參。

《圖經》曰：今江淮、河東州郡亦有之，皆不及蜀川者佳。葉似茗，經冬不枯，俗名三蔓草，又名不凋草。葉似麥門冬。今兩種，但擊破視，其中雖紫，鮮潔者，僞也。真者擊破，其中間紫色。有人嗜酒，日須五七杯。後患脚氣甚危，或教以巴戟半兩，糯米同炒，米微轉色，不用米，大黄一兩，剉、炒，同爲末，熟蜜爲丸，温水下五七十丸，仍禁酒，遂愈。

又有微白糝如粉色。

陶隱居云：今亦用建平、宜都者，狀如牡丹而細，外赤内黑，用之打去心。

《唐本》注云：一名三蔓草。葉似茗，經冬不枯，根如連珠，多者良，宿根青色，嫩根白紫，用之亦同。連珠厚者爲勝。

《日華子》云：味苦。安㉑五臟，定心氣，除一切風，治邪氣，療水腫。又名不凋草，色紫如小念珠，有小孔子，堅硬難搗。

雷公云：凡使，須用枸杞子湯浸一宿，待稍軟漉出，却用酒浸一伏時，又漉出，用菊花同熬令焦黄，去菊花，布拭令乾用。

禹錫云：謹按《藥性論》云：紫巴戟天，使。能治男子夜夢，鬼交泄精，强陰，除頭面中風，主下氣，大風血癩。病人虚損，加而用之。

《衍義》曰：巴戟天，本有心，乾縮時，偶自落，或可以抽摘，故中心或空，非自有小孔子也。今人欲要中間紫色，則多僞以大豆汁沃之，不可不察。外堅難染，故先從中間紫色。有人嗜

赤箭



赤箭　味辛，温。主殺鬼精物，蠱毒惡氣，消癰腫，下支滿，疝，下血。久服益氣力，長陰，肥健，輕身增年。一名離母，一名鬼督郵。生陳倉川谷、雍州及太山、少室。三月、四月、八月採根，暴乾。

《圖經》曰：赤箭，生陳倉川谷、雍州及泰山、少室，今江湖間亦有之，然不中藥用。謹按《抱朴子》云：按仙方中，有合離草，一名獨摇，一名離母，所

以謂之合離、離母者，此草爲物，下根如芋魁，有游子十二枚周環之，去大魁數尺，雖相須，而實不連，但以氣相屬耳。

陶隱居云：陳倉屬雍州扶風郡。按此草亦是芝類。云莖赤如箭杆，葉生其端。根如人足，又云如芋，有十二子爲衛。有風不動，無風自摇。如此亦非俗所見，而徐長卿亦名鬼督郵。又復有鬼箭，莖有羽，其療并相似，而益人乖異，恐并非此赤箭。

禹錫云：按《藥性論》云：赤箭，無毒。

《別説》云：謹按：今醫家見用天麻，即是此赤箭根。今《補注》與《圖經》所載，乃別是一物，中品之下又出天麻一目，注云出鄆州。考今之所出，赤箭根苗，乃自齊鄆而來者爲上。今翰林沈公括最爲博識，嘗解此一説云：古方用天麻者不用赤箭，用赤箭者即無天麻，方中諸藥皆同，而唯此名或別，即是天麻、赤箭本爲一物，并合用根也。今中品之下，所別出天麻一目，乃與此赤箭所説，都不相干，即明説[11]是一物爾。然中品之下所爲天麻者，世所未嘗見用，今就此赤箭根爲天麻，則與今所用不相違。然赤箭則言苗，用之有自表入裏之功；天麻則言根，用之有自内達外之理。根則抽苗徑直而上，苗則結子成熟而落，返從簳中而下，至上而生，以此粗可識其内外主治之理。

《衍義》曰：赤箭，天麻苗也。然與天麻治療不同，故後人分之爲二。《經》中言八月採根曝乾，故知此即苗也。

菴蕳子

寧州



秦州



菴蕳子　味苦，微寒、微温，無毒。主五臟瘀血，腹中水氣，臚脹留熱，風寒濕痹，身體諸痛，療心下堅，膈中寒熱，周痹，婦人月水不通，消食，明目。久服輕身延年不老，駏驉食之神仙。生雍州川谷，亦生上黨及道邊。十月採實，陰乾。荆實、薏苡爲之使。

《圖經》曰：今江淮亦有之。春生苗，葉如艾蒿，高三二尺。七月開花，八月結實，十月採，陰乾。今人通以九月採。江南人家多種此辟蛇。今人治打撲損，多用此法，飲散皆通，其效最速。服食方不見用。

《日華子》云：治腰脚重痛，膀胱疼，明目及骨節煩痛，不下食。

禹錫云：謹按《藥性論》云：菴蕳，使。味辛、苦。益氣，主男子陰痿不起，治心腹脹滿，能消瘀血。

《廣利方》：治瘀血不散變成癰，搗生菴蕳蒿，取汁一升服之。

菥蓂子　味辛，微温，無毒。主明目，目痛泪出，除痹，補五臟，益精光，療心腹腰痛。久服輕身不老。一名蔑

葶藶子



葶，一名大薁，一名馬辛，一名大薺。生咸陽川澤及道旁。四月、五月採，暴乾。得荆實、細辛良，惡乾薑、苦參。

《圖經》曰：《爾雅》云：葶藶，大薺。郭璞云：似薺，細葉，俗呼之曰老薺。蘇恭亦云是大薺。又云：然葶藶味辛，大薺味甘。陳藏器以大薺當是葶藶，非葶藶，葶藶大而褊，葶藶細⑫而圓，二物殊也。而《爾雅》自有葶藶，謂之蕳。注云：實、葉皆似芥，一名狗薺，大抵二物皆薺類，故人多不能細分，乃爾致疑也。古今眼目方中多用之。崔元亮《海上方》療眼熱痛，泪不止，以葶藶子一物，搗篩爲末，欲卧以銅箸點眼中，當有熱泪及惡物出，并去努肉。可三四十夜點之，甚佳。

《藥性論》云：葶藶子，苦參爲使。能治肝家積聚，眼目赤腫。

陶隱居云：今處處有之，人乃言是大薺子，俗用甚稀。

陳藏器云：葶藶子，《本經》一名大薺。蘇引《爾雅》爲注云：大薺。按《史記·龜策傳》曰：龜千歲，乃遊於蓮葉之上，蓍百莖共一根，又其所生，獸無虎狼，蟲無毒螫。徐廣注曰：劉向云龜千歲而靈，蓍百年而一本生百莖。又褚先生云：蓍生滿百莖者，其下必有神龜守之，其上常有黄⑬雲覆之。

《唐本》注云：此草所在有之，以其莖爲笤。陶誤用楮實爲之。《本經》云味苦，楮實味甘，其楮實移在木部傍，其生如蒿作叢，高五六尺，一本一二十莖，至多者三五十莖，生便條直，所以異於衆蒿也。秋後有花出於枝端，紅紫色，形如菊，八月、九月採其實，日乾入藥。今醫家亦稀用。其莖爲笤，以問鬼神知吉凶，故聖人贊之，謂之神物。《史記·龜策傳》曰：龜千歲，乃遊於蓮葉之上，蓍百莖共一根，又其所生，獸無虎狼，蟲無毒螫。徐廣注曰：劉向云龜千歲而靈，蓍百年而一本生百莖。又褚先生云：蓍生滿百莖者，其下必有神龜守之，其上常有黄雲覆之。



蓍實

味苦、酸，平，無毒。主益氣，充肌膚，明目，聰慧先知。久服不饑，不老，輕身。生少室山谷。八月、九月採實，日暴乾。

《圖經》曰：今蔡州上蔡縣白龜祠

卷柏

味辛、甘，温、平、微寒，無毒。主五臟邪氣，女子陰中寒熱痛，癥瘕，血閉，絶子，止咳逆，治脱肛，散淋結，頭中風眩，痿蹶，强陰益精。久服輕身和顔色，令人好容體。一名萬歲，



一名豹足，一名求股，一名交時。生常山山谷石間。五月、七月採，陰乾。

《圖經》曰：今關、陝、沂、兗諸州亦有之。宿根紫色多鬚。春生苗，似柏葉而細碎，拳攣如鷄足，青黄色，高三五寸。無花、子，多生石上。五月、七月採，陰乾。去下近石有沙土處，用之。

《藥性論》云：卷柏，君。能治月經不通，尸疰鬼疰，腹痛，去百邪鬼魅。

陶隱居云：今出近道。叢生石土上，細葉似柏，卷屈狀如鷄足，青黄色。用之，去下有沙土處。

《日華子》云：鎮心治邪，啼泣，除面皯，頭風，暖水臟。生用破血，炙用止血。

龍膽



龍膽　味苦，寒、大寒，無毒。主骨間寒熱，驚耀⑭，邪氣，續絶傷，定五臟，殺蠱毒，除胃中伏熱，時節温熱，熱泄下痢，去腸中小蟲，益肝膽氣，止驚惕。久服益智不忘，輕身耐老。一名陵游。生齊朐山谷及冤句。二月、八月、十一月、十二月採根，陰乾。貫衆上生苗，高尺餘。四月生葉，似柳葉而細，莖如小稍枝，七月開花如牽牛花，作鈴鐸形，青碧色。冬後結子，苗便枯。俗呼云草龍膽。湘中又有山龍膽草，味苦澀，此同類而別種也。古方治瘧多用之。《集驗方》穀疸丸：苦參三兩，龍膽一兩，二物下篩，牛膽和丸，先食以麥飲服之。

陶隱居云：今出近道，吴興爲勝。狀似牛膝，味甚苦，故以膽爲名。今按《别本》注云：狀似龍葵，味苦如膽，因以爲名。

《日華子》云：採得後陰乾。欲使時，用銅刀切去髭土頭了，剉，於甘草湯中浸一宿，至明漉出，暴乾用。勿空腹餌之，令人溺不禁。

禹錫云：謹按《藥性論》云：龍膽，能主小兒驚癇，入心，壯熱，骨熱，擁⑮腫，治時疾，熱黄，口瘡。

《聖惠方》：治蛔蟲攻⑯心如刺，吐黄白色，下抽根十餘本，大類牛膝。直

水。龍膽一兩去頭，剉，水二盞，煮取一盞去滓。隔宿不食，平旦服。

《外臺秘要》：治卒下血不止。龍膽一虎口，以水五升，煮取二升半，分温五服，差。

《肘後方》：治卒心痛。龍膽四兩，酒三升，煮取一升半，頓服。



白蒿

白蒿　味甘，平，無毒。主五臟邪氣，風寒濕痹，補中益氣，長毛髮令黑，療心懸，少食常饑。久服輕身，耳目聰明，不老。生中山川澤。二月採。

《圖經》曰：白蒿，蓬蒿也。今所在有之。似青蒿而葉粗，上有白毛錯瀏，從初生至枯，白於衆蒿，頗似細艾。三月採。此《爾雅》所謂蘩，皤蒿是也。疏云：蓬蒿，今白蒿，春始生，及秋香美，可生食，又可蒸。一名游胡，北海人謂之旁勃，故《大戴禮·夏小正》云：繁，游胡。游胡，旁勃也。此草故⑱以爲葙⑱。唐·孟詵亦云：生挼醋食。今人但食蔞蒿，不復食此。或疑此蒿即蔞蒿。

陶隱居云：蒿類甚多，而俗中不聞呼白蒿者，方藥家既不用，皆無復識之，所主療既殊，則應更加研訪。服食七禽散云：白兔食之，仙。與菴蕳子同法耳。

孟詵云：白蒿，寒。春初此蒿前諸草生。搗汁去熱黃及心痛。其葉生挼，醋淹之爲菹，甚益人。

白英　味甘，寒，無毒。主寒熱八疸，消渴，補中益氣。久服輕身延年。一名穀菜，一名白草。生益州山谷。春採葉，夏採莖，秋採花，冬採根。

陶隱居云：諸方藥不用。此乃有人蒸食之。此乃生山谷，當非是。又有白草，葉作羹飲，甚治勞，而不用根、華。益州乃有苦菜，是山名爾。

紫芝　味甘，温。主耳聾，利關節，保神，益精氣，堅筋骨，好顏色，久服輕身不老，延年。一名木芝。生高夏山谷。六芝皆無毒，六月採。薯蕷爲之使，得髮良，得麻子人、白瓜子、牡桂共益人，惡常山，畏扁青、茵蔯蒿。

《藥性論》云：紫芝，使，畏髮。味甘，平，無毒。主能保神益壽。

陶隱居云：按郡縣無高夏名，恐桂共益人，惡常山，畏扁青、茵蔯蒿。

稀見，族種甚多，形色壞㉑異，并載《芝草圖》中。今俗所用紫芝，此是朽樹木株上生，狀如木檽，名爲紫芝。蓋止療痔，而不宜以合諸補丸藥也。凡得芝草，便正爾食之，無餘節度，故皆不云服法也。

《抱朴子》云：赤者如截肪，黑者如澤漆，青者如珊瑚，白者如紫金，而皆光明洞徹，如堅冰也。又云：木芝者，松柏脂倫㉒地，千歲化爲茯苓，萬歲其上生小木，狀似蓮花，名曰木威喜芝，夜視有光，持之甚滑，燒之不焦，帶之辟兵。

赤芝　味苦，平，主胸中結，益心氣，補中，增智慧，不忘。久食輕身不老，延年神仙。一名丹芝。生霍山。

陶隱居云：南嶽本是衡山，漢武帝始以小霍山代之，非正也。此則應生衡山也。

黑芝　味鹹，平。主癰，利水道，益腎氣，通九竅，聰察。久食輕身不老，延年神仙。一名玄芝。生常山。

《唐本》注云：五芝，《經》云：皆以五色生於五嶽，諸方所獻，白芝未必華山，黑芝又非常嶽。且芝多黄、白，稀有黑、青者，然紫芝最多，非五芝類。但芝自難得，縱獲一二，豈得終久服耶。

青芝　味酸，平。主明目，補肝氣，安精魂，仁恕。久食輕身不老，延年神仙，不忘强志。一名龍芝。生泰山。

《海藥》云：謹按《廣志》云：生嶺南。又云：生大秦國。性温、平，無毒。主頭面遊風，遍身癢。煮汁淋蘸。陶朱術云：五月五日採，諸山野往往亦有之。

黄芝　味甘，平。主心腹五邪，益脾氣，安神，忠信和樂。久食輕身不老，延年神仙。一名金芝。生嵩山。

白芝　味辛，平。主咳逆上氣，益肺氣，通利口鼻，强志意，勇悍，安魄。久食輕身不老，延年神仙。一名玉芝。生蜀川山谷。葉細長，在諸草中羊不吃者是。

無風獨摇草　帶之使夫婦相愛。

《唐本》注云：五芝，《經》云：皆以五色生於五嶽，諸方所獻，白芝未必華山，黑芝又非常嶽。且芝多黄、白，稀有黑、青者，然紫芝最多，非五芝類。但芝自難得，縱獲一二，豈得終久服耶。

兜木香　燒去惡氣，除病疫。漢武帝故事，西王母降，上燒兜木香末。《唐本》注云：五芝，《經》云：皆以五色生於五嶽，諸方所獻，白芝未必華山，黑芝又非常嶽。且芝多黄、白，稀有黑、青者，然紫芝最多，非五芝類。但芝自難得，縱獲一二，豈得終久服耶。

兜木香　燒去惡氣，除病疫。漢武帝故事，西王母降，上燒兜木香末。《唐本》注云：五芝，《經》云：皆以五色生於五嶽，諸方所獻，白芝未必華山，黑芝又非常嶽。且芝多黄、白，稀有黑、青者，然紫芝最多，非五芝類。但芝自難得，縱獲一二，豈得終久服耶。

仙人草　主小兒酢瘡。煮湯浴，亦搗傅之。酢瘡，頭小，大硬。小者，

此瘡或有不因藥而自瘥者。當丹毒入腹必危，可預飲冷藥以防之，兼用此草洗瘡。亦明目，去膚醫，按汁滴目中。生階庭間。高二三寸，葉細有薦齒，似離鬲草，北地不生也。

千里及　味苦，平，小毒。主天下疫氣，結黃，瘧瘴，蟲毒。煮服之吐下，亦搗傅瘡，蟲、蛇、犬等咬處。藤生，道旁籬落間有之，葉細厚，宣湖間有之。

錢葛　味甘，温，無毒。主一切風，血氣羸弱，令人性健。久服風緩及偏風并正。生山南峽中。葉似枸杞，根如葛，黑色也。

甜藤　味甘，寒，無毒。去熱煩，解毒，調中氣，令人肥健。又主剥馬血毒入肉，狂犬，牛馬熱黃。搗絞取汁，和米粉作糗餌，食之甜美，止泄，搗葉汁傅蛇咬瘡。生江南山林下，蔓如葛。又有小葉尖長，氣辛臭，搗傅小兒腹，除痞滿閃癖。

地楊梅　味辛，平，無毒。主赤白痢。取莖、子煎服。生江東温濕地。四五月有子似楊梅，苗如蓑草也。

天竺乾薑　味辛，温，無毒。主冷氣寒中，宿食不消，腹脹下痢，腰背疼，痃癖氣塊，惡血積聚。生婆羅門國，似薑小黃。一名胡乾薑。

❶痹：晦明軒本『痹』上有『喉』字。
❷苦：晦明軒本作『善』。
❸口：疑當作『尸』。
❹令：晦明軒本作『冷』。
❺面：原作『而』，據晦明軒本改。
❻一葉：原脱，據晦明軒本補。
❼藥：晦明軒本作『櫟』。
❽爾：原作『小』，據晦明軒本改。
❾輕：晦明軒本作『經』。
❿安：原脱，據晦明軒本補。
⓫説：晦明軒本作『別』。
⓬細：原作『納』，據晦明軒本改。
⓭黄：晦明軒本作『青』。
⓮耀：晦明軒本作『癇』。
⓯擁：晦明軒本作『癰』。
⓰攻：原作『皮』，據晦明軒本改。
⓱故：晦明軒本作『古』。
⓲葙：晦明軒本作『菹』。
⓳倦：晦明軒本作『健』。
⓴珠：原作『味』，據晦明軒本改。
㉑壞：晦明軒本作『環』。
㉒倫：晦明軒本作『淪』。

圖經衍義本草卷之十

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部上品之下

芎藭

永康軍



鳳翔府



芎藭　味辛，温，無毒。主中風入腦，頭痛，寒痹，筋攣緩急，金瘡，婦人血閉，無子，除腦中冷動，面上遊風去來，目泪出，多涕唾，忽忽如醉，諸寒冷氣，心腹堅痛，中惡，卒急腫痛，脅風痛，温中内寒。一名胡藭，一名香果。其葉名蘼蕪。生武功川谷、斜谷西嶺。三月、四月採根，暴乾。白芷爲之使。畏黄連。

《圖經》云：蘼蕪，芎藭苗也。生雍州川澤及冤句，今關陝、蜀川、江東山中多有之，而以蜀川者爲勝。江東蜀川人採其葉作飲香，關中出者，俗呼爲京芎，并通用。雀腦狀者，謂之雀腦芎，此最有力也。山芎藭能去痹濕風氣。簡文帝《勸醫文》曰：麥麴芎藭，終止河魚之腹。

《藥性論》云：芎藭，臣。能治腰脚軟弱，半身不遂，主胞衣不生，治腹内冷痛。

陶隱居云：今惟出歷陽，節大莖細，狀如馬銜，謂之馬銜芎藭。蜀中亦有而細，人患齒根血出者，含之多差。苗名蘼蕪，亦入藥，别在下説。俗方多用。

《唐本》注云：今出秦州，其人間種者，形塊大，重實，多脂潤。山中採者瘦細。味苦、辛。以九月、十月採爲佳。歷陽出者，今不復用。

《日華子》云：治一切風，一切氣，一切勞損，一切血，補五勞，壯筋骨，調衆脉，破癥結宿血，養新血，長肉，鼻洪，吐血及溺血，痔瘻，腦癰，發背，瘰癧，癭贅，瘡疥及排膿，消瘀血。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：苗似芹、胡荽、蛇床輩，叢生，花白，今出秦州者爲善，九月採根乃佳。

《千金方》：治崩中，晝夜不止。芎藭八兩，清酒五升，煎取二升半，分三服。不耐者，徐徐進之。又方❶：治胎忽因倒地，忽舉動擎重促損，腹中不安及子死腹中。以芎藭末，酒服方寸匙❷，須臾一二服出。

《經驗後方》：治頭風，化痰。川芎不計分兩，用淨水洗浸，薄切片子，日乾或焙，杵爲末，煉蜜爲丸如彈子大。不拘時，茶、酒嚼下一丸。

《靈苑方》：治婦人經絡，住經三個月。驗胎法：川芎生爲末，空心濃

煎艾湯下一匙頭。腹内微動者，是有胎也。

《斗門方》：治偏頭痛。用京芎細剉，酒浸，服之差。

《衍義》曰：芎藭，今出川中，大塊，其裏色白，不油色，嚼之微辛、甘者佳。他種不入藥，止可爲末，煎湯沐浴。此藥今人所用最多，頭面風不可闕也，然須以他藥佐之。沈括云：予一族子，舊服芎藭，醫鄭叔熊見之云，芎藭不可久服，多令人暴死，後族子果無疾而卒。又朝士張子通之妻病腦風，服芎藭甚久，亦一旦暴亡。皆目見者。此蓋單服耳，若單服既久，則走散其❸氣。既使他藥佐使，又不久服，中病便已，則致使能至此也。

黄連　味苦，寒、微寒，無毒。主熱氣，目痛眦傷泣❹出，明目，腸澼腹痛，下痢，婦人陰中腫痛，五臟冷熱，久下泄澼膿血。止煩渴、大驚，除水利骨，調胃厚腸，益膽，療口瘡。久服令人不忘。一名王連。生巫陽川谷及蜀郡、太山，二月、八月採。黄芩、龍骨、理石爲之使，惡菊花、芫花、玄參、白鮮，畏款冬，勝烏頭，解巴豆毒。

黄連


澧州
宣州

《圖經》云：今江、湖、荆、夔州郡亦有，而以宣城者爲勝，施、黔者次之。苗高一尺已來，葉似甘菊，四月開花，黄色。六月結實似芹子，色亦黄。二月、八月採根用。古方以黄連爲治痢之最，《胡洽方》載九盞湯，主下痢，不問冷熱、赤白、穀滯、休息、久下，悉主之。以黄連長三寸三十枚秤重一兩半，龍骨如棋子四枚重四分，附❺子大者一枚，乾薑一兩半，膠一兩半，并切；先以水五合，著銅器中，去火三寸，煎沸便下，著生土上，沸止又上水五合，如此九上九下；内諸藥著火上，沸輒下，著土上，沸止又復，九上九下，度可得一升，頓服即止。又香蓮丸亦主下痢，近世盛行。其法以宣蓮、青木香分兩停同搗篩，白蜜丸如梧子，空腹飲下三十丸，日再，如神。其久冷人，即用煨熱大蒜作丸。此方本出李絳《兵部手集方》，嬰孺用之亦效。又治目方用黄連多矣。

《藥性論》云：黄蓮，臣。一名支蓮。耳❻白薑蠶，忌猪肉，惡冷水。殺小兒疳蟲，點赤眼昏痛，鎮肝去熱毒。

陶隱居云：巫陽在建服❼。今而❽間者，色淺而虚，不及東陽、新安諸縣最❾勝。臨海諸縣者不佳。用之當布裹挼去毛，令如連珠。俗方多療下痢及渴，道方服食長生。

《唐本》注云：蜀道者粗❿大節平，味極濃苦，療渴爲最。江東者節如連珠，療痢大善。今澧州者更勝。今注醫家見用宣州九節堅重、相擊⓫有聲者爲勝。

劉禹錫云：有崔承元者，囚⓬官治

一死罪囚出活之，囚後數年以病自致死。一旦，崔爲内障所苦，喪明逾年後，半夜嘆息獨坐，時聞階際間蟋蟀之聲，崔問爲誰？曰是昔⑬所蒙活者囚，今故報恩至此，遂以此方告訖而没。崔依此合服，不數月，眼復明，因傳此方於世。羊肝丸，黄連末一大兩，白羊子肝一具，去膜，同於沙盆内，研令極細，衆手拈爲丸如梧桐子。每食以暖漿水吞二七枚，連作五劑，差。但是諸眼目疾及障翳、青盲皆主之，禁食猪肉及冷水。

《抱朴子》云：乳汁煎之，治目中百病。

《外臺秘要》：治卒心痛。黄連八兩，一味㕮咀，水七升⑭，煮取五升，絞去滓，寒温飲五合，日三服。

《千金方》：治大熱毒純血痢。宣蓮六兩，以水七升，煮取三升半，夜露星月下，平旦空腹頓服之。

《肘後方》：治眼泪出不止，濃汁漬綿乾拭目。又方：赤痢熱下，久不止。黄連末，鷄子白丸，飲服十丸，三十丸即差。又方：治卒消渴，小便多。揭黄連，絹篩，蜜和，服三十丸，治渴延年。

《經驗方》：治暴赤白痢如鵝、鴨肝者，痛不可忍。黄連、黄芩各一兩，以水二升，煎取一升，分三服，熱吃，冷即凝矣。

《梅師方》：傷寒病，發豌豆瘡，未成膿方。黄連四兩，水三升，煎取一升，去滓分服。

《斗門方》：治骨節熱積漸黄瘦。者。用黄連末，傅之即差，更加赤小豆末尤良。

《簡要濟衆方》：小兒吐血不止。以一兩去鬚，搗碎爲散，每服一錢，水七分，入豉二十粒，同煎至五分，去滓，温服，量兒大小加減進。

《衍義》曰：黄連，今人多用治痢，蓋熱以苦燥之義。下俚但見腸虚滲泄，微似有血便，即用之，更不知止。又不顧寒熱多少，但以盡劑爲度，由是多致危困。若氣實初病，熱多血痢，服之便血⑮，乃不必盡劑也。或虚而冷，則不須服。餘如《經⑱》。

蒺藜子

味苦、辛，温、微寒，無毒。主惡血，破癥結積聚，喉痹，乳難，身體風癢，頭痛，咳逆傷肺，肺痿，止煩下氣，小兒頭瘡，癰腫陰瘡，可作摩粉。其葉主風癢，可煮以浴。久服長肌肉，明目，輕身。一名旁道⑲，一名屈人，一

蒺藜子

州同



州秦



名止行，一名豺羽，一名升推，一名即藜，一名茨。生馮翊平澤或道傍。七月、八月採實，暴乾。烏頭爲之使。

《圖經》曰：蒺藜子，生馮翊平澤或道傍。七月、八月採實，暴乾。又冬或道傍。七月、八月採實，暴乾。此《詩》云：布地采。黄白色，類軍家鐵蒺藜。此《詩》謂墻有茨者。郭璞注《爾雅》云：布地蔓生，細葉，子有三角刺人是也。古方云蒺藜子皆用刺者，治風明目最良。神仙方亦有單餌蒺藜，云不問黑白，但取堅實者，春去刺用。兼主痔漏，及婦人發乳，帶下。

《藥性論》云：白蒺藜子，君，味甘，有小毒。治諸風癮瘡[20]，破宿血，療吐膿，主難産，去躁熱，不入湯用。

陶隱居云：多生道上，而葉布地，子有刺，狀如菱而小。長安最饒，人行多著木屐。今軍家乃鑄鐵作之，以布敵路，亦呼蒺藜。《易》云：據於蒺藜。言其凶傷。今按《別本》注云：《本經》云温，《別録》云寒。此藥性宣通，久服不冷而無壅熱，則其温也。

《千金方》：治貲豚，腎氣，肺氣，胸膈滿，催生并墮胎，益精，療腫毒及水藏冷，小便多，止遺瀝泄精，溺血。入藥不計丸散，并炒去刺用。

雷公云：凡使，採得後净揀，擇了蒸，從午至酉，出，日乾。於木臼中舂，令皮上刺盡，用酒拌再蒸，從午至酉，出，日乾用。

《神仙秘旨》云：服蒺藜子一碩，當七八月熟時收，日乾，舂去刺，然後杵爲末。每服二錢，新汲水調下，日三服，勿令中絶，斷穀長生。服之一年已後，冬不寒，夏不熱。服之二年，老者復少，髮白復黑，齒落重生。服之三年，身輕長生。

《外臺秘要方》：補肝散：治三十子有刺，狀如菱而小。長安最饒，人行多著木屐。今軍家乃鑄鐵作之，以布敵路，亦呼蒺藜。《易》云：據於蒺藜。言其凶傷。今按《別本》注云：《本經》云温，《別録》云寒。此藥性宣通，久服不冷而無壅熱，則其温也。

《千金方》：治遍身風癢，生瘡疥。以蒺藜子苗煮湯洗之，立差。《千金翼方》同。

《梅師方》：治難産礙胎在腹中，如已見兒，并胞衣不出，胎死。蒺藜子、貝母各四兩，爲末。米湯下一匙，相去四五里不下，再服。

《衍義》曰：蒺藜有兩等：一等杜蒺藜，即今之道傍布地而生，或生墻上，有小黄花，結芒刺，此正是墻有茨者。花收摘，陰乾爲末，每服三二錢，飯後以温酒調服，治白癜風。又一種白蒺藜，出同州沙苑牧馬處。黄紫花，作莢，結子如羊内腎。補腎藥，今人多用。風家惟用刺蒺藜。

黄耆


憲州

黄耆　味甘，微温。無毒。主癰疽久敗瘡，排膿止痛，大風癩疾，五痔鼠瘻，補虚，小兒百病，婦人子藏風邪氣，逐五臟間惡血，補丈夫虚損，五勞羸瘦，止渴，腹痛，泄痢，益氣，利陰氣。生白水者冷，補。其莖葉療渴，及筋攣，癰腫疽瘡。一名戴糝，一名獨椹，一名芪草，一名蜀脂，一名生白水者冷，補。其莖葉療渴，及筋攣，癰腫疽瘡。一名戴糝，一名獨椹，一名芪草，一名蜀脂，一名百本。生蜀郡山谷、白水、漢中，二月、十月採，陰乾。惡龜甲。

《圖經》云：今河東、陝西州郡多有之。根長二三寸㉑已來。獨莖，作叢生，枝幹去地二三寸。其葉扶疏作羊齒狀，又如蒺藜苗。七月中開黄紫花，其實作莢子，長寸許。八月中採根用。其皮折之如綿，謂之綿黄耆。木耆不通用。唐·許裔言㉒初仕陳爲新蔡王外兵參軍，時太后感風不能言，脉沉而口噤。裔宗曰：既不能下藥，宜湯氣熏之，藥入腠理，周時可差。乃造黄耆防風湯數斛，置於床下，氣如烟霧，其夕便得語。藥力熏蒸，其效如此，因附著之。使善醫者，知所取法焉。

《藥性論》云：黄耆，一名王孫。治發背，内補，主虚喘，腎衰，耳聾，療寒熱。生隴西者下，補五臟。蜀白水赤皮者，微寒，此治客熱用之。

陶隱居云：第一出隴西叩陽，色黄白，甜美，今亦難得。

《唐本》注云：葉似羊齒，或如蒺藜。獨莖，或作叢生。今出原州及華原者最良，蜀漢不復採用。

《日華子》云：黄耆，惡白鮮皮。助氣壯筋骨，長肉補血，破癥癖，瘰癧瘻㉓贅，腸風，血崩，帶下，赤白痢，産前後一切病，月候不勻，消渴，痰嗽，并治頭風，熱毒赤目等。藥中補益，呼爲羊肉。又云：白水耆，凉，無毒。排膿，治血及煩悶熱毒，骨蒸勞。功次黄耆。赤水耆，凉，無毒。治血，退熱毒，餘功用并同上。木耆，凉，無毒。治煩，排膿。力微於黄耆，遇關即焙乾㉔之。

《別説》云：謹按黄耆本出綿上爲良，故名綿黄耆。今《圖經》所繪憲水者即綿上，地相鄰爾。若以謂柔韌如綿，即謂之綿黄耆，然黄耆本皆柔韌，若僞者，但以乾脆爲别爾。

《聖惠方》：治肺壅得吐。以黄耆二兩，杵爲細末。每服三錢，水一盞，煎至六分，温服，日三四服。

《梅師方》：補肺排膿。以黄耆六兩，剉碎，以水三升，煎取一升，去滓服。

《孫用和方》：治肠風瀉血。黄耆、黄連等分，右爲末，麵糊丸如緑豆大。每服三十丸，米飲下。

《席延賞方》：治虚中有熱，咳嗽膿血，口舌咽乾，又不可服凉藥。好黄耆四兩，甘草一兩，爲末。每服三錢，如茶點、羹、粥中亦可服。

肉蓯蓉　味甘、酸、鹹，微温，無毒。主五勞七傷，補中。除莖中寒熱

肉蓯蓉



痛，養五臟，强陰，益精氣，多子，婦人癥瘕，除膀胱邪氣，腰痛，止痢。久服輕身。生河西山谷及代郡雁門。五月五日採，陰乾。

《圖經》曰：舊説是野馬遺山㉕落地所生。今西人云大木門㉖及土正㉗垣中多生此，非遊牡㉘之所而乃有者，則知自有種類耳。或疑其初生於馬瀝，後乃滋殖，如茜根生於人血之類是也。草蓯蓉，性温，補男子。疑即是此物。今人鮮用，故少有辨之者，因附見於此。

《藥性論》云：肉蓯蓉，臣。益髓，悦顔色，延年，治女人血崩，壯陽，日御過倍大補益。主赤白下，補精敗，面黑，勞傷。用蓯蓉四兩，水煮令爛，薄切細研，精羊肉分爲四度，五味，以米煮粥，空心服之。

陶隱居云：代郡雁門屬并州，多馬處便有，言是野馬精落地所生。生時似肉，以作羊肉羹，補虚乏極佳，亦可生啖。苪苪河南間至多。今第一出隴西，形扁廣，柔潤，多花而味甘。次出北國者，形短而少花。巴東建平間亦有，而不如也。

陳㉙藏器序云：强筋健髓，蓯蓉、鮮㉚魚爲末，黄精酒丸服之，力可十倍。此説出《乾寧記》。

《唐本》注云：此注論草蓯蓉，陶未見肉者。今人所用亦草蓯蓉，刮去花用代肉爾。《本經》有肉蓯蓉，功力殊㉛勝。比來醫人，時有用者。

《日華子》云：治男陽不興，女陰不産，潤五臟，長肌肉，暖腰膝，男子泄精，尿血，遺瀝，帶下，陰痛。

雷公云：凡使，先須用清酒浸一宿，至明，以棕刷刷去沙土浮甲盡，劈破中心，去白膜一重，如竹絲草樣。是此偏隔人心前氣不散，令人上氣不出。凡使用，先須酒浸，并刷草了，却蒸，從午至酉，出，又用酥炙得所。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：出肅州禄福縣沙中，三月、四月掘根，切取中央好者三四寸，編穿陰乾。八月始好，皮如松子鱗甲，根長尺餘。

據本草云：即是野馬精餘瀝結成。採訪人方知勃落樹下并土塹上，此即非馬交之處，陶説誤耳。又有花蓯蓉，即是春抽苗者，力較微耳。

《衍義》曰：肉蓯蓉，《圖經》以謂皮如松子，有鱗。子字當爲殼。於義爲允。又曰：以酒浄洗，去黑汁作羹。黑汁既去，氣味皆盡。然嫩者方可作羹，老者苦。入藥，少則不效。

防風

味甘、辛，温，無毒。主大風，頭眩痛，惡風，風邪，目盲無所見，風行周身，骨節疼痹，煩懣，脊痛脊風，頭面去來，四肢攣急，字乳，金瘡，内茎㉜。久服輕身。葉，主中風熱汗出。一名銅芸，一名茼草，一名百枝，一名屏風，一名簡根，一名百蟲。生沙苑川

防風



澤及邯鄲、琅邪、上蔡。二月、十月採根，暴乾。得澤瀉、藁本療風，得當歸、芍藥、陽起石、禹餘糧療婦人子藏風，殺附子毒，惡乾薑、藜蘆、白斂、芫花。

《圖經》云：今京東、淮、浙州郡皆有之。根上黄色，與蜀葵根相類，莖、葉俱青緑色，莖深而葉淡，似青蒿而短小。初時嫩紫，作菜茹，極爽口。五月開細白花，中心攢聚作大房，似時蘿花。實似胡荽而大。二月、十月採根，暴乾。關中生者，三月、六月採，然輕虚不及齊州者良。又有石防風，出河中府，根如蒿根而黄，葉青花白，五月開花，六月採根，暴乾。亦療頭風眩痛。

《藥性論》云：防風，臣。花主心腹痛，四肢拘急，行履不得，經脉虚羸，主骨節間疼痛。段成式《酉陽雜俎》云：青州防風子，可亂蓽撥。

陶隱居云：郡縣無名沙苑。今第一出彭城、蘭陵，即近琅玡者。爵[33]州互市亦得之。次出襄陽、義陽縣界，亦可用，即近上蔡者。惟實而脂潤，頭節堅如蚯蚓頭者爲好。俗用療風最要，道方時用。

《唐本》注云：今出齊州、龍山最善，淄州、兖州、青州者亦佳。葉似牡蒿、附子苗等。《別録》云：叉頭者，令人發狂；叉尾者，發瘨疾。陶云無沙苑，誤矣。襄陽、義陽、上蔡，元無防風，陶乃妄注爾。

《日華子》云：治三十六般風，男子一切勞劣，補中，益神，風赤眼，止泪及癱緩，通利五臟，關脉，五勞七傷，羸損，盜汗，心煩體重，能安神定思[34]，勻氣脉。

《經驗後方》：治破傷風。防風、天南星等分，爲末。每服二三匙，童子小便五升，煎至四升服，愈即止。又方：治崩中。防風去蘆頭，炙赤色，爲末。每服二錢，以麵糊酒調下，更以麵糊酒投之。



蒲黄　味甘，平，無毒。主心腹膀胱寒熱，利小便，止血，消瘀血。久服輕身，益氣力，延年神仙。生河東池澤，四月採。

《圖經》曰：蒲黄，生河東池澤，香蒲，蒲黄苗也。生南海池澤，今處處有之，而太山者爲良。春初生嫩葉，未出水時，紅白色茸茸然。至夏抽梗於叢葉中，花抱梗端，如武士捧杵，故俚俗謂蒲捶，亦謂之蒲釐。花黄，即花中蕊屑也。細若金粉，當其欲開時，有便取之。市廛間亦採，以蜜搜作果食貨賣，甚益小兒。醫家又取其粉，下篩後有赤滓，謂之蒲蕚。入藥以澀腸止泄，殊勝。

陶隱居云：此即蒲釐花上黄粉也，伺其有，便拂取之，甚療血，《仙經》亦用此。

《日華子》云：蒲黄，治撲損血悶，排膿，瘡癰，婦人帶下，月候不勻，血氣心腹痛，妊孕人下血墜胎，血運，血癥，兒枕急痛，小便不通，腸風瀉血，遊風腫毒，鼻洪，吐血，下乳，止泄精，血痢。此即是蒲上黄花。入藥破血消腫即生使，補血止血即炒用。蒲黄篩下後有赤滓，名爲蕚。炒用，甚澀腸，止瀉血血痢。

雷公云：凡使，勿用松黄并黄蒿。其二件全似，只是味趄及吐人。凡欲使蒲黄，須隔三重紙焙令色黄，蒸半日，却焙令乾，用之妙。

禹錫云：按《藥性論》云：蒲黄，催生：蒲黄、地龍、陳橘皮等分，地龍洗去土，於新瓦上焙令微黄，各爲末，三處貼。如經日不産，各炒㊱一錢匕，新汲水調服，立産。此常親用之，甚妙。

《衍義》曰：蒲黄，處處有，即蒲槌中黄粉也。今京師謂槌爲蒲棒。初得血，止鼻衄，治尿血，利水道。

《千金方》：治臉上㉟，舌上生瘡，細羅，取蕚別貯，以備他用。將蒲黄水調爲膏，擘爲塊，人多食之，以解心臟虚熱，小兒尤嗜。涉月則燥，色味皆淡，須蜜水和。然不可多食，令人自利，不益極虚人。

香蒲



香蒲　味甘，平，無毒。主五臟，心下邪氣，口中爛臭，堅齒，明目，聰耳。久服輕身耐老。一名睢，一名醮。生南海池澤。

《圖經》曰：文具蒲黄條下。

陶隱居云：方藥不復用，俗人無採，彼土人亦不復識者[37]。江南貢菁茅，一名香茅，以供宗廟縮酒。或云是薰草，又云是燕麥，此蒲亦相類爾。

《唐本》注云：此即甘蒲，作薦者，春初生，用白爲菹，亦堪蒸食。山南名此蒲爲香蒲，謂昌蒲爲臭蒲。陶隱[38]菁其燕麥、薰草、香茅，乃三脊茅也。野俗皆識，都不爲類此，并非例也。蒲黄，即此香蒲花是也。

續斷

晉州



越州



續斷　味苦、辛，微温，無毒。主傷寒，補不足，金瘡，癰傷，折跌，續筋骨，婦人乳難，崩中漏血，金瘡血内漏，止痛生肌肉及踠傷，惡血，腰痛，關節緩急。久服益氣力。一名接骨，一名南草，一名槐。屬折，一名龍豆，一名續斷，生常山山谷。七月、八月採，陰乾。地黄爲之使，惡雷丸。

《圖經》曰：續斷，生常山山谷，今陝西、河中、興元有，寄[37]越、晉州亦有之。三月已後生苗，幹四棱，似苧麻，葉亦類之，兩兩相對而生。四月開花，紅白顏色，似益母花。根如大薊，赤黄色，七月、八月採。市之貨者，亦有數種，少能辨其粗良。醫人用之，但以節節斷，皮黄皺者爲真。

《藥性論》云：續斷，君。主絶傷，去諸温毒，能通宣經脉。

陶隱居云：按《桐君藥録》云：續斷生蔓延，葉細，莖如荏大，根本黄白有汁，七月、八月採根。今皆用莖葉，節節斷，皮黄皺，狀如鷄神[40]者，又呼爲桑上寄生。恐皆非真。

《唐本》注云：此藥所在山谷皆有。今俗用者，是葉似苧而莖方，根如大薊，黄白色。陶注者非。

《日華子》云：助氣，調血脉，補五勞七傷，破癥結瘀血，消腫毒，腸風，痔瘻，乳癰，瘰癧，撲損，婦人産前後一切病，面黄虚腫，縮小便，止泄精，尿血，胎漏，子宫冷。又名大薊、山牛蒡也。

雷公云：凡使，勿用草茅根，緣真似續斷，若誤用服之，令人筋軟，採得後横切剉之，又去向裏硬筋了，用酒浸一伏時，焙乾用。

《外臺秘要方》：治淋。取生續斷大薊，黄白色。陶注者非。

《子母秘録方》：治産後心悶，手足煩熱，厭厭氣欲絶，血暈，心頭硬，乍寒乍熱，增寒忍不禁。續斷皮一[41]握，絞取汁服之，馬薊根是。

漏蘆　味苦、鹹，寒、大寒，無毒。主皮膚熱，惡瘡，疽痔，濕痹，下乳汁，止遺溺，熱氣瘡癢如麻豆，可作浴湯。

漏蘆


州海


州秦


州單

久服輕身益氣，耳目聰明，不老延年。一名野蘭。生喬山山谷。八月採根，陰乾。

《圖經》曰：秦州、海州所謂漏蘆者，花葉及根頗相近，然彼人但謂之漏蘆，今醫家罕有用飛廉者。既未的識，故不復分別，但附其説於下。

陶隱居云：喬山應是黄帝所葬處，乃在上郡。今出近道亦有，療諸瘻疥，此久服甚益人，而服食方罕用之。俗中取根，名鹿驪根，苦酒摩，以療瘡疥。

《唐本》注云：此藥俗名菔蒿，莖葉似白蒿，花黄，生菔，長以㊷細麻，如箸許，有四五瓣，七月、八月後皆黑，異於衆草蒿之類也。

《日華子》云：連翹爲使。治小兒壯熱，通小腸，泄精，尿血，風赤眼，乳癰，發背，瘰癧，腸風，排膿，補血。治撲損，續筋骨，傅金瘡，止血長肉，通經脉。花、苗并同用，俗呼爲鬼油麻，形并氣味似乾牛蒡，頭上有白花子。

雷公云：凡使，勿用獨漏，緑㊸似漏蘆，只是味苦、酸，誤服令人吐不止，須細驗。夫使漏蘆，細剉，拌生甘草相對㊹，從巳至申，去甘草净揀用。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：葉似角蒿，今曹、兖州下濕地最多。六月、七月採莖，日乾之，黑於衆草。

《聖惠方》：治小兒無辜疳，肚脹或時瀉痢，冷熱不調。以漏蘆一兩，杵爲散。每服以猪肝一兩，散子一錢匕，鹽少許，以水煮熟，空心頓服。

《外臺秘要方》：治蛔蟲，漏蘆，杵，以餅羅和方寸匕，服之。

藍實


江陵府吴藍


福州馬藍

味苦，寒，無毒。主解諸毒，殺蟲蚑音其，小兒鬼也，疰鬼，螫毒。久服頭不白，輕身。其葉汁，殺百藥毒，解狼毒、射罔毒。其莖葉，可以染青。生河内平澤。

《圖經》曰：藍實，生河内平澤，今處處有之。人家蔬圃中作畦種蒔，三月、四月生苗，高三二尺許，葉似水蓼，花紅白色，實亦若蓼子而大，黑色，五月、六月採實。按藍有數種：有木藍，

出嶺南，不入藥；有草㊺藍，可以爲澱者，亦名馬藍，《爾雅》所謂蔵，馬藍是也；有蓼藍，但可染碧，而不堪作澱，即醫方所用也。

禹錫云：治蟲豸傷咬。取大藍汁一碗，入雄黄、麝香二物，隨意看多少，細研，投藍汁中，以點咬處，若是毒者，即并細服其汁，神異之極也。

張薦云：昔在劍南爲張延㊻賞判官，忽被斑蜘蛛咬項上，一宿，咬處有三道赤色，細如箸，繞項上，從胸前下至心；經兩宿，頭面腫疼如數升碗大，肚漸腫，幾至不救。張相素重薦，因出家財五百千，并薦家財又數百千，募能療者。忽一人應召，云可治。張相初甚不信，欲驗其方，遂令目前合藥。其人云：不惜方，當療人性命耳。遂取大藍汁一瓷碗，取蜘蛛投之藍汁，良久，方出得汁中，甚困不能動。又別搗藍汁，加麝香末，更取蜘蛛投之，至汁而死。又更取藍汁、麝香，復加雄黄和之，更取一蜘蛛投汁中，隨化爲水。張相及諸人甚異之，遂令點於咬處。兩日内悉平愈。但咬處作小瘡，痂落如舊。

《廣五行記》曰：永徽中，絳州僧病噎不下食。告弟子，吾死之後，便可開吾胸喉，視有何物，致㊼終而卒。弟子依言而開視，胸中得一物，形似魚而有兩頭，遍體是肉鱗。弟子致器中，跳躍不止。致㊽以諸味，皆隨化盡。時夏中藍盛作澱，有一僧以澱致器中，此蟲遂繞器中走，須臾化爲水矣。

《聖惠方》：治時氣熱毒，心神煩躁。用藍澱半大匙，以新汲水一盞服。又方：治小兒中蠱下血欲死。搗青藍汁，頻頻服半合。

《千金方》：治唇上生瘡，連年不瘥。以八月藍葉一斤，搗取汁洗，不過三日差。又方：治自經死，以藍汁灌之。又極須安定其心，徐緩解，慎勿割斷繩，抱取心下猶温者，刺鷄冠血滴著口中，即活也，男雌女用雄。

《梅師方》：治虎傷人瘡。取青布緊捲作纏，燒一頭内竹筒中，射瘡口，令烟熏入瘡中，佳。

《子母秘録方》：治小兒赤痢。搗青藍汁二升，分四服。又方：治小兒丹，藍澱傅，熱即安。

《衍義》曰：藍實，即大藍實也。謂之蓼藍非是，《爾雅》所説是。解諸藥等毒，不可闕也。實與葉兩用，注不解實，只解藍葉爲未盡。《經》所説盡矣。藍一本而有數色，刮竹青、緑雲、碧青、藍黄，豈非青出於藍而青於藍者也。生葉汁解藥毒，即大葉藍，又非蓼藍也。蓼藍即堪挼汁染翠碧，花成長穗，細小㊻，淺紅色。



絡石

絡石　味苦，温、微寒，無毒。主風熱，死肌，癰傷，口乾舌焦，癰腫不消，喉舌腫，不通，水漿不下，大驚入

腹，除邪氣，養腎，主腰髖痛，堅筋骨，利關節。久服輕身，明目，潤澤，好顏色，不老延年，通神。一名石蕊，一名略石，一名明石，一名領石，石蹉，一名懸石。生太山川谷，或石山之陰，或高山岩石上，或生人間。正月採。杜仲、牡丹爲之使，惡鐵落，畏貝母、菖蒲。

《圖經》曰：絡石，生太山川谷，或石山之陰，或高山岩上，或生人間，今在處有之。宮寺及人家亭圃山石間，種以爲飾。葉圓如細橘，正青，冬夏不凋。其莖蔓延，莖節著處，即生根鬚，包絡石，以此得名。又云：薜荔治背癰。晟頃寓宜興縣，張渚鎮有一老舉人聚村學，年七十餘，忽一日患發背，村中無他醫藥，急取薜荔葉，爛研汁，和蜜飲數升，以其滓傅瘡上，後以他藥傅貼，遂愈。醫者云：其本蓋得薜荔之力，乃知《圖經》所載不妄。

陶隱居云：不識此藥，仙、俗方法都無用者，或云是石類。既云或生人間，則非石，猶如石斛等，繫石以爲名爾。

陳藏器云：絡石，煮汁服之，主一切風，變白宜老。在石者良，在木者隨木有功。生山之陰，與[50]薜荔相似。更有木蓮、石血、地錦等十餘種藤，并是其類，大略皆主風血，暖腰脚，變白不衰。若呼石血爲絡石，殊誤爾。石血葉尖，一頭赤，絡石葉圓，正青。地錦，月採葉，暴乾。

《圖經》曰：蘼蕪《説文》已具芎藭條下。

陶隱居云：今出歷陽，處處亦有，人家多種之。葉似蛇床而香，騷人借以爲譬，方藥用甚稀。

《唐本》注云：此有二種：一種似芹葉，一種似蛇床。香氣相似，用亦不殊爾。

禹錫云：按《爾雅》云：蘄茝，蘼蕪。注：香草，葉小如萎狀。疏引郭云：如萎蕤之狀。

《廣志》曰：蘼蕪，香草。魏武帝以藏衣中。

郭璞贊曰：蘼蕪香草，亂之蛇床，喘息不通，須臾欲絶，神驗。以絡石草二兩，水一升，煎取三大盞，去滓，細細不隕其貴，自烈以芳。

營[53]**實**　味酸，温、微寒，無毒。主癰疽，惡瘡，結肉，跌筋，敗瘡，熱氣，陰蝕不瘳，利關節。久服輕身益氣。根止泄痢腹痛，五臟客熱，除邪逆氣，疽癰，諸惡瘡，金瘡傷撻，生肉復肌。一名薔薇，一名牆麻，一名牛棘，一名牛勒，一名薔蘼，一名山棘。生零陵川谷及蜀郡。八月、九月採，陰乾。

《藥性論》云：薔薇，使，味苦。子，治頭瘡白禿，主[54]五臟客熱。

陶隱居云：營實即是薔薇子，以白花者爲良。根亦可煮釀酒，莖、葉亦可煮作飲。

《日華子》云：白薔薇根，味苦、澀，冷，無毒。治熱毒風，癰疽，惡瘡，牙齒痛，治邪氣，通血經，止赤白痢，腸風瀉血，惡瘡疥癬，小兒疳風[55]肚痛。野白者用良。

雷公云：今薔薇也。凡採得，去根并用粗布拭黄毛了，用刀於槐砧上細剉，用漿水拌令濕，蒸一宿，至明出，日乾用。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：即薔薇也。葛洪治金創[56]方：用薔薇灰末一方寸匕，日三服之。

《外臺秘要方》：治鰒及刺不出。薔薇根末，水服方寸匕，日三服。

《千金方》：治癰腫發背及癰瘇已潰爛，疼痛。薔薇殼更炙熨之，即愈。又方：治小兒疳痢，行數暴多。生薔薇根洗净切，以適多少濃煎汁，稍稍飲之差。

《肘後方》：治口瘡。以根避風打去土，煮濃汁温含，冷易。《聖惠方》同。

圖經衍義本草卷之十

---

❶又方：晦明軒本作『續十全方』。
❷匙：晦明軒本作『匕』。
❸其：晦明軒本作『真』。
❹泣：原作『此』，據晦明軒本改。
❺附：原作『用』，據晦明軒本改。
❻耳：晦明軒本作『惡』。
❼服：晦明軒本作『平』。
❽而：晦明軒本作『西』。
❾縣最：原作『現敢』，據晦明軒本改。
❿粗：原作『分』，據晦明軒本改。
⓫擊：原作『繫』，據晦明軒本改。
⓬囚：晦明軒本作『因』。
⓭昔：原作『若』，據晦明軒本改。
⓮升：原作『丹』，據晦明軒本改。
⓯用：晦明軒本作『五』。
⓰頓：晦明軒本作『頻』。
⓱血：晦明軒本作『止』。
⓲經：原作『虚』，據晦明軒本改。
⓳道：晦明軒本作『通』。
⓴瘍：原作『傷』，據晦明軒本改。
㉑寸：晦明軒本作『尺』。
㉒言：晦明軒本作『宗』。
㉓癭：原作『瘦』，據晦明軒本改。
㉔焙乾：晦明軒本作『倍用』。
㉕山：晦明軒本作『瀝』。
㉖門：晦明軒本作『間』。
㉗正：晦明軒本作『塹』。
㉘牡：晦明軒本作『牝』。
㉙陳：『陳』上原有『以』字，且接『陶隱居』文后，今據晦明軒本刪『以』字，另分段。
㉚鮮：晦明軒本作『鱔』。
㉛殊：原作『味』，據晦明軒本改。
㉜莖：晦明軒本作『痙』。
㉝爵：晦明軒本作『鬱』。
㉞思：晦明軒本作『志』。
㉟臉上：晦明軒本作『重舌』。
㊱炒：晦明軒本作『抄』。
㊲者：原作『昔』，據晦明軒本改。
㊳隱：晦明軒本『隱』下有『居所引』三字。

㊴有，寄：晦明軒本作『府、舒』。
㊾神：晦明軒本作『脚』。
㊶一：原脱，據晦明軒本補。
㊷以：晦明軒本作『似』。
㊼緑：晦明軒本作『緣』。
㊹對：晦明軒本『對』下有『蒸』字。
㊼草：晦明軒本作『菘』。
㊾延：晦明軒本作『廷』。
㊼致：晦明軒本作『言』。
㊽致：晦明軒本作『戲』。
㊾小：原脱，據晦明軒本補。
㊸與：原作『南』，據晦明軒本改。
㊶濕：『濕』下原有『乾』字，據晦明軒本删。
㊷圓：原作『丸』，據晦明軒本改。下一『圓』字同。
㊸營：原作『蕪』，據晦明軒本改。
㊹主：原作『使』，據晦明軒本改。
㊺風：晦明軒本作『蟲』。
㊻創：原脱，據晦明軒本補。

圖經衍義本草卷之十一

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部上品之下

天名精

明州





天名精　味甘，寒，無毒。主瘀血，血瘕欲死，下血，止血，利小便，除小蟲，去痹，除胸中結熱，止煩渴，逐水大吐下。久服輕身，耐老。一名麥句薑，一名蝦蟆藍，一名豕首，一名天門精，一名玉門精。一名彘顱，一名蟾蜍蘭，一名覲。生平原川❶澤，五月採。垣衣爲之使。

《圖經》曰：天名精，生平原川澤，今江湖間皆有之。夏秋抽條，頗如薄荷，花紫白色，葉如菘菜而小，故南人謂之地菘。香氣似蘭，故名蟾蜍蘭。狀如藍，故名蛤蟆藍。其味甘、辛，故名麥句薑，一名豕首。《爾雅》所謂茢蓺，豕首是也。江東人用以熬炒蠶蛹。五月採此草。既名地菘，下品又有地菘。

《藥性論》云：麥句薑，使，味辛。治瘡，止血及鼻衄不止。

陶隱居云：即今人呼爲豨薟，亦名豨首。夏月搗汁服之，除熱病。味至苦，而云甘，恐或非是。

陳藏器云：天名精，《本經》一名麥句薑。蘇云：鹿活草也。《爾雅》云：大鞠，蘧麥。注云：麥句薑，蘧麥，即今之瞿麥，然終非麥句薑，《爾雅》注錯如此。陶公注鈎樟條云：有一草，似狼牙，氣辛臭，名爲地菘，人呼

爲劉燼草，主❷金瘡，言劉燼昔曾用之。《異苑》云：青州劉燼，宋元嘉中，射獐，剖五臟，以此草塞之，蹶然而起，燼怪之拔草，便倒，如此三度。燼密録此草種之，主傷折多愈，因以名焉。既有活鹿之名，雅與獐事相會。陶、蘇兩説俱是地菘，功狀既同，定非二物。

《唐本》注云：鹿活草是也。《别録》一名天蔓菁，南人名爲地菘，味甘、辛，故有薑稱；狀如藍，故名蛤蟆藍，香氣似蘭，故名蟾蜍蘭。主破血，生肌，止渴，利小便，殺三蟲，除諸毒腫，丁瘡，瘻痔，金瘡内射。身癢，癮疹不止者，揩之立已，其豨薟苦❸而臭，名精乃辛而香，全不相類。

《爾雅》云：茢蓺，豕首。釋曰：藥名也。一名麥秋❹薑。郭云：江東豨首，可以炒蠶蛹者。《三蒼》云：炒，熬也。

决明子　味鹹、苦、甘，平、微寒，無毒。主青盲，目淫，膚赤，白膜，眼赤痛，泪出，療唇口青。久服益精光，輕身。生龍門川澤。石决明生豫章。十月十日採，陰乾百日。蓍實爲之使，惡大麻子。



决明子

《圖經》曰：决明子，生龍門川澤，今處處有之，人家園圃所蒔。夏初生苗，高三四尺許，根帶紫色。葉似苜蓿而大。七月有花，黄白花。其子作穗，如青緑豆而鋭，十月十日採，陰乾百日。

《藥性論》云：决明，臣。利五臟，常可作菜食之。又除肝家熱，朝朝取一匙，挼令净，空心吞之，百日夜見光。

陶隱居云：龍門乃在長安北。今處處有之。葉如茳芏，子形似馬蹄，呼爲馬蹄决明。用之當搗細。又别有草决明，是萋蒿子，在下品中也。

《日華子》云：馬蹄决明，助肝氣，益精。水調末塗消腫毒。協太陽穴治頭痛。又貼腦心止鼻洪。作枕勝黑豆，治頭風，明目也。

禹錫云：按《唐本》云：石决明，是蚌蛤類，形似紫貝❺，附見别出在魚獸條中，皆主明目，故并有决明之名。俗方惟以療眼也，道術時須。

《蜀本圖經》云：葉似苜蓿而闊大，夏花，秋生子作角，實似馬蹄，俗名馬蹄决明。今出廣州、桂州，十月採子，陰乾。

《外臺秘要方》：治積年失明不識人。决明子二升杵散，食後以粥飲服方寸匕。

《衍義》曰：决明子，苗高四五尺，春亦爲蔬。秋深結角，其子生角中如羊腎。今湖南、北人家園圃所種甚多，或在村野或成段種。《蜀本圖經》曰：葉似苜蓿而闊大，甚爲允當。

丹參

州隨



丹參　味苦，微寒，無毒。主心腹邪氣，腸鳴幽幽如走水，寒熱積聚，破癥除瘕，止煩滿，益氣，養血，去心腹痼疾，結氣，腰脊强，脚痹，除風邪留熱。久服利人。一名郄蟬草，一名赤參，一名木羊乳。生桐柏山川谷及太山。五月採根，暴乾。畏鹹水，反藜蘆。

《圖經》曰：丹參，生桐柏山川谷及太山，今陝西、河東州郡及隨州亦有之。二月生苗，高一尺許。莖幹方棱，青色。葉生相對，如薄荷而有毛。三月開花，紅紫色似蘇花。根赤大如指，長亦尺餘，一苗數根。五月採，暴乾。又云：冬月採者良，夏月採者虛惡。

《藥性論》云：丹參，臣，平。能治脚弱疼痹，主中惡，治百邪鬼魅，腹痛，氣作聲音鳴吼，能定精神。陶隱居云：桐柏山，在義陽，非江東臨海之桐柏也。今近道處處有。莖方有毛，紫花，時人呼爲逐馬。酒漬飲之療風痹。道家時有用處，時人服多眼赤，故應性熱；今云微寒，恐爲謬矣。

《日華子》云：養神定志，通利關脉，治冷熱勞，骨節疼痛，四肢不遂，排膿止痛，生肌長肉，破宿血，補新生血，安生胎，落死胎，止血崩帶下，調婦人經脉不勻，血邪心煩，惡瘡疥癬，癭贅腫毒，丹毒，頭痛赤眼，熱温狂悶。又名山參。

蕭炳云：酒浸服之，治風軟脚，可逐奔馬，故名奔馬草，曾用有效。

《聖惠方》：治寒疾❻，小腹及陰中相引痛，白汗出欲死。丹參二❼兩，杵爲散。每服熱酒調下二錢匕。

《千金方》：治落胎，身下有血。丹參十二兩，以酒五升，煮取二❽升，温服一升，温三服。

《梅師方》：治中熱油及火燒，除外痛。丹參八兩，細剉，以水微調，取羊脂二斤，煎三上三下，以傅瘡上。《肘後方》同。

茜根



茜根　味苦，寒，無毒。主寒濕風痹，黄疸，補中，止血，内崩，下血，膀胱不足，踒跌，蠱毒。久服益精氣，輕身。可以染絳。一名地血，一名茹蘆，一名蒨。生喬山川谷。二月、三月採根，暴乾。畏鼠姑。

《圖經》曰：陸機《草木疏》云：茹蘆，茅鬼❾，一名蒨。生喬山川谷。二月、三月採根，暴乾。

《藥性論》云：茜根，味甘。主治六極傷心肺，吐血瀉血用之。

陶隱居云：此則今染絳茜草也。東間諸處乃有而少，不如西多。今俗道、經方不堪❿服用。此當以其爲療少

而豐賤故也。《詩》云茹藘在坂者是。

陳藏器云：茜根，主蠱，煮汁服之。今之染緋者，字亦作蒨。《周禮·庶氏⑬掌》除蠱毒，以嘉草攻之。嘉草、蘘荷與茜，主蠱爲最也。

《日華子》云：味醶。止鼻洪，帶下，産後血運，乳結，月經不止，腸風，痔瘻，排膿，治瘡癤，泄精，尿血，撲損，瘀血，酒煎服。殺蠱毒，入藥剉、炒用。

雷公云：凡使，勿用赤柳草根，真似茜根，只是味酸澀，不入藥中用，若服，能令人患内障眼，速服甘草水解之，即毒氣散。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：染緋草，葉似棗葉，頭尖下闊，莖葉俱澀，四五葉對生節間，蔓延草木上，根紫赤色。令所在有，八月採根。

《簡要濟衆方》：治吐血。茜草一兩，生搗羅爲散。每服二錢，水一中盞，煎⑬七分，放冷，食後服。

《傷寒類要方》：治中蠱毒，或吐下血如爛肝。茜草根、蘘荷葉根各三兩切，以水四升，煮取一服⑭，去滓，適寒温，頓服即愈。

五味子

越州



號州

五味子　味酸，温，無毒。主益氣，咳逆上氣，勞傷羸瘦，補不足，强陰，益男子精，養五臟，除熱，生陰中肌。一名會及，一名玄及。生齊山山谷及代郡。八月採實，陰乾。蓯蓉爲之使，惡萎蕤，勝烏頭。

《圖經》曰：今河東、陝西州郡尤多，而杭越間亦有。春初生苗，引赤蔓於高木，其長六七尺。葉尖圓似杏葉。三四月開黄白花，類小蓮花。七月成實，如豌豆許大，生青熟紅紫。《爾雅》云：菋，荎藸。注云：五味也。蔓生，子叢莖端。疏云：一名菋，一名荎藸。今有數種，大抵相近，而以味甘者爲佳。

《藥性論》云：五味子，君。能治中下氣，止嘔逆，補諸虚勞，令人體悦澤，除熱氣，病人虚而有氣兼嗽，加用之。

陶隱居云：今第一出高麗，多肉而酸甜；次出青州、冀州，味過酸，其核并似猪腎。又有建平者少肉，核形不相似，味苦，亦良。此藥多膏潤，烈日暴之，乃可搗篩，道方亦須用。

《唐本》注云：五味，皮肉甘、酸，核中辛、苦，有鹹味，此則五味具也。

《日華子》云：明目，暖水臟，治風下氣，消食，霍亂轉筋，痃癖，賁豚，冷氣，消水腫，反胃，心腹氣脹，止渴，除煩熱，解酒毒，壯筋骨。

雷公云：凡小顆皮皺治⑮者，有白撲鹽霜一重，其味酸、鹹、苦、辛、甘，味全者真也。

《抱朴子》云：移門子服五味子十六年，面⑯色如玉女，入水不沾，入火不灼。

《衍義》曰：五味子，今華州之西至秦州皆有之。方紅熟時，採得蒸爛，研濾汁去子，熬成稀膏。量酸甘入蜜，再火上，待蜜熟，俟冷，器中貯，作湯。肺虛寒人可化爲湯，時時服。作果，可以寄遠。《本經》言温，令食之，多致虛熱，小兒益甚。《藥性論》以謂除熱氣。《日華子》云謂暖水臟，又曰除煩熱。後學至此多惑。今既用之治肺虛寒，則更不取除煩熱之説。補下藥亦用之。入藥生曝不去子。

旋花

味甘，温，無毒。主益氣，去面皯⑰黑色，媚好。其根味辛，主腹中寒熱邪氣，利小便。久服不饑⑱，輕身。一名筋根花，一名金沸，一名美草。生豫州平澤。五月採，陰乾。

《圖經》曰：南人皆呼⑲爲續筋根。苗作叢蔓，葉似山芋而狹長。花白，夏秋間遍田野。根無毛節，蒸煮堪啖，甚甘美。五月採花，陰乾。二月、八月採根，日乾。花今不見用者，下品有旋復花，與此殊別。

陶隱居云：東人呼爲山薑，南人呼爲美草。根似杜若，亦似高良薑。



旋花

州池

根，日乾。花今不見用者，下品有旋復花，與此殊別。

陶隱居云：東人呼爲山薑，南人呼爲美草。根似杜若，亦似高良薑。五月採花，陰乾。二月、八月採根，日乾。花今不見用者，下品有旋復花，與此殊別。

陶隱居云：東人呼爲山薑，南人呼爲美草。根似杜若，亦似高良薑。

《唐本》注云：此即生平澤，旋葍是也。

陶注誤，而唐注是也。

《唐本》注云：此即生平澤，旋葍是也。其根似筋，故一名筋根。旋徐兗反，陶所證真山薑爾。陶復於下品旋葍注中云：此根出河南，北國來，根似芎藭，惟膏中用。今復道似高良薑，二説自相矛盾。且此根味甘，山薑味辛，都非此類。其旋葍膏療風逐水，止用花，言根亦無妨，然不可以杜若亂之也。又將旋葍花名金沸，作此別名，非也。《別録》云：根，主續筋也。

《救急方》：續斷筋法：取旋葍草根，净洗去土，搗量瘡大小傅之，日一易之，乃瘥止。一名肫腸草，俗謂鼓子花也。黔南出一種旋花，粗莖，大葉，無花，不作蔓，恐別是一物也。

《衍義》曰：旋花，蔓生，今之河北、京西、關陝田野中甚多，最難鋤艾，治之又生。世人謂之鼓子花，言其形肖也。四五月開花，亦有多葉者，其根寸截置土下，頻灌溉，方涉旬，苗已生。

《蜀本圖經》是矣。


南州

蛇牀子

蛇牀子　味苦、辛、甘，平，無毒。主婦人陰中腫痛，男子陰痿，濕癢，除痹氣，利關節，癲癇，惡瘡，温中下氣，令婦人子藏熱，男子陰强。久服輕身，好顏色，令人有子。一名蛇粟，一名蛇米，一名虺床，一名思益，一名繩毒，一名臨淄川谷及田野。五月採實，陰乾。貝母。

《圖經》曰：蛇床子，三月生苗，高二三尺，葉青碎作叢似蒿枝，每枝上有花頭百餘，結同一窠似馬芹類。四五月開白花，又似散水。子黄褐色如黍米，至輕虚。五月採實，陰乾。

《藥性論》云：蛇床子，君。有小毒。治男子、婦人虚，濕痹，毒風瘡⑳痛，去男子腰疼，浴男女陰，去風冷，大益陽事。主大風身癢，煎湯浴之差。療齒痛及小兒驚癇。

陶隱居云：近道田野墟落間甚多。花、葉正似蘼蕪。

《爾雅》一名盱。

《日華子》云：治暴冷，暖丈夫陽氣，助女人陰氣，撲損瘀血，腰跨疼，陰汗，濕癬，四肢頑痹，赤白帶下，縮小便。凡合藥取㉑食，即授去皮殼，取仁微炒殺毒，即不辣。作湯洗病則生使。

雷公云：凡使，須用濃藍汁，并百部草根自然汁，二味同浸二伏時，漉出日乾。却用生地黄汁相拌蒸，從午至亥，日乾。用此藥只令陽氣盛數，號曰鬼考也。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：似小葉芎藭，花白，子如黍粒，黄白色。生下濕地，今所在皆有，出揚州、襄州者良。採子暴乾。

《千金方》：治産後陰下脱。蛇床子絹袋盛，蒸熨之。又方：治小兒癬瘡。蛇床子末，和猪脂塗之。

《金匱方》：温中坐藥蛇床子散方：蛇床子仁爲末，以白粉少許和令勻相得，如棗大，綿裹内之，自然温矣。


密州　蜀州

地膚子

地膚子　味苦，寒，無毒。主膀胱熱，利小便，補中益精氣，去皮膚中熱氣，散惡瘡疝瘕，强陰。久服耳目聰明，輕身耐老，使人潤澤。一名地葵，一名地麥。生荆州平澤及田野。八月、十月採實，陰乾。

《圖經》曰：地膚子，生荆州平澤及田野，今蜀川、關中近地皆有之。初

生薄地五六寸，根形如蒿，莖赤葉青，大似荊芥。三月開黃白花，八月、九月採實，陰乾用。陶隱居謂莖苗可爲掃帚者。蘇恭云：苗極弱，不能勝舉。二說不同，而今醫家便以爲獨掃是也。故蘇注云其葉味苦，寒，無毒。主大腸泄瀉，止赤白痢，和氣，澀腸胃，解惡瘡毒。三四月、五月採。

《藥性論》云：地膚子，君。一名益明。與陽起石同服，主丈夫陰痿不起，補氣益力，治陰卵癕疾，去熱風，可作湯沐浴。

陶隱居云：今田野間亦多，皆取莖苗爲掃帚。子微細，入補丸散用，《仙經》不堪用。

《唐本》注云：地膚子，田野人名爲地麥草，葉細莖赤，多出熟田中。苗極弱，不能勝舉。今云堪爲掃帚，恐人未識之。《別録》云：搗絞取汁，主赤痢，洗目去熱，暗雀盲。苗灰，主痢亦善。北人亦名涎衣草。

《外臺秘要方》：治目痛及眯忽中傷，因有熱瞑者。取地膚子白汁㉒注目中。又方：治手足煩疼。地膚草三兩，水四升，煮取二升半。分三服，日一劑。

《肘後方》：治積年久疢腰痛，有時發動。六月、七月取地膚子乾末，酒服方寸匕，日五六服。

《子母秘録方》：治妊娠患淋，小便數，去少，忽熱痛酸索，手足疼煩。地膚草三兩，以水四升，煮取二升半，三服。

千歲蘽

州兗



千歲蘽　汁味甘，平，無毒。主補五臟，益氣，續筋骨，長肌肉，去諸痹。久服輕身不饑，耐老，通神明。一名蘽蕪。生太山川谷。

《圖經》曰：千歲蘽，生太山川谷。作藤生，樹如葡萄，葉如葡萄而小。四月摘其莖，汁白而甘。五月開花，七月結實，八月採子，青黑微赤。冬惟凋葉。此即《詩》云葛蘽者也。蘇恭謂是蘡薁藤，深爲誤妄。陶隱居、陳藏器説最得之。

陶隱居云：作藤生，樹如葡萄，葉如鬼排㉓，蔓延木上，汁白。今俗人方藥，都不復識用此，《仙經》數處須之。而遠近道俗咸不識此，非甚是異物，正是未研訪尋識之爾。《草木疏》云：一名苣菰㉔，連蔓而生，子赤可食。《毛詩》云：葛蘽。注云：似葛之草也。此藤大者盤薄，故云千歲蘽，謂蘡薁者，深是妄言。

《日華子》云：味甘、酸。止渴，悦色。年多大者佳，莖葉同用，又名蘡薁藤。

《衍義》曰：千歲蘽，唐開元末，訪隱民姜撫，已幾百歲。召至集賢院。言服常春藤，使白髮還黰，則長生可

致。藤生太湖，終南往往有之。帝遣使多取，以賜老臣。詔天下使自求之。擢撫銀青光禄大夫，號沖和先生。又言終南山有旱藕，餌之延年，狀類葛粉。帝取之作湯餅，賜大臣。右驍騎將軍甘守誠曰：常春者千歲蘘也，旱藕者杜㉕蒙也。方家久不用，撫易名以神之。民間以酒漬藤飲者，多暴死，乃止。撫内慚，請求藥牢山，遂逃去。今書之以備世疑。

景天



景天　味苦、酸，平，無毒。主大熱火瘡，身熱煩，邪惡氣，諸蠱毒，痂疕，寒熱風痹，諸不足。久服通神不老。下赤白，輕身明目。花，主女人漏一名戒火，一名火母，一名救火，一名據火，一名慎火。生太山川谷。四月四日、七月七日採，陰乾。

《圖經》曰：景天，生太山山谷，今南北皆有之，人家多種於中庭，或以盆盛植於屋上，云以辟火，謂之慎火草。春生苗，葉似馬齒而大，作層而上，莖極脆弱。夏中開紅紫碎花，秋後枯死。

陶隱居云：今人皆盆盛，養之於屋上，即知是草藥。又言廣州城外有一株，云可三四圍，呼爲慎火木。既曰云，即非親見也。蓋是傳聞，亦非誤耳，乃陶之輕聽也。然極易種，但折生枝置土中，頻澆漑，旬日便生根，濃研取汁，塗火心瘡，甚驗。乾爲末，水調，掃游風、赤瘨頻熱者。

茵蔯蒿

茵蔯蒿　味苦，平、微寒，無毒。主風濕，寒熱，邪氣，熱結，黄疸，通身發黄，小便不利，除頭熱，去伏瘕。久服輕身，益氣耐老，面白悦長年。白兔食之仙。生太山及丘陵坡岸上。五月五日採，陰乾。

《圖經》曰：江寧府又有一種茵蔯，葉大根粗，黄白色，至夏有花實。階州有一種名白蒿，亦似青蒿而背白，本土皆通入藥用之。今南方醫人用山

茵蔯蒿





茵蔯，乃有數種。本草論之，但有茵蔯蒿，而無山茵蔯。本草注云：茵蔯蒿葉似蓬蒿而緊細。今京下北地用爲山茵蔯者是也。大體世方用山茵蔯療腦㊲，解傷寒發汗，行肢節滯氣，化痰利膈，治勞倦。諸家議論，謂家茵蔯亦能解肌下膈，去胸中煩。方家少用，但可研作飲服之。本草所無，自出俗方。茵蔯蒿復當別是一物，主療自異，不得爲山茵蔯，此説亦未可據。但以功較之，則江南者爲勝。

《藥性論》云：茵蔯蒿，使，味苦、辛，有小毒。治眼目通身黃，小便赤。

陶隱居云：今處處有，似蓬蒿而葉緊細，莖，冬不死，春又生。惟入療黃疸用。《仙經》云：白蒿，白兔食之仙。而今茵蔯乃云此，恐是誤爾。

陳藏器云：茵蔯本功外，通關節，去滯熱，傷寒用之。雖蒿類，苗細經冬不死，更因舊苗而生，故名茵蔯，後加蒿字也。今又詳：此非菜中茵蔯也。

《日華子》云：石茵蔯，味苦，涼，無毒。治天行時疾，熱狂，頭痛頭旋，風眼疼，瘴瘧，女人癥瘕，并悶損乏絶。又名茵蔯蒿、山茵蔯。本出和州及南山，嶺上皆有。

雷公云：凡使，須用葉有八角者，採得陰乾，去根細剉用，勿令犯火。

《千金方》：治遍身風癢，生瘡疥。茵蔯不計多少，煮濃汁洗之，立瘥。

《食醫心鏡》：茵蔯，主除大熱，黃疸，傷寒頭痛，風熱瘴癘，利小便。切煮羹，生食之亦宜。

《衍義》曰：茵蔯蒿，使，味苦、辛，有小毒。治眼目通身黃，小便赤。

陶隱居云：今處處有，似蓬蒿而葉緊細，莖，冬不死，春又生。惟入療黃疸用。《仙經》云：白蒿，白兔食之仙。而今茵蔯乃云此，恐是誤爾。

陳藏器云：茵蔯本功外，通關節，去滯熱，傷寒用之。雖蒿類，苗細經冬不死，更因舊苗而生，故名茵蔯，後加蒿字也。今又詳：此非菜中茵蔯也。

《日華子》云：石茵蔯，味苦，涼，無毒。治天行時疾，熱狂，頭痛頭旋，風眼疼，瘴瘧，女人癥瘕，并悶損乏絶。又名茵蔯蒿、山茵蔯。本出和州及南山，嶺上皆有。

雷公云：凡使，須用葉有八角者，採得陰乾，去根細剉用，勿令犯火。

《千金方》：治遍身風癢，生瘡疥。茵蔯不計多少，煮濃汁洗之，立瘥。

《食醫心鏡》：茵蔯，主除大熱，黃疸，傷寒頭痛，風熱瘴癘，利小便。切煮羹，生食之亦宜。

杜若



味辛，微温，無毒。主胸脅下逆氣，温中，風入腦户，頭痛腫，多涕泪出，眩倒目瞎瞎莫郎切，止痛，除口臭氣。久服益精，明目，輕身，令人不忘。一名杜蘅，一名杜蓮，一名白蓮，一名

白苓㊀，一名若芝。生武陵川澤及冤句。二月、八月採根，暴乾。得辛夷、細辛良，惡柴胡、前胡。

《圖經》曰：杜若，生武陵川澤及冤句，今江湖多有之。葉似薑花赤色，根似高良薑而小辛味，子如豆蔻。二月、八月採根暴乾用。謹按：此草一名杜蘅，而中品自有杜蘅條。杜蘅，《爾雅》所謂土鹵者也。杜若，《廣㊁雅》所謂楚蘅者也。

陶隱居云：今處處有。葉似薑而有文理，根似高良薑而細，味辛香。又絶似旋復根，殆欲相亂，葉小異爾。《楚辭》云：山中人兮芳杜若。此者一名杜蘅，今復別有杜蘅，不相似。

雷公云：凡使，勿用鴨喋草根，真相似，只是味效不同。凡修事，採得後，刀刮上黄赤皮了，細剉，用三重絹作袋盛，陰乾。臨使以蜜浸一夜，至明漉出用。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：苗似山薑，花黄赤，子赤色，大如棘子，中似豆蔻。今出硤州、嶺南者好。

沙參



淄州　歸州

沙參　味苦，微寒，無毒。主血積驚氣，除寒熱，補中，益肺氣，療胃痹心腹痛，結熱邪氣，頭痛，皮間邪熱，安五臟，補中。久服利人。一名知母，一名苦心，一名志取，一名識美，一名文希。生河内川谷及冤句、般陽續山，二月、八月採根，暴乾。古方亦單用。葛洪卒得諸疝，小腹及陰中相引痛如絞，白汗出欲死者，搗篩末，酒服方寸匕，立差。

《藥性論》云：沙參，臣。能去皮肌浮風，疝氣下墜，治常欲眠，養肝氣，宣五臟風氣。

陶隱居云：今出近道。叢生，葉似枸杞，根白實者佳。此沙參并人參是爲五參，其形不盡相類，而主療頗同，故皆有參名。又有紫參，正名牡蒙，在中品。

《唐本》注云：紫參、牡蒙，各是一物，非異名也。今沙參出華州爲善。

《日華子》云：補虚，止驚煩，益心肺，并一切惡瘡疥癬及身癢，排膿，消腫毒。

徐長卿

徐長卿　味辛，温，無毒。主鬼物百精，蠱毒疫疾，邪惡氣，温瘧。久服强悍輕身，益氣延年。一名鬼督郵。生太山山谷及隴西。三月採。

《圖經》曰：徐長卿，生太山山谷及隴西，今淄、齊、淮、泗間亦有之。三

徐長卿


淄州


泗州

月生青苗，葉似小桑，兩兩相當，而有光潤。七八月著子，似蘿摩而小。

陶隱居云：鬼督郵之名甚多。今俗用徐長卿者，其根正如細辛，小短扁爾，氣亦相似。今狗脊散用鬼督郵，當取其强悍宜腰脚，所以知是徐長卿，而非鬼箭、赤箭。

《唐本》注云：此藥葉似柳，兩葉相當，有光澤，所在川澤有之。根如細辛，微粗長，而有臊㉛氣。今俗用代鬼督郵，非也。鬼督郵別有本條在下。

雷公云：凡採得，粗將㉜，拌少蜜令通㉝，用瓷器皿盛，蒸三伏時，日乾用。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：苗似小麥，兩葉相對，三月苗青，七月、八月著子，似蘿摩子而小，九月苗黃，十月凋。生下濕川澤之間，今所在有之，八月採，日乾。

味苦，微寒，微温，無毒。主療蛔蟲及不消食爾。

今按：《別本》注：《別録》云：微温，今之服用能除熱，蓋不温也。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：莖如綖，叢生，俗名龍鬚草。今人以爲席，所在有之。八月、九月採根，暴乾。

石龍芻

主心腹邪氣，小便不利，淋閉，風濕，鬼疰惡毒，補内虚不足，瘡滿，身無潤澤，出汗，除莖中熱痛，殺鬼疰惡毒氣。久服補虚羸，輕身，耳目聰明，延年。一名龍鬚，一名草續斷，一名龍珠，一名龍華，一名懸莞，一名草毒。九節多味者良，生梁州山谷濕地。五月、七月採莖，暴乾。

陶隱居云：莖青細相連，實赤，今出近道水石處，似東陽龍鬚以作席者，但多節爾。

陳藏器云：按龍鬚作席，彌敗有垢者，取方尺煮汁服之。主淋及小便卒不通。今出汾州，亦處處有之。

《唐本》注云：《別録》云，一名方賓。主療蛔蟲及不消食爾。

今按：《別本》注：《別録》云：微温，今之服用能除熱，蓋不温也。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：莖如綖，叢生，俗名龍鬚草。今人以爲席，所在有之。八月、九月採根，暴乾。

雲實


瀛州

味辛、苦，温，無毒。主泄痢腸澼，殺蟲蠱毒，去邪惡結氣，止痛，除寒熱，消渴。花，主見鬼精物，多食令人狂走，殺精物，下水。燒之致鬼。久服輕身通神明，益壽。一名員實，一名雲英，一名天豆。生河間川谷。十月採，暴乾。

《圖經》曰：雲實，生河間川谷。高五六尺，葉如槐而狹長，枝上有刺。苗名臭草，又名羊石子草。花黃白色，實若麻子大，黃黑色，俗名馬豆。十月

採，暴乾用。今三月、四月採苗，五月、六月採實，實過時即枯落。治瘧藥中多用之。

陶隱居云：今處處有。子細如葶藶而小黑，其實亦類莨菪。燒之致鬼，未見其法術。

《唐本》注云：雲實大如黍及大麻子等，黃黑似豆，故名天豆。叢生澤傍，高五六尺。葉如細槐，亦如苜蓿。枝間微刺。俗謂苗爲草雲母。陶云似葶藶，非也。

雷公云：凡使，採得後粗搗，相對拌渾顆豫[84]實，蒸一日後出用。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：葉似細槐，花黃白，其莢如大豆，實青黃色，大若麻子。今所在平澤中有。五月、六月採實。

王不留行



王不留行

河中府

成德軍

《圖經》曰：王不留行，生太山山谷，今江浙及并河近處皆有之。苗莖俱青，高七八寸已來。根色黃如薺根，葉尖如小匙頭，亦有似槐葉者。四月開花，黃紫色，隨莖而生，如菘子狀，又似猪藍花。五月內採苗莖，曬乾用。俗間亦謂之剪金草。河北生者，葉圓花紅，與此小別。張仲景治金瘡，八物王不留行散，小瘡粉其中，大瘡但服之，產婦亦服。《正元廣利方》療諸風瘂，有王不留行湯最好。

陶隱居云：今處處有。人言是蓼子，亦不爾。葉似酸漿，子似菘子。而多入癰瘦方用之。

《日華子》云：治發背遊風、風疹，婦人血經不勻及難產。根、苗、花、子通用，又名禁宮花、剪金花。

雷公云：凡採得拌渾蒸，從巳至未，出，却下漿水浸一宿，至明出，焙乾用之。

《梅師方》：治竹木針刺在肉中不出，疼痛。以王不留行爲末，熟水調方寸匕，即出。

地不容



地不容　味苦，大寒，無毒。主解蠱毒，止煩熱，辟瘴癘，利喉閉及痰毒。一名解毒子。生山西谷。採無時。

《圖經》曰：地不容，生戎州。味

苦，大寒，無毒。蔓生，葉青，如杏葉而大，厚硬，凌冬不凋，無花實。根黃白色，外皮微粗褐，累累相連，如藥實而圓大。能解蠱毒，辟瘴氣，治咽喉閉塞，鄉人亦呼爲解毒子也。

飛廉　味苦，平，無毒。主骨節熱，脛重酸疼，頭眩頂重，皮間邪風如蜂螫針刺，魚子細起，熱瘡癰疽痔，濕痹，止風邪咳嗽[35]，下乳汁。久服令人身輕，益氣，明目，不老，可煮可乾。一名漏蘆，一名天薺，一名伏猪，一名木禾。輕，一名伏兔，一名飛雉，一名水生河內川澤。正月採根，七月、八月採花，陰乾。得烏頭良，惡麻黃。

陶隱居云：處處有之，似苦芙，惟葉下附莖，輕有皮起似箭羽，葉又多刻缺，花紫色。俗方殆無用，而道家服其枝莖，可得長生，又入視[36]枕方。今既別有漏蘆，則非此別名爾。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：葉似苦芙，莖似軟羽，紫[35]花，子毛白。今所在平澤皆有，五月、六月採。蕭炳云：小兒疳痢，爲散，以漿水下之，大效。

《千金翼方》：治疳蠹食口齒及下部。飛廉蒿燒灰搗篩，以兩錢匕著痛處，甚痛忍之；若不痛，非疳也。下部蟲如馬尾大，相纏出無數。十日瘥，二十日平復。

蘭草　味辛，平，無毒。主利水道，殺蠱毒，辟不祥，除胸中痰癖。久服令人服益氣，輕身，不老，通神明。一名水香。生大吳池澤。四月、五月採。

《衍義》曰：蘭草，諸家之說異，同是曾未的識，故無定論。葉不香，惟花香。今江陵、鼎、澧州山谷之間頗有，山外平田即無，多生陰地，生於幽谷，葉如麥門冬而闊，且韌，長及一二尺，四時常青，花黃，中間葉上有細紫點，有春芳者，爲春蘭，色深；秋芳者，爲秋蘭，色淡。秋蘭稍難得，二蘭移植小檻中，置座右，花開時，滿室盡香，與他花香又別。唐·白樂天有種蘭不種艾之詩，正爲[35]此蘭矣。今未[35]見用者。《本經》蘇注：八月花白，此即澤蘭也。

忍冬　味甘，温，無毒。主寒熱身腫。久服輕身，長年益壽。十二月採，陰乾。

陶隱居云：今處處皆有，似藤生，凌冬不凋，故名忍冬。人取煮汁以釀酒，補虛療風。《仙經》少用。此既長年益壽，甚可常採服。凡易得之草，而人多不肯爲之，更求難得者，是貴遠賤近之情乎？

禹錫云：按《藥性論》云：忍冬亦可單用。味辛，主治腹脹滿，能止氣下辟[40]。

《肘後方》：飛尸者，遊走皮膚，穿臟腑，每發刺痛，變作無常；遁尸者，附骨入肉，攻鑿血脉，每發不可得近，見尸喪聞哀哭便作；風尸者，淫躍四肢，不知痛之所在，每發昏悶，得風雪便作；沉尸者，纏骨結臟，衝心脅，每發絞切，遇寒冷便作；尸注者，舉身沉重，精神錯雜，常覺昏廢，每節氣改變，

輒發大惡。此一條別有治後熨也。忍冬莖葉，剉數斛，煮令濃，取汁煎之服如鷄子一枚，日二三服。

薇銜　味苦，平、微寒，無毒。主風濕痹，歷節痛，驚癇吐舌，悸氣賊風，鼠瘻癰腫，暴癥，逐水，療痿蹶。久服輕身明目。一名糜銜，一名承膏，一名承肌，一名無心，一名無顛。生漢中川澤及冤句、邯鄲。七月採莖、葉，陰乾。得秦皮良。

陳藏器云：婦人服之，絶産無子。《唐本》注云：此草叢生，似茺蔚及白頭翁，其葉有毛，莖赤。療賊風大效。南人謂之吴風草，一名鹿銜草，言鹿有疾，銜此草差。又有大小二種，楚人猶謂大者爲大吴風草，小者爲小吴風草也。

白兔藿　味苦，平，無毒。主蛇虺、蜂蠆、猘狗、菜肉、蠱毒，鬼疰、風疰，諸大毒不可入口者，皆消除之。又去血，可末著痛上，立消。毒入腹者，煮飲之即解。一名白葛。生交州山谷。

陶隱居云：此藥療毒，莫之與敵，而人不復用，殊不可解，都不聞有識之者，想當似葛爾，須別廣訪，交州人未得委悉。

《唐本》注云：此草荆、襄間山谷大有，苗似蘿摩，葉圓厚，莖俱有白毛，與衆草異，蔓生，山南俗謂之白葛。用療毒有效。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：蔓生，葉圓若蓴，今襄州北、汝州南岡上有。五月、六月採苗，日乾。

《海藥》云：主風邪熱極，宜煮白兔藿飲之。乾則搗末，傅諸毒妙。

鬼督郵　味辛、苦，平，無毒。主鬼疰、卒忤中惡，心腹邪氣，百精毒，温瘧疫疾，强腰脚，益膂力。一名獨摇草。

《唐本》注云：苗惟一莖，葉生莖端若傘，根如牛膝而細黑。所在有之。有亦叢生，今人以徐長卿代之，非也。唐本先附。

雷公云：凡採并細剉了，搗，用生甘草水煮一伏時，漉出用也。

白花藤　味苦，寒，無毒。主解諸藥、菜、肉中毒。酒漬服之，主虚勞風熱。生嶺南、交州、廣州平澤。

《唐本》注云：苗似野葛而白花。根皮厚，肉白，其骨柔於野葛。唐本先附。

雷公云：凡使，勿用菜花藤，緣真似白花藤，只是味不同。菜花藤酸澀，不堪用。其白花藤，味甘香，採得後去根細剉，陰乾用之。

人肝藤　主解諸毒藥，腫遊風，脚手軟痹。并研服之，亦煮服之，亦傅病上。生嶺南。葉三椏，花紫色。一名承露仙。又有伏鷄子，亦名承靈仙，葉圓，與此名同物異。

《海藥》云：《廣志》云：生嶺南山石間，引蔓而生。主蟲毒及手脚不遂等風。生研服。

越王餘算　味鹹，平，無毒。主下水，破結氣。生南海水中，如竹算子，長尺許。《異苑》曰：晋安有越王餘算，葉白者似骨，黑者似角。云是越王行海作籌有餘，棄於水中而生。

《海藥》云：味鹹，温。主水腫浮氣，結聚宿滯不消，腹中虚鳴，并宜煮服之。

石蓴　味甘，平，無毒。下水，利小便。生南海中水石上。《南越志》云：似紫菜，色青。《臨海異物志》曰：附石生也。

《海藥》云：主風秘不通，五膈氣，并小便不利，臍下結氣，宜煮汁飲之。胡人多用治耳疾。

海根　味苦，小温，無毒。主霍亂中惡，心腹痛，鬼氣注忤，飛尸，喉痹，蠱毒，癰疽惡腫，走馬疳瘡，傅之亦佳。生會稽海畔山谷，莖赤，葉似馬蓼，根似菠薐而小也，海人極用之。

圖經衍義本草卷之十一

❶川：原脱，據晦明軒本補。
❷主：原作『王』，據晦明軒本改。
❸苦：原作『若』，據晦明軒本改。
❹秋：晦明軒本作『句』。
❺貝：原作『目』，據晦明軒本改。
❻疾：晦明軒本作『疝』。
❼二：晦明軒本作『一』。
❽二：晦明軒本作『三』。
❾鬼：晦明軒本作『蒐』。
❿鬼：晦明軒本作『蒐』。
⓫堪：晦明軒本作『甚』。
⓬氏：原作『民』，據晦明軒本改。
⓭煎：晦明軒本『煎』下有『至』字。
⓮一服：晦明軒本作『二升』。
⓯治：晦明軒本作『泡』。
⓰面：原作『而』，據晦明軒本改。
⓱奸：原作『好』，據晦明軒本改。
⓲饑：原作『饒』，據晦明軒本改。
⓳呼：原作『去』，據晦明軒本改。
⓴瘡：晦明軒本作『痛』。
㉑取：晦明軒本作『服』。
㉒汁：原作『汗』，據晦明軒本改。
㉓排：晦明軒本作『桃』。
㉔茂：晦明軒本作『荒』。
㉕杜：晦明軒本作『牡』。
㉖疰瘡：晦明軒本作二『癢』字。
㉗腦：晦明軒本『腦』下有『痛』字。
㉘苓：晦明軒本作『芩』。
㉙廣：原作『黄』，據晦明軒本改。
㉚潞：原作『路』，據晦明軒本改。
㉛臊：原作『燥』，據晦明軒本改。
㉜將：晦明軒本作『杵』。
㉝通：晦明軒本作『遍』。
㉞豫：晦明軒本作『橡』。
㉟嗽：原作『漱』，據晦明軒本改。
㊱視：晦明軒本作『神』。
㊲紫：原作『此』，據晦明軒本改。
㊳爲：晦明軒本作『謂』。
㊴未：原作『若』，據晦明軒本改。
㊵辟：晦明軒本作『澼』。
㊶大：晦明軒本作『犬』。

圖經衍義本草卷之十二

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部中品之上

乾薑



乾薑　味辛，温、大熱，無毒。主胸滿，咳逆上氣，温中，止血，出汗，逐風濕痹，腸澼下痢，寒冷腹痛，中惡霍亂，脹滿，風邪諸毒，皮膚間結氣，止唾血。生者尤良。

《圖經》云：文具生薑條下。

禹錫云：謹按《唐本》注云：治短、結氣❶，止血，宣諸絡脉，發汗，久服令眼暗。

《外臺秘要》：治瘧不痊。乾薑、高良薑等分爲末。每服一錢，水一中盞，煎至七分服。又方：治卒心痛。乾薑爲末，米飲調下一錢。

《千金方》：治鼽鼻，以乾薑末蜜和塞鼻中。

《肘後方》：治身體重，小腹急，熱必上衝胸，頭重不能舉，眼中生翳，膝脛拘急。乾薑四兩，末。湯和温服，覆取汗，得解。又方：治寒痢。切乾薑如大豆，米飲服六七十枚，日三夜一服。痢青色者爲寒痢，累服得效。

《王氏博濟方》：治瘧。乾薑炒令黑色，搗羅爲末，臨發時以温酒調三錢服，已發再服之。

《廣利方》：治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇。乾薑、雄黄等分，同研，用小絹袋盛繫臂上，男左女右，蛇聞藥氣逆避人。螫毒傅之。

《孫真人方》：治水瀉無度。乾薑末，粥飲調一錢服，立效。

《集驗方》：治血痢神效。乾薑急於火内燒黑，不令成灰，瓷碗合放冷，爲末。每服一錢，米飲調下。又方：治咳嗽，冷氣結脹。乾薑末，熱酒調半錢服。兼治頭旋眼眩，立效。

《傷寒類要》：治傷寒，婦人得病雖差，未滿百日，不可與交合，爲陰陽之病，必拘急，手足拳欲死，丈夫病名爲陰易，婦人名爲陽易，速當汗之可愈，滿四日不可療，宜令服此藥。乾薑四兩爲末，湯調頓服。覆衣被出汗得解，手足伸遂愈。

生薑





州溫　州涪

生薑　味辛，微温。主傷寒頭痛鼻塞，咳逆上氣，止嘔吐。久服去臭氣，通神明。生犍爲川谷及荆州、揚州，九月採。秦椒爲之使，殺半夏、苴

若毒，惡黃芩、黃連、天鼠糞。

《圖經》曰：生薑，生犍爲山谷及荆州、揚州，今處處有之，以漢、温、池州者爲良。苗高二三尺，葉似箭竹葉而長，兩兩相對。苗青根黄，無花實。八九月採根，於長流水洗過，日曬爲乾之，取生薑八兩，附子生用四兩，四破之，二物以水五升，煮取二升，分再服。亦主卒風。禁猪肉、冷水。崔元亮《集驗方》載敕賜薑茶治痢方，以生薑切如麻粒大，和好茶一兩碗，呷，任意，便差。若是熱痢即留薑皮，冷即去皮，大妙。劉禹錫在淮南與李亞同幕府，李每與人藥而不出方，或譏其吝。李乃情話曰：凡人患嗽，多進冷藥，若見此方用藥熱燥，即不肯服，故但出藥多效，試之信然。李卿換白髮方云：刮老生薑皮一大升，於鐺中以文武火煎之，不得令過沸，其鐺惟得多油膩者尤佳，更不須洗刷，便以薑皮置鐺中，密固濟，勿令通氣。令一精細人守之，地色未分，便須煎之，緩緩不得令火急。如其人稍疲，即換人看火，一伏時即成，置於瓷鉢中，極研之。李云：雖曰一復時，若火候勻即至日西藥成也。使時先以小物點取如麻子大，先於白鬚下點藥訖，然後拔之，再拔以手指熟撚之，令入肉。第四日當有黑者生，神效。

陶隱居云：乾薑，今惟出臨海、章安，兩三村解作之。蜀漢薑舊美，荆州有好薑，而并不能作乾者。又云：生薑，使。主痰水氣滿，冷痢，治血閉。病人虚而冷，宜加用之。又云：生和半夏，主心下急痛。若中熱不能食，搗汁和蜜食之。又汁和杏仁作煎，下一切結氣實，心胸擁隔，冷熱氣。

禹錫云：按《藥性論》云：乾薑，臣，味苦、辛。治腰腎中疼冷，冷氣，破血去風，通四肢關節，開五臟六腑，去風毒冷痹，夜多小便。乾者治嗽，主温中，用秦艽。主霍亂不止，腹痛，消脹滿，冷痢，治血閉。病人虚而冷，宜加用之。又云：生薑，使。主痰水氣滿，下氣。生與乾并治嗽，療時疾，止嘔逆❷，不下食。若中熱不能食，搗汁和蜜食之。又汁和杏仁作煎，下一切結氣實，心胸擁隔，冷熱氣。

《食療》云：生薑，温。去痰下氣，除壯熱，治轉筋，心滿，去胸中臭氣，通神明。又，胃氣虚，風熱，不能食。薑汁拌鷄子殼，生地黄汁少許，蜜一匙頭，和水三合，煎服立差。

《唐本》注云：薑，久服通神明，主風邪，主痰氣。生者尤良。《經》云：久服通神明，即可常啖也。

《外臺秘要》：治霍亂，注痢不止，轉筋入腹欲死。生薑三兩搗破，以酒一升，煮三四沸頓服。又方：久患咳嗽，連咳四五之❸聲者。取生薑汁半合，蜜一匙頭，煎令熱，温服。如此三服，立效。

《日華子》云：乾薑，消痰，下氣，治轉筋，吐瀉，腹臟冷，反胃乾嘔，瘀血，撲損，止鼻洪，解冷熱毒，開胃，消宿食。

《千金方》：治乾噦嗽，若手足厥冷。宜食生薑，此是嘔家藥。又治心下痞堅不能食，胸中嘔噦。生薑八兩細切，以水三升，煮取一升，半夏五合洗去滑，以水五升，煮取一升，二味合煮取一升半，稍稍服之。又方：治產後穢污下不盡，腹滿。生薑二斤，以水煮取汁服，即出。

《經驗方》：善治狐臭用生薑汁塗腋下，絶根本。

《楊氏産乳方》：胎後血上衝心。生薑五兩切，以水八升，煮三升，分三服。

唐·崔魏公云：鉉夜暴亡，有梁新聞之，乃診之曰：常好食竹鷄，竹鷄多食半夏苗。僕曰：必是半夏毒，命生薑捩汁，折齒而灌❹之，即活。

《衍義》曰：生薑，治暴逆氣，嚼三、兩皂子大，下咽定，屢服屢定。初得寒熱痰嗽，燒一塊，含齒之終日間，嗽自愈。暴赤眼無瘡者，以古銅錢刮净薑上取汁，於錢唇點目，熱淚出。今日點，來日愈。但小兒甚懼，不須疑，已試良驗。

葉耳

滁州



葉耳葉，私以反　實：味苦、甘，温。無毒。主肝家熱，明目。

陶隱居云：此是常思菜，傖人皆食之。以葉覆麥作黄衣者，一名羊負來，昔中國無此，言從外國逐羊毛中來，方用亦堪❺稀。

《唐本》注云：蒼耳，三月已後，七月已前刈，日乾爲散。夏，水服；冬，酒服。主大風癲癇，頭風濕痹，毒在骨髓。日二服，丸服二十、三十丸。

陳藏器云：葉，授安舌下，令涎出，去目黄，好睡。子炒令香，搗去刺，使腹破，浸酒，去風，補益。又燒作灰，和臘月猪脂，封丁腫。

雷公云：凡採得，去心，取黄精，用竹刀細切拌之，和同蒸，從巳至亥，甘，無毒。主肝家熱，明目。

陶隱居云：此是常思菜，傖人皆食之。以葉覆麥作黄衣者，一名羊負來，昔中國無此，言從外國逐羊毛中來，方用亦堪❺稀。

《唐本》注云：蒼耳，三月已後，七月已前刈，日乾爲散。夏，水服；冬，酒服。主大風癲癇，頭風濕痹，毒在骨髓。日二服，丸服二十、三十丸。

陳藏器云：葉，授安舌下，令涎出，去目黄，好睡。子炒令香，搗去刺，使腹破，浸酒，去風，補益。又燒作灰，和臘月猪脂，封丁腫。

雷公云：凡採得，去心，取黄精，用竹刀細切拌之，和同蒸，從巳至亥，去黄精。取出，陰乾用。

禹錫云：按《爾雅》云：菉耳也，亦云胡葉青白似胡荽，白華細莖，蔓生，可煮爲茹，滑而少味。或曰此物本生蜀中，其實多刺，因羊過之，毛中粘綴，遂至中國，故名羊負來。俗呼爲道人頭。

釋曰：《詩·周南》云：采采卷耳。

孟詵云：蒼耳，温。主中風，傷寒

頭痛。又，丁腫困重，生搗蒼耳根、葉和小兒尿，絞汁，冷服一升，日三度，甚驗。

《聖惠方》：治婦人風瘙癮疹，身癢不止。用蒼耳花、葉、子等分，搗羅爲末，豆淋酒調服二錢匕。又方：治產後諸痢，神效。蒼耳葉，搗絞汁。温服半中盞，日三四服。

《外臺秘要》：療熱毒病攻手足，腫疼痛欲脱方：取蒼耳汁以漬之。

《千金方》：當以五月五日午時乾地刈取菜耳葉，洗曝燥，搗下篩。酒若漿水服方寸匕，日三夜三。散若吐逆，可蜜爲丸，準計一方寸匕數也。風輕易❻治者，日再服。若身體有風處皆作粟肌出，或如麻豆粒，此爲風毒出也。

《千金翼方》：治牙痛。以蒼耳子五升，水一斗，煮取五升。熱含之，痛即吐，吐後復含，不過三劑差。莖、葉亦得。又方：治五痔方。蒼耳莖、葉，以五月五日採，乾爲末，以水服方寸匕，立效。

《食醫心鏡》云：除一切風濕痹，四肢拘攣。蒼耳子三兩搗末，水一升半，煎取七合，去滓呷。

《斗門方》：治婦人血風攻腦，頭旋悶絶忽死，忽倒地不知人事者。用蒼耳子等分，搗羅爲末。以常酒服一大盞❼，不拘時候，其喝起草取其嫩心，不限多少，陰乾，爲功大效。服之多連腦蓋，善通頂門，今蒼耳是也。

《勝金方》：治毒蛇并射工❽、沙虱等傷，眼黑口噤，手脚强直，毒攻腹内成塊，逡巡不救，宜用此方。蒼耳嫩葉一握，研取汁，温酒和灌之，將滓厚罨所傷處。

《楊氏方》❾產乳》：治誤吞錢。菜耳頭一把，以水一升，浸水中十餘度，飲水愈。

葛根　味甘，平，無毒。主消渴，身大熱，嘔吐，諸癘❿，起陰氣，解諸毒，療傷寒中風頭痛，解肌發表出汗，開腠理，療金瘡，止痛脅風痛。生根汁：大寒。療消渴，傷寒壯熱。葛殼⓫：主下痢十歲已上。葉：主金瘡止血。花：主消酒。一名鷄齋根，一名鹿藿，一名黄斤。生汶山川谷。五月採根，曝乾。

《圖經》曰：葛根，生汶山川谷，今成州海州處處有之，江浙尤多。春生苗，引藤蔓，長一二丈，紫色；葉頗似楸葉而青，七月著花似豌豆花，不結實。根形如手臂。張仲景治傷寒，有葛根及加半夏、葛根黄芩黄連湯，以其主大熱，解肌，開腠理。

陶隱居云：即今之葛根。人皆蒸食之。當取入土深大者，破而日乾之。生者搗取汁飲之，解毒⓬病發熱。其花并小豆花乾末，服方寸匕，飲酒不知



醉。南康、廬陵間最勝，多肉而少筋，甘美。

陳藏器云：葛根，生破血，合瘡，墮胎，解酒毒，身熱赤，酒黄，小便赤澀。可斷穀不饑，根堪作粉。

《日華子》云：葛，冷，治胸膈熱，心煩悶，熱結⑬，止血痢，通小腸，排膿破血，傅蛇蟲嚙，解署毒箭。乾者力同。

《食療》云：葛根，蒸食之，消酒毒。其粉亦甚妙。

《聖惠方》：治時氣頭痛壯熱。用生葛根净洗，搗取汁一大盞，豉一合，煎至六分，去豉，不計時候，分作二服，汗出即差。未汗再服。若心熱，加梔子仁十枚同煎，去滓服。又方：治小兒熱渴久不止。用葛根半兩細剉，水一中盞，煎取六分，去滓，頻温服。

《外臺秘要》：治傷筋絶，搗葛根汁飲之。葛白屑熬令黄，傅瘡止血。

《千金方》：酒醉不醒，搗葛根汁飲一二升，便醒。

《肘後方》：治卒乾嘔不息，搗葛根，絞取汁，服一升，差。又方：食諸菜中毒，發狂煩悶，吐下欲死。煮葛根汁飲之。

《梅師方》：治傷寒初患二三日，頭痛壯熱。葛根五兩，香豉一升細剉，以童子小便六升，煎取二升，分作三服，取汗。觸風，食葱豉粥。

《聖惠方》治中鴆毒氣欲絶者。用葛粉三合，水三中盞調飲之。又方：治胸中煩熱或渴，心躁。葛粉四兩，先以水浸粟米半升，經宿漉出，與葛粉相拌，令匀，煮熟食之。

《食醫心鏡》：治小兒壯熱，嘔吐不住食，驚癇方。葛粉二大錢，以水二合調令匀，瀉向鎁鐸中，傾側令遍，重湯中煮令熟，以糜飲相和食之。

葛粉　味甘，大寒，無毒。主壓丹石，去煩熱，利大小便，止渴。小兒熱痞，以葛根浸搗汁飲之良。

《圖經》曰：文具葛根條下。

陳藏器云：按中品上卷葛根條，功用與此相通。

《聖惠方》：治傷寒初患二三日，熱瘡妙。

禹錫云：按中品上卷葛根條下。

栝樓　根：味苦，寒，無毒。主消渴，身熱煩滿，大熱，補虚安中，續絶傷，除腸胃中痼熱，八疸⑯，身面黄，唇乾口燥，短氣，通月水，止小便利。一名地樓，一名果贏，一名天瓜，一名澤姑。實：名黄瓜，主胸痹，悦澤人面。

栝樓



莖、葉：療中熱傷暑。生洪農川谷及山陰地，入土深者良，生鹵地者有毒。二月、八月採根，曝乾，三十日成。枸杞爲之使，惡乾薑，畏牛膝、乾漆，反烏頭。

《圖經》曰：栝樓，生洪農山谷及山陰地，今所在有之。《詩》所謂果蓏之實是也。根亦名白藥，皮黄肉白。三四月内生苗，引藤蔓。葉如甜瓜葉，作叉，有細毛。七月開花，似葫蘆花，淺黄色。實在花下，大如拳，生青，至九月熟。孫思邈作粉法：深掘大根，厚⑰削皮至白處，寸切之，水浸，一日一易水⑱，經五日取出，爛搗研，以絹袋盛之，澄濾令極細如粉。唐·崔元亮療箭鏃不出。搗根傅瘡，日三易，自出。又療時疾發黄，心強⑲煩熱，悶不認人者。取大實一枚黄者，以新汲水九合，浸淘取汁，下蜜半大合，朴消八分，合不⑳令消盡，分再服，便差。

陶隱居云：出近道，藤生，狀如土瓜而葉有叉。《毛詩》云：果蓏之實，亦施於宇。其實，今以雜作手膏用。根入土六七尺，大二三圍者，服食亦用之。

《唐本》注云：今用根作粉，大宜服食，虚熱人食之。作粉如作葛粉法，潔白美好。今出陝州者，白實最佳。

禹錫云：按《爾雅》云：果蓏之實，栝樓。釋曰：果蓏之草，其實名栝樓。郭云：今齊人謂之天瓜。

《日華子》云：栝樓子，味苦，冷，無毒。補虚勞，口乾，潤心肺，療手面皴，吐血，腸風瀉血，赤白痢，并炒用。又栝樓根，通小腸，排膿，消腫毒，生肌長肉，消撲損瘀血，治熱狂時疾，乳癰，發背，痔瘻，瘡瘕。雷公云：栝樓，凡使皮、子、莖、根，效各别。其栝并樓樣全别。若栝，自丸，黄皮厚蒂小；若樓，唯形長，赤皮蒂粗，是陰人服。若修事，去上殼皮革膜并油子㉑，使。

《聖惠方》：治熱病頭疼發熱進退方。用栝樓一枚大者，取瓤細剉，置瓷碗中，用熱湯一盞沃之，蓋却良久，去滓，不計時候服。

《外臺秘要》：治消渴利方。生栝樓三十斤，以水一碩，煮取一斗半，去滓，以牛脂五合，煎取水盡。以暖酒先食服如鷄子大，日三服，即妙。

《肘後方》：消渴，小便多。栝樓實，栝樓。釋曰：果蓏之實。又方：若腸隨肛出，轉久不可收入。搗生栝樓取汁，温之猪肉汁中洗手，隨挼之令暖，自得入。

《梅師方》：治諸癰發背㉒，乳房初起微赤。搗栝樓作末，以井花水調方寸匕。

《集驗方》：下乳汁。栝樓子淘洗控乾，炒令香熟，瓦上擩令白色爲末，

酒調下一匕，合面卧少時。

《杜壬方》：治胸膈痛徹背，心腹痞滿，氣不得通及治痰嗽。大栝樓去穰取子熟炒，别研和子皮，麵糊爲丸，如梧桐子大，米飲下十五丸。

《子母秘録》：治乳腫痛。栝樓黄色老大者一枚熟搗，以白酒一斗煮取四升，去滓温一升，日三服。若無大者，小者二枚，黄熟爲已㉓。

《楊氏産乳方》：治熱遊丹赤腫。栝樓末二大兩，醶醋調塗之。

《産寶方》：治産後乳無汁。栝樓末，井花水服方寸匕，日二服，夜流出。

《楊文蔚方》：治痰嗽，利胸膈方。栝樓肥實大者，割開，子净洗，捶破括皮，細切焙乾，半夏四十九個，湯洗十遍，捶破焙乾，爲末，用洗栝樓熟水并瓤同熬成膏，研爲丸如梧子大，生薑湯下二十丸。

《衍義》曰：栝樓實，九月、十月間取穰，以乾葛粉拌，焙乾，銀石器中煴火炒熟爲末。食後、夜卧，以沸湯點一二錢服，治肺燥、熱渴、大腸秘。其根與貝母、知母、秦艽、黄芩之類，皆治馬熱。

苦參



部蠶，平胃氣，令人嗜食、輕身。一名水槐，一名苦識音識，一名地槐，一名虎麻，一名槐，一名騎槐，一名岑莖，一名禄白，一名陵郎。生汝南山谷及田野。三月、八月、十月採根，曝乾。玄參爲之使，惡貝母、漏蘆、菟絲，反藜蘆。

《圖經》曰：苦參，生汝南山谷及田野，今近道處處皆有之。其根黄色，長五七寸許，兩指粗細。三五莖并生，苗高二三尺已來。葉碎青色，極似槐葉，故有水槐名，春生冬凋。其花黄白，七月結實如小豆子。治癩疾。其法用苦參五斤切，以好酒三斗漬三十日。每飲一合，日三，常服不絶。若覺痺即差。

陶隱居云：今出近道處處有。葉極似槐樹，故有槐名，花黄，子作莢，根味至苦惡。病人酒實㉕飲之多差。患疥者，一兩服亦除，蓋能殺蟲。

禹錫云：按《藥性論》云：苦參，能治熱毒風，皮肌煩燥生瘡，赤癩眉脱，主除大熱，嗜唾，治腹中冷痛，中惡氣，癥瘕積聚，黄疸，溺有餘瀝，逐水，明目止泪，養肝膽氣，除癬腫，補中，益精，利九竅，除伏熱腸安㉔五臟，定志益精，利九竅，除伏熱腸澼，止渴，醒酒，小便黄赤，療惡瘡、下

腹痛，除體悶，治心腹積聚。不入湯用。

《日華子》云：殺疳蟲，炒帶烟出爲末，飯飲下，治腸風瀉血并熱痢。

雷公云：凡使，不計多少，先須用糯米濃泔汁浸一宿，上有腥穢氣，并在水面上浮，并須重重淘過，即蒸，從巳至申出，曬乾，細剉用之。

《外臺秘要》：治天行病四五日，結胸滿痛，壯熱，身體熱。苦參一兩剉，以醋二升，煮取一升二合，盡飲之，當吐㉖，即愈。天行毒病，非苦參、醋藥不解，及温㉗覆取汗愈。又方：小兒身熱，苦參湯浴兒良。

《千金方》：治狂邪發無常，披頭大叫，欲殺人，不避水火。苦參蜜丸桐子大。每服十丸，薄荷湯下。

《梅師方》：治飲食中毒，魚、肉、菜等。苦參三兩，以苦酒一升，煎五沸，去滓服之，吐出即愈。或取煮犀角汁一升，亦佳。又方：治傷寒四五日，頭痛。苦參五兩，烏梅二十枚細剉，以水二升，煎取一升，温服。

《勝㉖金方》：治時疾熱病，狂言心躁。苦參不限多少，炒黄色爲末。每服二錢，水一盞，煎至八分，温服，連進三服。有汗無汗皆差。

《集驗方》：治毒熱，足腫疼欲絶㉖。酒煮苦參以漬之。

太史公云：淳於意醫齊中大夫病齲齒，灸左手陽明脉，苦參湯日漱三升。出入得㉛，五六日愈。

《衍義》曰：苦參，有朝士苦腰重，久坐，旅拒十餘步，然後能行。有一將佐謂朝士曰：見公日逐以藥揩齒，其氣味傷腎，故使人腰重㉜。後有太常少卿舒昭亮，用苦參揩齒，歲久亦病腰。自後悉不用，腰疾皆愈，此皆方書舊不載者。有人病遍身風熱細疹，癢痛不可任，連胸、頸、臍、腹及近隱處㉜皆然，涎痰亦多，夜不得睡。以苦參末一兩，皂角二兩，水一升，揉濾㉞取汁，銀石器熬成膏，和苦參末爲丸如梧桐子大。食後温水服二十丸至三十丸，次日便





當歸

當歸　味甘、辛，温、大温，無毒。主咳逆上氣，温瘧寒熱洗音癬在皮膚中，婦人漏下，絶子，諸惡瘡瘍音羊，金瘡，煮飲之。温中止痛，除客血内塞，中風痙，汗不出，濕痹，中惡，客氣虚冷，補五臟，生肌肉。一名乾歸。生隴西川谷，今川蜀、陝西諸郡及江寧、滁州皆有之，

以蜀中者爲勝。春生苗，緑葉有三瓣。七八月開花似時羅，淺紫色。根黑黄色。二月、八月採根，陰乾。然苗有二種，都類芎藭，而葉有大小爲異，莖梗比芎藭甚卑下。根亦二種，大葉名馬尾當歸，細葉名蠶頭當歸。以肉厚不枯者勝。

《藥性論》云：當歸，臣，惡熱麵。止嘔逆，虚勞寒熱，破宿血，主女子崩中，下腸胃冷，補諸不足，止痢腹痛。單煮飲汁，治温瘧，主女人瀝血腰痛，療齒疼痛不可忍。患人虚冷，加而用之。

陶隱居云：今隴西叩陽黑水當歸，多肉少枝，氣香，名馬尾當歸，稍難得。西川北部當歸，多根[36]枝而細。歷陽所出，色白而氣味薄[35]，不相似，呼爲草當歸，闕少時乃用之。方家有云真當歸，正謂此，有好惡故也。俗用甚多，道方時須爾。

《唐本》注云：當歸苗有二種：一種似大葉芎藭；一種似細葉芎藭，惟莖葉卑下於芎藭也。今出當州、岩[37]州、翼州、松州、宕州最勝。細葉者名蠶頭當歸，大葉者名馬尾當歸，今用多是馬尾當歸，蠶頭者不如此，不復用，陶稱歷陽者，是蠶頭當歸也。

《日華子》云：治一切風，一切血，補一切勞，破惡血，養新血及主癥癖。

雷公云：凡使，先去塵并頭尖硬處一分已來，酒浸一宿。若要破血，即使頭一節硬實處。若要止痛止血，即用尾。若一時用，不如不使，服食無效，單使妙也。

禹錫云：按《爾雅》云：薜，山蘄。注《廣雅》曰：山蘄，當歸也。當歸今似蘄而粗大。

吴氏云：當歸，神農、黄帝、桐君、扁鵲：甘，無毒。岐伯、雷公：辛，無毒。或生羌胡地。

季氏：小温。

《别説》云：謹按：當歸，自古醫家方論，用治婦人産後惡血上衝，倉卒取效，無急於此。氣血昏亂者，服之即可以於産後備急於補虚速效，恐聖人立當歸之名，必因此出矣。

《外臺秘要》：治頭疼欲裂。當歸二兩，酒一升，煮取六合，飲至再服。

又方：治心痛。當歸爲末，酒服方寸匕。

《肘後方》：小兒多患胎寒好啼，晝夜不止，因此成癇。當歸末小豆大，乳汁灌之，日夜三四度服。

《葛氏方》：治小便出血。當歸四兩細剉，酒三升，煮取一升，頓服。

《梅師方》：胎動下血，心腹疼，死生不知，服此湯，活即安，死即下。用當歸四兩，芎藭九兩，細剉，以酒三升，水四升，煎取三升，分服。

《子母秘録》：治倒産，子死腹中。搗當歸末，酒服方寸匕。

《支太醫方》：治婦人百病，諸虚不足。當歸四兩，地黄二兩，爲末，蜜和丸如梧子大。食前米飲下十五丸。

麻黄

味苦，温、微温，無毒。主中風傷寒頭痛，温瘧，發表出汗，去邪熱氣，止咳逆上氣，除寒熱，破癥堅積聚，五臟邪氣緩急，風脅痛，字乳餘疾，

麻黃



止好唾，通腠理，疏傷寒頭疼，解肌，泄邪惡氣，消赤黑斑毒。不可多服，令人虛。一名卑相，一名龍沙，一名卑鹽。陰乾令青。生晉地及河東，厚朴爲之使，惡辛夷、石韋。

《圖經》曰：麻黃，生晉地及河東，今近京多有之，以滎陽、中牟者爲勝。苗春生，至夏五月則長及一尺已來。梢上有黃花，結實如百合瓣而小，又似皂莢子，味甜，微有麻黃氣，外紅皮，裏仁子黑。根紫赤色。俗説有雌雄二種：雌者於三月、四月内開花，六月内結子。雄者無花，不結子。至立秋後，收採其莖，陰乾令青。張仲景治傷寒，有麻黃湯及大、小青龍湯，皆用麻黃；治肺痿上氣，有射干㊳麻黃湯、厚朴麻黃湯，皆大方也。古方湯用麻黃，先煮去沫，然後内諸藥。亦㊴用丸散者，皆不然也。

陶隱居云：今出青州、彭城、滎陽、中牟者爲勝，色青而多沫。蜀中亦有，不好。用之折除節，節止汗故也。先煮一兩沸，去上沫，沫令人煩。其根亦止汗，夏月雜粉用之。俗用療傷寒，解肌第一。

《唐本》注云：鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙洲上大多。其青、徐者，今不復用。同州沙苑最多。

《日華子》云：通九竅，調血脉，開毛孔皮膚，逐風，破癥癖積聚，逐五臟邪氣，退熱，禦山嵐瘴氣。

雷公云：凡使，去節并沫，若不盡，去之，令人悶。用夾刀剪去節并頭，槐砧上用銅刀細剉，煎三四十沸，竹片掠去上沫盡，漉出，曬乾用之。

禹錫云：按《藥性論》云：麻黃，君，味甘，平。能治身上毒風瘡癬，皮肉不仁，主壯熱，解肌發汗，温瘧，治温疫。根、節能止汗。方曰：并故竹扇杵末撲之。又牡蠣粉、粟粉并根等分末，生絹袋盛，盜汗出即撲，手摩之。

《傷寒類要》：張仲景《傷寒論》云：黃疸病，以麻黃醇酒湯主之。麻黃一把去節，綿裹，以美酒五升，煮取半升，去滓，頓服。

《子母秘録》：治産後腹痛及血下不盡。麻黃去節杵末，酒服方寸匕，日二三服，血下盡即止。澤蘭湯服亦妙。

《衍義》曰：麻黃，出鄭州者佳，剪去節，半兩，以蜜一匙匕同炒，良久，以水半升煎，俟沸，去上沫，再煎，去三分之一，不用滓。病瘡疱倒靨黑者，乘熱盡服之，避風，伺其瘡復出。一法用無灰酒煎。但小兒不能飲酒者難服，然其效更速。以此知此藥入表也。

通草

味辛、甘，平，無毒。主去惡蟲，除脾胃寒熱，通利九竅、血脉關節，令人不忘，療脾疸，常欲眠，心煩，噦出音聲，療耳聾，散癰腫、諸結不消，及金瘡惡瘡，鼠瘻，踒折，鼸音瓮鼻息肉，墮胎，去三蟲。一名附支，一名丁

通草



翁。生石城山谷及山陽。正月採枝，陰乾。

《圖經》曰：通草，生石城山谷及山陽，今澤、潞[40]、漢中、江淮、湖南州郡亦有之。生作藤蔓，大如指，其莖幹大者徑三寸。每節有二三枝，枝頭出五葉，頗類石韋，今人謂之木通，俗間所謂通草，乃通脱木[41]。

陶隱居云：今出近道。繞樹藤生，汁白。莖有細孔，兩頭皆通。含一頭吹之，則氣出彼頭者良。或云即葍藤莖。

陳藏器云：通脱木，無毒。花上粉，主諸蟲瘡，野鷄病，取粉内瘡中。生山側，葉似萆麻，心中有瓤，輕白可愛，女工取以飾物。《爾雅》云：離南，活脱也。一本云：藥草，生江南，主蟲病，今俗亦名通草。又云：本功外，子味甘，利大小便，宣通去煩熱，食之令人心寬，止渴下氣，江東人呼爲畜葍子，江西人呼爲拏子，如算袋，穰黄子黑，食之當去其皮。蘇云：色白，乃猴葍也。

《日華子》云：木通，安心除煩，止渴退熱，治健忘，明耳目，治鼻息[42]，通小腸，下水，破積聚血塊，排膿，治瘡癤，止痛，催生下胞，女人血閉，月候不匀，天行時疾，頭痛目眩，羸劣，乳結及下乳。子名蘉子，七八月採。

禹錫云：按《藥性論》云：木通，臣，微寒，一名王翁萬年。主治五淋，利小便，開關格，治人多睡，主水腫浮大，除煩熱。用根治項下瘤癭。

陳士良云：燕蘉子，寒，無毒。主胃口熱閉，反胃不下食，除三焦客熱。此是木通，實名桴掞子，莖名木通。主理風熱淋疾，小便數急疼，小腹虚滿。宜煎湯并葱食之，有效。野生。

《海藥》云：謹按《徐表南州記》云：生廣州山谷。味温，平。主諸瘻瘡，喉嚨痛及喉痹，并宜煎服之，磨亦得，急即含之。

《食療》云：煮飲之，通婦人血氣。濃煎三五盞即便通。又除寒熱不通之氣，消鼠瘻，金瘡，踒折，煮汁釀酒也。

芍藥

澤州



芍藥　味苦、酸，平、微寒，有小毒。主邪氣腹痛，除血痹，破堅積，寒熱疝瘕，止痛，利小便，益氣，通順血脉，緩中，散惡血，逐賊血，去水氣，利膀胱、大小腸，消癰腫，時行寒熱，中惡，腹痛、腰痛。一名白术[43]，一名餘容，一名犁食，一名解倉，一名鋌。生中嶽川谷及丘陵。二月、八月採根，暴

乾。須丸爲之使。

禹錫等按：《別本》作雷丸，惡石斛、芒消，畏消石、鱉甲、小薊，反藜蘆。

《圖經》曰：芍藥，生中嶽川谷及丘陵，今處處有之，淮南者勝。春生紅芽作叢，莖上三枝五葉，似牡丹而狹長，高一二尺。夏開花，有紅、白、紫數種，子似牡丹子而小。秋時採根，根亦有赤、白二色。崔豹《古今注》云：芍藥有二種：有草芍藥、木芍藥。木者花大而色深，俗呼爲牡丹，非也。《正元㊹廣利方》治婦女赤白下，年月深久不差者，白芍藥三大兩，乾薑半大兩，細剉，熬令黃，搗篩，空肚和飲汁服一㊺錢匕。

《藥性論》云：芍藥，臣。能治肺邪氣，腹中疝痛，血氣積聚，通宣臟腑擁氣，治邪痛敗血，主時疾骨熱，强五臟，補腎氣，治腹堅脹，婦人血閉不通，消瘀血，能蝕膿。

陶隱居云：今出白山、蔣、茅山最好，白而長大。餘處亦有而多赤，赤者小利，俗呼以止痛，乃不減當歸。道家亦服食之，又煮石用之。

《別本》注云：此有兩種：赤者利小便下氣；白者止痛散血。其花亦有紅、白二色。

《日華子》云：治風補勞，主女人一切病，并産前後諸疾，通月水，退熱除煩，益氣。

雷公云：凡採得後，於日中曬乾，以竹刀刮㊻上粗皮并頭土了，剉，蜜水拌蒸，從巳至未，曬乾用。

禹錫云：按《吳氏》云：芍藥，神農：苦。桐君：甘，無毒。岐伯：鹹。季氏：小寒。雷公：酸。

《別説》云：今淮南真陽尤多。藥家見其肥大，而不知香味絶不佳，故入藥不可責其效。今考，用宜依《本經》所説，川谷丘陵有生者爲勝爾。

《經驗後方》：治風毒，骨髓疼痛。芍藥二分，虎骨一兩，炙爲末，夾絹袋盛，酒三升漬五日，每服二合，日三服。

《博濟方》：治五淋。赤芍藥一兩，檳榔一個，麵裹煨爲末，每服一錢匕，水一盞，煎至七分，空心服。

蠡實　異州



蠡實　味甘，平、温，無毒。主皮膚寒熱，胃中熱氣，風寒濕痹，堅筋骨，令人嗜食，止心煩滿，利大小便，長肌膚肥大。久服輕身。花、葉：去白蟲，療喉痹，多服令人溏泄。一名荔實，一

名劇草，一名三堅，一名豕首。生河東川谷。五月採實，陰乾。

《圖經》曰：蠡實，馬藺子也，北人音訛，呼爲馬揀[48]子。生河東川谷，今陝西諸郡及鼎、澧州亦有之，近京尤多。葉似薤而長厚，三月開紫碧花，五月結實作角子。如麻大而赤色有棱，根細長，通黄色，人取以爲刷。三月採花，五月採實，并陰乾用。崔元亮治喉痹腫痛。取荔花、皮、根，共十二分，以水一升，煮[49]六合，去滓含之，細細咽汁，差止。

陶隱居云：方藥不復用，俗無識者。本[50]名精，亦名豕首也。

《日華子》云：馬藺，治婦人血氣煩悶，産後血運并經脉不止，崩中，帶下，消一切瘡癰腫毒，止鼻洪吐血，通小腸，消酒毒，治黄病，傅蛇蟲咬，殺蕈毒。亦可蔬菜食，莖、葉同用。

《外臺秘要》：治喉痹垂死者。杵蠡實根一握，水絞取汁，稍稍咽之，口噤灌之。

《千金方》：治中蠱下血如鷄肝出，其餘四臟悉壞，唯心未毁，或鼻破待死。取馬藺根末，水服方寸匕，隨吐則出，極神。此苗似葛蔓緑紫，生子似橘子。

《衍義》曰：蠡實，陶隱居云：方藥不復用，俗無識者。《本經》諸家所注不相應，若果是馬藺，其《日華子》不當更言亦可爲蔬菜食。蓋馬藺，其葉似而有毛，花紅紫赤可愛，合子、葉刈取之，子頗似麥，故名瞿麥。此類乃有兩種：一種肥[51]大，花邊有叉椏，未知何者是？今市人皆用小者。復一種葉廣相似，花晚而甚赤。按《經》云：瞿麥，生太山川谷，今處處有之。高一尺以來，葉尖小，青色，根紫黑色，形如細蔓菁。花紅紫赤色，亦似映山紅，二月至五月開花。七月結實作穗，子頗似麥，故名瞿麥。立秋後合子、葉收採陰乾用。古今方通心經、利小腸爲最要。張仲景治小便不利，有水氣，栝蔞瞿麥丸主之。

陶隱居云：今出近道。一莖生細葉，花紅紫赤可愛，合子、葉刈取之，子頗似麥，故名瞿麥。此類乃有兩種：一種肥[51]大，花邊有叉椏，未知何者是？今市人皆用小者。復一種葉廣相似而有毛，花晚而甚赤。按《經》云：瞿麥，生太山川谷。今處處有之。高一尺以來，葉尖小，青色，根紫黑色，形如細蔓菁。花紅紫赤色，亦似映山紅，二月至五月開花。七月結實作穗，子頗似麥，故名瞿麥。立秋後合子、葉收採陰乾用。古今方通心經、利小腸爲最要。張仲景治小便不利，有水氣，栝蔞瞿麥丸主之。

《衍義》曰：瞿麥，生太山川谷，今處處有之。高一尺以來，葉尖小，青色，根紫黑色，形如細蔓菁。花紅紫赤色，亦似映山紅，二月至五月開花。七月結實作穗，子頗似麥，故名瞿麥。立秋後合子、葉收採陰乾用。古今方通心經、利小腸爲最要。張仲景治小便不利，有水氣，栝蔞瞿麥丸主之。

州絳

瞿麥



瞿麥　味苦、辛，寒，無毒。主關格諸癃結，小便不通，出刺，決癰腫，明目去翳，破胎墮子，下閉血，養腎氣，逐膀胱邪逆，止霍亂，長毛髮。一名巨句麥，一名大菊，一名大蘭。生太山川谷。立秋採實，陰乾。蓑草、牡丹爲之使，惡螵蛸。

《圖經》曰：瞿麥，生太山川谷，今處處有之。高一尺以來，葉尖小，青色，根紫黑色，形如細蔓菁。花紅紫赤色，亦似映山紅，二月至五月開花。七月結實作穗，子頗似麥，故名瞿麥。立秋後合子、葉收採陰乾用。古今方通心經、利小腸爲最要。張仲景治小便不利，有水氣，栝蔞瞿麥丸主之。

陶隱居云：今出近道。一莖生細葉，花紅紫赤可愛，合子、葉刈取之，子頗似麥，故名瞿麥。此類乃有兩種：一種肥[51]大，花邊有叉椏，未知何者是？今市人皆用小者。復一種葉廣相似而有毛，花晚而甚赤。按《經》云：瞿麥，生太山川谷。今處處有之。高一尺以來，葉尖小，青色，根紫黑色，形如細蔓菁。花紅紫赤色，亦似映山紅，二月至五月開花。七月結實作穗，子頗似麥，故名瞿麥。立秋後合子、葉收採陰乾用。古今方通心經、利小腸爲最要。張仲景治小便不利，有水氣，栝蔞瞿麥丸主之。

《日華子》云：瞿麥，催生，又名杜母草、燕麥、薕麥，又云石竹。治痔瘻并瀉血，作湯粥食并得。

雷公云：凡使，只用蕊殼，不用

花[52]、葉。若一時使，即空心令人氣咽，小便不禁。凡欲用，須以堇竹瀝浸一伏時，漉出，曬乾使用。

《外臺秘要》：治鯁。以瞿麥爲末，水調方寸匕。

《千金方》：治產經數日不出，或子死腹中，母欲死。以瞿麥煮濃汁服之。

《梅師方》：治竹木刺入肉中不出。瞿麥爲末，水服方寸匕。或煮瞿麥汁飲之。日三。《千金》同。

《崔氏方》：治魚膾瘡毒腫，燒灰和油傅於腫上，甚佳。

《衍義》曰：瞿麥，八政散用瞿麥，今人爲至要藥。若心經雖有熱而小腸虛者服之，則心熱未退，而小腸別作病。料其意者，不過爲心與小腸爲傳送，故用此入小腸藥。按《經》，瞿麥并不治心熱。若心無大熱，則當止治其心，若或制之不盡，須當求其屬以衰之。用八正散者，其意如此。

玄參

味苦、鹹，微寒，無毒。主腹中寒熱積聚，女子產乳餘疾，補腎氣，令人目明，主暴中風，傷寒身熱，支滿狂邪，忽忽不知人，温瘧灑灑，血瘕，下寒血，除胸中氣，下水，止煩渴，散頸下核，癰腫，心腹痛，堅癥，定五臟。久服補虛，明目，强陰益精。一名重臺，一名玄臺，一名鹿腸，一名正馬，一名咸，一名黿[53]。生河間川谷及冤句。三月、四月採根，暴乾。惡黄耆、乾薑、大棗、山茱萸，反藜蘆。



《圖經》曰：玄參，生河間及冤句，今處處有之。二月生苗。葉似脂麻，又如槐柳。細莖青紫色。七月開花青碧色。八月採[54]子黑色。亦有白花，莖方大，紫赤色而有細毛，有節若竹者，高五六尺。葉如掌大尖長如鋸齒。其根尖長，生青白，乾即紫黑，新者肥[55]膩。一根生五七枚，三、八、九月采，暴乾。或云蒸日乾。

陶隱居云：今出近道，處處有。莖似人參而長大。根甚黑，亦微香，道家時用，亦以合香。

《唐本》注云：玄參根苗臭，莖亦不似人參，陶云道家亦以合香，未見其理也。

《日華子》云：治頭風，熱毒遊風，補勞虛損，心驚煩躁劣乏，骨蒸傳尸邪氣，止健忘，消腫毒。

雷公云：凡採得後，須用蒲葉重重相隔，入甑蒸兩伏時後，出乾曬。使用時，勿令犯銅，餌之後噎人喉，喪人目，揀去蒲草盡了，用之。

禹錫云：按《藥性論》云：玄參，使，一名逐馬，味苦。治暴結熱，主熱風頭痛，傷寒勞復，散瘤癭瘰癧。

《經驗方》：治患勞人燒香法。玄參一斤，甘松六兩，爲末，煉蜜一斤和勻，入瓷瓶内封閉，地中埋窖十日取

出。更用灰末六兩，更煉蜜六兩，和匀，入瓶内封，更窖五日取出。燒令鼻中常聞其香，疾自愈。

《廣利方》：治瘰癧經年，久不差。生玄參搗碎傅上，日二易之。

秦艽


齊州


泰州


石州


寧化軍

秦艽音交　味苦、辛，平、微温，無毒。主寒熱邪氣，寒濕風痹，肢[56]節痛，下水，利小便，療風無問新久，通身攣急。生飛烏山谷。二月、八月採根，暴乾。菖蒲爲之使。

《圖經》曰：秦艽，生飛烏山谷，今河陝州軍多有之。根上[57]黄色，相交糾，長一尺已來，粗細不等。枝幹高五六寸，葉婆娑連莖梗，俱青色，如萵苣葉。六月開紫花，似葛花，當月結子。每於春秋採根，陰乾。

陶隱居云：飛烏或是地名，今出甘松、龍洞、蠶陵，長大黄白色爲佳。根皆作羅紋相交，中多御土，用之熟破除去。方家多作秦膠字，與獨活療風常用，道家不須爾。

《唐本》注云：今出涇州、鄜州、岐州者良。本作札，或作糾，作膠，正作芃也。

《日華子》云：味甘[58]，冷。主傳尸骨蒸，治疳及時氣。又名秦芃，羅紋者佳。

雷公云：凡使，秦并芃，須於脚文處認取：左文列爲秦，即治疾；芃，即發脚氣。凡用秦，先以布拭上黄肉毛盡，然後用還元湯浸一宿，至明出，日乾用。

禹錫云：按《藥性論》云：秦芃，解米脂，人食穀不充悦，畏牛乳。點食之，利大小便。差五種黄病，解酒毒，去頭風。

蕭炳云：《本經》名秦瓜，世人以療酒黄、黄疸大效。

《聖惠方》：治傷寒，心神熱躁，口乾煩渴。用秦艽一兩，去苗細剉，以牛乳一大盞，煎[59]六分，去滓，不計時候，分温一[60]服。又方：治小便難，腹滿悶，不急療之殺人。用秦艽一兩去苗，以水一大盞，煎取七分，去滓，每於食前作兩服差[61]。

《孫真人方》：治黄疸，皮膚、眼睛赤金色，小便赤。取秦艽五兩，牛乳三升，煮取一升，去滓，内芒消一兩服。

百合　味甘，平，無毒。主邪氣腹脹，心痛，利大小便，補中益氣，除浮腫臚脹，痞滿，寒熱，通身疼痛，及乳難，

百合



喉痹，止涕泪。一名重箱，一名中逢花，一名强瞿。生荆州川谷。二月、八月採根，曝乾。

《圖經》曰：百合，生荆州川谷，今近道處處有之。春生苗，高數尺。幹粗如箭，四面有葉如鷄距，又似柳葉，青色，葉近莖微紫，莖端碧白。四五月開白[62]花，如石榴觜而大。根如葫蒜，重疊生二三十[62]。二月、八月採根，暴乾。人亦蒸食之，甚益氣。張仲景治病，有百合知母湯、百合滑石代赭湯、百合鷄子湯、百合地黄湯。凡四方，病名百合，而用百合治之，不識其義。

陶隱居云：近道處處有。根如葫蒜，數十片相累。人亦蒸煮食之，乃言初是蛇[64]蚹相纏結變作之。俗人皆呼爲强仇，仇即瞿也，聲之訛爾。亦堪服食。

《唐本》注云：此藥有二種：一種葉大莖長，根粗細葉，花紅白色；一種葉大莖長，根粗葉如大柳葉，四向攢枝而上。其顛即花白，不[65]入藥用。

《日華子》云：白百合，安心定膽，益志，養五臟，治癲邪、啼泣、狂叫、驚悸，殺蠱毒，氣協、乳癰、發背及諸瘡腫，并治産後血狂[66]運。

禹錫云：按《藥性論》云：百合，使，有小毒。主百邪鬼魅，涕泣不止，除心下急滿痛，治脚氣，熱咳逆。

《食療》云：平。主心急黄。蒸過蜜食之，作粉尤佳。紅花者名山丹，不堪食。

《聖惠方》：治肺臟壅熱煩悶。新百合四兩，蜜半盞，和蒸令軟，時時含一棗大，咽津。又方：治傷寒，腹中滿痛。用百合一兩，炒令黄色，搗爲散，不計時候，粥飲調下二錢服之。

《孫真人食忌》云：治陰毒傷寒。煮百合濃汁，服一升良。

《勝金方》：治耳聾疼痛。以乾百合爲末，温水調下二錢匕，食後服。

《衍義》曰：百合，張仲景用治傷寒壞後百合病，須此也。莖高三尺許，葉如大柳葉，四向攢枝而上。其顛即花白，四垂向下覆，長蕊。花心有檀色，每一枝顛，須五六花。紫[67]色，圓如梧子，生於枝葉間。每葉一子，不在花中，此又異也。根即百合，其色白，其形如松子殼，四向攢生，中間出苗。

---

❶治短、結氣：晦明軒本作『治風、下氣』。
❷逆：原作『通』，據晦明軒本改。
❸之：晦明軒本作『十』。
❹灌：原作『于』，據晦明軒本改。
❺堪：晦明軒本作『甚』。
❻易：原作『勿』，據晦明軒本改。
❼盞：晦明軒本作『錢』。
❽工：原作『丁』，據晦明軒本改。
❾方：『方』字疑當在『乳』字下，作『楊氏産乳方』。
❿癢：晦明軒本作『痹』。
⓫殼：原作『穀』，據晦明軒本改。
⓬毒：晦明軒本作『温』。
⓭結：晦明軒本作『狂』。
⓮水：晦明軒本作『作』。
⓯可：晦明軒本作『賣』。
⓰疸：晦明軒本作『疸』。

⑰厚：原作『屈』，據晦明軒本改。
⑱水：原作『未』，據晦明軒本改。
㊴强：晦明軒本作『狂』。
㉗不：晦明軒本作『攪』。
㉑子：晦明軒本作『了』。
㉜發背：原作『背發』，據晦明軒本乙正。
㉘已：晦明軒本作『上』。
㉔安：『安』下原衍『安』字，據晦明軒本删。
㉕實：晦明軒本作『漬』。
㉖吐：原作『上』，據晦明軒本改。
㉗温：原作『湛』，據晦明軒本改。
㉘温：晦明軒本作『分』。
㉘勝：原作『千』，據晦明軒本改。
㉘絶：晦明軒本作『脱』。
㉛得：晦明軒本作『慎風』。
㉜重：『重』下原衍『後有太常少卿舒昭亮，用苦參已數年此病。曰苦參入齒，其氣味傷腎，故使人腰重』三十二字，據晦明軒本删。
㉘處：原脱，據晦明軒本補。
㉞濾：原作『慮』，據晦明軒本改。
㉟根：原作『少』，據晦明軒本改。
㊱薄：原作『藻』，據晦明軒本改。
㊳岩：晦明軒本作『宕』。
㊳干：原作『肝』，據晦明軒本改。
㊴亦：晦明軒本作『今』。
㊸潞：原作『路』，據晦明軒本改。
㊶通脱木：原作『道脱水』，據晦明軒本改。
㊷息：晦明軒本作『塞』。
㊸术：晦明軒本作『木』。
㊹元：原作『比』，據晦明軒本改。

㊾一：晦明軒本作『二』。
㊻刮：原作『刊』，據晦明軒本改。
㊼即多：晦明軒本作『多即』。
㊽揀：晦明軒本作『楝』。
㊾煮：晦明軒本『煮』下有『取』字。
㊿本：晦明軒本作『天』。
(61)肥：晦明軒本作『微』。
(32)花：晦明軒本作『莖』。
(58)綸：晦明軒本作『端』。
(54)采：晦明軒本作『結』。
(56)肥：晦明軒本作『潤』。
(56)肢：原作『枝』，據晦明軒本改。
(57)上：晦明軒本作『土』。
(58)甘：晦明軒本作『苦』。
(39)煎：晦明軒本『煎』下有『至』字。
(60)一：晦明軒本作『二』。
(61)食前作兩服差：晦明軒本作『食後分二服』。
(62)白：晦明軒本『白』上有『紅』字。
(63)十：晦明軒本『十』下有『瓣』字。
(64)蛇：晦明軒本作『蚯』。
(67)不：晦明軒本作『宜』。
(66)狂：原作『任』，據晦明軒本改。
(67)紫：原作『子』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之十三

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部中品之上

知母

味苦，寒，無毒。主消渴熱中，除邪氣，益氣，療傷寒，久瘧，煩熱，脅下邪氣，肢體浮腫，下水，補不足，腸中惡及風汗、内疸。多服令人泄。

一名蚔音岐母，一名連母，一名野蔞，一名水參，一名水浚，一名貨母，一名蜤音匙，又音提母，一名女雷，一名女理，一名兒草，一名鹿列，一名韭逢，一名兒踵草，一名東根，一名水須，一名沈燔，一名蓴杜含切。臣禹錫等謹按《唐本》一名昌支。生河内川谷。二月、八月採根，曝乾。

《圖經》曰：知母，生河内川谷，今瀕河諸郡及解州、滁州亦有之。根黄色，似菖蒲而柔潤。藥❶至難死，掘出隨生，須燥乃止。四月開青花，八月結

實。二月、八月採根，暴❷乾用。

《藥性論》云：知母，君，性平。主

知母

威勝軍　解州　滁州　隰州　衛州











治心煩躁悶，骨熱勞來往，生産後蓐勞，腎氣勞，憎寒虛損，患人虛而口乾，加而用之。

陶隱居云：今出彭城。似菖蒲而柔潤，葉至難死，掘出隨生，須枯燥乃止。甚療熱結，亦主瘧熱煩也。郭云：生山上，葉如韭。

范子云：提母出三輔，黃白者善。

《日華子》云：味苦、甘。治熱勞，傳尸疰病，通小腸，消風痰，止嗽，潤心肺，補虛乏❸，安心，止驚悸。

雷公云：凡使，先於槐砧上細剉，焙乾，木臼杵搗，勿令犯鐵器。

《聖惠方》：治妊娠月未足似欲産，腹中痛。用知母二兩末，蜜丸如梧桐子大，不計時候，粥飲下二十丸。《楊氏方》同。

貝母　味辛、苦，平、微寒，無毒。主傷寒煩熱，淋瀝、邪氣、疝瘕，喉痹，乳難，金瘡風痙，療腹中結實，心下滿，洗洗惡風寒，目眩項直，咳嗽上氣，止煩熱渴，出汗，安五臟，利骨髓。一名

貝母

越州　峽州







空草，一名藥實，一名苦花，一名苦菜，一名商草，一名勒❹母。生晉地。十月採根，曝乾。厚朴、白薇爲之使，惡桃花，畏秦艽、礬石、莽草，反烏頭。

《圖經》曰：貝母生晉地，今河中、江陵府、郢、壽、隨、鄭、蔡、潤、滁州皆有之。根有辨❺子，黃白色，如聚貝子，故名貝母。二月生苗，莖細青色，葉亦青，似蕎麥，葉隨苗出。七月開花碧綠色，形如彭❻子花。八月採。又云：四

月蒜熟時採之良。此藥亦治惡瘡。唐人記其事云：江左嘗有商人，左膊上有瘡，如人面，亦無他苦。商人戲滴酒口中，其面亦赤色。以物食之，亦能食，食多則覺膊内肉脹起。或不食之，則一臂痹。有善醫者，教其歷試諸藥，金石草木之類，悉試之無苦，至貝母，其瘡乃聚眉閉口，商人喜曰：此藥可治也。因以小葦筒毀其口灌之，數日成痂，遂愈，然不知何疾也。

《藥性論》云：貝母，臣，微寒。治虚熱，主難産，作末服之。兼治胞衣不出，取七枚末酒下。末，點眼去膚翳。主胸中逆氣，療時疾、黄疸。與連翹同主項下瘤癭疾。

陶隱居云：今出近道。形似聚貝子，故名貝母。斷穀，服之不饑。

《唐本》注云：此葉似大蒜。四月蒜熟時，採良。若十月苗枯，根亦不佳也。出潤州、荆州、襄州者最佳，江南諸州亦有。味甘、苦、不辛。按《爾雅》一名荷。

《日華子》云：消痰，潤心肺。末和沙糖爲丸，含止嗽。燒灰油❼，傅人畜惡瘡。

雷公云：凡使，先於柳木灰中炮令黄。擘破。去内口鼻上有米許大者心一小顆。然拌糯米於鐺上同炒，待米黄熟，然後去米，取出。其中有獨顆採根，曝乾。當歸爲之使，惡旋復花。

《圖經》曰：白芷，生河東川谷下澤。二月、八月採根，曝乾。

白芷



澤州

白芷　味辛，温，無毒。主女人漏下赤白，血閉，陰腫，寒熱，風頭侵目泪出，長肌膚，潤澤，可作面脂，療風邪，除風邪，主女人血崩及嘔逆，明目止泪出。療婦人瀝血腰痛，能蝕膿。

《日華子》云：治目赤弩肉，及補胎漏滑落，破宿血，補新血，乳癰發背，瘰癧，腸風，痔瘻，排膿，瘡痍疥癬，止久渴，吐嘔，兩脅滿，風痛，頭眩目癢。可作膏藥、面脂，潤顔色。一名白茝，一名苻蘺，一名澤芬。葉名蒿音歷麻，可作一名白芷，一名芳草，生河東川谷下澤。二月、八月採根，曝乾。當歸爲之使，惡旋復花。

痛，生肌，去面皯疵瘢癜。

雷公云：凡採得後，勿用四條作一處生者，此名喪公藤。兼勿用馬藺，并不入藥中。採得刮削上皮，細剉，用黃精亦細剉，竹刀切，二味各等分，兩度蒸一伏時後，取出。於日中曬乾，去黃精用之。

《子母秘録》：治小兒身熱。白芷煮湯浴之，避風。

《外臺秘要》：治丹癮疹。白芷及根葉煮汁洗之，效。

《衍義》曰：白芷，菹是也。出吴地者良。《經》曰：能蝕膿。今人用治帶下，腸有敗膿，淋露不已，腥穢殊甚，遂至臍腹更增⓫冷痛。此蓋爲敗膿血所致。卒無已期，須以此排膿。白芷一兩，單葉紅蜀葵根二兩，芍藥根白者、白蘞各半兩，蘞燒枯别研，餘爲末，同以蠟丸如梧子大，空肚及飯前，米飲下十丸或十五丸。俟膿盡，仍别以他藥補之。

淫羊藿

味辛，寒，無毒。主陰痿，絶傷，莖中痛，利小便，益氣力，强志，堅筋骨，消瘰癧瘕赤癰，下部有瘡洗出蟲。丈夫絶陽不起，女人絶陰無子，筋骨攣急，四肢不任，及老人昏耄，健⓬忘。俗名黃德祖、千兩金、乾鷄筋、放杖草、棄杖草。



生上郡陽山山谷，今江東、陝西、泰山、漢中、湖湘間皆有之。此草似杏葉，上有刺，莖如粟稈，根紫色有鬚，四月開花白色，亦有紫色碎小獨頭子，五月採葉曬乾，湖湘出者葉如小豆，枝莖緊細，經冬不凋，根似黃連，關中俗呼三枝九葉草，苗高一二尺許，根、葉俱堪使。

陶隱居云：服此使人好爲陰陽。西川北部有淫羊，一日百遍合，蓋食藿所致，故名淫羊藿。

《唐本》注云：此草，葉形似小豆而圓薄，莖細亦堅，所在皆有，俗名仙靈脾者是也。

禹錫云：按《蜀本》云：淫羊藿，注云：生處不聞水聲者良。

《日華子》云：仙靈脾，紫芝爲使，得酒良。治一切冷風勞氣，補腰膝，强心力，丈夫絶陽不起，女人絶陰無子，筋骨攣急，四肢不任，及老人昏耄，健⓬忘。俗名黃德祖、千兩金、乾鷄筋、放杖草、棄杖草。

雷公云：凡使時呼仙靈脾，須用生上郡陽山山谷者，細剉，用羊脂四兩爲度也。

《聖惠方》：治偏風，手足不遂，皮膚不仁，宜服仙靈脾浸酒方：仙靈脾葉曬乾，湖湘出者，細剉，以生絹袋盛於不津器⓭中，用無灰酒一⓮斗浸之，以厚紙重重密封不通氣，春夏二⓭日，秋冬五日，後旋開，每日隨性暖飲之，常令醺醺，

不得大醉。若酒盡，再合服之，無不效驗。合時切忌鷄犬見之。

《經驗方》：治瘡子入眼。以仙靈脾、葳靈仙等分爲末，食後米湯下一⑲錢匕，小兒半錢匕。

《食醫心鏡》：益丈夫，興陽，理脾⑰膝冷。淫羊藿一斤，酒一斗，浸經二⑱日，飲之佳。

黄芩



黄芩　味苦，平、大寒，無毒。主諸疾⑲黄疸，腸澼泄痢，月⑳水下血閉，惡瘡疽蝕火瘡，療痰熱，胃中熱，小便澀痛㉑，消穀，利小腸，女子血閉，淋露下血，小兒腹痛。一名腐腸，一名内虚，一名黄文，一名經芩，一名妬婦。其子主腸澼膿血。生秭歸山㉒谷及冤句。三月三日採㉓根，陰乾。得厚朴、黄連止腹痛。得五味子、牡蒙、牡蠣令人有子。得黄耆、白斂、赤小豆療鼠瘻。山茱萸、龍骨爲之使。惡葱實，畏丹砂、牡丹、藜蘆。

《圖經》曰：黄芩，生秭歸山谷及冤句，今川蜀、河東、陝西近郡皆有之。苗長尺餘，莖幹粗如箸，葉從地四面作叢生，類紫草，高一尺許，亦有一莖者，葉細長，青色，兩兩相對。六月開花紫色，根黄如知母粗細，長四五寸，二月、八月採根，暴乾用之。張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯，四方皆用黄芩，以其主諸熱，利小腸故也。又太陽病，下之利不止，有葛㉔根黄芩黄連湯㉕，及㉖主妊娠安胎散㉗，亦多用黄芩。今醫家嘗用有效者，因著之。又《千金方》：巴郡太守奏加減三黄丸，療男子五勞七傷，消渴，不生肌肉，婦人帶下，手足寒熱者。久服走及奔馬，近頻有驗。食禁猪肉。又陶隱居云：黄芩丸者名子芩，爲勝，破者名宿芩，其腹中皆爛，故名腐腸，惟取深色堅實者㉘爲好。

《唐本》注云：葉細長，兩葉相對，作叢生，亦有獨莖者。今出沂㉖州、鄜州、涇州者佳。兖州者大實亦好，名豚尾芩也。

禹錫云：按《藥性論》云：黄芩，臣，味苦、甘。能治熱毒，骨蒸，寒熱往來，腸胃不利，破擁氣，治五淋，令人宣暢，去關節煩悶，解熱渴，治熱，腹中疠痛，心腹堅脹。

《日華子》云：下氣，主天行熱疾，丁瘡，排膿，治乳癰、發背。

《千金翼方》：治淋。黄芩四兩，袋貯之，水五升，煮三升，分三服。

《梅師方》：治火丹。杵黄芩末，水調傅之。

狗脊

味苦、甘，平，微温，無毒。主腰背强，關機緩急，周痹，寒濕膝痛，頗利老人，療失溺不節，男子脚弱腰痛，風邪淋露，少氣，目暗，肩脊利俯仰，女子傷中，關節重。一名百枝，一出彭城，鄧州亦有之。圓者名子芩

狗脊



名强脊，一名扶蓋，一名扶筋。生常山川谷，二月、八月採根，曝乾。莖蘼爲之使，惡敗醬。

《圖經》曰：狗脊，生常山川谷，今太行山、淄、溫、眉州亦有。根黑色，長三四寸，兩指許大，苗尖細碎，青色，高一尺已來，無花。其莖、葉似貫衆而細，其根長而多歧，似狗脊骨，故以名之。其肉青緑，春秋採根，暴乾用。今方亦用金毛者。

《藥性論》云：狗脊，味苦、辛，微熱。治男子、女人毒風，軟脚邪氣濕痹，腎氣虛弱，益男子，續筋骨。

陶隱居云：今山野處處有，與菝葜相似而小異。其莖、葉少肥，其節疏，其莖大直，上有刺，葉圓有赤脉。根凹凸龍嵕如羊角，細强者是。

《唐本》注云：此藥，苗似貫衆，根長多歧，狀如狗脊骨，其肉作青緑色，今京下用者是。陶所説乃有刺蕘蘼，非狗脊也，今江左俗尤用之。

禹錫云：按吴氏云：狗脊，一名狗青，一名赤節。神農：苦。桐君、黄帝、岐伯、雷公、扁鵲：甘，無毒。季氏：小温。如蕘蘼，莖節如竹，有刺，葉圓赤，根黄白，亦如竹根。岐伯經云：莖無節，葉端圓青赤，皮白，有赤脉。

雷公云：凡使，勿用透山藤，其大腳根與透山藤一般，只是入頂苦，不可餌之。凡修事，細剉了，酒拌，蒸，從巳至申，出，曬乾用。

石龍芮



味苦，平，無毒。主風寒濕痹，心腹邪氣，利關節，止煩滿，平補陰氣不足，失精莖冷。久服輕身，明目，不老，令人皮膚光澤，有子。一名魯果能，一名地椹，一名石能，一名彭根，一名天豆。生太山川澤石邊。五月五日採子，二月、八月採皮，陰乾。大戟爲之使，畏蛇蜕皮、吴茱萸相似而小異。

《圖經》曰：石龍芮，生泰山川澤石邊。陶隱居云：近道處處有之。今惟出兗州。一叢數莖，青紫色，每莖三葉，其葉芮芮短小多刻缺。子如葶藶而色黄。五月採子，二月、八月採皮，陰乾用。能逐諸風，除心熱躁。蘇恭云：俗名水堇，苗如附子，實如桑椹。生下濕地，此乃水堇，非石龍芮也。今

兖州所生者，正與《本經》、陶説相合，爲得其真也。

陶隱居云：今出近道，子形粗，似蛇床子而扁，非真好者，人言是蓄菜子爾。東山石上所生。其葉芮芮短小，其子狀如葶藶，黄色而味小辛，此乃實是也。

《唐本》注云：今用者，俗名水堇。苗似附子，實如桑椹，故名地椹。生下濕地，五月熟，葉、子皆味辛，山南者粒大如葵子。關中、河北者細如葶藶，氣力劣於山南者。陶以細者爲真，未爲通論。又《别録》水堇云：主毒腫，癰瘡，蛔蟲，齒齲。堇，音謹。

陳藏器云：芮子，味辛。按蘇《别藥録》云：水堇，主毒腫，蛇蟲，齒齲。且水堇如蘇所注，定是石龍芮，更非别草。《爾雅》云：茛，堇草。郭注云：烏頭苗也。蘇又注天雄云：石龍芮，葉似堇草，又㊵名水堇。如此，則依蘇所注是水堇，附子是堇草。二物同名也。

禹錫云：按《藥性論》云：石龍芮，能逐諸風，主除心熱躁。

《衍義》曰：石龍芮，有兩種：水中生者，葉光而末圓；陸生者，葉有毛而末鋭。入藥須生水者。陸生者謂之。春生苗，布地如針，天炙，取少葉揉繫臂上，一夜作大泡，如火燒者是。惟陸生者，補陰不足，莖常冷，失精。餘如《經》。

茅根

州鼎



州澶

味甘，寒，無毒。主勞傷虚羸，補中益氣，除瘀血、血閉，寒熱，利小便，下五淋，除客熱在腸胃，止渴，堅筋，婦人崩中。久服利人。其苗主下水。一名蘭根，一名茹根，一名地菅，一名地筋，一名兼杜。生楚地山谷、田野。六月採根。

《圖經》曰：茅根，生楚地山谷、田野，今處處有之。春生苗，布地如針，俗間謂之茅針，亦可啖，甚益小兒，夏生白花茸茸然，至秋而枯。其根至潔白，亦甚甘美，六月採根用。

陶隱居云：此即今白茅菅。《詩》云：露彼菅茅，其根如渣芹，甜美。服食此，斷穀甚良。俗方稀用。

《唐本》注云：茅針，味甘，平，無毒。主惡瘡腫未潰者，煮服之。服一針一孔，二針二孔。生挼傅金瘡，止血。煮服之，主鼻衄及暴下血。成白花者，功用亦同。針即茅笋也。又云：屋茅，主卒吐血。細剉三升，酒煮，服一升。屋上爛茅，和醬汁研傅斑瘡，蠶嚙瘡。一名百足蟲。茅屋滴溜水，殺雲母毒。

《日華子》云：茅針，凉。通小腸，癰毒、軟節不作頭，濃煎和酒服。花瞢刀箭瘡，止血并痛。根主婦人月經不

勻。又云：茅根，通血脉淋瀝，是白花茅根也。

《肘後方》：療熱。取白茅根四升剉，水一斗五升，煮取五升，適冷暖飲之，日三。又治竹木刺肉。

紫菀

州房



州甘



州泗



紫菀　味苦、辛，温，無毒。主飲[32]逆上氣，胸中寒熱結氣，去勞傷[33]，痿蹶，安五臟，療咳[34]唾膿血，止喘悸，五勞體虚，補不足，小兒驚癇。一名紫菀，一名青苑。生房陵山谷及真定、邯鄲。二月、三月採根，陰乾。款冬爲之使，惡天雄、瞿麥、雷丸、遠志、茵[35]蔯蒿。

《圖經》曰：紫菀，生房陵山谷及真定、邯鄲，今耀、城[36]、泗、壽、臺、孟州，興國軍皆有之。三月内布地生苗葉，其葉三四相連，五月、六月内開黄、紫、白花，結黑子。本有白毛，根甚柔細。二月、三月内取根陰乾用。又有一種白者名白菀。《古今傳信方》用之最要，近醫療久嗽不差，此方甚佳。紫菀去蘆頭、款冬花各一兩，百部半兩，三物擣[37]羅爲末，每服三錢匕。生薑三片，烏梅一個，同煎湯調下，食後、欲卧各一服。

陶隱居云：近道處處有，生布地，花亦紫，本有白毛，根甚柔細。有白者名白菀，不復用。

《唐本》注云：白菀即女菀也。療體與紫菀同。無紫菀時亦用白菀。陶云不復用，或是未悉。

禹錫云：按《藥性論》云：紫菀，臣，味苦，平。能治尸疰，補虚，下氣及胸脅逆氣，治百邪鬼魅，勞氣虚熱。

《日華子》云：調中及肺痿吐血，消痰止渴，潤肌膚，添骨髓。形似重臺，根作節，紫色，潤軟者佳。

雷公云：凡使，先去髭，有白如練色者，號曰羊鬚草，自然不同。採得後，去頭土了，用東流水淘洗令净，用蜜浸一宿，至明取於火上焙乾用。凡修一兩，用蜜二分。

《千金方》：治婦人卒不得小便。紫菀末，以井花水服三撮，便通。小便血，服五撮立止。

《斗門方》：治纏喉風，喉閉飲食不通欲死者。用返魂草根一莖，净洗内入喉中，待取惡涎出即差，神驗。更以馬牙消津咽之，即絶根本。一名紫菀，又南中呼爲液牽牛是也。

《衍義》曰：紫菀，用根。其根細柔，紫色，益肺氣，《經》具言之。《唐本》注云：無紫菀時，用白菀。今本草無白菀之名，蓋唐即女菀也。修本草删去。

紫草

單州　東京



紫草　味苦，寒，無毒。主心腹邪氣，五疸，補中益氣，利九竅，通水道，療腹腫脹滿痛。以合膏，療小兒瘡及面皶側加切。一名紫丹，一名紫芙哀老切。生碭山山谷及楚地。三月採根，陰乾。

《圖經》曰：紫草，出碭山山谷及楚地，今處處有之，人家園圃中或種蒔，其根所以染紫也。《爾雅》謂之藐，《廣雅》謂之茈莀。苗似蘭香，節青。二月有花，紫白色，秋實白，三月採根，陰乾。治傷寒時疾，發瘡疹不出者，以此作藥，使其發出。韋宙《獨行方》治豌豆瘡，煮紫草湯飲。後人相承用之，其效尤速。

《藥性論》云：紫草亦可單用。味甘，平。能治惡瘡瘑癬。

陶隱居云：今出襄陽，多從南陽、新野來，彼人種之，即是今染紫者，方藥家都不復用。

《博物志》云：平氏陽山紫草特好。魏國以染色，殊黑。比年東山亦種，色小淺於此者。

雷公云：凡使，須用臘水蒸之，待水乾，取去頭并兩畔髭，細剉用。每修事，紫草一斤，用臘三兩，於鐺中鎔，鎔盡，便投蠟水作湯用。

《聖惠方》：治卒小便淋瀝痛。紫草一兩，搗爲散，食前，井水調下二錢匕。又治蟲咬，紫草油塗之。

《經驗後方》：治嬰兒童子患疹豆疾。用紫草二兩細剉，以百沸湯一大盞泡，便以物合定，勿令氣漏，放如人體温，量兒大小，服半合至一合，服此瘡雖出，亦當減輕。

前胡

淄州　絳州　江寧府　建州　成州



前胡　味苦，微寒，無毒。主療痰滿，胸脅中痞，心腹結氣，風頭痛，去痰實，下氣。治傷寒寒熱，推陳致新，明目，益精。二月、八月採根，曝乾。半夏爲之使，惡皂莢，畏藜蘆。

《圖經》曰：前胡，舊不著所出州土，今陝西、漢、梁、江淮、荆襄州郡及相州、孟州皆有之。春生苗，青白色，似斜蒿。初出時有白芽，長三四寸，味甚香美，又似芸蒿。七月内開白花，與葱花相類。八月結實。根細，青紫色。

二月、八月採，暴乾。今諸方所用前胡皆不同。京師此[39]地者，色黃白，枯脆，絶無氣味。江東乃有三四種，一種類當歸，皮斑黑，肌黃而脂潤，氣味濃烈。一種色理黃白，似人參而細短，香味都微。

陶隱居云：前胡，似柴胡而柔軟，爲療殆欲同，而《本經》上品有芘胡而無此，後來醫方用之。亦有畏惡，明畏惡非盡出《本經》也。此近道皆有，生下濕地，出吴興者爲勝。

禹錫云：按《藥性論》云：前胡，使，味甘、辛。能去熱實，下氣，主時氣內外俱熱。單煮服佳。

《日華子》云：治一切勞，下一切氣，止嗽，破癥結，開胃下食，通五臟，主霍亂轉筋，骨節煩悶，反胃嘔逆，氣喘，安胎，小兒一切疳氣。越、衢、婺、睦等處皆産[40]。七八月採。外黑裏白。

雷公云：凡使，勿用野蒿根，緣真似前胡，只是味咀咀[40]酸。若誤用，令人胃反不受食。若是前胡，味甘、微苦。凡修事，先用刀刮上蒼黑皮并髭土了，細剉，用甜竹瀝浸令潤，於日中曬乾用之。

《外臺秘要》：治小兒夜啼。前胡搗篩，蜜丸如小豆。日服一丸，熟水下，至五六丸，以差爲度。

禹錫云：按《藥性論》云：鹿醬，臣，敗醬是也。味辛、苦，微寒。治毒風瘋痹，主破多年凝血，能化膿爲水及産後諸病，及[42]腹痛餘疹，煩渴。

《日華子》云：味酸。治赤眼障膜，弩肉，瞎耳，血氣心腹痛，破癥結，産前[40]諸疾，催生落胞，血運，排膿，補癆，鼻洪，吐血，赤白帶下，瘡痍疥癬，丹毒。又名酸益。七八十月採。

雷公云：凡使，收得後便粗杵，入甘草葉相拌對蒸，從巳至未，出，焙乾，去甘草葉，取用。

《楊氏産乳》治蠼螋溺繞腰者。煎敗醬汁塗之，差。

敗醬

味苦、鹹，平、微寒，無毒。主暴熱火瘡，赤氣，疥瘙，瘡痔，馬鞍熱氣，除癰腫，浮腫，結熱，風痹不足，産後疾痛。一名鹿腸，一名鹿首，一名馬草，一名澤敗。生江夏川谷。八月採根，曝乾。



江寧府

《圖經》曰：敗醬，生江東亦有之，多生崗嶺間。葉似水莨及薇銜，叢生，花黃根紫色，似柴胡，作陳敗醬氣，故以爲名。八月採根，暴乾用。

陶隱居云：出近道，葉似猕猴桃，根形似芘胡，氣如敗豆醬，故以爲名。

《唐本》注云：不出近道，多生崗嶺間。葉似水莨及薇銜，叢生，花黃根紫，作陳醬色，葉殊不似猕猴桃。

禹錫云：按《藥性論》云：鹿醬，味辛、苦，微寒。治毒風瘋痹，主破多年凝血，能化膿爲水及産後諸病，及[42]腹痛餘疹，煩渴。

《日華子》云：味酸。治赤眼障膜，弩肉，瞎耳，血氣心腹痛，破癥結，産前[40]諸疾，催生落胞，血運，排膿，補癆，鼻洪，吐血，赤白帶下，瘡痍疥癬，丹毒。又名酸益。七八十月採。

雷公云：凡使，收得後便粗杵，入甘草葉相拌對蒸，從巳至未，出，焙乾，去甘草葉，取用。

《楊氏産乳》治蠼螋溺繞腰者。煎敗醬汁塗之，差。

白鮮

味苦、鹹，寒，無毒。主頭風，黃疸，咳逆，淋瀝，女子陰中腫痛，濕痹死肌，不可屈伸，起止行步，療四肢不安，時行腹中大熱飲水，欲走大

白鮮

江寧府　滁州



呼，小兒驚癇，婦人産後餘痛。生上谷川谷及冤句。四月、五月採根，陰乾。

惡螵蛸、桔梗、茯苓、菴蕳蘼。

《圖經》曰：白鮮，生上谷及滁州、潤州亦有之。苗高尺餘，莖青，葉稍白如槐，亦似茱萸。四月開花淡紫色，似小蜀葵。根似蔓菁，皮黄白而心實。四月、八月採根，陰乾用。葛洪治鼠瘻已有口，膿血出者，白鮮皮煮汁服一升，當吐鼠子乃愈。

陶隱居云：近道處處有，以蜀中者爲良。俗呼爲白羊鮮，氣息正似羊羶，或名白羶。

《唐本》注云：葉似茱萸，苗高尺餘，根白心實，花紫白色。根宜二月採。若四五月採，便虚惡也。

禹錫云：按《藥性論》云：白鮮皮，

酸漿



味酸，平、寒，無毒。主熱煩滿，定志益氣，利水道，産難吞其實立産。一名醋漿。生荆楚川澤及人家田園中。五月採，陰乾。

《圖經》曰：酸漿，生荆楚川澤及人家田園中，今處處有之。苗似水茹，而小，葉亦可食。實作房如囊，囊中有子，如梅李大，皆赤黄色。小兒食之尤有益。可除熱。

陶隱居云：處處人家多有。葉亦可食，子作房，房中有子，如梅李大，皆黄赤色。小兒食之能除熱，亦主黄病，多效。

禹錫云：按《蜀本》注云：根如菹芹，白色，絶苦，搗其汁治黄病，多效。

《爾雅》云：箴，寒漿。注：今酸漿草，江東人呼曰苦箴。

《千金方》：治婦人赤白帶下。三葉酸漿草陰乾爲末，空心温酒下三錢匕。

《靈苑方》：治卒患諸淋，遺瀝不止，小便赤瀝疼痛。三葉酸漿草，人家園林亭檻中，著地開黄花，味酸者是。取嫩者净洗，研絞自然汁一合，酒一合，攪湯暖，令空心服之，立通。

《衍義》曰：酸漿，今天下皆有之。苗如天茄子，開小白花，結青殼。熟則

深㊀，穀中子大如櫻，亦紅色。櫻中復有細子，如落蘇子，食之有青草氣。此即苦耽也。今《圖經》又立苦耽條，顯然重復。《本經》無苦耽。

紫參

滁州　濠州　眉州　晉州



紫參　味苦、辛，寒、微寒，無毒。主心腹積聚，寒熱邪氣，通九竅，利大小便，療腸胃大熱，唾血，衄血，腸中聚血，癰腫，諸瘡，止渴，益精。一名馬行。一名牡蒙，一名衆戎，一名童腸，一名生河西及冤句山谷。三月採根，火炙使紫色。畏辛夷。

《圖經》曰：紫參，生河西及冤句山谷，今河中解、晉、齊及淮、蜀州郡皆有之。苗長一二尺，根淡紫色如地黃狀，莖青而細，葉亦青似槐葉，亦有似羊蹄者。五月開花，白色似葱花。張仲景治痢，紫參湯主之。紫參半斤，甘草二兩，以水五升煎紫參，取二升，內甘草煎取半升，分温二㊁服。

《藥性論》云：紫參，使，味苦。能散瘀血，主心腹堅脹，治婦人血閉不通。

陶隱居云：今方家皆呼爲牡蒙，用之亦少。

《唐本》注云：紫參，葉似羊蹄，紫花青穗，皮紫黑，肉紅白，肉淺皮深，所在有之。

藁本　味辛、苦，温、微温、微寒，無毒。主婦人疝瘕，陰中寒腫痛，腹中急，除風頭痛，長肌膚，悦顔色，辟霧露，金瘡，可作沐藥面脂。實：主風流四肢。一名鬼卿，一名地新，一名微莖。生崇山山谷。正月、二月採根，曝乾，三十日成。惡蔺茹。

威勝軍　并州　寧化軍



《圖經》曰：藁本，生崇山山谷，今西川、河東州郡及兗州、杭州有之。葉似白芷香，又似芎藭，但芎藭似水芹而大，藁本葉細耳。根上苗下似禾藁，故以名之。

陶隱居云：俗中皆用芎藭根鬚，其形氣乃相類。而《桐君藥録》説芎藭苗似藁本，論説花實皆不同，所生處又異。今東山別有藁本，形氣甚相似，惟長大爾。

禹錫云：按《藥性論》云：藁本，臣，微温。畏青葙子。能治百六十種

惡風，鬼疰[51]，流入腰痛冷[53]，能化小便，通血，去頭風，黈[53]疱。

《日華子》云：治癇疾并皮膚疵奸，酒齄[54]，粉刺。



石韋

石韋　味苦、甘，平，無毒。主勞熱邪氣，五癃閉不通，利小便水道，止煩下氣，通膀胱朘滿，補五勞，安五臟，去惡風，益精氣。一名石韡之夜切，一名石皮。用之去黃毛，毛射人肺，令人咳不可療。生華陰山谷石上，不聞水及人聲者良。二月採葉，陰乾。滑石、杏仁爲之使，禹錫等按《蜀本》作絡石。得菖蒲良。

《圖經》曰：石韋，生華陰山谷石上，今晉、絳、滁、海、福州，江寧府皆有之。叢生石上，葉如柳，背有毛而斑點如皮，故以名之。以不聞水聲者良。二月、七月採葉，陰乾用。南中醫人炒末，冷酒調服，療發背甚效。一名石皮，福州自有一種石皮，三月有花，其月採葉煎浴湯，主風。又有生古瓦上，名瓦韋，治淋。

陶隱居云：蔓延石上，生葉如皮，故名石韋。今處處有。以不聞水聲、人聲爲佳。出建平者，葉長大而厚。

禹錫云：按《藥性論》云：石韋，使，微寒。治勞及五淋，胞囊結熱不通，去膀胱朘熱滿。



興元府　邛州　荆門軍　成德軍

葶藶

葶藶　味苦、甘，平，無毒。主腰背痛强，骨節風寒濕周痹，惡瘡不瘳，熱氣，傷中，恚怒，陰痿失溺，關節老血，老人五緩。一名赤節。生真定山谷。二月、八月採根，曝乾。薏苡爲之使，畏葵根、大黃、葩胡、牡蠣。

《圖經》曰：葶藶，生真定山谷，今河、陝、京東、荆、蜀諸郡有之。根黃白色，多節，三指許大。苗葉俱青，作蔓生，葉作三叉似山芋，又似緑豆葉。花有黃、紅、白數種，亦有無花結白子者。春、秋採根，暴乾。舊説此藥有二種：莖有刺者，根白實；無刺者，根虚軟，以軟者爲勝。

《正元廣利方》療丈夫腰脚痹緩急，行履不穩者。以葶藶二十四分，合杜仲八分，搗篩。每日[53]温酒和服三錢匕，增至五匕。禁食牛肉。

陶隱居云：今處處有，亦似菠薐而小異，根大，不甚有角節，色小淺。

《唐本》注云：此藥有二種：莖有刺者，根白實；無刺者，根虚軟。内軟者爲勝，葉似署預，蔓生。

禹錫云：按《藥性論》云：蕘蘼，能治冷風痛痹，腰脚不遂，手足驚掣，主男子腎腰痛。久冷，是腎間有膀胱宿水。

《日華子》云：治癰緩軟，風頭旋，癇疾，補水臟，堅筋骨，益精，明目，中風失音。時人呼爲白菝葜。

孫尚藥：治腸痔漏如聖散：蕘蘼去土，等分搗細剉，貫衆逐葉擘下了，去土，等分搗羅，末。每服二錢，温酒調下，空心食前服。



杜蘅

杜蘅　味辛，温，無毒。主風寒咳逆。香人衣體。生山谷。三月三日採根，熟洗，曝乾。

《圖經》曰：杜蘅，舊不著所出州土，今江淮間皆有之。謹按《山海經》云：天帝之山有草，狀如葵，其臭如蘼蕪，名曰杜蘅，可以走馬，食之已癭。郭璞注云：帶之可以走馬，或曰：馬得之則健走。《爾雅》謂之杜，又名土卤。然杜若亦名杜蘅，或疑是杜若。據郭璞注云：似葵而香，故知是此杜蘅也。

《藥性論》云：杜蘅，使。能止氣奔喘促，消痰飲，破留血，主項間瘤癭之疾。

陶隱居云：根、葉都似細辛，惟香[56]小異爾。處處有之。方藥少用，惟道家服之。令人身衣香。

《唐本》注云：杜蘅葉似葵，形如馬蹄，故俗云馬蹄香。生必[57]之陰，水澤下濕地。根似細辛、白前等。今俗以及己代之，謬矣。及己獨莖，莖端四葉，葉間白花，殊無芳氣。有獨[58]，服之令人吐，惟療瘡疥，不可亂杜蘅也。



白薇

白薇　味苦、鹹，平、大寒，無毒。主暴中風，身熱肢滿，忽忽不知人，狂惑邪氣，寒熱酸疼，温瘧洗洗，發作有時，療傷中淋露，下水氣，利陰氣益精。一名白幕，一名薇草，一名春草，一名滁州。久服利人。生平原川谷。三月三日採根，陰乾。惡黄耆、大黄、大戟、乾薑、乾漆、山茱萸、大棗。

《圖經》曰：今陝西諸郡亦有之。根黄白色，今云八月採。

陶隱居云：近道處處有。根狀如牛膝而短小。方家多用，療驚邪，風狂，疰病。

禹錫云：按《藥性論》云：白薇，

金釵股　味甘[57]，平，小毒。解諸藥毒，人中毒者，煮汁服之。亦生研更烈，必大吐下，如無毒，亦吐，去熱痰瘧瘴，天行蠱毒，喉閉。生嶺南山谷。根

如細辛，三四十莖，一名三十根釵子股，嶺南人用之。

離鬲草　味辛，寒，有小毒。主瘰癧丹毒，小兒無辜寒熱，大腹痞滿，痰飲膈上熱。生研絞汁服一合，當吐出胸膈間宿物。生人家階庭濕處，高三二寸，苗葉似羃䍦，去瘧爲上，江東有之，北土無。

圖經衍義本草卷之十三

❶藥：晦明軒本作『葉』。
❷暴：原作『異』，據晦明軒本改。
❸乏：原作『之』，據晦明軒本改。
❹勒：晦明軒本作『勤』。
❺辨：晦明軒本作『瓣』。
❻彭：晦明軒本作『鼓』。
❼油：晦明軒本『油』下有『調』字。
❽若誤：原作『水設』，據晦明軒本改。
❾亦：晦明軒本作『尤』。
❿三：原作『生』，據晦明軒本改。
⓫增：原作『曾』，據晦明軒本改。
⓬健：晦明軒本『健』上有『中年』二字。
⓭器：原作『氣』，據晦明軒本改。
⓮一：晦明軒本作『二』。
⓯二：晦明軒本作『三』。
⓰一：晦明軒本作『二』。
⓱脾：晦明軒本作『脚』。
⓲二：晦明軒本作『三』。
⓳疾：晦明軒本作『熱』。
⓴月：晦明軒本作『逐』。
㉑小便澀痛：晦明軒本作『小腹絞痛』。
㉒山：晦明軒本作『川』。
㉓採：原作『探』，據晦明軒本改。
㉔葛：原作『下』，據晦明軒本改。
㉕湯：原脱，據晦明軒本補。
㉖及：原作『亦』，據晦明軒本改。
㉗散：原作『故』，據晦明軒本改。
㉘者：原脱，據晦明軒本補。
㉙沂：晦明軒本作『宜』。
㉚又：晦明軒本作『故』。
㉛堇：原脱，據晦明軒本補。
㉜飲：晦明軒本作『咳』。
㉝勞傷：晦明軒本作『蠱毒』。
㉞咳：原作『飲』，據晦明軒本改。
㉟茵：晦明軒本『茵』上有『畏』字。
㊱城：晦明軒本作『成』。
㊲擳：晦明軒本作『搗』。
㊳白：原脱，據晦明軒本補。
㊴此：晦明軒本作『北』。
㊵産：晦明軒本作『好』。
㊶咀咀：晦明軒本作『粗』。
㊷及：晦明軒本作『止』。
㊸前：晦明軒本『前』下有『後』字。
㊹八：晦明軒本作『五』。
㊺節：原脱，據晦明軒本補。
㊻以：晦明軒本作『亦』。
㊼茹：晦明軒本作『茄』。
㊽澀：晦明軒本作『瀝』。
㊾深：晦明軒本『深』下有『紅』字。
㊿二：晦明軒本作『三』。
(51)疰：原作『症』，據晦明軒本改。
(52)冷：原作『今』，據晦明軒本改。
(53)黖：原作『點』，據晦明軒本改。
(54)齇：原作『齆』，據晦明軒本改。
(55)日：晦明軒本作『旦』。
(56)香：晦明軒本作『氣』。
(57)必：晦明軒本作『山』。
(58)獨：晦明軒本作『毒』。
(59)鬼魅：此下原有『瞿麥』、『玄參』、『秦艽』等藥大段文字，與卷十二重出，今删。
(60)甘：晦明軒本作『辛』。

圖經衍義本草卷之十四

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部中品之下❶

牛蒡子

蜀州



牛蒡子 惡實：味辛，平。主明目，補中，除風傷。根、莖療傷寒寒熱汗出，中風面腫，消渴熱中，逐水。久服輕身耐老。生魯山平澤。

陶隱居云：方藥不復用。

《唐本》注云：魯山在鄧州東北。其草、葉大如芋，子殼似栗狀，實細長如茺蔚子。根主牙齒疼痛，勞瘧，脚弱，風毒癰疽，咳嗽傷肺，肺壅，疝瘕，止❷血，主諸風癥瘕，冷氣。吞一枚，出癰疽頭。《別録》名牛蒡。一名鼠黏草。

今按：陳藏器《本草》云：惡實根，蒸，暴乾，不爾，令人欲吐。浸酒去風，又治惡瘡。子名鼠黏，上有芒，能綴鼠。味苦，主風毒腫，諸瘻。根可作茹食之，葉亦搗傅杖瘡，不膿，避風。

禹錫等按：《藥性論》云：牛蒡可單用，味甘，無毒。能主面目煩悶，四肢不健，通十二經脉，洗五臟惡氣。可常作菜食之，令人身輕。子研末，投酒中浸三日，每日服三二盞，任性飲多少，除諸風，去丹石毒，主明目，利腰脚。又食前吞三枚，熟挼下，散諸結節，筋骨煩熱毒。又根細切如豆，麵拌作飯❸食之，消脹壅。又莖、葉煮汁釀酒良。又取汁夏月多浴，去皮間習習如蟲行風，洗了慎風少時。又能搨一切腫毒。用根、葉入少許鹽花搗。

《圖經》曰：惡實即牛蒡子也，生魯山平澤，今處處有之。葉如芋而長。實似葡萄核❹而褐色，外殼如栗捄，小而多刺。鼠過之則綴惹不可脱，故謂之鼠黏子，亦如羊負來之比。根有極大者，作菜茹尤益人。秋後採子入藥用。根、葉亦可生搗，入少鹽花，以搨腫毒。又冬月採根蒸暴之入藥。劉禹錫《傳信方》療中風，用緊細牛蒡根，取時須避風，以竹刀或荆刀刮去土，用生布拭了，搗絞取汁一大升，和著❺好蜜四大合，温分爲兩服，每服相去五六里。初服得汗，汗出便差。此方得之岳鄂鄭中丞。鄭頃年至潁陽，因食一頓熱肉，便中暴風，外生❻盧代❼爲潁陽尉，有此方，當時便服得汗，隨差，神效。又《篋中方》風頭及腦掣痛不可禁者，摩膏主之。取牛蒡莖葉，搗取濃汁二升，合無灰酒一升，鹽花一匙頭，煻火煎，令稠成膏，以摩痛處，風毒散自止。亦主時行頭痛，摩時須極力令作熱，乃速效。冬月無苗，用根代之亦可。

雷公云：凡使，採之净揀，勿令有雜子，然後用酒拌蒸，待上有薄白霜重

出，却用布拭上，然後焙乾。別搗如粉用。

《食療》云：根，作脯食之良。熱毒腫，搗根及葉封之，永不畏風。又，癱瘓及丹石風葉貼之。杖瘡、金瘡，取毒，石熱發毒。明耳目，利腰膝，則取其子末之，投酒中浸經三日，每日飲三兩盞，隨性多少。錄❽散支節筋骨煩熱毒，則食前取子三七枚，熟搥吞之，十服後甚良。細切根如小豆大，拌麵作飯煮食，尤良。又，皮毛間習習如蟲行，煮根汁浴之。夏浴慎風。却入其子炒過，末之如茶，煎三匕，通利小便。

《聖惠方》：治時氣餘熱不退，煩躁發渴，四肢無力，不能飲食。用根搗絞取汁，不計時，服一小盞，立效。

《外臺秘要》：治喉痹。牛蒡子六分，馬藺子八分，搗爲散。每空心暖水服方寸匕，漸加一匕半，日再服。

《孫真人食忌》：主天行。以生牛蒡根搗取汁五大合，空腹分爲兩服。服訖，取桑葉一大把炙令黄，水一升，煮取五合，去滓預❾服，暖覆取汗，無葉用枝。

《食醫心鏡》：治熱攻心，煩躁恍惚。以牛蒡根搗汁一升，食後分三服良。

《斗門方》：治頭面忽腫，熱毒風内攻，或手足頭面腫，觸著痛。用牛蒡根，一名蝙蝠到❿，洗淨爛研，酒煎成膏，攤在紙上，貼腫處。仍熱酒調下一服，腫止痛減。

《王氏博濟》：治瘡疹。牛蒡子、浮萍等分，以蒌苛湯調下二錢，日二服。

《衍義》曰：惡實，是子也，今謂牛蒡。未去萼時，謂之鼠黏子，根謂之牛菜。疏風壅，涎唾多，咽膈不利。微炒，荆芥穗各一兩，甘草炙半兩，同爲末。食後、夜卧湯點二錢服，當緩取效。子在萼中，萼上有細鉤，多至百十，謂之芒則誤矣。根長二尺，粗如拇指，煮爛爲菜。

水萍



水萍　味辛、酸，寒，無毒。主暴熱身癢，下水氣，勝酒，長鬚髮，主消渴，下氣。以沐浴，生毛髮。久服輕身。一名水肥⓬，一名水白，一名水蘇。生雷澤池澤。三月採，曝乾。

陶隱居云：此是水中大萍爾，非今浮萍子。

《藥録》云：五月有花，白色。即非今溝渠所生者。楚王渡江所得，非斯實也。

《唐本》注云：水萍者，有三種，大者名蘋。水中又有荇菜，亦相似，而葉

圓。水上小浮萍，主火瘡。

今按：陳藏器《本草》云：水萍有三種，大者曰蘋，葉圓闊寸許，葉下一點如水沫，一名茅菜。暴乾，栝樓等分，以人乳爲丸，主消渴。搗絞汁飲，主蛇咬毒入腹，亦可傅熱瘡。小萍子是溝渠間者。末傅面黡，搗汁服之，主水腫，利小便。又人中毒，取萍子暴乾，末，酒服方寸匕。又爲膏，長髮。《本經》云水萍，應是小者。

禹錫等按：《爾雅》云：萍，萍。其大者蘋。注：水中浮萍，江東謂之藻，陸機《毛詩義疏》云：其粗大者謂之藻，小者曰萍。季春始生，可糝蒸爲茹，又可苦酒淹以就酒。

《日華子》云：治熱毒風，熱疾，熱狂，煬腫毒，湯火瘡，風疹。

《圖經》曰：水萍，生雷澤池澤，今處處溪澗中皆有之。此是水中大萍，葉圓闊寸許，葉下有一點，如水沫，一名茅菜。《爾雅》謂之萍。其大者曰蘋是也。《周南詩》云：於以採蘋。陸機云：海中浮萍粗大者謂之蘋。季春始生，可糝蒸，以爲茹。又可用苦酒淹，以挼酒。三月採，暴乾。蘇恭云：此有三種：大者曰蘋，葉下一點如水沫，一名茅菜。暴乾，栝樓等分，以人乳爲丸，主消渴。搗絞汁飲，主蛇咬毒入腹，亦可傅熱瘡。小萍子是溝渠間者。末傅面黡，搗汁服之，主水腫，利小便。又人中毒，取萍子暴乾，末，酒服方寸匕。又爲膏，長髮。《本經》云水萍，應是小者。

禹錫等按：《爾雅》云：萍，萍。其大者蘋。注：水中浮萍，江東謂之藻，陸機《毛詩義疏》云：其粗大者謂之藻，小者曰萍。季春始生，可糝蒸爲茹，又可苦酒淹以就酒。

《日華子》云：治熱毒風，熱疾，熱狂，煬腫毒，湯火瘡，風疹。

《圖經》曰：水萍，生雷澤池澤，今處處溪澗中皆有之。此是水中大萍，葉圓闊寸許，葉下有一點，如水沫，一名茅菜。《爾雅》謂之萍。其大者曰蘋是也。《周南詩》云：於以採蘋。陸機云：海中浮萍日乾，末，服方寸匕，良。季春始生，可糝蒸，以爲茹。又可用苦酒淹，以挼酒。三月採，暴乾。蘇恭云：此有三種：大者曰蘋，葉下一點如水沫，一名茅菜。暴乾，栝樓等分，以人乳爲丸，主消渴。搗絞汁飲，主蛇咬毒入腹，亦可傅熱瘡。小萍子是溝渠間者。末傅面黡，搗汁服之，主水腫，利小便。又人中毒，取萍子暴乾，末，酒服方寸匕。又爲膏，長髮。《本經》云水萍，應是小者。

禹錫等按：《爾雅》云：萍，萍。其大者蘋。注：水中浮萍，江東謂之藻，陸機《毛詩義疏》云：其粗大者謂之藻，小者曰萍。季春始生，可糝蒸爲茹，又可苦酒淹以就酒。

《日華子》云：治熱毒風，熱疾，熱狂，煬腫毒，湯火瘡，風疹。

《圖經》曰：水萍，生雷澤池澤，今處處溪澗中皆有之。此是水中大萍，葉圓闊寸許，葉下有一點，如水沫，一名茅菜。《爾雅》謂之萍。其大者曰蘋是也。《周南詩》云：於以採蘋。陸機云：海中浮萍日乾，末，服方寸匕，良。

《千金翼》：治小便不利，膀胱水氣流滯。以浮萍日一二服，良。

《孫真人食忌》：五月取浮萍陰乾，燒烟去蚊子。又主消渴，以浮萍汁服之。

《子母秘録》：熱毒，浮萍搗汁傅之令遍。高供奉《採萍時日歌》：不在山，不在岸，採我之時七月半。選甚癱風與瘓風，些小微風都不算。豆淋酒下三丸，鐵幞頭上也出汗。

王瓜



味苦，寒，無毒。主消渴，內痹，瘀血，月閉寒熱，酸疼，益氣，愈聾，療諸邪氣，熱結，鼠瘻，散癰腫留血，婦人帶下不通，下乳汁，止小便數不禁，逐四肢骨節中水，療馬骨刺人瘡。一名土瓜。生魯地平澤田野及人家墻間。三月採根，陰乾。

陶隱居云：今土瓜生籬院間亦有，子熟時赤，如彈丸大。根今多不預

乾，臨用時乃掘取。不堪入大方，正單行小小爾。《禮記·月令》云：王瓜生，此之謂也。鄭玄云菠薟，殊爲謬矣。

《唐本》注云：其物蔓生，葉似栝樓，圓無叉缺，子如梔子，生青熟赤，但無棱爾。根似葛，細而多糁。北間者累累相連，大如棗，皮黄肉白，苗子相似，根狀不同。試療黄疸，破血。南者大勝也。

今按：陳藏器《本草》云：王瓜，主蠱毒，小兒閃癖，痞滿并癥。取根及葉，搗絞汁服，當吐下，宜少進之，有小毒故也。

禹錫等按：《爾雅》云：鉤，瞿姑。郭曰：鉤，蠲也。一名王瓜。實如卵瓜，正赤味苦。

《藥性論》云：瓜根，使，平，一名王瓜子，主蠱毒。治小便數，遺不禁。

《日華子》云：王瓜子，潤心肺，及肺痿，吐血，腸風瀉血，赤白痢，炒用。又云：土瓜根，通血脉，天行熱疾，酒黄病，壯熱，心悶，吐痰痰癊，排膿，熱勞，治撲損，消瘀血，破癥癖，落胎。

《圖經》曰：王瓜，生魯地平澤田野及人家垣墻間，今處處有之。《月令》云：四月王瓜生。即此也。葉似栝樓，圓無叉缺，有刺如毛。五月開黄花。花下結子如彈丸，生青熟赤。根似葛，細而多糁，謂之土瓜根。北間者，其實累累相連，大如棗，皮黄肉白。苗葉都相似，但根狀不同耳。三月採根，陰乾。均、房間人呼爲老鴉瓜，亦曰菟瓜。謹按《爾雅》曰：蒡，音物，菲，亦謂之土瓜，自別是一種也。又云：菦，音勤，芹，亦謂之土瓜，自別是一物。採菲者，非此土瓜也。大凡物有異類，同名甚多，不可不辨也。葛氏療面上瘢瘭子用之，仍得光潤皮急。以土瓜根搗篩，漿水勻[13]和，入夜先漿水洗面，旦復洗之。百日光華射人。小兒四歲發黄。生搗絞汁三合與飲，不過三飲已。

《聖惠方》：治黑疸多死，宜急治。用瓜根一斤，搗絞汁六合，頓服。當有黄水隨小便出。如未出，更服之。

《外臺秘要》：治蠱。土瓜根大如母指，長三寸，切。以酒半升漬一宿，一服，當吐下。

《肘後方》：治黄疸變成黑疸，醫所不能治。土瓜根汁，頓服一小升。平旦服食後須病汗，小便出，愈。不爾，再服。又方：治小便不通及關格方，生土瓜根搗取汁，以少水解之筒中，吹下部取通。

《産書》：下乳汁。土瓜[14]爲末，酒服一錢，一日三[13]。

《衍義》曰：王瓜，體如栝樓，其殼徑寸。一種長二寸，上微圓，下尖長，七八月間熟，紅赤色。殼中子如螳螂之赤雹子，其根即土瓜根也。於細根上又生淡黄根，三五相連，如大指許。根與子兩用。紅子同白土子治頭風。

地榆　味苦、甘、酸，微寒，無毒。主婦人乳痓痛，七傷，帶下病，止痛，除惡肉，止汗，療金瘡，止膿血，諸瘻惡

地榆

江寧府



衛州



瘡，熱瘡，消酒，除消渴，補絶傷，産後内塞，可作金瘡膏。生桐柏及菟句山谷。二月、八月採根，曝乾。得髮良，惡麥門冬。

陶隱居云：近道處處有，葉似榆而長，初生布地，花、子紫黑色如豉，故名玉豉。一莖長直上，根亦入釀酒。道方燒作灰，能爛石也。乏茗時用葉作飲亦好。

今按：《別本》注云：今人止冷熱痢及疳痢，熱極，效。

禹錫等按：《藥性論》云：地榆，味苦，平。能治産後餘瘀，疹痛，七傷，治金瘡，止血痢，蝕膿。

蕭炳云：今方用共樗皮同療赤白痢。

《日華子》：排膿，止吐血，鼻洪，月經不止，血崩，産前後諸血疾，赤白痢并水瀉，瀼⑯前止腸風。但是平原川澤皆有，獨莖，花紫，七八月採。

《圖經》曰：地榆，生桐柏及菟句山谷，今處處有之。宿根，三月内生苗，初生布地，莖直，高三四尺，對分出葉。葉似榆少狹⑰，細長作鋸齒狀，青色。七月開花如椹子，紫黑色。根外黑裏紅，似柳根。二月、八月採，暴乾。葉不用，山人乏茗時，採此葉作飲亦好。古斷下方多用之。葛氏載徐平療下血二十年者。取地榆、鼠尾草各三兩，水二升，煮半，頓服。不斷，水漬屋塵，飲一小杯投之。不過重作，乃差。小兒疳痢，亦單煮汁如飴糖與服，便已。又毒蛇螫人，搗新根取汁飲，兼以漬瘡，良。

崔元亮《海上方》：赤白下骨立者，地榆一斤，水三升，煮取一升半，去滓再煎如稠餳，絞濾，空腹服二合，日再。

《唐本》注云：主帶下十二病。

《孔氏音義》云：一曰多赤，二曰多白，三曰月水不通，四曰陰蝕，五曰子臟堅，六曰子門辟，七曰合陰陽患痛，八曰小腹寒痛，九曰子門閉，十曰子宮冷，十一曰夢與鬼交，十二曰五臟不定。用葉作飲代茶，甚解熱。

《聖惠方》：治婦人漏下赤白不止，令人黄瘦虚竭。以地榆三兩細剉，米醋一升，煮十餘沸，去滓。食前稍熱服一合，亦治吐血。

《千金翼》：代指逆腫。單煮地榆作湯漬之，半日愈。

《肘後方》：療虎、犬咬人。地榆根末，服方寸匕，日一二服、傅瘡尤佳。

葛氏云：毒蛇螫人。搗地榆根，絞取汁飲，兼以漬瘡。

《梅師方》：治獝犬咬人。煮地榆上，服方寸匕，日三服，飲之，兼末傅瘡上。若治瘡已差者。搗生韭汁，飲之一二升。

《齊民要術》：地榆汁釀酒。治風

痹，補腦。

《三洞要録》：地榆剉一升，稻米一升，白玉屑一升，三物取白露汁二升，置銅器中煮米熟，絞取汁。玉屑化爲水，名曰玉液。以藥内杯醴中，所謂神王漿也。

《衍義》曰：地榆，性沉寒。入下焦，熱血痢則可用；若虚寒人及水瀉白痢，即未可輕使。

大小薊根

冀州



大小薊根　味甘，温，主養精保血。大薊主女子赤白沃，安胎，止吐血，衄鼻，令人肥健。五月採。

陶隱居云：大薊是虎薊，小薊是猫薊，葉并多刺相似。田野甚多，方藥不復用，是賤之故。大薊根甚療血，亦有毒。

《唐本》注云：大小薊，葉欲相似，功力有殊，并無毒，亦非虎、猫薊也。

今按：陳藏器《本草》云：小薊破大薊生山谷，根療癰腫，小薊生平澤，俱能破血，小薊不能消腫也。

今按：陳藏器《本草》云：小薊破宿血，止新血，暴下血，血痢，金瘡出血，嘔血等，絞取汁温服。作煎和糖，療癰腫。小薊專主血疾。

陳藏器云：薊門以薊爲名，北方二月苗初生二三寸時，并根作茹，食之甚美。四月採苗，九月採根，并陰乾入藥，亦生搗根絞汁飲。以止吐血，衄血，下血，皆驗。大薊根，苗與此相似，但肥大耳。而功力有殊，破血之外，亦療癰腫。

陳藏器云：薊門以薊爲名，北方者勝也。

《食療》云：小薊根，主養氣。取生根、葉，搗取自然汁，服一盞立佳。又，取菜煮食之，除風熱。根主崩中。又，女子月候傷過，搗汁半升服之。金瘡血不止，挼葉封之。夏月熱，煩悶不止，搗葉取汁半升，服之立差。

《聖惠方》：治心熱吐血，口乾。用刺薊葉及根，搗絞取汁，每服一小盞，頓服。又方：乳石發動，壅熱心悶，吐血。以生刺薊搗取汁，每服三合，入蜜少許，攪匀服之。

《外臺秘要》：治鼻窒塞不通。小薊一把，水二升，煮取一升，去滓分服。曾有人陰冷，漸漸冷氣入陰囊，腫滿恐死，夜疼悶不得眠。煮大薊根汁服，立

差也。

《梅師方》：治卒吐血及瀉鮮血。取小薊葉搗絞取汁，温服。

《簡要濟衆》：治九竅出血。以刺薊一握絞取汁，以酒半盞調和，頓服之。如無青汁，只搗乾者爲末，冷水調三錢匕。又方：治小兒浸淫瘡，疼痛不可忍，發寒熱。刺薊末，新水調傅瘡上，乾即易之。

《衍義》曰：大小薊，皆相似，花如髻。但大薊高三四尺，葉大都似藻。又有石帆，葉皺；小薊高一尺許，葉不皺，以此爲異。小薊，山野人取爲蔬，甚適用。雖有微芒，亦不能害人。

海藻



海藻　味苦、鹹，寒，無毒。主瘿瘤氣，頸下核，破散結氣，癰腫，癥瘕堅氣，腹中上下鳴，下十二水腫，療皮間積聚，曝癗，留氣熱結，利小便。一名落首，一名薄。生東海池澤。七月七日採，曝乾。反甘草。

陶隱居云：生海島上，黑色如亂髮而大少許，葉大都似藻。又有石帆，狀如柏，療石淋。又有石[18]松，狀如松，於北人，北人食之倍生諸疾，更不宜矣。

陳藏器《本草》云：比[19]物小毒。主辟百邪鬼魅，治氣疾急滿，療疝氣下墜疼痛，核腫，去腹中雷鳴，幽幽作聲。

孟詵云：海藻，主起男子陰氣，常食之，消男子瘰疾。南方人多食之，傳兒赤白游，疹火焱熱瘡。搗絞汁服，去暴熱，熱痢，止渴。生水上，如馬齒相連。又云：石帆，高尺餘，根如漆，上有馬尾者，大而有葉者。《本經》及注，海藻功狀不分。馬尾藻，生淺水，如短馬尾，細黑色，用之當浸去鹹；大葉漸軟，作交羅文，生海底。煮汁服，主婦人血結，月閉，石淋。又云：水松，葉如松丰茸，食之，主水腫，亦生海底。

《本經》云：主結氣癭瘤是也。

《爾雅》云：石帆，水松是也。

《吳都賦》云：海人取大葉藻，正在深海底，以繩繫腰沒水下則得，旋繫繩上。五月已後，當有大魚傷人，不可取也。

《日華子》云：石帆，平，無毒。紫色，梗大者如箸，見風漸硬，色如漆。多人飾作珊瑚裝。

禹錫等按：《爾雅》云：藫，海藻。注：海草也。一名海蘿。如亂髮，生海中。

《藥性論》云：海藻，臣，味鹹，有

《圖經》曰：海藻，生東海池澤，今出登、萊諸州海中。凡水中皆有藻。

《周南詩》云：於以採藻，於沼於沚是也。陸機云：藻，水草，生水底。有二種：一種葉如鷄蘇，莖如箸，長四五

尺；一種莖如釵股，葉如蓬蒿，謂之聚藻，扶風人謂之藻聚，爲發聲也。二藻皆可食，熟挼其腥氣，米麵糝蒸爲茹，甚佳美。荆、楊人饑荒，以當穀食。今謂海藻者，乃是海中所生，根著水底石上，黑色如亂髮，而粗大少許，葉類水藻而大，謂之大葉藻。《本經》云主癭瘤是也。海人以繩繫腰，没水下則得之，旋繫繩而之[20]。又有一種馬尾藻，生淺水中，狀如短馬尾，細黑色。此主水癕，下水用之。

陶隱居云：《爾雅》所謂綸似組，東海有之。今青苔、紫菜皆似綸，昆布亦似組，恐即是此也。而陳藏器乃謂綸、組，正謂此二藻也。謹按《本經》：海藻，一名薄。薄爲石衣，又謂蓴徒南切，名海藻與藻同，是海藻自有此二名，而注釋皆以爲藥草，謂綸、組乃别草。若然隱居所云，似近之藏器之説，亦未可的據。又注釋以石衣爲水苔，一名石髮，石髮即陟釐也，色類似苔而粗澀爲異。又云薄葉似鼸音蘼而大，生海底。有條，味性功用與海藻全别。又生江南池澤，乃是水中青苔，古人用以爲紙，亦青黄色，今注以爲石髮是也。然則薄與蓴皆是海藻之名。石髮别是一類，無疑也。昆布，今亦出登、萊諸州，功用乃與海藻相近也。陶又云：凡海中菜[21]，皆療癭瘤，結氣。青苔、紫菜輩亦然。又有石帆如柏，主石淋；水松如松，主溪毒。《吴都賦》所謂草則石帆、水松。劉淵林注云：石帆生海嶼石上，草類也。無葉，高尺許，其花離婁相貫連，死則浮水中，人於海邊得之，稀有見其生者。水松，藥草，生水中，出南海交趾是也。紫菜，附石生海上，正青，取乾之則紫色，南海有之。東海又有一種海帶，似海藻而粗且長，盛，以清酒二升浸，春夏二日，秋冬三日，一服兩合，日三。酒盡更合飲之如前，滓暴乾，末，服方寸匕，日三，不過兩劑，皆差。《廣濟》療氣膀胱急方，宜家用下水，速於海藻、昆布之類。石髮，今人亦乾之作菜，齏臛啖之尤美。下氣昆布臛法：高麗昆布一斤，白米泔浸一宿，洗去鹹味，以水一斗，煮令向熱，擘長三寸，闊四五分，仍取葱白一握，二寸切斷，擘之，更煮，令昆布極爛，仍下鹽、酢、豉、糝調和，一依臛法，有瓦松，卑有澤葵，散巖竇者曰石髮，補空田者曰垣衣，在屋曰昔邪，在藥曰陟釐是也。瓦松，生古瓦屋上，若松子大抵主療略同。陸龜蒙《苔賦》云：高作層。澤葵，鳧葵也。雖曰異類，而皆感瓦石而生，故陸推類而云耳。今人罕復用之，故但附見於此。瓦松，即下條昨葉何草也。《廣志》謂之蘭香。段成式云：或言構木上多松栽土，木氣泄則生瓦松，然亦不必爾。今醫家或用作女子行經絡藥。陟釐，古方治虚冷下痢最要。范汪治腹中留飲有海藻丸。又有癭酒方，用海藻一斤，絹袋

不得令鹹、酸。以生薑、橘皮、椒末等調和，宜食粱米、粳米飯。海藻亦依此法，極下氣，大效。無所忌。

《海藥》云：主宿食不消，五膈痰壅，水氣浮腫，脚氣，賁豚氣，并良。

雷公云：凡使，先須用生烏豆并紫貝㉒天葵和海藻，三件同蒸一伏時後，日乾用之。

《肘後方》：治頷下瘰癧如梅李。宜速消之。海藻一斤，酒二升，漬數日，稍稍飲之。又方：治頸下卒結囊欲成癭。海藻一斤，洗去鹹，酒浸飲之。

澤蘭

州徐



州梧



澤蘭　味苦、甘，微温，無毒。主乳婦血衄，中風餘疾，大腹水腫，身面四肢浮腫，骨節中水，金瘡，癰腫膿，産後金瘡内塞。一名虎蘭，一名龍棗，一名虎蒲。生汝南諸大澤傍。三月三日採，陰乾。防己爲之使。

陶隱居云：今處處有，多生下濕地。葉微香，可煎油。或生澤傍，故名澤蘭，亦名都梁香，可作浴湯。人家多種之而葉小異。今山中又有一種甚相似，莖方，葉小强，不甚香。既云澤蘭又生澤傍，故山中者爲非，而藥家乃採用之。

《唐本》注云：澤蘭，莖方，節紫色，葉似蘭草而不香，今京下用之者是。陶云都梁香，乃蘭草耳。俗名蘭香，煮水洗浴，亦生澤畔，人家種之，花白紫萼，莖圓，殊非澤蘭也。陶注蘭草，復云名都梁香，并不深識也。

禹錫等按：《吴氏》云：澤蘭一名水香。神農、黄帝、岐伯、桐君：酸，無毒。李㉒氏：温。生下地水傍，葉如蘭，二月生香，赤節，四葉相值枝節間。

《藥性論》云：澤蘭，使，味苦、辛。主産後腹痛，頻産血氣衰冷，成勞羸瘦，又治通身面目大腫。主婦人血瀝，腰痛。

《日華子》云：澤蘭，通九竅，利關脉，養血氣，破宿血，消癥瘕，産前産後百病，通小腸，長肉生肌，消撲損瘀血，治鼻洪吐血，頭風目痛，婦人勞瘦，丈夫面黄。四月、五月採，作纏把子。

《圖經》曰：澤蘭，生汝南諸大澤傍，今荆、徐、隨、壽、蜀、梧州，河中府皆有之。根紫黑色，如粟根。二月生苗，高二三尺，莖葵青紫色，作四棱。葉生相對，如婆苛，微香。七月開花，帶白㉔色，萼通紫色，亦似婆苛花。三月採苗，陰乾。荆、湖、嶺南人家多種之。壽州出者無花子。此與蘭草大抵相類，但蘭草生水傍，葉光潤，陰小紫，五六月盛；而澤蘭生水澤中及下濕地，葉尖，微有毛，不光潤，方莖紫節，七月、八月初採，微辛，此爲異耳。今婦人方中最急用也。又有一種馬蘭，生水澤傍，頗似澤蘭，而氣臭，味辛。

亦主破血，補金瘡，斷下血。陳藏器以爲《楚辭》所喻惡草即是也。北人呼爲紫菊，以其花似菊也。又有一種山蘭，生山側，似劉寄奴，葉無椏，不對生，花心微黄赤。亦能破血，皆可用。

雷公云：凡使，須要別識雄雌，其形不同。大澤蘭形葉皆圓，根青黄，能生血調氣與榮合。小澤蘭迴別，採得後，看葉上斑，根須尖，此藥能破血，通久積。凡修事，大小澤蘭須細剉之。用絹袋盛，懸於屋南畔角上，令乾用。

《子母秘録》：治小兒蓐瘡，嚼澤蘭心封上。

《衍義》曰：澤蘭，按《補注》云：葉如蘭。今蘭葉如麥門冬，稍闊而長，及一二尺無枝梗，殊不與澤蘭相似。澤蘭纔出土便分枝，梗葉如菊，但尖長。若取香臭，則稍相類。故謂之澤蘭。又曰生汝南大澤傍，則其種本別。如蘭之説誤矣。

昆布　味鹹，寒，無毒。主十二種水腫，癭瘤聚結氣，癭瘡。生東海。

陶隱居云：今惟出高麗，繩把索之如卷麻，作黄黑色，柔韌可食。《爾雅》云：綸音關似綸，組似組，東海有之。今青苔、紫菜皆似綸，此昆布亦似組，恐即是也。凡海中菜，皆療癭瘤結氣。青苔、紫菜輩亦然。乾苔性熱，柔滑，主大腹水腫，諸浮氣，并癭瘤氣結等，良。

雷公云：凡使，先弊[25]箅筒[26]煮，去鹹味，焙乾，細剉用。每修事一斤，用甑箅大小十個，同昆布細剉，二味各一處，下東流水，從巳煮至亥，水逐旋添，勿令少。

《食療》云：下氣，久服瘦人。無此疾者，不可食。海島之人愛食，爲無好菜，只食此物。服久，病亦不生。遂傳説其功於北人。北人食之，病皆生。是水土不宜爾。又云：紫菜，下熱氣，塞咽喉，煮汁飲之。此是海中之物，味猶有毒性。凡是海中菜，所以有損人矣。

《聖惠方》：治癭氣結核，癰癰腫硬。以昆布一兩，洗去鹹，搗爲散，每

以一錢綿裹，於好醋中浸過。含咽津，藥味盡，再含之。

《外臺秘要》：治頷下卒結囊，漸大欲成癭。以昆布、海藻等分爲末，蜜圓，含如杏核大，稍稍咽汁。

《千金翼》：治五癭。昆布一兩，并切如指大，酢漬，含咽汁，愈。

防己

黔州



興化軍



防己　味辛、苦，平、温，無毒。主風寒，温瘧，熱氣，諸癇，除邪，利大小便，療水腫風腫，去膀胱熱，傷寒，寒熱邪氣，中風手脚攣急，止泄，散癰腫惡結，諸蝸疥癬，蟲瘡，通腠理，利九竅。一名解離。文如車輻理解者良。生漢中川谷。二月、八月採根，陰乾。殷孽爲之使，殺雄黄毒，惡細辛，畏葶藶。

陶隱居云：今出宜都、建平，大而青白色，虚軟者好，黯黑水㉗强者不佳。是療風水家要藥爾。

《唐本》注云：防己，本出漢中者，作車輻解，黄實而香，其青白虚軟者，名木防己，都不任用。陶謂之佳者，蓋未見漢中者爾。

禹錫等按：《藥性論》云：防己，君，味苦，有小毒。能治濕風，口面喎斜，手足疼，散風痰，主肺氣嗽喘。又云：木防己，使，畏女菀、鹵鹹，味苦、辛。能治男子肢節中風，毒風不語，主散結氣，擁腫，温瘧，風水腫，治膀胱。

蕭炳云：木防己出華州。

《圖經》曰：防己，生漢中川谷，今黔中亦有之。但漢中出者，破之文作車輻解，黄實而香，莖梗甚嫩，苗葉小類於牽牛。折其莖，一頭吹之，氣從中貫，如木通類。他處者青白虚軟，又有腥氣，皮皺，上有丁足子，名木防己。二月、八月採，陰乾用。木防己，雖今不入藥，而古方亦通用之。張仲景治傷寒有增減木防己湯，及防己地黄、五物防己、黄耆六物等湯。深師療膈間支滿，其人喘滿，心下痞堅，面黧黑，其脉沉緊，得之數十日，吐下之乃愈，木防己湯主之。木防己二兩，石膏二枚，鷄子大，碎，綿裹，桂心二兩，人參四兩，四物以水六升，煮取二升，分再服。虚者便愈，實者三日復發汗，至三日復不愈者，宜去石膏，加芒消三合。以水六升煮三味，取二升，去滓。内芒消，分兩服。微下利則愈。禁生葱。孫思邈療遺溺，小便澀，亦用三物木防己湯。

陳藏器云：如陶所注，即是木防己，用體小同。按木、漢二防，即是根、苗爲名。漢主水氣，木主風氣，宣通。作藤著木生，吹氣通一頭，如通草。

雷公云：凡使，勿使木條，以其木條已黄、腥、皮皺，上有丁足子，不堪用。夫使㉘防己要心花文黄色者。然細剉，又剉車前草根相對同蒸，半日後

出曬，去車前草根，細剉用之。

《肘後方》：服雄黄中毒，防己汁解之。防己實焙乾爲末，如茶法煎服，俗用治脱肛。

《初虞世南㉙方》：治肺痿咯血，多痰。防己、葶藶等分爲末，糯米飲調下一錢。

天麻

州邵



天麻　味辛，平，無毒。主諸風濕痹，四肢拘攣，小兒風癇驚氣，利腰膝，强筋力。久服益氣，輕身長年。生鄜州、利州、太山、嶗山諸山。五月採根，曝乾。葉如芍藥而小，當中抽一莖，直上如箭幹。莖端結實，狀若續隨子。至葉枯時，子黄熟。其根連一二十枚，猶如天門冬之類。形如黄瓜，亦如蘆菔，大小不定。彼人多生啖，或蒸煮之。今多用鄜州者佳。今附。

禹錫等按：《別注》又云：主諸毒惡氣，皮㉚滿，寒疝，下血。今處處有之。時人多用焉。莖似箭幹，赤色，故莖名赤箭也。

《藥性論》云：赤箭脂，一名天麻，又名定風草。味甘，平。能治冷氣痛痹，癱瘓不遂，語多恍惚，多驚失志。

陳藏器云：天麻，寒。主熱毒癰腫。搗莖、葉以傅之，亦取子作飲，去熱氣。生平澤，似馬鞭草，節節生紫花，花中有子，如青葙子。

《日華子》云：味甘，暖。助陽氣，補五勞七傷，鬼疰蠱毒，通血脉關竅，透虚入莖中，潜生土内。其根形如黄瓜，連生一二十枚，大者有重半斤或五六兩。其皮黄白色，名白龍皮，肉名天麻。二月、三月、五月、八月内採。初取得，乘潤刮去皮，沸湯略煮過，暴乾收之。嵩山、衡山人或取生者蜜煎作果食之，甚珍。

雷公云：凡使，勿用御風草，緣與天麻相似，只是葉、莖不同，其御風草根、莖、斑葉皆白有青點。使御風草根，勿使天麻。一件若同用，即令人有腸結之患。修事天麻十兩，用蒺藜子一鎰，緩火熬焦熟後，便先置天麻十兩於瓶中，上用火炒過蒺藜蓋内，外便用三重紙蓋并繫，從巳至未時，又取蒺藜子，再入熬炒，准前安天麻於瓶内，用炒了蒺藜子於中，依前蓋。又隔一伏時後出，如此七遍，瓶盛出後，用布拭上氣汗，用刀劈，焙之，細剉，單搗。然用御風草，修事法亦同天麻。

《別説》云：謹按：赤箭條下所説甚詳，今就此考之，尤爲分明。詳此《圖經》之狀，即赤箭苗之未長大者。

二説前後自不同，則所爲紫花者，又不知是何物也。若依赤箭條後用之爲是。

《衍義》曰：天麻，用根，須別藥相佐使，然後見其功，仍須加而用之。人或蜜漬爲果，或蒸煮食。用天麻者，深思之則得矣。苗則赤箭也。

阿魏

廣州



阿魏　味辛，平，無毒。主殺諸小蟲，去臭氣，破癥積，下惡氣，除邪鬼蠱毒。生西蕃及崑崙。

《唐本》注云：苗、葉、根、莖酷似白芷。搗根汁，日煎作餅者爲上，截根穿暴乾者爲次。今廣州出者，云是木膏亦爲奇物也。唐本先附。

禹錫等按：蕭炳云：今人日煎蒜所生相近耳。

《海藥》云：謹按《廣志》云：生石崑崙國。是木津液，如桃膠狀。其色黑者不堪，其狀黃散者爲上。其味辛，温。善主於風邪鬼疰，并心腹中冷，服虜，亦出波斯國。波斯呼爲阿虜。載樹長八九尺，皮色青黃。三月生葉，形似鼠耳。無花實。斷其枝，汁出如飴，久乃堅凝，名阿魏。拂林國僧彎所説同。摩伽陀僧提婆言：取其汁和米、豆屑合成阿魏。

《日華子》云：阿魏，熱。治傳尸，破癥癖冷氣，辟温治瘧，兼主霍亂，心腹痛，腎氣，温瘴，禦一切蕈菜毒。

《圖經》曰：阿魏，出西蕃及崑崙，舊説苗、葉、根極似白芷。搗根汁，日煎作餅者爲上，截根穿暴乾者爲次。今惟廣州有之。苗長八九尺，皮色青黃。三月生葉，似鼠耳，無花實。斷其枝，汁出如飴，久乃堅凝，名阿魏。或云取汁和米、豆屑，合釀而成，乃與今廣州所生相近耳。

《海藥》云：謹按《廣志》云：生石崑崙國。是木津液，如桃膠狀。其色黑者不堪，其狀黃散者爲上。其味辛，温。善主於風邪鬼疰，并心腹中冷，服虜，亦出波斯國。波斯呼爲阿虜。載樹長八九尺，皮色青黃。三月生葉，形似鼠耳。無花實。斷其枝，汁出如飴，久乃堅凝，名阿魏。拂林國僧彎所説同。摩伽陀僧提婆言：取其汁和米、豆屑，合成阿魏。

《日華子》云：阿魏，熱。治傳尸，破癥癖冷氣，辟温治瘧，兼主霍亂，心腹痛，腎氣，温瘴，禦一切蕈菜毒。

《圖經》曰：阿魏，出西蕃及崑崙，舊説苗、葉、根極似白芷。搗根汁，日煎作餅者爲上，截根穿暴乾者爲次。今惟廣州有之。苗長八九尺，皮色青黃。三月生葉，似鼠耳，無花實。斷其枝，汁出如飴，久乃堅凝，名阿魏。或云取

高良薑


州雷


州儋

高良薑　大温。主暴冷，胃中冷逆，霍亂腹痛。

陶隱居云：出高良[34]郡，人腹痛不止，但嚼食亦效。形氣與杜若相似，而葉如山薑。

《唐本》注云：生嶺南者，形大虚軟，江左者細緊。味亦不甚辛，其實一也。今相與呼細者爲杜若，大者爲高良薑。此非也。

今按：陳藏器《本草》云：高良薑，味辛，温。下氣益聲，好顔色。煮作飲服之，止痢及霍亂。又按：《别本》注云：二月、三月採根，暴乾。味辛、苦，大熱，無毒。

禹錫等按：《藥性論》云：高良薑，使。能治腹[35]内久冷，胃氣逆嘔吐，治風破氣，腹冷氣痛，去風冷痹弱，療下氣冷逆衝心，腹痛吐瀉。

《日華子》云：治轉筋瀉痢，反胃嘔食，解酒毒，消宿食。

《圖經》曰：高良薑，舊不載所出州土，陶隱居云出高良郡，今嶺南諸州及黔、蜀皆有之，内郡雖有而不堪入藥。春生，莖、葉如薑苗而大，高一二尺許。花紅紫色如山薑。二月、三月採根，暴乾。古方亦單用，治忽心中惡，口吐清水者。取根如骰塊，含咽津，逡巡即差。若臭亦含咽，更加草豆蔻同爲末，煎湯常飲之佳。

《聖惠方》：治霍亂、吐利、腹痛等疾。高良薑一兩剉，以水三大盞，煎取二盞半，去滓，下粳米二合，煮粥食之。

《外臺秘要》：《備急》急霍亂吐利方。火炙高良薑令焦香。每用五兩，打碎，以酒一升煮三四沸，頓服。亦治腹痛氣惡。

蘇恭云：凡患脚氣，每旦任意飽食，午後可[35]食，日晚不食。如饑，可食豉粥。若瞑不消，欲成霍亂者，即以高良薑一兩打碎，以水三升，煮取一升，頓服盡即消。待極饑，乃食一碗薄粥，其藥唯極，飲之良。若卒無高良薑，母薑一兩代之，以清酒一升，煮令極熟，和[35]滓食之。雖不及高良薑，亦大效矣。

《十全方》：治心脾痛。以高良薑細剉，微炒杵末，米飲調下一錢匕，立止。

百部根

微寒。主咳嗽上氣。

陶隱居云：山野處處有，根數十相連，似天門冬而苦强，亦有小毒，火炙酒漬飲之，療咳嗽，亦主去虱。煮作湯，洗牛、犬虱即去。《博物志》云：九真一種草似百部，但長大爾，懸火上令乾，夜取四五寸短切，含咽汁，勿令人知。主暴嗽甚良，名爲嗽藥。疑此



滁州



峽州



衡州

是百部。恐其土肥潤處，是以長大爾。

今按：陳藏器《本草》云：百部根，火炙浸酒，空腹飲，去蟲蠶咬兼疥癬瘡。

禹錫等按：《藥性論》云：百部，使。味甘，無毒。能治肺家熱，上氣咳逆，主潤益肺。

《日華子》云：味苦，無毒。治疳蝕及傳尸，骨蒸勞，殺蛔蟲、寸白、蟯蟲，并治一切樹木蛀蚘，燒之亦可殺蠅蠓。又名婆婦草。一根三十來莖。

《圖經》曰：百部根，舊不著所出州土，今江、湖、淮、陝、齊、魯州郡皆有之。春生苗作藤蔓，葉大而尖長，頗似竹葉，面青色而光，根下作撮如芋子。一撮乃十五六枚，黃白色，二月、三月、八月採，暴乾用。古今方書治嗽多用。葛洪主卒嗽。以百部根、生薑二物，各絞汁合煎，服二合。張文仲單用百部根，酒漬再宿。大温，服一升，日再。《千金方》療三十年嗽。以百部根二十斤，搗絞取汁，煎之如飴，服方寸匕，日三服，驗。

《唐本》云：微寒，有小毒。

薤香子　味辛，平，無毒。主諸癆，霍亂及蛇傷。

《唐本》注云：葉似老葫荽，極細，破，去心、皮、花作數十條，懸於檐下令風吹，待土乾後，却用酒浸一宿，漉出焙乾，細剉用。忽一窠自有八十三條者，號曰地仙苗。若修事餌之，可千歲也。

《外臺秘要》：治誤吞錢。百部根四兩，酒一升，漬一宿，温服一升，日再服。

《續十全方》：治暴嗽。百部藤根搗自然汁，和蜜等分，沸湯煎成膏咽之。

《抱朴子》：百部根，理咳嗽及殺虱。



簡州



薤音懷

薤香子

可單用，味苦、辛。和諸食中甚香，破一切臭氣。又卒惡心，腹中不安。煮食之，即差。川中多食之。

《日華子》云：得酒良，治乾濕脚氣并腎勞，癩疝氣，開胃下食，治膀胱痛，陰疼。入藥炒用。

《圖經》曰：蘹香子亦名茴香。《本經》不載所出，今交、廣諸蕃及近郡皆有之。入藥多用蕃舶者，或云不及近處者有力。三月生葉似老胡荽，極疏細，作叢。至五月高三四尺。七月生花，頭如傘蓋，黄色。結實如麥而小，青色。北人呼爲土茴香。茴、蘹聲近，故云耳。八月九月採實，陰乾。今近地人家園圃種之甚多。古方療惡毒癰腫，或連陰髀間疼痛急攣，牽入小腹不可忍，一宿則殺人者。用茴香苗葉，搗取汁一升，服之，日三四，用其滓以貼腫上。冬中根亦可用。此外國方，永嘉以來用之，起死神效。

《食療》云：國人重之，云有助陽道，用之未得其方法也。生搗莖葉汁一合，投熱酒一合服之。治卒腎氣衝脅如刀刺痛，喘息不得。亦甚理小腸氣。

孫真人云：治瘴瘧，渾身熱連背項。蕤、茴香子搗取汁服。

《經驗後方》：治脾胃進食。茴香二兩，生薑四兩，同搗令匀，净器内濕紙蓋一宿。次以銀、石器中，文武火炒令黄焦爲末，酒圓如梧子大。每服十丸至十五丸，茶酒下。

《食醫心鏡》：茴香治霍亂，辟熱除口氣臭，煮作羹及生食并得。

《衍義》曰：蘹香子，今人止呼爲茴香，治膀胱冷氣及瘇痛。亦調和胃氣。《唐本》注：似老葫荽，此誤也。葫荽葉如蛇床，蘹香徒有葉之名，但散如絲髮，特異諸草。枝上時有大青蟲，形如蠶，治小腸氣甚良。

款冬花　味辛、甘，温，無毒。主咳逆上氣，善喘，喉痹，諸驚癇，寒熱邪氣，消渴，喘息呼吸。一名橐吾，一名顆東，一名虎鬚，一名菟奚，一名氐冬。生常山山谷及上黨水傍。十一月採花，陰乾。杏人爲之使，得紫苑良，惡皂角、消石、玄參，畏貝母、辛夷、麻黄、

款冬花

雄州　潞州　秦州　晉州



黄耆、黄芩、黄連、青葙。

陶隱居云：今第一出河北，其形如宿蒓未舒者佳，其腹内有絲。次出高麗、百濟，其花乃似大菊花。次亦出蜀北部宕昌，而并不如。其冬月在冰下生，十二月、正月旦取之。

《唐本》注云：今出雍州南山溪水及華州山谷澗間。葉似葵而大，叢生，花出根下。

禹錫等按：《爾雅》云：菟奚，顆凍。釋曰：藥草也。郭云：款凍，紫赤，華生水中。

《藥性論》云：款冬花，君。主療肺氣心促急，熱乏勞咳，連連不絶，涕唾稠黏，治肺痿肺癰，吐膿。

《日華子》云：潤心肺，益五臟，除煩，補勞劣，消痰止嗽，肺痿吐血，心虚驚悸，洗肝明目及中風等疾。十一月十二月雪中出花。

《圖經》曰：款冬花，出常山山谷及上黨水傍，今關中亦有之。根紫色，莖青紫，葉似萆薢。十二月開黄花，青紫萼，去土一二寸，初出如菊花萼，通直而肥實無子。則陶隱居所謂出高麗百濟者，近此類也。又有紅花者，葉如荷而斗直，大者容一升，小者容數合，俗呼爲蜂斗葉，又名水斗葉。則唐所注大者如葵而叢生者是也。十一月採花，陰乾。或云花生於冰下，正月旦採之。郭璞注《爾雅》顆凍云：紫赤，花生水中。冰、水字近，疑一有誤。而傅咸《款冬賦序》曰：余曾逐禽，登於北山，於時中冬之月，冰凌盈谷，積雪被崖，顧見款冬煒然，始敷華豔，當是生於冰下爲正也。《本經》主咳逆，古今方用之，爲治嗽之最。崔知悌療久嗽熏法：每旦取款冬花如鷄子許，少蜜拌花使潤，内一升鐵鐺中，又用一瓦碗鑽一孔，孔内安一小竹筒，筆管亦得，其筒稍長，作碗鐺相合，及插筒處皆麵塗之，勿令漏氣。鐺下著炭火，少時，款冬烟自從筒出，則口含筒吸取烟咽之。如胸中稍悶，須舉頭，即將指頭捻筒頭，勿使漏烟氣，吸烟使盡止。凡如是，五日一爲之。待至六日則飽食羊肉餺飥一頓，永差。

雷公云：凡採得，須去向裏裹花蕊殼，并向裏實如粟零殼者。并枝、葉用，以甘草水浸一宿，却取款冬花、葉相伴裛一夜，臨用時即干曬去兩件拌著葉了用。

《衍義》曰：款冬花，百草中惟此不顧冰雪最先春也。世又謂之鑽凍。雖在冰雪之下，至時亦生芽。春時，人或採以代蔬，入藥須微見花者良。如已芬芳，則都無力也。今人又多使如箸頭者，恐未有花爾。有人病嗽多日，或教以然款冬花三兩枚[38]，於無風處，以筆管吸其烟，滿口則咽之，數日效。



紅藍花

紅藍花　味辛，温，無毒。主産後血運口噤，腹内惡血不盡絞痛，胎死腹

中，并酒煮服。亦主蠱毒下血。堪作燕脂。其苗生搗碎，傅游腫。其子吞數顆，主天行瘡子不出。其燕脂，主小兒聤耳，滴耳中。生梁、漢及西域。一名黄藍。《博物志》云：黄藍，張騫所得。今滄、魏地亦種之。今附。

《圖經》曰：紅藍花，即紅花也。生梁、漢及西域，今處處有之。人家場圃所種，冬而布子於熟地，至春生苗，夏乃有花。亦作梂彙，多刺，花蕊出梂上。圃人承露採之，採已復出，後出，至盡而罷。梂中結實，白顆如小豆大。其花主産後血病暴乾，以染真紅及作燕脂，主産後血病》：産後血暈，心悶氣爲勝，其實亦同，葉頗似藍，故有藍名，又名黄藍。

《博物志》云：張騫所得也。張仲景治六十二種風，兼腹内血氣刺痛。用紅花一大兩，分爲四分，以水一大升，煎强半，頓服之。不止，再服。又一方：用紅藍子一升搗碎，一大升八合，拌了暴令乾，重搗篩，蜜圓如梧子大，空腹酒下四十圓。《正元廣利方》治女子中風，血熱煩渴者。以紅藍子五大合，微熬搗碎，旦日取半大匙，以水一升，煎取七合，去滓，細細咽之。又崔元亮《海上方》治喉痹，壅塞不通者。取紅藍花搗，絞取汁一小升服之，以差爲度。如冬月無濕花，可浸乾者濃絞取汁，如前服之，極驗。咽喉塞服之皆差。亦療婦人産運絶者。

《唐本》注云：治口噤不語，血結，産後諸疾，堪染紅。

《外臺秘要》：治一切腫方。以紅花熟爛搗取汁服之，不過再三服便差。

《簡要濟衆》：産後血暈，心悶氣絶。紅花一兩，搗爲末，分作兩服，酒二中盞，煎取一盞并服。如口噤，斡開灌之。《子母秘録》同。

《産寶方》：療産後中風，煩渴。紅花子五合，微熬研碎，以一匙水一升，煎取七合，徐徐呷之。

《近效方》：治血暈絶不識人，煩悶者。紅花三兩，新者佳。無灰酒半升，童子小便半升，煮取一大盞，去滓，俟冷，頓服之，新汲水煮之亦良。

牡丹

州滁



味辛、苦，寒、微寒，無毒。主寒熱，中風瘛音契瘲音縱，痙、驚癎邪氣，除癥堅，瘀血留舍腸胃，安五藏，療癰瘡，除時氣，頭痛，客熱，五勞，勞氣，頭、腰痛，風噤，癲疾。一名鹿韭，一名鼠姑。生巴郡山谷及漢中。二月、八月採根，陰乾。畏菟絲子。

陶隱居云：今東間亦有。色赤者爲好，用之去心。按鼠婦亦名鼠姑，而此又同，殆非其類，恐字誤。

《唐本》注云：牡丹，生漢中。劍南所出者苗似羊桃，夏生白花，秋實圓緑，冬實赤色，凌冬不凋。根似芍藥，肉白皮丹。山江、劍南，土人謂之牡丹，亦名百兩金，京下謂之吴牡丹者，是真也。今俗用者異於此，别有臊氣也。

禹錫等按：《藥性論》云：牡丹，能治冷氣，散諸痛，治女子經脉不通，血瀝腰痛。

蕭炳云：今出合州者佳。白者補，赤者利。出和州、宣州者并良。

《日華子》云：除邪氣，悦色，通關腠血脉，排膿，通月經，消撲損瘀血，續筋骨，除風痹，落胎下胞，産後一切女子冷熱血氣。此便是牡丹花根。巴、蜀、渝、合州者上，海鹽者次。服忌蒜。

《圖經》曰：牡丹，生巴郡山谷及漢中，今丹、延[39]、青、越、滁、和州山中皆有之。花有黄、紫、紅、白數色，此當是山牡丹。其莖梗枯燥，黑白色，二月於梗上生苗葉，三月開花。其花、葉與人家所種者相似，但花止五六葉耳。五月結子黑色，如鷄頭子大。根黄白色，可五七寸長，如筆管大。二月、八月採，銅刀劈去骨，陰乾用。此花一名木芍藥。近世人多貴重，圃人欲其花之詭異，皆秋冬移接，培以壤土，至春盛開，其狀百變。故其根性殊失本真，藥中不可用此品，絶無力也。牡丹止[40]血，仍去瘀滯。《正元廣利方》療因傷損血瘀不散者，取牡丹皮八分，合虹蟲二十一枚，熬過同搗篩，每用温酒和散方寸匕服，血當化爲水下。

雷公云：凡使，採得後日乾，用銅刀劈碎去骨了，細剉如大豆許，用清酒拌蒸，從巳至未，出，日乾用。

《外臺秘要》：治蠱毒方：取牡丹根搗爲末，服一錢匕，日三服，良。

《肘後方》：治下部生瘡已決洞者。服牡丹方寸匕，日三服。

《衍義》曰：牡丹，用其根上皮。花亦有緋者，如西洛潛溪緋是也。今禁苑又有深碧色者。惟山中單葉花紅者爲佳，家椑子次之。若移枝接者不堪用，爲其花葉既多發，奪根之氣也。何以知之？今千葉牡丹，初春留花稍多，來年花枝并葉便瘦，多是開不成。市人或以枝梗皮售於人，其乖殊甚。

京三棱　味苦，平，無毒。主老癖癥瘕結塊。俗傳昔人患癥癖死，遺言令開腹取之。得病塊乾硬如石，文理有五色，人謂異物，竊取削成刀柄，後因以刀刈三棱，柄消成水，乃知此可療

京三棱



癥癖也。黄色體重，狀若鯽魚而小。又有黑三棱，狀似烏梅而稍大，有鬚相連蔓延，體輕。爲療體并同。今附。

禹錫等按：《日華子》云：味甘、澀。治婦人血脉不調，心腹痛，落胎，消瘀血，補勞，通月經治氣脹，消撲損瘀血，産後腹痛，血運并宿血不下。

《圖經》曰：京三棱，舊不著所出地土，今河、陝、江、淮、荆襄間皆有之。春生苗，高三四尺，似茭蒲葉皆三棱。五六月開花，似莎草，黄紫色。採根，削去皮、鬚，黄色，微苦，以如小鯽魚狀體重者佳。多生淺水傍，及陂澤中。其根初生成塊，如附子大，或有扁者。傍生一根，又成塊，亦出苗，其不出苗，只生細根者，謂之鷄爪三棱。大小不一物，但力有剛柔，各適其用。因其形爲名，如烏頭、烏喙，雲母、雲華之類，非兩物也。今人乃妄以京三棱皆獨傍引二根，無此。一説，三棱生荆楚，字當作荆，以著其地。《本經》作京，非也。今世都不復有。三棱所用皆淮南紅蒲根也，有三四種，但取根似烏梅，有鬚相連蔓如綖，作漆色，蜀人織爲器。一名蓑者是也。

陳藏器云：《本經》無傳三棱，總泰州尤多，舉世皆用之，雖太醫不以爲藥者莫究其用，因緣差失，不復更辨。葉今三棱，荆襄、江淮水澤之間皆有。葉如莎草，極長，莖三棱如削，大如人指，高五六尺，莖端開花，大體皆如莎草而大，生水際及淺水中。苗下即魁，其傍有根横貫，一根則連數魁，魁上發苗。採時斷其莖及横根，形扁長如鯽魚者，一魁未發苗，小圓如烏梅者，黑三棱也。根末將盡，一魁如爪者，即鷄爪三棱。皆皮黑肌白而至輕。三者本一物，但力有剛柔，各適其用。因其形爲名，如烏頭、烏喙，雲母、雲華之類，非兩物也。今人乃妄以京三棱皆獨傍引二根，無名三棱也。今三棱，根黄白色，形似釵股，葉緑色，如蒲，苗高及尺，葉上亦有三棱，四月開花，白色，如紅蓼花，五月採根。亦消積氣。下品别有草三棱條，云生蜀地，即鷄爪三棱也。其實一類，故附見於直下根。其形大體多亦如鯽魚。

陳藏器云：《本經》無傳三棱，總有三四種，但取根似烏梅，有鬚相連蔓不復有。三棱所用皆淮南紅蒲根也，泰州尤多，舉世皆用之，雖太醫不以爲藥者莫究其用，因緣差失，不復更辨。葉如綖，作漆色，蜀人織爲器。一名蓑者是也。

《外臺秘要》：治癥瘕及主鼓脹滿。以三棱草切一石，水五石，煮一石，去滓更煎，取三斗汁，銅器中重釜煎如稠糖，出内密器中，旦服一匙，酒一盞服之，日二，每服恒令酒氣相續。又方：下乳汁。以京三棱三個，以水二㊶碗，煎取一碗，洗奶，取汁爲度，極妙。

《子母秘録》：治小兒氣癖。取三棱汁作羹粥，以米麵爲之，與奶母食，每日取一棗大，與小兒吃亦得，作粥與小兒十歲已下及新生百日無問癇熱無辜、疰癖等，皆理之，秘妙不可具言，大效。

薑黄　味辛、苦，大寒，無毒。主心腹結積，疰忤，下氣破血，除風熱，消癰腫，功力烈於鬱金。

薑黃



州澧



州宜

《唐本》注云：根、葉都似鬱金。花春生於根，與苗并出，夏花無子。根有黃、青、白三色。其作之方法，與鬱金同。惟花生異耳。

禹錫等按：陳藏器云：薑黃真者，是經種三年已上老薑，能生花，在根際，一如蘘荷。根節緊硬，氣味辛辣。種薑處有之，終是難得。性熱不冷，《本經》云寒，誤也。破血下氣。西蕃亦有來者，與鬱金、莪蒁相似。如蘇恭所附，即是莪蒁而非薑黃。蘇不能分別二物也。又云：莪，味苦，温。主惡風疰忤，心痛，血氣結積。蘇云薑黃是莪，又云鬱金是胡莪。夫如此，則三物無別，遞相連名，總稱爲莪，功狀則合不殊。今莪味苦，色青。薑黃味辛，温，無毒，色黃，主破血下氣，温，不寒。鬱金味苦，寒，色赤，主馬熱病。三物不同，所用全別。又劉淵林注《吴都賦》薑彙非一。云薑彙大如螺，氣猛近於臭，南土人搗之以爲齏芟。一名廉薑。生沙石中，薑類也。其味大辛而香，削皮以黑梅并鹽汁漬之，乃成啖之，云治氣爲最。醫家治氣藥大方中，亦時用之。

《圖經》曰：薑黃、莪蒁、舊不載所出州郡，今江、廣、蜀川多有之。葉青緑，長一二尺許，闊三四寸，有斜文如紅蕉葉而小。花紅白色㊷，至中秋漸凋。春末方生，其花先生，次方生葉，不結實。根盤屈，黃色，類生薑而圓，有節。或云真者是經種三年已上老薑，能生花，花在根際。一如蘘荷，根節堅硬，氣味辛辣，種薑處有之。八月採根，片切暴乾。蜀人以治氣脹，及産後敗血攻心，甚驗。蠻人生啖，云可以祛邪辟惡。謹按：鬱金、薑黃、莪蒁三物相近，蘇恭不細辨，所説乃如一物。陳藏器解紛云：莪，味苦，色青；薑黃味辛，温，色黃；鬱金味苦，寒，色赤，主馬熱病。都賦》薑彙非一。云薑彙大如螺，氣猛近於臭，南土人搗之以爲齏芟。一名廉薑。生沙石中，薑類也。其味大辛而香，削皮以黑梅并鹽汁漬之，乃成啖之，云治氣爲最。醫家治氣藥大方中，亦時用之。

《千金翼》：治心痛。薑黃一兩，桂穰三兩爲末，醋湯下一錢匕。

《經驗後方》：治癖疥初成，或始痛癢。以薑黃傅之，妙。

葦撥

州端



蓽撥　味辛，大温，無毒。主温中下氣，補腰脚，殺腥氣，消食，除胃冷，陰疝痃癖。其根名蓽撥没，主五勞七傷，陰汗核腫。生波斯國。此藥叢生，莖、葉似蒟醬，子緊細，味辛烈於蒟醬。今附。

禹錫等按：《日華子》云：治霍亂冷氣，心痛血氣。

陳藏器云：畢勃没，味辛，温，無毒。主冷氣嘔逆，心腹脹滿，食不消，寒疝核腫，婦人内冷無子，治腰腎冷，除血氣。生波斯國，似柴胡黑硬。畢撥根也。

《圖經》曰：蓽撥，出波斯國，今嶺南有之，多生竹林内。正月發苗作叢，高三四尺，其莖如箸，葉青圓，闊二三寸如桑，面光而厚。三月開花白色在表。七月結子如小指大，長二寸已來，青黑色，類椹子，九月收採，灰殺暴乾。已出《拾遺》。生波斯國，胡人將來此，調食用之。

《唐本》注云：蒟醬注蘇云：蓽撥叢生，子細味辛，烈於蒟醬。按蓽撥温中下氣，補腰脚，煞腥氣，消食，除胃冷，有衛士進乳煎蓽撥法，御用有效。劉禹錫亦記其事云，後累試年長而虚冷者必效。

《海藥》云：謹按《徐表南州記》，本出海南，長一指，赤褐色爲上。復有蓽撥，短小黑，味不堪。舶上者味辛，温。主人老冷心痛，水瀉虚痢，與阿魏和合良。亦滋食味。得訶子、人參、桂心、乾薑，治臟腑虚冷，腸鳴泄痢，神效。

《經驗後方》：治偏頭痛絶妙。蓽撥爲末，令患者口中含❶，左邊疼，令左鼻吸一字；右邊，令右鼻吸一字，效。

《衍義》曰：蓽撥，走腸胃中冷氣、嘔吐、心腹滿痛。多服走泄真氣，令人腸虚下重。

圖經衍義本草卷之十四

---

❶之下：此二字原脱，循例補。
❷止：晦明軒本作『積』。
❸飯：原作『飲』，據晦明軒本改。
❹核：原脱，據晦明軒本補。
❺著：晦明軒本作『灼然』。
❻生：晦明軒本作『甥』。
❼代：晦明軒本作『氏』。
❽録：晦明軒本作『欲』。
❾預：晦明軒本作『碩』。
❿到：晦明軒本作『刺』。
⓫膿：晦明軒本作『疹』。
⓬肥：晦明軒本作『花』。
⓭匀：原作『句』，據晦明軒本改。
⓮瓜：晦明軒本『瓜』下有『根』字。
⓯三：晦明軒本『三』下有『次』字。
⓰濃前：晦明軒本作『濃煎』。
⓱狹：原作『俠』，據晦明軒本改。

⑱石：晦明軒本作『水』。
⑲比：晦明軒本作『此』。
㊴而之：晦明軒本作『上』。
㉑菜：原作『萊』，據晦明軒本改。
㉒貝：晦明軒本作『背』。
㊴李：晦明軒本作『季』。
㉞白：晦明軒本『白』上有『紫』字。
㊴弊：晦明軒本『弊』下有『甑』字。
㉖筒：晦明軒本作『同』。
㉗水：晦明軒本作『冰』。
㊴使：原作『死』，據晦明軒本改。
㊴南：晦明軒本無『南』字。
㊴皮：晦明軒本作『支』。
㊴勞：晦明軒本作『嶗』。
㊴呼：原作『乎』，據晦明軒本改。
㊴將：原脱，據晦明軒本補。
㉞良：『良』下原有『薑』字，據晦明軒本删。
㊴腹：原作『服』，據晦明軒本改。
㊴可：晦明軒本作『少』。
㊴和：晦明軒本作『去』。
㊴枚：原作『放』，據晦明軒本改。
㊴延：原作『廷』，據晦明軒本改。
㊸止：晦明軒本作『主』。
㊸二：原作『一』，據晦明軒本改。
㊷色：原作『花』，據晦明軒本改。
㊸含：晦明軒本『含』下有『温水』二字。

圖經衍義本草卷之十五

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部中品之下❶

蒟醬

蒟醬



蒟 音矩 **醬**　味辛，温，無毒。主下氣温中，破痰積。生巴蜀。

《唐本》注云：《蜀都賦》所謂流味於番禺者。蔓生，葉似王瓜而厚大，味辛香，實似桑椹，皮黑肉白。西戎亦時將來，細而辛烈。或謂二種。交州、愛州人云：蒟醬，人家多種，蔓生。子長大，謂苗爲浮留藤。取葉合檳榔食之，辛而香也。又有蓽撥，叢生，子細，味辛，烈於蒟醬。此當信也。

今注：渝、濾等州出焉。唐本先附。

《圖經》曰：蒟醬，生巴蜀，今夔州、嶺南皆有之。昔漢武使唐蒙曉諭南越，南越食蒙以蒟醬，蒙問所從何來。答曰：西北牂牁江廣數里，出番禺城下。武帝感之，於是開牂牁、越巂也。劉淵林注《蜀都賦》云：蒟醬，緣木而生。其子如桑椹，熟時正青，長二三寸。以蜜藏而食之，辛香，調五臟。今云蔓生，葉似王瓜而厚大，實皮黑肉白，其苗爲浮留藤。取葉合檳榔食之，辛而香也。兩説大同小異，然則淵林所云乃蜀種。如此今説是海南所傳耳。今惟貴蓽撥而不尚蒟醬，故鮮有用者。

《海藥》云：謹按《廣州記》云：波斯國文，實狀如桑椹，紫褐色者爲上，黑者是老不堪。黔中亦有，形狀相似，滋味一般。主咳逆上氣，心腹蟲痛，胃弱虚瀉，霍亂吐逆，解酒食味。近多黑色，少見褐色者也。

雷公云：凡使，採得後以刀刮去

粗皮便搗，用生薑自然汁拌之，蒸一日了，出，日乾。每修事五兩，用生薑汁五兩，蒸乾爲度。

《食療》云：温。散結氣，治心腹中惡氣。亦名土藭撥。嶺南藭撥，尤治胃氣疾。巴蜀有之。

《齊民要術》：蒟子下氣消穀。

蘼摩子　味甘、辛，温，無毒。主虚勞。葉食之功同於子。陸機云：一名芄蘭，幽州謂之雀瓢。

《唐本》注：按雀瓢是女青别名。葉蓋相似，以葉似女青，故兼名雀瓢。

今按：陳藏器《本草》云：蘼摩條中，白汁主蜘蛛、蠶咬，折取汁點瘡上，此汁爛絲煮食補益。按陶注枸杞條云：傅腫。東人呼爲白環，藤生籬落間，折有白汁，一名雀瓢。此注又云：雀瓢是女青，然女青終非白環，二物相似，不能分别。唐本先附。

禹錫等按：《爾雅》云：藿，芄蘭。釋曰：藿，一名芄蘭。郭璞云：藿芄蔓生，斷之有白汁，可啖。如此注，則似藿芄一名蘭，或傳寫誤。芄，衍字。

《外臺秘要》：治白癜風。以蘼摩草白汁傅上，揩令破再傅，三度瘥。

《梅師方》：治火丹毒，遍身赤腫不可忍。以蘼摩草搗絞汁傅之，或搗傅上，隨手消之。

青黛　味鹹，寒，無毒。主解諸藥毒，小兒諸熱，驚癇發熱，天行頭痛寒熱，并水研服。亦摩傅熱瘡惡腫，金瘡，下血，蛇、犬等毒。從波斯國來，及太原并廬陵、南康等，染澱亦堪傅熱惡腫，蛇虺螫毒。染瓮上池沫紫碧色者用之，同青黛功。今附。

禹錫等按：《藥性論》云：青黛，治諸蟲毒所傷。青黛、雄黄等分，同研爲末，新汲水調下二錢匕。

《太平廣記》：青黛，殺惡蟲物，化爲水。

《梅師方》：治傷寒，發豌豆瘡未成膿方。以波斯青黛大棗許，冷水研服。

《衍義》曰：青黛，乃藍爲之。有一婦人患臍下腹上，連二陰，遍滿生濕瘡，狀如馬瓜瘡。他處并無，熱癢而痛，大小便澀，出黄汁，食亦減，身面浮腫。醫作惡瘡治，用鰻鮮魚、松脂、黄丹之類。塗上，瘡愈熱，痛❷甚。治不對，故如此。問之，此人嗜酒，貪啖，喜

魚蟹發風等物。急令用温水洗，拭去膏藥。尋以馬齒莧四兩，爛研細，入青黛一兩，再研勻，塗痛瘡上，即時熱減，痛癢皆去。仍服八正散，日三服，分敗客熱。每塗藥，得一時久，藥已乾燥，又再塗新濕藥。凡如此二日，減三分之一，五日減三分之二，自此二十日愈。既愈乃問曰：此瘡何緣至此？曰：中、下焦蓄風熱毒氣，若不出，當作腸癰内痔，仍常須禁酒及發風物。然不能禁酒，後果餘患内❸痔。

鬱金



潮州

鬱金　味辛、苦，寒，無毒。主血積下氣，生肌止血，破惡血，血淋尿血，金瘡。

《唐本》注云：此藥苗似薑黃，花白質紅，末秋出莖心，無實，根黃赤。取四畔子根，去皮火乾之。生蜀地及西戎。馬藥用之，破血而補，胡人謂之馬蓮。嶺南者有實似小豆蔻，不堪啖。

唐本先附。

禹錫等按：《藥性論》云：鬱金，單用亦可。治女人宿血氣心痛，冷氣結聚。温醋摩服之。亦啖馬藥，用治脹痛。

《圖經》曰：鬱金，《本經》不載所出州土，蘇恭云：生蜀地及西戎，胡人謂之馬蓮，今廣南、江西州郡亦有之，然不及蜀中者佳。四月初生，苗似薑黃，花白質紅，末秋出莖心，無實。根黃赤，取四畔子根，去皮火乾之。古方及馬醫多用之。謹按崑草之華。遠方所貢芳草，合釀之以降神。

《經驗後方》：治風痰。鬱金一分，藜蘆十分，各爲末，和令勻，每服一字，用温漿水一盞，先以少漿水調下，餘者水漱口都服，便以食壓之。

孫用和：治陽毒入胃，下血頻，疼痛不可忍。鬱金五個大者，牛黃一皂莢子大，別細研二味同爲散。每服用醋漿水一盞，同煎三沸，温服。

《丹房鏡源》云：灰可用結砂子。

《説文》曰：鬱金，芳草也。十葉爲貫，百二十貫築以煮之爲鬯。曰鬱，今❹鬱林郡也。木部中品有鬱金香，云生大秦國。二月、三月有花，狀如紅藍，其花即香也。陳氏云：爲百草之英，既云百草之英，乃是草類。又與此同名，而在木部，非也。今人不復用，亦無辨之者，故但附於此耳。

《經驗方》：治尿血不定。以一兩搗爲末，葱白一握相和，以水一盞，煎至三合，去滓，温服，日須三服。

《經驗後方》：治風痰。鬱金一分，藜蘆十分，各爲末，和令勻，每服一字，用温漿水一盞，先以少漿水調下，餘者水漱口都服，便以食壓之。

孫用和：治陽毒入胃，下血頻，疼痛不可忍。鬱金五個大者，牛黃一皂莢子大，別細研二味同爲散。每服用醋漿水一盞，同煎三沸，温服。

《丹房鏡源》云：灰可用結砂子。

《説文》曰：鬱金，芳草也。十葉爲貫，百二十貫築以煮之爲鬯。曰鬱，今鬱林郡也。

《周禮》云：鬱人，凡祭祀賓客之裸，和事鬱鬯。

《衍義》曰：鬱金不香，今人將染婦人衣最鮮明，然不奈日炙。染成衣，則微有鬱金之氣。

盧會　味苦，寒，無毒。主熱風煩悶，胸膈間熱氣，明目鎮心，小兒癲癎

盧會

廣州



驚風，療五疳，殺三蟲及痔病瘡瘻，解巴豆毒。一名訥會，一名奴會，俗呼爲象膽。蓋以味苦如膽故也。生波斯國，似黑錫。今附。

禹錫等按：《藥性論》云：盧會亦可單用。殺小兒疳蛔，主吹鼻，殺腦疳，除鼻瘜。《南海藥譜》云：樹脂也，本草不細委之，謂象膽者，殊非也。兼治小兒諸熱。

《圖經》曰：盧會，出波斯國，今惟廣州有來者。其木生山野中，滴脂泪而成。採之不拘時月。俗呼爲象膽，其味苦而云耳。盧會治濕癢，搔之有黃汁者，劉禹錫著其方云：余少年曾患癬，初生頸項間，後延上左耳，遂成濕瘡。用斑猫、狗膽、桃根等諸藥，徒令蝨蟲，其瘡轉盛。偶於楚州，賣藥人教用盧會一兩研，炙甘草半兩末，相和令勻，先以温漿水洗癬，乃用舊乾帛子拭乾，便以二味合和傅之，立乾，便瘥，神奇。又治蠹齒。崔元亮《海上方》云：取盧會四兩❺，杵末，先以鹽揩齒令淨，然後傅少末於上，妙。

雷公云：凡使，勿用雜膽，其象膽乾了，上有青竹文斑并光膩，微微甘，勿便❻和衆藥搗，此藥先搗成粉，待衆藥末出，然後入藥中。此物是胡人殺得白象，取膽乾入漢中是也。

禹錫等按：《爾雅》云：蔚，牡菽。釋曰：蔚，即蒿之雄無子者。又曰：蔚，一名牡菽。《詩·蓼莪》云：匪莪伊蔚。陸機云：牡蒿也。三月始生，七月華，葉似胡麻華而紫赤，八月爲角，角似小豆角，銳而長。一名馬新蒿。

《圖經》曰：文具第七卷中白蒿條下。

《聖惠方》：治大風癩疾，骨肉疽敗，百節疼酸，眉鬚墮落，身體習習癢痛。以馬先蒿細剉，炒爲末。每空心及晚食前，温酒調下三錢匕。

《外臺秘要》：治癩。馬先蒿一名馬矢蒿。搗末服方寸匕，日三服，如更赤起，一年都瘥。

馬先蒿

味苦，平，無毒。主寒熱鬼疰，中風濕痹，女子帶下病，無子。一名馬屎蒿。生南陽川澤。

陶隱居云：方云一名爛石草。主惡瘡。方藥亦不復用。唐《本草》❼云：此葉大如芜蔚，花紅白色。實八月、九月熟，俗謂之虎麻是也，一名馬新蒿，所在有之。芜蔚苗短小，子夏中熟。而初生二種相似也。

今按：《別本》注云：近❽道處處有。三月、八月採莖、葉，陰乾。

延胡索

味辛，温，無毒。主破血，産後諸病因血所爲者，婦人月經不調，腹中結塊，崩中淋露，産後血運，暴血衝上，因損下血，或酒摩及煮服。生奚國。根如半夏，色黄。今附。

禹錫等按：《日華子》云：除風治氣，暖腰膝，破癥癖，撲損瘀血，落胎，

及暴腰痛。

《海藥》云：生奚國，從安東道來。味苦、甘，無毒。主腎氣，破產後惡露及兒枕。與三棱、鱉甲、大黃爲散，能散風通經絡，蛀蚘成末者，使之惟良。偏主產後病也。

《聖惠方》：治產後穢污不盡腹滿方。延胡索末，調酒服一錢，立止。又方：治墮落車馬，筋骨疼痛不止。用延胡索一兩，搗羅爲散，不計時候，以豆淋酒調下二錢。

《勝金方》：治膜肉❾氣及氣塊方。延胡索不拘多少爲末，猪胰一具切作塊子，炙熟蘸藥末食之。

《產書》：治產後心悶，手脚煩熱，氣力欲絶，血暈連心頭硬，及寒熱不禁。延胡索熬搗爲末，酒服一錢匕。

《拾遺·序》云：延胡索，止心痛。酒服。

肉豆蔻

味辛，温，無毒。主鬼氣，温中治積冷，心腹脹痛，霍亂中惡，冷疰，嘔沫冷氣，消食止泄，小兒乳霍。



其形圓小，皮紫緊薄，中肉辛辣。生胡國，胡名迦拘勒。今附。

禹錫等按：《藥性論》云：豆蔻，君，味苦，辛。能主小兒吐逆，不下乳，腹痛，治宿食不消，痰飲。

《日華子》云：調中下氣，止瀉痢，開胃消食，皮外絡下氣及氣塊方。

《圖經》曰：肉豆蔻，出胡國，今惟嶺南人家種之。春生苗，花實似豆蔻而圓小，皮紫緊薄，中肉辛辣，六月、七月採。《續傳信方》治脾泄氣痢等，以豆蔻二顆，米醋調麵裹之，置於灰中令黃焦，和麵碾末。更以炒了欖子末一兩，相和。又焦炒陳廩米爲末，每用二錢匕煎作飲，調前二物三❿匕，旦暮各一服，便瘥。

陳藏器云：大舶來即有，中國無。

及崑崙，味辛，温，無毒。主心腹蟲痛，脾胃虛冷，氣併冷熱，虛泄赤白痢等。凡痢以白粥飲服佳。霍亂氣併以生薑湯服良。

雷公云：凡使，須以糯米作粉，使熱湯搜裹豆蔻，於煻灰中炮，待米圓子焦黃熟，然後出，去米，其中有子取用。勿令犯銅。

《海藥》云：謹按《廣志》：生秦國

補骨脂



味辛，大温，無毒。主五

勞七傷，風虛冷，骨髓傷敗，腎冷精流，及婦人血氣墮胎。一名破故紙。生廣南諸州及波斯國。樹高三四尺，葉小似薄苛。其舶上來者最佳。今附。

禹錫等按：《藥性論》云：婆固脂，一名破故紙。味苦、辛。能主男子腰疼，膝冷囊濕，逐諸冷痹頑，止小便利，腹中冷。

《日華子》云：興陽事，治冷勞，明耳目。南蕃者色赤，廣南者色緑。入藥微炒用。又名胡韭子。

《圖經》曰：補骨脂，生廣南諸州及波斯國，今嶺外山坂間多有之，不及蕃舶者佳。莖高三四尺，葉似薄苛，花微紫色，實如麻子，圓扁而黑，九月採。或云胡韭也。今人多以胡桃合服。此法出於唐·鄭相國。自叙云：余爲南海節度，年七十有五。越地卑濕，傷於内外，衆疾俱作，陽氣衰絶，服乳石補益之藥，百端不應。元和七年，有訶陵國舶主李摩訶，知予病狀，遂傳此方并藥。予初疑而未服，摩訶稽顙固請，遂服之。經七八日而覺病驗。自爾常服，而⑫功神驗。十年二月，罷郡歸京，録方傳之。破故紙十兩，净擇去皮洗，搗篩令細，用胡桃瓤二十兩，湯浸去皮，細研如泥，即入前末，更以好蜜和，攪令勻如飴糖，盛於瓷器中。旦以暖酒二合，調藥一匙服之，便以飯壓。如不飲酒，以暖熟水調亦可。服彌久則延年益氣，悦心明目，補添筋骨。但禁食芸薹、羊血、餘毒⑫。此物本自外蕃隨海舶而來，非中華所有。蕃人呼爲補骨鴈，語訛爲破故紙也。《續傳信方》載其事，其義頗詳，故并録之。

《海藥》云：惡甘草。

雷公云：凡使，性本大燥毒。用破故紙爲末，温酒下三錢匕。又方：治腰疼極妙。用破故紙爲末，生下濕地，三月採，陰乾。

禹錫等按：陳藏器云：薰草，明目止泪，療泄精，去臭惡氣，傷寒頭疼。



零陵香

州蒙

州濠

零陵香　味甘，平，無毒。主惡氣疰心腹痛滿，下氣。令體香，和諸香作湯圓用之，得酒良。生零陵山谷。葉如羅勒。《南越志》名燕草，又名薰草，即香草也。《山海經》云：薰草，麻葉方莖，氣如蘼蕪，可以止癘，即零陵香也。今附。

禹錫等按：陳藏器云：薰草，明目止泪，療泄精，去臭惡氣，傷寒頭疼。一名蕙草，生下濕地，三月採，陰乾。脱節者良。按薰草，即蕙⑯也。葉如

麻，兩兩相對，此即是零陵香[17]也。

《日華子》云：治血氣腹脹，酒煎服莖、葉。

《圖經》曰：零陵香，生零陵山谷，今湖嶺諸州皆有之，多生下濕地。葉如麻，兩兩相對，莖方，氣如蘼蕪，常以七月中旬開花，至香，古所謂薰草是。或云蕙草，亦此也。又云：其莖、葉謂之蕙，其根謂之薰。三月採，脫節者良。今嶺南收之，皆作窟竈，以炭火焙乾，令黃色乃佳。江淮間亦有土生者，作香亦可用，但不及湖嶺者芬薰耳。古方但用薰草，不用零陵香。今合香家及面膏、澡豆諸法皆用之，都下市肆貨之甚多。

《唐本》注云：生水山間，可和諸香，煮汁飲之亦宜。合衣中香。

《海藥》云：謹按《山海經》生廣南山谷。陳氏云：地名零陵，故以地爲名。味辛，温，無毒。主風邪衝心，牙車腫痛，虚勞疳蠱。凡是齒痛煎含良。得升麻、細辛善。不宜多服，令人氣喘。

《衍義》曰：零陵香，至枯乾猶香，入藥絶可用。婦人浸油飾髮，香無以加，此即蕙草是也。

縮紗蜜

新州



味辛，温，無毒。主虚勞冷瀉，宿食不消，赤白泄痢，腹中虚痛，下氣。生南地。苗似廉薑，形如白豆蔻，其皮緊厚而皺，黄赤色，八月採。今附。

禹錫等按：《藥性論》云：縮紗蜜，君，出波斯國。味苦、辛。能主冷氣腹痛，止休[17]息氣痢，勞損，消化水穀，温暖脾胃，治冷滑下痢不禁，虚羸。方曰：燥爲末，羊子肝薄切，用末逐片糝，瓦上焙乾爲末，入乾薑末，飯爲圓。又方：炮附子末、乾薑、厚朴、陳橘皮等分爲丸，日二服四十丸。

陳藏器云：縮紗蜜，味酸。主上氣咳嗽，奔豚鬼疰，驚癇邪氣。似白豆蔻子。

嵩陽子曰：止痢。味辛、香。

《日華子》云：治一切氣，霍亂轉筋，心腹痛，能起酒香味。

《圖經》曰：縮紗蜜，生南地，今惟嶺南山澤間有之。苗莖似高良薑，高三四尺。葉青，長八九寸，闊半寸已來。三月、四月開花在根下，五六月成實，五七十枚作一穗，狀似益智，皮緊厚而皺如粟[17]文，外有刺，黄赤色。皮開[20]細子一團，八漏，可四十餘粒，如黍米大，微黑色，七月、八月採。

《海藥》云：今按陳氏，生西海及西戎諸國。味辛，平，鹹。得訶子、鱉甲、豆蔻、白蕪荑等良。多從安東道來。

孫尚藥：治婦人妊娠偶因所觸或墮高傷打，致胎動不安，腹中痛不可忍者。縮紗不計多少，熨斗内盛，慢火炒令熱透，去皮用人，搗羅爲末，每服二

錢，用熱酒調下。須臾覺腹中胎動處極熱，即胎已安。神效。

蓬莪茂

州溫



州端



蓬莪茂　味苦、辛，温，無毒。主心腹痛，中惡疰忤鬼氣，霍亂冷氣，吐酸水，解毒，飲食不消，酒研服之。又療婦人血氣，丈夫奔豚。生西戎及廣南諸州。子似乾椹，葉似蘘荷，茂在根下并生。一好一惡，惡者有毒。西戎人取之，先放羊食，羊不食者棄之。今附。

禹錫等按：陳藏器云：一名蓬莪，黑色；二名遂，黄色；三名波殺，味甘，有大毒。

《藥性論》云：蓬莪茂，炮過，熱搗爲末，用一大能治女子血氣心痛，破痃癖冷氣，以酒、醋摩服，效。

《日華子》云：得酒、醋，治一切氣，開胃消食，通月經，消瘀血，止撲損痛下血，及内損惡血等。此即是南中薑黄根也。

《圖經》曰：蓬莪茂，生西戎及廣南諸州，今江浙或有之。三月生苗，在田野中。其莖如錢大，高二三尺。葉青白色，長一二尺，大五寸已來，頗類蘘荷。五月有花作穗，黄色，頭微紫。根如生薑，而茂在根下，似鷄鴨卵，大小不常。九月採，削去粗皮，蒸熟暴乾用。此物極堅硬難搗，治用時，熱灰火中煨令透熟，乘熱入臼中，搗之即碎如粉。古方不見用者。今醫家治積聚諸婦人藥中亦多使。

雷公云：凡使，於砂盆中用醋磨令盡，然後於火畔吸令乾重篩過用。

《十全博濟方》：治小兒氣候止疼。蓬莪茂炮過，熱搗爲末，用一大錢，熱酒調下。

孫用和：正元散治氣不接續，氣短，兼治滑泄及小便數，王丞相服之有效。蓬莪茂一兩，金鈴子去核一分，右件爲末，入鵬砂一錢，煉過研細。都令匀，每服二錢，鹽湯或温酒調下，空心服。

積雪草



積雪草　味苦，寒，無毒。主大熱，惡瘡癰疽，浸淫赤熛，皮膚赤，身熱。生荆州山谷。

陶隱居云：方藥不用，想此草當寒冷爾。

《唐本》注云：此草葉圓如錢大，莖細勁，蔓延生溪澗側，搗傅熱腫丹毒，不入藥用。荆楚人以葉如錢，謂之地錢草，《徐儀藥圖》名連錢草，生處亦稀。

今按：陳藏器《本草》云：積雪草，主暴熱，小兒丹毒，寒熱腹内熱結，搗絞取汁服之。又按：《别本》注云：今處處有，并入藥用。生陰濕地，八月、九月採苗、葉，陰乾。

禹錫等按：《藥性論》云：連錢草亦可單用。能治瘰癧鼠漏，寒熱時節來往。

《日華子》云：味苦、辛。以鹽挼貼，消腫毒并風疹疥癬。

《圖經》曰：積雪草，生荆州川谷，今處處有之。葉圓如錢大，莖細而勁，蔓延生溪澗之側，楚人以葉如錢，謂之地錢草，《徐儀藥圖》名連錢草。八月、九月採苗、葉，陰乾用。段成式《酉陽雜俎》云：地錢葉圓，莖細有蔓，一曰連錢草。謹按《天寶單行方》云：連錢草㉑，味辛㉒，平，無毒。元生咸陽下濕地，亦生臨淄郡、濟陽郡池澤中，甚香。俗間或云葉圓似薄荷，江東吴越郡丹陽郡極多，彼人常充生菜食之。河北柳城郡盡呼爲海蘇，好近水生，經冬不死，咸、洛二京亦有。或名胡婆荷，所在有之。單服療女子小腹痛。又云：女子忽得小腹中痛，月經初來，便覺腰中切痛連脊間，如刀錐所切，忍不可堪者。衆醫不别，是謂鬼疰，妄服諸藥，終無所益，其疾轉增。審察前狀相當，即用此藥。其藥，夏五月正放花時，即採取暴乾，搗篩爲散。女子有患前件病者，取二方寸匕，和好醋二小合，攪令勻，平旦空腹頓服之。一日一服，以知爲度。如女子先冷者，即取前件藥五兩，加桃人二百枚，去尖、皮，熬搗爲散，以蜜爲丸如梧子大。每日空腹以飲及酒下二十丸，日再服，以疾愈爲度。忌麻子、蕎麥。

陳藏器云：東人呼爲連錢草，生陰濕地，葉如錢。

《衍義》曰：積雪草，今南方多有，生陰濕地，不必荆楚。形如水荇而小，面亦光潔，微尖爲異。今人謂之連錢草，蓋取象也。華㉒葉各生，搗爛，貼一切熱毒癰疽等。秋後採之，陰乾爲末，水調傅。



白前　舒州

白前　越州

《蜀本》云微寒。

味甘㉔，微温，臣禹錫等謹按：《唐本》注云：此藥出近道。似細辛而大，色白，易折。主氣嗽方多用之。

《唐本》注云：此藥葉似柳，或似芫花，苗高尺許，生洲渚沙磧之上。根白，長於細辛，味甘，俗以酒漬服之。主上氣，不生近道。俗名石藍，又名嗽

藥。今用蔓生者，味苦，非真也。

今按：《別本》注云：三月、八月採根，暴乾。根似牛膝、白薇。

禹錫等按：《藥性論》云：白前，味辛。兼主一切氣。

《日華子》云：治賁豚腎氣，肺氣煩悶及上氣。

《圖經》曰：白前，舊不載所出州土，陶隱居云出近道，今蜀中及淮、浙州郡皆有之。苗似細辛而大，色白，易折。亦有葉似柳，或似芫花苗者，高尺許。生洲渚沙磧之上，根白，長於細辛，亦似牛膝、白薇輩。今用蔓生者，味苦，非真也。二月、八月採根，暴乾。

深師療久咳逆上氣，體腫，短氣脹滿，晝夜倚壁不得卧，常作水鷄者，白前湯主之。白前二兩，紫菀、半夏洗各三兩，大戟七合，四物以水一斗，漬一宿，明旦煮取三升，分三服。禁食羊肉、餳大佳。

《唐本》云：微寒。主上氣衝喉中，呼吸欲絶。

雷公云：凡使，先用生甘草水浸一伏時候，漉出，去頭鬚了，焙乾，任入藥中用。

《梅師方》：治久患暇呷咳嗽，喉中作聲，不得眠。取白前搗爲末，温酒調二錢匕。

《衍義》曰：白前，保定肺氣，治嗽多用。白而長於細辛，但粗而脆，不似細辛之柔。以温藥相佐使，則尤佳，餘如《經》。

薺苨



潤州



蜀州

薺苨　味甘，寒。主解百藥毒。

陶隱居云：根、莖都似人參，而葉小異，根味甜絶，能殺毒。以其與毒藥共處，而毒皆自然歇，不正入方家用也。

今按：《別本》注：根似桔梗，以無心爲異，無毒。二月、八月採根，暴乾。

臣禹錫等按：《爾雅》云：苨，蔵苨，一名蔵苨。郭云：薺苨根搗爲末，以飲服方寸匕，立瘥。

《食療》云：丹石發動，取根食之尤良。

《千金翼》：封丁腫。取生薺苨根汁一合，去滓傅之，不過三。

《食醫心鏡》：薺苨，主利肺氣，和

中，明目，止痛。蒸切作羹粥食之，齏菹亦得。

《金匱玉函方》：鈎吻葉與芹葉相似，誤食之殺人。薺苨八兩，水六升，煮取三升，爲兩服解之。

《朝野僉載》：野猪中毒藥箭，多食此物，即出。

《別説》云：今多蒸壓匾亂人參，但味淡爾。

《衍義》曰：薺苨，今陝州採爲脯，別有法，甚甘美，兼可寄遠。古人以謂薺苨似人參者是此。解藥毒甚驗。

白藥　味辛，温，無毒。主金瘡生肌。出原州。

《唐本》注云：三月苗生，葉似苦苣，四月抽赤莖，花白，根皮黄，八月葉落，九月枝折，採根，日乾。

今按：《別本》注云：解野葛、生金、巴豆百藥毒，刀斧折傷，乾末傅之。唐本先附。

禹錫等按：《藥性論》云：白藥亦可單用，味苦。能治喉中熱塞，噎痹不通，胸中隘塞，咽中常痛，腫脹。



《日華子》云：白藥，冷。消痰止嗽，治渴并生[25]血，喉閉，消腫毒。又云：剪草根名白藥。

《圖經》曰：白藥，出原州，今夔、嶺南亦有之。三月生苗，似施、江西、嶺南亦有之。三月生苗，似苦苣葉，四月而赤，長[25]似葫蘆蔓，六月開白花。八月結子，亦名菰蔞。九月採根，以水洗，切碎，暴乾，名白藥子。江西出者，葉似烏臼，子如緑豆，至八月，其子變成赤色，施州人取根，并野猪尾二味，洗净去粗皮，焙乾，等分，停搗篩，酒調服一錢匕。療心氣痛，解熱毒，甚效。又諸瘡癰腫不散者，取生根爛搗傅貼，乾則易之。無生者用末水調塗之亦可。

崔元亮《海上方》：治一切天行。取白藥研如麵，漿水一大盞，空腹頻服之，便仰卧一食頃[25]，俟心頭悶亂，或惡心，腹内如車鳴疠刺痛，良久當下吐痢數行，勿怪。欲服藥時，先令煮漿水粥於井中懸著待冷。若吐痢過度，即吃冷粥一碗止之，不吃即困人。

《經驗後方》：治妊娠護胎。以白

藥子不拘多少爲末，用鷄子清調攤於紙花上，可碗來大，貼在臍下胎存生處，乾即以温水潤之。

《衍義》曰：白藥，今爲治馬肺熱藥，有效。



荭草

荭音紅**草**　味鹹，微寒，無毒。主消渴，去熱，明目，益氣。一名鴻薧音纘。如馬蓼而大，生水傍，五月採實。

陶隱居云：此類甚多，今生下濕地，極似馬蓼，甚長大。《詩》稱隰有遊龍，注云：即籠古也。

今按：《別本》注云：此即水紅也。以爲湯，浸療脚氣。

禹錫等按：《爾雅》云：紅，籠古。其大者薧丘追切。鄭詩云：隰有遊龍是也。陸機云：一名馬蓼，葉大而赤白色，生水澤中，高丈餘。郭《圖經》曰：荭草爲籠鼓，語轉耳。

不著所出州郡，云生水傍，今所在下濕地皆有之。似蓼而葉大，赤白色，高丈餘。《爾雅》云：紅，籠古。其大者薧丘追切。鄭詩云：隰有遊龍是也。陸機云：一名馬蓼。《本經》云：似馬蓼而大。若然，馬蓼自是一種也。五月採實，今亦稀用。但取根、莖作湯，捋脚氣耳。

陳藏器云：作湯浸水氣，惡腫瘡，佳。

《唐本》注云：此草根名香附子，一名雀頭香。大下氣，除胸腹中熱，所在有之。莖、葉都似三棱，根若附子，周匝多毛。交州者最勝。大如棗，近道者如杏人許。荆襄人謂之莎草根，療體異此。

莎草根

胸中熱，充皮毛。久服利人，益氣，長鬚眉。一名薃音號，一名侯莎。其實名或云交州者勝，大如棗，近道者如杏人許。苗、莖、葉都似三棱，根若附子，周匝多毛。今近道生者，苗、葉如薤而瘦，根如箸頭大。二月、八月採。

陶隱居云：方藥亦不復用。《離騷》云：青莎雜樹，繁草靡音髓蘼音美。古人爲詩多用之，而無識者。乃有鼠



採。謹按《天寶單方圖》載水香棱，功狀與此頗相類，但味差不同。其方云：水香棱，味辛，微寒，無毒，性澀。元生博平郡池澤中，苗名香棱，根名莎結，亦名草附子。河南及淮南下濕地即有，名水莎，隴西謂之地藾根，蜀郡名續根草，亦名水巴戟。今涪都最饒，名三棱草。用莖作鞋履，所在皆有。單服療虛[30]風。又云：其藥療丈夫心肺中虛風及客熱，膀胱間連脅下時有氣妨，皮膚瘙癢癮疹，飲食不多，日漸瘦損，常有憂愁，心忪少氣等。并春收苗及花，陰乾。入冬採根，切，貯於風涼處。有患前病者，取苗二十餘斤，剉，以水二石五斗，煮取一石五斗，於浴斛中浸身，令汗出五六度。浸兼浴，其肺中風、皮膚癢即止。每載四時常用，則癮疹風永差。其心客熱，膀胱間連脅下氣妨，常日憂愁不樂，兼心忪者，取根二大斤，切，熬令香，以生絹袋[30]盛貯，於三大斗無灰清酒中浸之。春三月浸一日即堪服，冬十月後即七日，近暖處乃佳。每空腹服一盞，日夜三四服之，常令酒氣相續，以知爲度。若不飲酒，即取根十兩，加桂心五兩，蕪荑三兩，和搗爲散，以蜜和爲丸，搗一千杵，丸如梧子大。每空腹，以酒及薑蜜湯飲汁等，下二十丸，日再服，漸加至三十丸，以瘥爲度。

雷公云：凡採得後，陰乾，於石臼中搗，勿令犯鐵器，用之切忌。

《衍義》曰：莎草，其根上如棗核者，又謂之香附子，亦入印香中，亦能走氣，今人多用。雖生於莎草根上，然根或有或無。有薄皸皮，紫黑色，非多毛也。刮去皮則色白。若便以根爲之，則誤矣。其味苦。

蓽澄茄

廣州



蓽澄茄　味辛，温，無毒。主下氣消食，皮膚風，心腹間氣脹，令人能食，療鬼氣。能染髮及香身。生佛誓國。似梧桐子及蔓荆子微大，亦名毗陵茄子。今附。

禹錫等按：《日華子》云[30]：治一切氣并霍亂瀉，肚腹痛，腎氣膀胱冷。

《圖經》曰：蓽澄茄，生佛誓國，今廣州亦有之。春夏生葉，青滑可愛，結實似梧桐子及蔓荆子，微大。八月、九月採之。今醫方脾胃藥中多用。又治傷寒咳噫，日夜不定者，其方以蓽澄茄三分，高良薑三分，二物搗羅爲散，每服二錢，以水六分煎十[32]餘沸，入醋少許，攪匀和查[30]，如茶熱呷。

《海藥》云：謹按《廣志》云：出諸海。嫩胡椒也。青時就樹採摘造之，有柄粗而蒂丸是也。其味辛、苦，微温，無毒。主心腹卒痛，霍亂吐瀉，痰癖冷氣。古方偏用染髮，不治病。

雷公云：凡採得後，去柄及皺皮了，用酒浸蒸，從巳至酉出，細杵，任用也。

胡黄連　味苦，平，無毒。主久痢

胡黄連

廣州



成疳，傷寒咳嗽，温瘧骨熱，理腰腎，去陰汗，小兒驚癇，寒熱不下食，霍亂下痢。生胡國，似乾楊柳，心黑外黄。一名割孤露澤。今附。

《圖經》曰：胡黄連，生胡國，今南海及秦隴間亦有之。初生似蘆，乾似楊柳枝，心黑外黄，不拘時月收採。今小兒藥中多用之。又治傷寒勞復，身熱，大小便赤如血色者。胡黄連一兩，山梔子二兩去皮，入蜜半兩，拌和，炒令微焦，二味搗羅爲末，用猪膽[34]汁和丸，如梧桐子大。每服用生薑二片，烏梅一個，童子小便三合，浸半日去滓，食後暖小便令温，下十丸，臨卧再服，甚效。

《唐本》云：大寒。主骨蒸勞熱，補肝膽，明目，治冷熱泄痢，益顔色，厚腸胃，治婦人胎蒸虚驚，治三消五痔，大人五心煩熱。出波斯國，生海畔陸地，八月上旬採。惡菊花、玄參、白蘚皮，解巴豆毒。服之忌猪肉，令人漏精。以人乳浸點目甚良。苗若夏枯草，根頭似烏觜，折之内似鸜鵒眼者良。

孫尚藥：治小兒盜汗，潮熱往來。南蕃胡黄連、柴胡等分，羅極細，煉蜜和丸如鷄頭大。每服二丸至三丸，銀器中用酒少許化開，更入水五分，重湯煮三二十沸，放温，食後和滓服。

《别説》云：謹按：胡黄連，折之塵出如烟者爲真。

船底苔　冷，無毒。治鼻洪吐血，淋疾。以炙甘草并豉汁，濃煎湯旋呷。又主五淋，取一團鴨子大，煮服之。又水中細苔，主天行病，心悶，搗絞汁服。新補。見孟詵、陳藏器、日華子。

陳藏器云：主五淋。取一鴨卵大塊，水煮服之。

《聖惠方》：治乳石發動，小便淋澀不通，心神悶亂。用船底青苔如半鷄子大，以水一大盞，煎至五分，去滓温服，日三四服。

《子母秘録》：小兒赤遊，行於體上下，至心即死。水中苔搗末，傅上良。

紅豆蔻　味辛，温，無毒。主腸虚水瀉，心腹攪痛，霍亂，嘔吐酸水，解酒毒。不宜多服，令人舌粗，不思飲食。云是高良薑子，其苗如蘆，葉似薑，花作穗，嫩葉卷而生微帶紅色。生南海諸谷。今附。

禹錫等按：《藥性論》云：紅豆蔻亦可單用，味苦、辛。能治冷氣腹痛，消瘴霧氣毒，去宿食，温腹腸，吐瀉痢疾。

《海藥》云：擇嫩者，加入鹽，纍纍作朵不散落，須以朱槿染令色深，善醒於醉，解酒毒。此外無諸要使也。

蒔蘿　味辛，温，無毒。主小兒氣脹，霍亂吐逆，腹冷，食不下，兩肋痞

蒔蘿

廣州



滿。生佛誓國，如馬芹子，辛香。亦名慈謀勒。今附。

禹錫等按：《日華子》云：健脾，開胃氣，温腸，殺魚肉毒，補水臟及壯筋骨，治腎氣。

《海藥》云：謹按《廣州記》云：生波斯國。馬芹子即黑色而重，蒔蘿子即褐色而輕。主膈氣，消食温胃，善滋食味，多食無損，即不可與阿魏同合，奪其味耳。

《圖經》曰：蒔蘿，今嶺南及近道皆有之。三四月生苗，花、實大類蛇床而香辛。六七月採實。今人多以和五味，不聞入藥用。

艾納香

味甘，温，無毒。去惡氣，殺蟲，主腹冷泄痢。《廣志》曰：出西國，似細艾。又有松樹皮緑衣，亦名艾納。可以和合諸香，燒之能聚其烟，青白不散，而與此不同也。今附。

禹錫等按：古樂府詩云：行胡從何方，列國持何來，氍毹毾㲪五木香，迷迭艾納與都梁。是也。

陳藏器云：主癬，辟蛀。

《海藥》云：謹按《廣志》云：生剽國，温，平。主傷寒，五泄，主心腹注氣，下寸白，止腸鳴。燒之，辟瘟疫，合整[35]窠，浴[36]氣甚良。

甘松香

文州



味甘，温，無毒。主惡氣，卒心腹痛滿，兼用合諸香，叢生，葉細。《廣志》云：甘松香出姑臧。今附。

禹錫等按：《日華子》云：治心腹脹，下氣。作浴湯，令人身香。

《圖經》曰：甘松香，出姑臧，今黔、蜀州郡及遼州亦有之。叢生山野，葉細如茅草，根極繁密，八月採，作浴湯，令人體香。

陳藏器云：叢生，葉細，出涼州。

《海藥》云：謹按《廣志》云：生源州，苗細引蔓而生。又陳氏云：主黑皮黚黯，風疳齒蠹，野鷄痔。得白芷、附子良。和合諸香及裛衣妙也。

垣衣

味酸，無毒。主黄瘴[37]心煩，咳逆血氣，暴熱在腸胃，金瘡内寒[38]。久服補中益氣，長肌好顔色。一名昔邪，一名烏韭，一名鼠韭。生古垣墻陰或屋上。三月三日採，陰乾。

陶隱居云：方藥不甚用，俗中少見有者，《離騷》亦有昔邪。或云即是天蒜耳。

《唐本》注云：此即古墻北陰青苔衣也。其生石上者名昔邪，一名烏韭。江南少墻，陶故云少見。《本經》載之，在下品，形并相似，爲

療略同。《別録》云：主暴風口噤，金瘡，酒漬服之效。

禹錫等按：《日華子》云：垣衣，冷。又云：地衣，冷，微毒。治卒心痛，中惡。以人垢膩爲丸，服七粒。此是陰濕地被日曬起苔蘚是也，并生油調，傅馬反花瘡甚良。

《圖經》曰：文具海藻條下。

陟釐 音離　味甘，大温，無毒。主心腹大寒，温中消穀，强胃氣，止泄痢。生江南池澤。

陶隱居云：此即南人用作紙者，方家惟合斷下藥用之。

《唐本》注云：此物乃水中苔，今取以爲紙，名苔紙，青黄色，體澀。《小品方》云：水中粗苔也。范東陽方云：水中石上生，如毛，緑色。

《藥對》云：河中側梨。側梨、陟釐，聲相近也。王子年《拾遺》云：張華撰《博物志》上晉武帝，嫌繁，命削之，賜華側理紙萬張。子年云：陟釐紙也，此紙以水苔爲之，溪人語訛，謂之側理也。

今按：《別本》注云：此即石髮也。色類似苔，而粗澀爲異。且水苔性冷，陟釐甘温，明其陟釐與苔全異也。澤中石上名陟釐，浮水中者名苔去。

《圖經》曰：文具海藻條下[39]。

《衍義》曰：陟釐，今人事治音池爲苔脯堪啖，京城市中甚多。然治渴疾，仍須禁食鹽。餘方家亦[41]罕用。

鳧葵　味甘，冷，無毒。主消渴，去熱淋，利小便。生水中，即荇菜也。一名接俞。

《唐本》注云：此物乃水中苔，今有名未用條中載也。

《別本》注云：即荇菜也，生水中。菜似蒓，莖澀，根極長。江南人多食。云是猪蒓，與絲蒓并一種，以春夏細長肥滑爲絲蒓，至冬短爲猪蒓，亦呼爲龜蒓。比與鳧葵殊不相似也。南人搗汁服之，療寒熱也。唐本先附。

禹錫等按[41]：《日華子》云：猪蒓，解蠱毒，毒藥。絲蒓已見蒓條解之。

今按：《唐本》注云：此即石髮也。今據《唐本》注云，有名未用條中，即無鳧葵，猪蒓蓋經《開寶詳定》已删去。

《圖經》曰：鳧葵，即荇菜也。舊不著所出州土，云生水中，今處處池澤皆有之。葉似蒓，莖澀，根甚長，花黄色，水中極繁盛。謹按《爾雅》：荇，謂之接俞，其葉謂之符。郭璞以爲叢生水中，葉圓在莖端，長短隨水之深淺。江東人食之。《詩·周南》所謂參差荇菜是。陸機云：白莖，葉紫赤色，正圓，徑寸餘，浮在水上，根在水底，大如釵股，上青下白，煮其白莖，以苦酒浸脆美，可以按酒。今人不食，醫方亦不用。

女苑　味辛，温，無毒。主風寒洗洗，霍亂泄痢，腸鳴上下無常處，驚癇，寒熱百疾。療肺傷咳逆出汗，久寒在膀胱支滿，飲酒夜食發病。一名白苑，一名織女苑，一名茹音柳。生漢中川谷或山陽。正月、二月採，陰乾。畏鹵

鹹。

陶隱居云：比來醫方都無復用之。市人亦少有，便是欲絶。別復有白苑似紫苑，非此之別名也。

《唐本》注云：白苑即女苑，更無別者，有名未用中浪出一條。無紫苑時亦用之，功效相似也。

禹錫等㊶：今據有名未用中無白苑者，蓋唐修本草時删去耳。

《衍義》曰：女苑，一名白苑。或者謂爲二物，非也。唐删去白苑之條，甚合宜。陶能言，不能指説性狀。餘從《經》中所説甚明，今直取《經》。

王孫　味苦，平，無毒。主五臟邪氣，寒濕痹，四肢疼酸，膝冷痛，療百病，益氣。吴名白功草，楚名王孫，齊名長孫，一名黄昏，一名海孫，一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

陶隱居云：今方家皆呼爲黄昏，又云牡蒙，市人亦少識者。

《唐本》注云：《小品·述本草》牡蒙，一名王孫。《藥對》有牡蒙無王孫。此則一物明矣。又主金瘡，破血㊷，生肌肉，止痛，赤白痢，補虚益氣，除脚腫，發陰陽也。

禹錫等按：《蜀本》注云：葉似及己而大，根長尺餘，皮、肉亦紫色。

今按：《別本》注云：今處處有，生陰濕地，三月、四月採苗、葉，陰乾之。

土馬鬃　治骨熱敗煩，熱毒壅，衄鼻。所在背陰古墻垣上有之，歲多雨則茂盛。世人或便以爲垣衣，非也。

陶隱居云：方藥亦不復用，彼土人時有採識者。

《唐本》注云：此草俗名漆姑。葉似菊，花紫色，子類枸杞子，根如遠志，無心有糝。苗主小兒驚，兼療漆瘡，生毛髮，所在平澤皆有之。

今按：《別本》注云：今處處有，生陰濕地，三月、四月採苗、葉，陰乾之。

菟葵　味甘，寒，無毒。主下諸石五淋，止虎、蛇毒。

《唐本》注云：苗如石龍芮，葉光澤，花白似梅，莖紫色，煮汁極滑，堪啖。《爾雅·釋草》：一名蒉，所在平澤皆有，田間人多識之。

今按：《別本》注云：蛇、虎毒，諸瘡，搗汁飲之，及塗瘡能解毒止痛，六月、七月採莖、葉，暴乾。唐本先附。

禹錫等按：《爾雅》云：蒉，菟葵。注㊸：頗似葵而小，葉狀如藜，有毛，汋啖之，滑蔬。

《圖經》曰：文具第二十八卷冬葵條焉㊹。新定。

蜀羊泉　味苦，微寒，無毒。主頭禿惡瘡，熱氣，疥瘙痂癬蟲，療齲齒，女子陰中内傷，皮間實積。一名羊泉，一名羊飴。生蜀郡山谷。

條下。

《衍義》曰：菟葵，緑葉如黄蜀葵，花似物[46]霜甚雅，形如至小者初開單葉蜀葵。有檀心，色如牡丹姚黄蕊，則蜀葵也。唐·劉夢得還京云：唯菟葵、燕麥，動摇春風者是也。

薤草　味甘，寒，無毒。主暴熱喘息，小兒丹腫。一名斛榮。生水傍。

《唐本》注云：葉圓似澤瀉而小。花青白，亦堪啖。所在有之。

今按：《别本》注云：江南人用蒸魚，食之甚美。五月、六月採莖、葉，暴乾。唐本先附。

鱧腸　味甘、酸，平，無毒。主血痢。針灸瘡發，洪血不可止者，傅之立已。汁塗髮眉，生速而繁。生下濕地。

《唐本》注云：苗似旋復，一名蓮子草，所在坑渠間有之。

今按：《别本》注云：二月、八月採，陰乾。唐本先附。

禹錫等按：蕭炳云：作膏點鼻中，添腦。

《日華子》云：排膿止血，通小腸，長鬚髮，傅一切瘡并蠶瘡。

《圖經》曰：鱧腸，即蓮子草也。舊不載所出州郡，但云生下濕地，今處處有之，南方尤多。此有二種：一種葉似柳而光澤，莖似馬齒莧，高一二尺許，花細而白，其實若小蓮房。蘇恭云：苗似旋覆者是也，一種苗梗枯瘦，頗似蓮花而黄色，實亦作房而圓，南人謂之蓮翹者。二種摘其苗皆有汁出，須臾黑色，故侈[47]作烏髭髮藥用之，俗謂之旱蓮子。三月、八月採，陰乾。亦



州滁

鱧腸

爵床　味鹹，寒，無毒。主腰脊痛，不得著床，俯仰艱難，除熱，可作浴湯。生漢中川谷及田野。

《唐本》注云：此藥似香菜，葉長而大，或如苘且細。生平澤熟田近道傍，甚療血脹下氣。又主杖瘡，汁塗立差。俗名赤眼老母草。

今按：《别本》注云：今人名爲香蘇。

井中苔及萍　大寒。主漆瘡，熱瘡，水腫。井中藍，殺野葛、巴豆諸毒。

陶隱居云：廢井中多生苔、萍，及磚土間生雜草、菜藍，既解毒，在井中者彌佳。不應復別是一種名井中藍。井華水，井底泥至冷，亦療湯火灼瘡。又復煉法用之。

禹錫等按：《蜀本》云：井中苔及萍，味苦。

《日華子》云：無毒。

《圖經》曰：文具海藻條下。

茅香花　味苦，温，無毒。主中惡，温胃止嘔吐，療心腹冷痛。苗、葉可煮作浴湯，辟邪氣，令人身香。生劍南道諸州。其莖、葉黑褐色，花白，即非白茅香也。今附。

禹錫等按：陳藏器云：茅香，味甘，平。生安南，如茅根。

《日華子》云：白茅香花塞鼻洪，傅久不合灸瘡，署刀箭瘡，止血并痛。煎湯止吐血、鼻衄。

《圖經》曰：茅香花，生劍南道諸州，今陝西、河東、京東州郡亦有之。三月生苗，似大麥。五月開白花，亦有結實者，亦有無實者，并黄花者。或有結實者，亦有無實者，并正月、二月採根，五月採花，八月採苗。其莖、葉黑褐色，而花白色者，名白茅香。



茅香花　岢嵐軍　丹州　淄州

《海藥》云：謹按《廣志》云：生廣南山谷，味甘，平，無毒。主兒遍身瘡疱，以桃葉同煮浴之，合諸衣[48]香甚奇，尤勝舶上來者。

《肘後方》：治熱淋。取白茅根四斤剉之，以水一斗五升，煮取五升，令冷，仍暖飲之。日三服。又方：諸竹木刺在肉中不出。取白茅根燒末，脂膏和塗之，亦治因風致腫。

《衍義》曰：茅香，花白，根如茅，但明潔而長，皆可作浴湯，同藁本尤佳。仍入印香中，合香附子用。

馬蘭　味辛，平，無毒。主破宿血，養新血，合金瘡，斷血痢，蠱毒，解酒疸，止鼻衄，吐血及諸菌毒。生搗傅蛇咬。生澤傍，如澤蘭氣臭，《楚辭》以惡草喻惡人。北人見其花呼爲紫菊，以其花似菊而紫也。又山蘭，生山側，似劉寄奴，葉無椏，不對生，花心微黄赤，亦大破[49]，下俚人多用之。見陳藏器及《日華子》。

《圖經》：文具澤蘭條下。

使君子



使君子　味甘，温，無毒。主小兒五疳，小便白濁，殺蟲，療瀉痢。生交、廣等州。形如栀子，棱瓣深而兩頭尖，亦似訶梨勒而輕。俗傳始因潘州郭使君，療小兒多是獨用此物，後來醫家因號爲使君子也。今附。

《圖經》曰：使君子，生交、廣州等，今嶺南州郡皆有之，生山野中及水岸。其葉青，如兩指，頭長二寸。其莖作藤，如手指，三月生花，淡紅色，久乃深紅，有五瓣。七月、八月結子如拇指，長一寸許，大類栀子而有五棱，其殼青黑色，内有人，白色，七月採實。

《衍義》曰：使君子，紫黑色，四棱高，瓣深。今《經》中謂之棱瓣深，似令人難解。秋末冬初，人將入鼎、澧。其人味如椰子肉。《經》不言用人，爲復用皮。今按文味甘即是用肉，然難得人，蓋絶小。今醫家或兼用殼。

乾苔　味鹹，寒。一云温。主痔，殺蟲及霍亂嘔吐不止，煮汁服之。又心腹煩悶者，冷水研如泥，飲之即止。又發諸瘡疥，下一切丹石，殺諸藥毒。不可多食，令人瘕黄少血色，殺木蠹蟲，内木孔中，但是海族之流，皆下丹石。見孟詵、陳藏器、《日華子》。

百脉根　味甘、苦，微寒，無毒。主下氣，止⑤渴去熱，除虚勞，補不足。酒浸，若水煮，圓散兼用之。出肅州、巴西。

《唐本》注云：葉似苜蓿，花黄，根如遠志。二月、八月採根，日乾。唐本先附。

白豆蔻　味辛，大温，無毒。主積冷氣，止吐逆反胃，消穀下氣。出伽古羅國，呼爲多骨。形如芭蕉，葉似杜若，長八九寸，冬夏不凋，花淺黄色，子作朵如葡萄，生青熟白，七月採。張文仲治胃氣冷，喫食即欲得吐。以白豆蔻子三枚，搗篩更研細，好酒一盞，微温調之，併飲三兩盞佳。又有治嘔吐白术等六物湯，亦用白豆蔻，大抵主胃冷，即宜服之。

白豆蔻



作朵如葡萄，其子初出微青，熟則變白，七月採。今附。

《圖經》曰：白豆蔻，出伽古羅國，今廣州、宜州亦有之，不及蕃舶者佳。苗類芭蕉，葉似杜若，長八九尺而光滑，冬夏不凋，花淺黄色，子作朵如葡萄，生青熟白，七月採。張文仲治胃氣冷，喫食即欲得吐。以白豆蔻子三枚，搗篩更研細，好酒一盞，微温調之，併飲三兩盞佳。又有治嘔吐白术等六物湯，亦用白豆蔻，大抵主胃冷，即宜服之。

地笋　温，無毒。利九竅，通血脉，排膿治血，止鼻洪吐血，産後心腹痛，一切血病。肥白人、産婦可作蔬菜食，甚佳。即澤蘭根也。新補。出陳藏器及

《日華子》。

海帶　催生，治婦人及療風。亦可作下水藥。出東海水中石上，比海藻更粗，柔韌而長，今登州人乾之以苴束器物。新定。

陀得花　味甘，温，無毒。主一切風血。浸酒服，生西國，胡人將來，胡人採得花以釀酒，呼爲王勒漿。今附。

剪草



潤州

剪草　凉，無毒。治惡瘡，疥癬，風瘙。根名白藥。新分條。見《日華子》。《圖經》曰：剪草，生潤州。味苦、平，有毒。主諸瘡疥痂瘙蝕，及牛馬諸瘡。二月、三月採，暴乾用。

陳藏器云：剪草，味甚苦，平，無毒。主蟲瘡疥癬。浸酒服之。生山澤間，葉如茗而細，江東用之。

《治勞瘵方》云：婺、台州皆有，惟婺州者可用。狀如茜草，又如細辛。每用一斤，净洗爲末，入生蜜一斤，和爲膏，以器皿盛之，不得犯鐵器，九蒸九曝，日一蒸曝。病人五更起，面東坐，不得語，令匙抄藥，如粥服之，每服四兩，服已，良久服稀粟米飲壓之。藥冷服，粥飲亦不可太熱，或吐或下皆不妨，如久病肺損咯血，只一服愈。尋常咳嗽，血妄行，再服一匙可也。有一貴人，其國封病瘵，其尊人嘗以此方畀之，九日而藥成。前一夕，病者夢人戒令翌日勿亂服藥。次日將服之，爲屋土墜器中，不可服。再合既成，又將服之，爲藉覆器，又不得食。又再合未就，而夫人卒矣。此藥之異如此。若小小血妄行，一啜而愈矣。

一十種陳藏器餘

迭迷香㊶　味辛，温，無毒。主惡氣，令人衣香，燒之去鬼。《魏略》云：出大秦國。《廣志》云：出西海也。

《海藥》云：味平，不治疾，燒之祛鬼氣。合羌活爲丸散，夜燒之，辟蚊蟲。此外別無用矣。

故魚網　主鯁，以網覆鯁者頸差。

故繳脚布　無毒。主天行勞復，如煮汁飲之，骨當下矣。

江中採出蘆　蘆令夫婦和同。用馬駿風黑汗。洗汁飲，帶垢者佳。

虱建草　味苦，無毒。去蟣虱。授取汁沐頭，盡死。人有誤吞虱成病者，搗絞汁，服一小合。亦主諸蟲瘡。之有法。此江中出波蘆也。生山足濕地，莖葉似山丹，微赤，高一二尺。又有水竹葉，如竹葉而短小。生水中，亦云去虱，人取水竹葉生食之。

含生草　主婦人難産，口中含之，

立産。亦咽其汁。葉如卷柏而大。生鞠羯國。其葉，煮之不熱，無毒。

兔肝草　味甘，平，無毒。主金瘡，止血生肉，解丹石發熱。初生葉細軟，似兔肝。一名鷄肝，與蘩蔞同名。

石芒　味甘，平，無毒。主人、畜爲虎、狼等傷，恐毒入肉者。取莖雜葛根，濃煎服之，亦取汁。生高山，如芒，節短。江西人呼爲折草。六月、七月生穗如荻也。

蠶綱草　味辛，平，無毒。主蠶及諸蟲，如蠶類咬人，恐毒入腹，煮汁服之。生搗傅瘡。生濕地，如蓼大，莖赤花白，東土亦有之。

問荆　味苦，平，無毒。主結氣瘤痛上氣，氣急。煮服之。生伊、洛間洲渚，苗似木賊，節節相接，亦名接續草。

---

❶草部中品之下：此下原有藥目，循本書體例删。
❷痛：晦明軒本『痛』下有『愈』字。
❸患内：原作一『心』字，據晦明軒本改。
❹今：原作『金』，據晦明軒本改。
❺兩：晦明軒本作『分』。
❻便：晦明軒本作『使』。
❼草：晦明軒本作『注』。
❽近：原作『迄』，據晦明軒本改。
❾肉：晦明軒本作『外』。
❿三：晦明軒本『三』下有『錢』字。
⓫來：晦明軒本作『平』。
⓬而：晦明軒作『其』。
⓭毒：晦明軒本作『無忌』。
⓮却：晦明軒本作『即』。
⓯末：原作『來』，據晦明軒本改。
⓰蕙：晦明軒本『蕙』下有『根』字。
⓱香：原脱，據晦明軒本補。
⓲休：原作『依』，據晦明軒本改。
⓳粟：晦明軒本作『栗』。
⓴開：晦明軒本作『間』。
㉑草：原脱，據晦明軒本補。
㉒辛：晦明軒本作『甘』。
㉓華：晦明軒本作『葉』。
㉔甘：原脱，據晦明軒本補。
㉕生：晦明軒本作『吐』。
㉖長：晦明軒本『長』上有『莖』字。
㉗頃：原作『須』，據晦明軒本改。
㉘陸機：原作『鄭詩』，據晦明軒本作『肺』。
㉙虚：晦明軒本作『肺』。
㉚袋：原脱，據晦明軒本補。
㉛云：原作『去』，據晦明軒本改。
㉜十：原作『干』，據晦明軒本改。
㉝查：晦明軒本作『滓』。
㉞膽：原作『腸』，據晦明軒本改。
㉟整：晦明軒本作『螫』。
㊱浴：晦明軒本『浴』下有『脚』字。
㊲癰：晦明軒本作『疸』。
㊳寒：晦明軒本作『塞』。
㊴下：此下原有『今按《别本》注云』一節文字，與上文重，今删。
㊻亦：原作『以』，據晦明軒本改。
㊶按：原脱，據晦明軒本補。
㊷等：『等』下疑脱『按』字。
㊸血：原作『而』，據晦明軒本改。
㊹焉：原作『馬』，據晦明軒本改。
㊺注：原脱，據晦明軒本補。
㊻物：晦明軒本作『拗』。
㊼侈：晦明軒本作『多』。
㊽衣：晦明軒本作『名』。
㊾破：晦明軒本『破』下有『血』字。
㊿止：原作『上』，據晦明軒本改。
(51)迭迷香：晦明軒本作『迷迭香』。

圖經衍義本草卷之十六

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部下品之上

附子

梓州



附子　味辛、甘，温、大熱，有大毒。主風寒咳逆，邪氣，温中，金瘡，破癥堅積聚血瘕，寒濕踒烏卧切躄，拘攣膝痛，脚疼冷弱，不能行步，腰脊風寒，心腹冷痛，霍亂轉筋，下利赤白，堅肌骨，强陰。又墮胎，爲百藥長。生犍爲山谷及廣漢。冬月採爲附子，春採爲烏頭。地膽爲之使，惡蜈蚣，畏防風、黑豆、甘草、黄耆、人參、烏韭。八月上旬採，八角者良。凡用，三建皆熱灰微炮令拆，勿過焦，惟薑附湯生用之。俗方每用附子，皆須甘草、人參、生薑相配者，正以制其毒故也。

今按：陳藏器《本草》云：附子醋浸，削如小指，内耳中，去聾。去皮炮令拆，以蜜塗上炙之，令蜜入内，含之，勿咽其汁，主喉痹。

《圖經》曰：文具側子條下。

陳藏器云：附子，無八角，陶强名之。古方多用八角附子，市人所貨，以八角爲名。

雷公云：凡使，先須細認，勿誤用。有烏頭、烏喙、天雄、側子、木鱉子。烏頭少有莖苗，長身烏黑，少有傍尖。烏喙皮上蒼，有如大豆許者，孕八九個，周圍底陷，黑如烏鐵。宜於文武火中，炮令皴拆❶，即劈破用。天雄身全矮，無尖，周匝四面有附，孕十一個，皮蒼色即是天雄。宜炮皴拆後，去皮尖底用。不然，陰制用并得。側子只是附子傍，有小顆附子，如棗核者是，宜生用。治風疹神妙。木鱉子，只是諸喙、附、雄、烏、側中毗樏者，號曰木鱉子，不入藥中用。若服，令人喪目。若附子底平有九角，如鐵色，一個重一兩，即是氣全，堪用。夫修事十兩，於文武火中炮令皴拆者去之，用刀刮上孕子，并去底尖，微細劈破，於屋下午地上掘一坑，可深一尺，安於中一宿，至明取出，焙乾用。夫欲炮者，灰火勿用雜木火，只用柳木最妙。若陰制使，即生去尖皮底了❷，薄切，用東流水并黑豆浸五日夜，然後漉出，於日中曬令乾用。凡使，須陰制去皮尖了，每十兩，用生烏豆五兩，東流水六升。

《聖惠方》：治丁瘡腫甚者。用附子末，醋和塗之，乾即再塗。《千金翼方》同。

《外臺秘要》：治大風冷痰癖，脹滿諸痹等病。用大附子一枚重半兩者，兩枚亦得，炮之酒漬❸，春冬五日，夏秋

三日。服一合，以差爲度。日再服，無所不治。又方：治口噤卒不開。搗附子末内管中，開口吹入喉，差。

《經驗方》：嘔逆翻胃散：大附子一個，生薑一斤，細剉煮研如麵糊，米飲下之。

《經驗後方》：治大人久患口瘡。生附子爲末，醋麵調，男左女右貼脚心，日再換。又方：治熱病，吐下水利，身冷脉微，發躁不止。附子一枚去皮臍，分作八片，入鹽一錢，水二升，煎一升，温服，立效。

《斗門方》：治翻胃。附子一個最大者，坐於磚上，四面着火漸逼碎，入生薑自然汁中，又依前火逼乾，復淬之，約生薑汁可盡半碗許，搗羅爲末。用粟米飲下一錢，不過三服差。又方：治元臟傷冷及開胃。附子炮過，去皮尖，搗羅爲末，以水兩盞，入藥二錢，鹽及棗、薑同煎，取一盞，空心服。大去積冷，暖下元，肥腸益氣，酒食必無所礙。

《簡要濟衆》：治脚氣連腿腫滿，久不差方。黑附子一兩，去皮臍，生用搗爲散，生薑汁調如膏，塗傅腫上。藥乾再調塗之，俟腫消爲度。

孫用和：治大瀉霍亂不止。附子秤重七錢，炮去皮臍，爲末。每服四錢，水兩盞，鹽半錢，煎取一盞，温服立止。

張文仲：療眼暴赤腫，碜痛不得開，又泪出不止。削附子去皮末，如蠶屎，著眦中，以定爲度。

《崔氏方》：療耳聾風，牙關急不得開方。取八角附子一枚，酢漬之三宿令潤，微削一頭内耳中，灸上十四壯，氣通耳中，即差。

《孫兆口訣》云：治陰盛隔陽傷寒，其人必躁熱，而不欲飲水者是也。附子一枚，燒爲炭存性，爲末，蜜水調下爲一服而愈。此逼散寒氣，然後熱氣上行而汗出，乃愈。又方：治頭痛。附子炮，石膏煅，等分爲末，入腦、麝少許。茶、酒下半錢。

《修真秘旨》：治頭風至驗。以附子一個，生去皮臍，用緑豆一合，同入銚子内，煮豆熟爲度。去附子服豆，即立差。每個附子，可煮五服，後爲末服之。

烏頭　州龍　州成　州梓　府寧江　州晉　州邵　**烏頭**



味辛、甘，温、大熱，有大

毒。主中風惡風，洗洗出汗，除寒濕痹，咳逆上氣，破積聚寒熱，消胸上痰冷，食不下，心腹冷疾，臍間痛，肩胛痛，不可俯仰，目中痛，不可久視。又墮胎。其汁煎之，名射罔，殺禽獸。

射罔：味苦，有大毒。療尸疰癰堅，及頭中風痹痛。一名奚毒，一名即子，一名烏喙。禹錫等按：《中蠱通用藥》云：射罔，温，大毒❹。

烏喙音諱：味辛，微温，有大毒。主風濕，丈夫腎濕陰囊癢，寒熱歷節，制引腰痛，不能行步，癰腫膿結。又墮胎。生朗陵山谷，採❺，陰乾。長三寸已上爲天雄。

莽草爲之使，反半夏、栝樓、貝母、白斂、白及、惡藜蘆。

陶隱居云：今採用四月烏頭與附子同根，春時莖初生，有腦形似烏鳥之頭，故謂烏頭。有兩歧，其蒂狀如牛角，名烏喙。喙即烏之口也。亦以八月採，搗笮莖取汁，日煎爲射罔。獵人以傅箭，射禽獸，中人亦死，宜速解之。《唐本》注：烏喙，即異名烏頭也。此物同苗，或有三歧者，然兩歧者少。

陳藏器云：射罔本功外。主瘿瘻，瘡根結核，瘰癧，毒腫及蛇咬。先取藥塗肉四畔，漸漸近瘡，習習逐病至骨。瘡有熟膿及黄水出，塗之；若無膿水，有生血，及新傷肉破，即不可塗，立殺人。亦如殺走獸，塗箭鏃射之，十步倒也。

《日華子》云：土附子，味瘥、辛，熱，有毒。生去皮，搗濾汁澄清，旋❻日乾取膏，名爲射罔。獵人以作毒箭使用，或中者，以甘草、藍青、小豆葉、浮萍，冷水、薺苨，皆可禦也。

文具側子條下。

《圖經》曰：

《聖惠方》：治風，腰脚冷痹疼痛。用川烏頭三分去皮臍，生搗羅，醞醋調塗於故帛上傅之，須臾痛止。又方：用川烏頭七枚，生用搗碎，以水二大盞，煎至一大盞，去滓，温洗之。

《外臺秘要》：治頭風頭痛。臘日烏頭一升，炒令黄，末之，絹袋盛，酒三升浸，温服。

《千金方》：治耳鳴如流水聲，耳癢及風聲，不治久成聾。生烏頭一味，掘得承濕削如棗核大，塞耳。旦易夜易，不過三日愈。又方：治沙虱毒，以射罔傅之佳。

《經驗方》：治一切冷氣，去風痰，定遍身疼痛，益元氣，强精力，固精益髓，令人少病。川烏頭一斤，用五升許大瓷鉢子盛，以童子小便浸，逐日添注任令溢出，浸二七日，其烏頭通軟，揀去爛壞者不用，餘以竹刀切破，每個作四片，却用新汲井水淘七遍後浸之，每日換。七日通前浸二十一日，取出焙乾，其藥潔白，搗羅爲末，酒煮麵糊丸緑豆大。每服十丸，空心鹽湯、酒下，少粥飯壓之。如冷氣稍盛，加丸數服之。

《經驗後方》：治痢獨聖丸：川烏頭一個好者，柴灸❼火燒烟欲盡取出，地上盞子合，良久，細研，用酒蠟丸如大麻子，每服三丸。赤痢用黄連、甘草、黑豆煎湯放冷吞下；如白，用甘草、黑豆煎湯放冷吞下；如瀉及肚痛，水吞下。每於空心服之，忌熱物。

《梅師方》：治蛇虺螫人，以射罔塗螫處，頻易。又方：治婦人血風虚冷，月候不勻，或即脚手心煩熱，或頭面浮虚腫頑麻。川烏頭一斤，清油四兩，鹽四兩，一處鎖❽内熬令裂❽，如桑椹色爲度，去皮臍，五靈脂四兩，合一處爲末，入臼中搗令勻後，蒸餅丸如梧桐子大。空心温酒、鹽湯下二十丸，亦治丈夫風疾。又方：補益元臟，進飲食，壯筋骨。二虎丸：烏頭尖、黄檗等分，爲末，洗釅醋浸三宿，取出切作片子，穿一小孔，以炭火燒令通赤，用好醋三斗❾，同藥傾入熱坑子内，盆合之，經一宿取出，去砂土，用好青鹽四兩，研與前藥同炒，令赤黄色，杵爲末，醋、麵糊丸如梧桐子大。空心冷酒下十五丸，鹽湯亦得，婦人亦宜。

《孫兆口訣》：治陰毒傷寒，手足逆冷，脉息沉細，頭疼腰重，兼治陰毒赤白痢生薑甘草湯下。

《古今録驗》：治癰攻腫，若有瘕

肉突出。烏頭五枚，以苦酒三升，漬三日，洗之，日夜三四度。

《楊氏産乳》：療耳鳴無晝夜。烏頭燒作灰，菖蒲等分爲末，綿裹塞耳中，日再用，效也。唐·李寶臣爲妖人置堇於液中，寶臣飲之即喑，三日死。武后置堇於食，賀蘭氏食之，暴死。

《衍義》曰：烏頭、烏喙、附子、天雄、側子五等，皆一物也。止以大小、長短、似像而名之。後世補虛寒，則須用附子，仍取其端平而圓，大及半兩以上者，其力全不僭。風家即多用天⑩雄，亦取其大者。以其尖角多熱性，不肯就下，故取敷散也。此用烏頭、附子之大略如此。餘三等，則量其材而用之。其炮製之法，經方已著。

天雄　味辛、甘，温，大温，有大毒。主大風，寒濕痹，歷節痛，拘攣緩急，破積聚邪氣，金瘡，强筋骨，輕身健行，療頭面風去來疼痛，心腹結積，關節重，不能行步，除骨間痛，長陰氣，强志，令人武勇力作不倦。又墮胎。



天雄

一名白幕。生少室山谷。二月採根，陰乾。遠志爲之使，惡腐婢。

陶隱居云：今採用八月中旬。天雄似附子，細而長便是。長者乃至三四寸許。此與烏頭、附子三種，本并出建平，故謂之三建。今宜都佷山最好，謂爲西建。錢塘間者謂爲東建，氣力劣弱不相似，故曰西水猶勝東白也。其用灰殺之，時有水强巨兩切者，不佳。

《唐本》注云：天雄、附子、烏頭等，并以蜀道綿州、龍州出者佳。餘處縱有造得者，力弱，都不相似。江南來者，全不堪用。陶以三物俱出建平故名之，非。按《國語》置堇於肉，注云：堇，堇音靳草。郭注云：烏頭苗也。此物本出蜀漢，其本名堇。今訛爲建，遂以建平釋之。又石龍芮葉似堇，故名水堇。今復爲水莨，亦作建音。此豈復生建平耶？檢字書，又無莨字，甄立言《本草音義》亦論之。天雄、附子、側子并皆用。八月採造，其烏頭四月上旬，今云二月採，恐非時也。

禹錫等按：《淮南子》云：天雄，雄鷄志氣益注云，取天雄三枚，内雄鷄腸中，搗生食之，令人勇。

《藥性論》云：天雄，君，忌豉汁，大熱，有大毒。乾薑製，用之能治風痰，冷痹，軟脚，毒風，能止氣喘促急，殺禽蟲毒。

《日華子》云：治一切風，一切氣，助陽道，暖水臟，補腰膝，益精，明目，通九竅，利皮膚，調血脉，四肢不遂，破痃癖癥結，排膿止痛，續骨消瘀血，補冷氣虛損，霍亂轉筋，背脊僂傴，消風痰，下胸膈水，發汗，止陰汗，炮含治喉痹。凡丸散，炮去皮臍用，飲藥即和皮生使，甚佳。可以便驗。又云：天雄，

大長少角刺而虛，烏喙似天雄，而附子大短有角，平穩而實，烏頭次於附子，側子小於烏頭，連聚生者，名爲虎掌，并是天雄一裔，子母之類，氣力乃有殊等，即宿根與嫩者耳。已上并忌豉汁。

《圖經》曰：文具側子條下。

陳藏器云：天雄，身全短無尖，周匝四面有附子，孕十一個，皮蒼色即是。天雄宜炮皴拆後，去皮尖底用之。不然，陰製⓫用，并得。

《別説》云：謹按此數條，説前項備悉。但天雄者始種烏頭傍出也。以小者側子、側子之類。經年獨生長大者是也。蜀人種之忌生。此以爲不利。如養蠶而爲白僵之類。

側子

州峽



側子　味辛，大熱，有大毒。主癰腫，風痹歷節，腰脚疼冷，寒熱，鼠瘻。又墮胎。

陶隱居云：此即附子邊角之大者爲附子。殊無證據。但云附子角小如黍粟，難充於用，故有此⓬説。今據脱取之。昔時不用，比來醫家以療脚氣多驗。凡此三建，俗中乃是同根，而附子邊，果有角大如棗核及檳榔已來者，形狀亦自是一顆，仍不小。則是烏頭傍出附子，附子傍出側子，理亦明矣。陶云：初生形似烏鳥頭，故謂之烏頭，兩歧者如烏鳥口，故名烏喙，細而長，乃至三四寸者爲天雄，根傍如芋散生者名附子，傍連生者名側子，五物同出而異名。苗高二尺許，葉似石龍芮及艾，其花紫赤，其實紫黑。今以龍州、綿州者爲佳。作之法：以生熟湯浸半日，勿令滅氣出。以白灰裹之，數易使乾。又法：以米粥及糟麴等，并不及前法。

《吳氏》云：側子，一名莨。神農、岐伯：有大毒。八月採，陰乾。是附子角之大者，畏惡與附子同。

《藥性論》云：側子，使。能治冷風濕痹，大風筋骨攣急。

《圖經》曰：烏頭、烏喙，生朗陵山谷，天雄，生少室山谷，附子、側子，生

犍爲山谷及廣漢，今并出蜀土。然四品都是一種所産，其種出於龍州。種之法：冬至前，先將肥腴陸田耕五七遍，以猪糞糞之，然後布種，逐月耕耔，至次年八月後方成。其苗高三四尺已來，莖作四棱，葉如艾，花紫碧色，作穗，實小紫黑色，如桑椹。本只種附子，四歲爲烏頭，五歲爲一物，至成熟後有此四物，收時一處造釀方成。釀之法：先於六月内，踏造大、小麥麴，至收採前半月，預先用大麥煮成粥，後將上件麴造醋，候熱淋去糟。其醋不用大酸，酸則以水解之。便將所收附子等去根須，於新潔瓮内淹浸七日，每日攪一遍，日足撈出，以彌疏篩攤之，後向慢風日中曬[13]之百十日，以透乾爲度。若猛日曬，則皺而皮不附肉。其長三二寸者，爲天雄，割削附子傍尖牙角爲側子，附子之絶小者亦名爲側子。元種者，母爲烏頭，其餘大、小皆爲附子，以八角者爲上。如方藥要用，須炮令裂，去皮臍使之。綿州彰明縣多種之，惟赤水一鄉者最佳。然收採時月與《本經》所説不同。蓋今時所種如此。其内地所出者，與此殊别，今亦稀用。謹按《本經》冬採爲附子，春採爲烏頭。而《廣雅》云：奚毒，烏喙，三歲爲荎與側同子[14]，二歲爲烏附子也。一歲爲天雄。今一年種之，便有五物也，豈今人種蒔之法，用力倍至，故爾繁盛也。雖然藥力當緩，於歲久者耳。崔氏治寒疝心腹脅引痛，諸藥不可近者，蜜煎烏頭主之。以烏頭五枚大者，去芒角及皮，四破，以白蜜一斤，煎令透潤，取出焙乾，搗篩，又以熟蜜丸如梧桐子大，冷鹽湯吞二十圓，永除。又法：用煎烏頭蜜汁，以桂枝湯五合解之。飲三合不知，加五合。其知者如醉，以爲中病。《續傳信方》：治陰毒傷寒，煩躁，迷悶不主悟人，急者用大附子一個，可半兩者，立劈作四片，生薑一大塊，立劈作三片，如中指長，糯米一撮，水一鄉者最佳。煎取六合，去滓，如人體温，頓服，厚衣覆之。或汗出，或不出，候心神定，别服水解散，太白通關散之類。不得與冷水，如渴，更將滓煎與吃。今人多用有效，故詳著之。

陳藏器云：側子，冷酒調服，治遍身風疹。

雷公云：側子，只是附子傍有小顆。附子，如棗核者是，宜生用。治風疹神妙也。木鱉子，只是諸喙附雄烏側中毗楖者，號曰木鱉子，不入藥用。若服之，令人喪目。

半夏　州齊



味辛，平，生微寒、熟温，有毒。主傷寒寒熱，心下堅，下氣，咽喉腫痛，頭眩，胸脹咳逆，腸鳴，止汗，消心腹胸膈痰熱滿結，咳嗽上氣，心下急痛堅痞，時氣嘔逆，消癰，墮胎，療痿黄，悦澤面目。生令人吐，熟令人下。用之湯洗令滑盡。一名守田，一名地文，一名水玉，一名示姑。生槐里川谷。五月、八月採根，暴乾。射干爲之

使，惡皂莢，畏雄黄、生薑、乾薑、秦皮、龜甲，反烏頭。

陶隱居云：槐里屬扶風，今第一出青州，吴中亦有。以肉白者爲佳，不厭陳久，用之皆先湯洗十許過，令滑盡，不爾，戟人咽喉。方中有半夏，必須生薑者，亦以制其毒故也。

《唐本》注云：半夏，所在皆有，生平澤中者，名羊眼半夏，圓白爲勝，然江南者大，乃徑寸，南人特重之，頃來互用，功狀殊異。問南人，説苗乃是由跋，陶注云：虎掌極似半夏，注：由跋乃説鳶尾，於此注中似説由跋，二事混淆，陶終不識。

禹錫等按：《蜀本》云：熟可以下痰。又《圖經》云：苗一莖，莖端三葉，有二根相重，上小下大，五月採則虚小，八月採則實大。採得當以灰裛二日，湯洗暴乾之。

《藥性論》云：半夏，使，忌羊血、海藻、飴糖，柴胡爲之使，有大毒。湯淋十遍去涎方盡，其毒以生薑等分制而用之。能消痰涎，開胃健脾，止嘔吐，去胸中痰滿，下肺⑮氣，主咳結。新生，磨塗癰腫不消，能除瘤癭氣。虚如有痰氣，加而用之。

《日華子》云：味癈、辛。治吐食反胃，霍亂轉筋，腸腹冷，痰瘧。

《圖經》曰：半夏，生槐里川谷，今在處有之，以齊州者爲佳。二月生苗一莖，莖端出三葉，淺緑色，頗似竹葉而光，江南者葉似芍藥葉。根下相重生，上大下小，皮黄肉白。五月、八月内採根，以灰裛二日，湯洗暴乾。一云五月採者虚小，八月採者實大。然以圓白，陳久者爲佳。其平澤生者甚小，名羊眼半夏。又由跋絶類半夏，而苗高近一二尺許，根如鷄卵大，多生林下，或云即虎掌之小者，足以相亂。半夏主胃冷嘔噦，方藥之最要。張仲景治反胃嘔吐，大半夏湯：半夏三升，人參三兩，白蜜一升，以水一斗二升和，揚之二百四十遍，煮取三升半，温服一升，日再。亦治膈間支飲。又主嘔吐，穀不得下，眩悸。半夏加茯苓湯：半夏一升，生薑半斤，茯苓三兩，切，以水七升，煎取一升，温服之。又主心下悸。半夏麻黄圓：二物等分，末，蜜丸，大如小豆。每服三丸，日三服。其餘主寒厥赤丸，四逆嘔吐。附子粳米湯及傷寒方：用半夏一升，洗去滑，焙乾，搗末，小麥麵一升，合和，以水溲令熟，和如彈丸，以水煮令麵熟則藥成。初吞四五枚，日二，稍稍增至十五枚，旋煮旋服，覺疾減，欲更重合亦佳。禁食餳與羊肉。

雷公云：凡使，勿誤用傍籛子，真似半夏，只是咬著微酸，不入藥用。若修事，半夏四兩，白芥子末二兩，頭醋六兩，二味攪令濁，將半夏投於中，洗三遍用之。半夏上有隙涎，若洗不净，令人氣逆，肝氣怒滿。

《聖惠方》：治時氣，嘔逆不下食。用半夏半兩，浸洗七遍去滑，生薑一兩同剉碎，以水一大盞，煎至六分去滓，分二服，不計時候温服。又方：治蝎瘻五孔皆通。半夏一分爲末，以水調傅之。

《經驗後方》：正胃。半夏二兩，

天南星二兩，右以爲末，用水五升，入鐺子内，與藥攪匀，浸一宿，去清水，焙乾，重研令細。每服水二盞，藥末二錢，薑三片，同煎至六分，温服，至五服效。

《斗門方》：治胸膈壅滯，去痰開胃。用半夏净洗焙乾，搗羅爲末，以生薑自然汁和爲餅子，用濕紙裹，於慢火煨令香熟。水兩盞，用餅子一塊如彈丸大，入鹽半錢，煎取一盞，温服。能去胸膈壅逆，大壓痰毒及治酒食所傷，其功極驗。

《簡要濟衆》：治久積冷，不下食，嘔吐不止，冷在胃中。半夏五兩，洗過爲末，每服三錢，白麵一兩，以水和搜，切作棋子，水煮麵熟爲度。用生薑、醋和調服之。

《古今録驗》：治喉痹。半夏末方寸匕，鷄子一枚頭開竅子，去内黄白，盛淳苦酒令小滿，内半夏末著中，攪和鷄子内，以鐶子坐之，於炭上煎，藥成置杯中，稍暖咽之。

錢相公《箧中方》：治蝎螫人，取半夏以水研塗之，立止。

《梅[16]師方》：治傷寒病惋不止。薑一兩碎之，半夏湯洗，與大棗各三十枚，水一升，瓷瓶中慢火燒爲熟水，時時呷，數日已。

《子母秘録》：治小兒腹脹。半夏半夏熟洗乾末之，生薑湯服一錢匕

《唐本》注云：此藥是由跋宿者。其苗一莖，莖頭一葉，枝丫音鴉陜古協切莖。根大者如拳，小者如鷄卵，都似扁柿，四畔有圓牙，看如虎掌，故有此名。其由跋是新根，猶大於半夏二三倍，但四畔無子牙爾。陶云：虎掌似半夏，即由來以由跋爲半夏，釋由跋苗，全説鳶尾南人至今猶用由跋爲半夏也。

禹錫等按：《蜀本圖經》曰：其莖端有八九葉，花生莖間。根周圍有牙，然若獸掌也。

《吴氏》云：虎掌，神農、雷公：苦，無毒。岐伯、桐君：辛，有毒。立秋，九月採。

《藥性論》云：虎掌，使，味甘。不入湯服，能治風眩目轉，主疝瘕腸痛，主傷寒時疾，强陰。

《圖經》曰：虎掌，生漢中山谷及冤句，今河北州郡亦有之。初生根如豆大，漸長大似半夏而扁，累年者，其根圓如寸，大者如鷄卵。周回生圓牙二三枚，或五六枚。三四月生苗，高尺餘。獨莖上有葉如爪，五六出分布，尖而圓。一窠生七八莖，時出一莖作穗，直上如鼠尾。中生一葉如匙，裹莖作房，傍開一口，上下尖。中有花，微青褐色。結實如麻子大，熟即白色，自落一莖，莖端直八九葉，根圓扁而肉白湯入器中，漬五七日，湯冷乃易。日換三四遍，洗去涎，暴乾用之。或再火炮。今冀州人菜園中種之，亦呼爲天南星。江州有一種草，葉大如掌，面青背紫，四畔有芽如虎掌，生三五葉如一本，冬青，治心痛寒熱積氣，不結花實，與此名同，故附見之。

由跋　主毒腫結熱。

陶隱居云：本出始興，今都下亦種之。狀如烏翼而布地，花紫色，根似附子。苦酒磨塗腫，亦效。不入餘藥。

《唐本》注云：由跋根，尋陶所注，乃是鳶尾根，即鳶頭也。由跋，今南人以爲半夏，頓爾乖越，非惟不識半夏，亦不知由跋與鳶尾。

今按：陳藏器《本草》云：半夏高三⑲尺，生澤中熟地，根如小指，正員，所謂羊眼半夏也。由跋苗高一二尺，似苣蒻，根如鷄卵，生林下，所謂由跋也。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：春抽一莖，莖端直八九葉，根圓扁而肉白也。

《圖經》曰：文具半夏條下。

鳶尾　味苦，平，有毒，主蠱毒邪氣，鬼疰諸毒，破癥瘕積聚，大水，下三蟲，療頭眩，殺鬼魅。一名烏園。生九疑山谷。五月采。

陶隱居云：方家云是射干苗，無鳶尾之名。主療亦異，當別一種物。方亦有用鳶頭者，即應是其根，療體相似，而本草不顯之。

《唐本》注云：此草葉似射干而闊短，不抽長莖，花紫碧色。根似高良薑，皮黄肉白，有小毒。嚼之戟人咽喉，與射干全別。人家亦種，所在有之。射干花紅，抽莖長，根黄有臼。今陶云由跋，正説鳶尾根莖。

禹錫等按：《蜀本》云：此草名鳶

尾，根名鳶頭，亦謂之鳶根。又《圖經》：葉似射干，布地生。黑根似高良薑而節大，數個相連。今所在皆有。九月、十月採根，日乾。

陳藏器云：鳶尾，主飛尸，游蠱著喉中，氣欲絶者。以根削去皮，内喉中，摩病處，令血出爲佳。

大黄

蜀州



大黄將軍　味苦，寒、大寒，無毒。主下瘀血，血閉，寒熱，破癥瘕痕積聚，留飲宿食，蕩滌腸胃，推陳致新，通利水穀，調中化食，安和五臟，平胃下氣，除痰實，腸間結熱，心腹脹滿，女子寒血閉脹，小腹⑳諸老血留結。一名黄良。二月、八月採根，生河西山谷及隴西。一名火乾。得芍藥、黄芩、牡蠣、細辛、茯苓療驚恚怒，心下悸氣。得消石、紫石英、桃人療女子血閉

四月開黃花，亦有青紅似蕎麥花者。莖青紫色，形如竹。二月、八月採根，去黑皮，火乾。江淮出者曰土大黃，一月開黃花，結細實。又鼎州出一種羊蹄大黃，療疥瘙又甚效。初生苗葉如羊蹄，累年長大，即葉似商陸而狹尖。四月内於押條上出穗，五七莖相合，花葉同色。結實如蕎麥而輕小，五月熟即黃色，亦呼爲金蕎麥。三月採苗，五月收實，并陰乾。九月採根，破之亦有錦文，日乾之。亦呼爲土大黃。凡收大黃之法，蘇恭云：作時燒石使熱，横寸截，著石上熁之，一日微燥，乃繩穿眼之至乾。今土大黃，往往作横片，曾經火爆。蜀大黃乃作緊片如牛舌形，謂之牛舌大黃。二者用之皆等。《本經》稱大黃推陳致新，其效最神。故古方下積滯多用之。張仲景治傷寒，用處尤多。又有三物備急圓，司空裴秀爲散，用療心腹諸疾，卒暴百病。其方須精好者，用大黃、乾薑、巴豆各一兩，須精好者，搗篩，蜜和，更搗一千杵，圓如小豆，服三圓，老小斟量之。爲散不及圓也。若中惡客忤，心腹脹，卒痛如錐刀刺痛，氣急口噤，停尸卒死者，以暖水若酒服之。若不下，捧頭起灌令下喉，須臾差。未知，更與三丸，腹當鳴轉，即盡，當下冷膿及惡物等，病即差止。古人用藥毒攻病，必隨人之虚實而處置，非一切而用也。姚僧垣初仕梁，武帝之，藥入喉即差。崔知悌療小兒無辜閃癖，癥癖，或頭乾黃聳，或乍痢乍差，因發熱欲服大黃。僧垣曰：大黃乃是快藥，至尊年高，不可輕用。帝勿㉕從，諸狀多者，皆大黃無差理。元帝常有心腹疾，諸醫咸錦文新實者，若微朽㉓即不中用，削去幾至委頓。蒼皮乃秤，搗篩爲散。以上好米醋三謂宜用平藥，可漸宣通。僧垣曰：脉升和之，置銅碗中，於大鐺中浮湯上，洪而實，此有宿妨，非用大黃無差理。帝從而遂愈。以此言之，今醫用一毒炭火煮之，火不用猛，又以竹木篦攪藥，候任丸乃停，於小瓷器中貯。兒年藥而攻衆病，以偶中病，便謂此方之神三歲一服七圓，如梧桐子，日再服，常㉔奇；其差誤，乃不言用藥之失，如此者以下青赤膿爲度。若不下膿，或下膿衆矣，可不戒哉？少者，稍加圓。下膿若多者圓又須減。

《唐本》注云：葉似蓖麻，根如大芋，傍生細根如牛蒡。《圖經》云：高病重者或至七八劑方盡根本。大人、六七尺，莖脆味酸，醒酒。小兒，以意量之。此藥惟下膿宿結，不令兒利。須禁食毒物，食乳者乳母亦同忌法。

雷公云：凡使，細剉，内文如水旋斑緊重，剉蒸，從巳至未，曬乾，又灑臘水蒸，從未至亥。如此蒸七度。曬乾，炒令酥，盡入藥中，切不得令黃焦則無力，搗篩爲末，每日空腹以水大三合，卻灑薄蜜水再蒸一伏時，其大黃擘如烏膏樣。於日中曬乾用之爲妙。

《聖惠方》：治時氣發豌豆瘡。用川大黃半兩微炒，以水一大盞煎至七分，去滓，分爲二服。又方：熱病狂語及諸黃。用川大黃五兩剉炒微赤，搗爲散，用臘月雪水五升煎如膏，每服不計時候，冷水調下半匙。

《外臺秘要》：療癖方。大黃十兩，杵篩，醋三升，和勻，白蜜兩匙煎，堪丸如梧桐子大。一服三十圓，生薑湯吞下，以利爲度，小者減之。

《千金方》：治產後惡血衝心，或胎衣不下，腹中血塊等。用錦紋大黃一兩，杵羅爲末，用頭醋半升同熬成膏，圓如梧桐子大。患者用溫醋七分盞化五圓，服之，良久下。亦治馬墜內損。

《千金翼》：治婦人血癖痛。大黃三兩搗篩，以酒二升，煮十沸，頓服。

《經驗後方》：治風熱疏積熱風壅，消食，化氣導血，大解壅滯。大黃四兩，牽牛子四兩，半生半熟，爲末，煉蜜圓如梧桐子大，每服茶下一十圓，如要微動，吃十五圓。冬月中最宜服，并不搜攪人。

《梅師方》：治卒外腎偏腫疼痛。大黃末醋和塗之，乾即易之。

《斗門方》：治腰痛。用大黃半兩，更入生薑半兩，同切如小豆大，於鐺內炒令黃色，投水兩碗，至五更初頓服，天明取下。腰間惡血物用盆器盛如鷄肝樣，即止。

《簡要濟衆》：治吐血。川大黃一兩，搗羅爲散。每服一錢，以生地黃汁一合，水半盞，煎三五沸，無時服。

《廣利方》：治骨節熱，積漸黃瘦。大黃四分，以童子小便五大合，煎取四合，去滓，空心分爲二服，如人行四五里再服。

《傷寒類要》：療急黃病。大黃粗切二兩，水三升半，漬一宿，平旦煎絞汁二升半，內芒消二兩絞服，須臾當快利。

姚和衆：治小兒腦熱常閉目。大黃一分粗㉖剉，以水三合浸一宿，一歲兒每日與半合，服餘者塗頂上，乾即再塗。

《別說》云：謹按大黃收時，皆以火燒石煿乾。欲速貨賣，更無生者，用之不須更多炮炙，少蒸煮之類也。

《衍義》曰：大黃，損益前書已具。仲景治心氣不足，吐血、衄血。瀉心湯用大黃、黃芩、黃連。或曰：心氣不足，則不當須吐衄也。此乃邪熱，因不足以客之，故吐衄。以苦泄其熱，就以若補其心，蓋兩全之。有是證者用之無不效。量虛實用之。

葶藶　味辛、苦，寒、大寒，無毒。主癥瘕積聚結氣，飲食寒熱，破堅逐邪，通利水道，下膀胱水，伏留熱氣，皮間邪水上出，面目浮腫，身暴中風熱痱音沸癢，利小腹。久服令人虛。一名丁歷，一名葶音典蒿，一名大室，一名大適。生藁城平澤及田野。立夏後採實，陰乾。得酒良。榆皮爲之使，惡僵蠶、石龍芮。

陶隱居云：出彭城者最勝，今近㉘道亦有。母則公薺，子細黃至苦，用之

葶藶

成德軍



丹州



曹州



當熬。

今按：此藥亦療肺壅上氣咳嗽，定喘促，除胸中痰飲。

禹錫等按：《蜀本》云：苗似薺花黄，角生子黄細。五月熟，採子暴乾。

《藥性論》云：葶藶，臣，味酸，有小毒。能利小便，抽肺氣上喘息急，止嗽。

《爾雅》云：蕐，葶藶。注：實、葉皆似芥，一名狗薺。

《日華子》云：利小腸，通水氣虚腫。

《圖經》曰：葶藶，生藁城平澤及田野，今京東、陝西、河北州郡皆有之，曹州者本㉙勝。初春生苗葉，六七寸，有似薺。根白，枝莖俱青。三月開花，微黄。結角，子偏㉚小如黍米微長，黄色。立夏後採實，暴乾。《月令》：孟夏之月，靡草死。許慎、鄭康成注皆云：靡草，薺、葶藶之屬是也。至夏則枯死，故比時採之。張仲景治肺癰，喘不得卧，葶藶大棗瀉肺湯主之。葶藶炒黄色，搗末爲圓，大如彈子。每服用大棗二十枚，水三升，煎取一升，頓服之。支後内一彈丸更煎，取二升，然飲不得息亦主之。《崔知悌方》：療上氣嗽，長引氣不得卧，或遍體氣腫，或單面腫，或足腫，并主之。葶藶子三升，微火熬，搗篩爲散，以清酒五升漬之，冬七日，夏三日。初服如桃許大，日三夜一，冬日二夜二。量其氣力，取微利一二爲度。如患急困者，不得待日滿，亦可以綿細絞。即服其葶藶單莖向上，葉端出角，角粗且短。又有一種荷芥草，葉近根下作奇，生角細長。取時必須分別前件二種也。又《簽中方》治嗽含膏丸：曹州葶藶子一兩，紙襯熬令黑，知母一兩，貝母一兩，三物同搗篩，以棗肉半兩，别銷沙糖一兩半，同入藥中和爲丸，大如彈㉛丸。每服以新綿裹一丸，含之徐徐咽津，甚者不過三丸。今醫亦多用。

雷公云：凡使，勿用赤鬚子，真相似葶藶子，只是味微甘苦。葶藶子入項苦。凡使，以糯米相合，於焙上，微焙，待米熟，去米，單搗用。

《聖惠方》：治上氣喘急，遍身浮腫。用甜葶藶一升，隔紙炒令紫色，搗令極細，用生絹袋盛，以清酒五升浸三日後，每服抄一匙，用粥飲調下，日三四服。

《外臺秘要》：治食飲不得息。葶藶子三兩，熬令黄，搗爲末，以水三升煮，大棗三十枚，得汁一升内藥中。每服如棗大，煎取七合，頓服。

《千金方》：治腹脹積聚癥瘕。葶

蘘子一升熬㉜，以酒五升浸七日，日服三合。

《千金翼》：治頭風。搗葶藶子，以湯淋取汁洗頭止㉝。

《經驗方》：河東裴氏傳經效，治水腫及暴腫。葶藶三兩，杵六千下，令如泥。即下漢防己末四兩，取緑頭鴨就臼中截頭瀝血於臼中，血盡，和鴨頭更搗五千下，圓如梧桐子。甚者，空腹白湯下十圓，稍可五圓，頻服，五日止。此藥利小便，有效如神。

《梅師方》：治遍身腫浮，小便澀。葶藶子二兩，大棗二十枚，以水一大升，煎取一小升，去棗，内葶藶於棗汁煎丸如梧桐子，飲下十圓。又方：治肺壅氣喘急不得卧。葶藶子三兩炒，大棗三十枚，水三升煮棗，取二升，又煎取一升去滓，併二服。

《簡要濟衆》：治小兒水氣腹腫，兼下痢膿血，小便澀。葶藶子半兩，微㉞炒搗如泥，以棗肉和搗爲圓如緑豆大。每服五圓，棗湯下，空心、晚下㉟量兒大小，加減服之。

《續十全方》：治一切毒，入腹不可療及馬汗。用葶藶子一兩炒研，以水一升浸湯服，取下惡血。

《崔氏》：治水氣。葶藶三兩，以物盛，甑上蒸令熟，即搗萬杵，若圓得如梧桐子，不須蜜和。一服五圓，漸加至七圓，以得微利即佳。不可多服，令人不甚美食。若氣發，服之，得利，氣下定即停。此方治水氣無比。蕭駙馬患水腫，惟服此得差。

《傷寒類要》：治腎痺唇乾，以葶藶主之。

《子母秘録》：治小兒白禿。葶藶搗末，以湯洗訖塗上。

姚和衆：治孩兒蛔蟲。葶藶子一分，生爲末用，以水三合，煎取一合，一日服盡。

《聖惠》：又方：治支飲久不差，大腹水腫，喘促不止。用甜葶藶三兩，隔紙炒令紫色，搗如膏。每服圓如彈子大，以水一中盞，入棗四枚，煎至五分去滓，非時服。

《衍義》曰：葶藶，用子。子之味有甜、苦兩等，其形則一也。然既言味辛、苦，即甜者不復更入藥也。大概治體皆以行水走泄爲用，故曰久服令人虚。蓋取苦泄之義，其理甚明。《藥性論》所説盡矣，但不當言味酸。

桔梗

州和　州成　州解



主胸脅痛如刀刺，腹滿腸鳴幽幽，驚恐悸氣，利五臟腸胃，補血氣，除寒熱風痹，温中消穀，療喉咽痛，下蠱毒。一名房圖，一名白藥，一名梗

草，一名薺苨。生嵩高山谷及冤句。二月㊱採根，暴乾。節皮爲之使。得牡蠣、遠志，療恚怒。得消石、石膏，療傷寒。畏白及、龍眼、龍膽。

陶隱居云：近道處處有，葉名隱忍。二三月生，可煮食之。桔梗療蠱毒甚驗，俗方用此，乃名薺苨。今別有薺苨，能解藥毒，所謂亂人參者便是。非此桔梗，而葉甚相似。但薺苨葉下光明、滑澤、無毛爲異，葉生又不如人參相對者爾。

《唐本》注云：人參，苗似五加闊短，莖圓，有三四椏，椏頭有五葉。陶引薺苨亂人參，謬矣。且薺苨、桔梗，又有葉差互者，亦有葉三四對者，皆一莖直上，葉既相亂，惟以根有心、無心爲別爾。

禹錫等按：《藥性論》云：桔梗，臣，味苦，平，無毒。能治㊲下痢，破血，去積氣，消積聚痰涎，主肺氣氣促嗽逆，除腹中冷痛，主中惡及小兒驚癇。

《日華子》云：下一切氣，止霍亂轉筋，心腹脹痛，補五勞，養氣，除邪辟瘟，補虛，消痰破癥瘕，養血排膿，補内漏及喉痹，癒毒。以白粥解之。

《圖經》曰：桔梗，生嵩高山谷及冤句，今在處有之。根如小指大，黄白色。春生苗，莖高尺餘。葉似杏葉而長橢，四葉相對而生，嫩時亦可煮食之。夏開花紫碧色，頗似牽牛子也，秋後結子。八月採根，細剉暴乾用。葉名隱忍。其根有心，無心者乃薺苨也。用桔梗二兩去蘆頭剉，以水三大盞，煎至一盞，去滓，不計時分温三服。又方：妊娠中惡，心腹疼痛。用桔梗一兩細剉，水一中盞，入生薑三片，煎至六分去滓，非時温服。

《外臺秘要》：治卒客忤停尸不能言者。燒桔梗一兩，末，米飲服，仍吞麝香如豆大許，佳。

《千金方》：治喉閉并毒氣。桔梗二兩，水三升，煮取一升，頓服。又方：鼻衄方。桔梗爲末，水服方寸匕，日四五，亦止吐下血。

《百一方》：若被打擊，瘀血在腸内，久不消，時發動者。取桔梗末，熟水下刀圭。

《經驗後方》：治骨曹風，牙疼腫。桔梗爲末，棗穰和圓如皂子大，綿裹咬之。腫則荆芥湯漱之。

《簡要濟衆》：治痰嗽不定喘急。桔梗一兩半，搗羅爲散，用童子小便半升，煎取四合，去滓温服。

《子母秘録》：治小兒卒客忤死。燒桔梗，末三錢匕，飲服。

杜壬：治上焦有熱，口舌咽中生瘡，嗽有膿血。桔梗一兩，甘草二兩，右爲末，每服二錢，水一盞，煎六分去滓，温服，食後細呷之，亦治肺壅。

《梅師方》：治卒蠱毒，下血如鵝肝，晝夜不絶，臟腑敗壞。桔梗搗汁，服七合佳。

《衍義》曰：桔梗，治肺熱氣奔促、嗽逆，肺癰排膿。陶隱居云：俗方用此，乃名薺苨。今別[39]薺苨，所謂亂人參者便是，非此桔梗也。《唐本》注云：陶引薺苨亂人參，謬矣。今詳之非也。隱居所言，其意止以根言之，所以言亂人參。《唐本》注却以苗難之，乃本注誤矣。

莨菪

莨音浪　菪音蕩子　味苦、甘，寒，有毒。主齒痛出蟲，肉痹拘急，使人健行，見鬼，療癲狂風癎，顛倒拘攣。多服輕身，走及奔馬，强志益力，通神。生海濱川谷及雍州。五月採子。



秦州

禹錫等按：《蜀本圖經》云：葉似王不留行、菘藍等。莖、葉有細毛，花白，子殼作罌子形，實扁細，若粟米許，青黄色。所在皆有。六月、七月採子，日乾。

《藥性論》云：莨菪亦可單用，味苦、辛，微熱，有大毒。生能瀉人見鬼，拾針狂亂。熟炒止冷瀉，主齒痛，蚘牙孔。子，咬之蟲出。石灰清煮一伏時，掬出，去牙暴乾，以附子、乾薑、陳橘皮、桂心、厚朴爲圓，去一切冷氣，積年氣痢，甚温暖。熱發用緑豆汁解之。焦炒碾細末，治下部脱肛。

《日華子》云：温，有毒。甘草、升麻、犀角并能解之。燒熏蚘牙及洗陰汗。

《圖經》曰：莨菪子，生海濱川谷及雍州，今處處有之。苗莖高二三尺許。葉似地黄、王不留行、紅藍等，而三指闊。四月開花，紫色。苗、莢、莖有白毛。五月結實，有殼作罌子狀，如小石榴。房中子至細，青白如米粒。一名天仙子。五月採子，陰乾。謹按

《本經》云：莨菪性寒，後人多云大熱。而《史記·淳於意傳》云：淄川王美人懷子而不乳，意飲以莨菪藥一撮，以酒飲之，旋乳。且不乳豈熱藥所治？又古方主㊶卒癲狂又㊷多單用莨菪，不知果性寒邪？《小品》載治癲狂方云：取莨菪三升作末，酒一升漬數日，出搗之，以向汁和絞去滓，湯上煎令可圓服，如小豆三圓，日三。當覺口面急，頭中有蟲行，額及足手有赤色處，如此便是差候。未知再服，取盡神良。又《簽中方》主腸風，莨菪煎：取莨菪實一升，治之。暴乾搗篩，生薑半斤取汁，二物相和，銀鍋中更以無灰酒二升投之，上火煎令如稠餳，即旋投酒，度用酒可及五升以來，即止煎。令可圓如梧子。每旦酒飲通下三圓，增至五七圓止。若圓時粘手，則菟絲粉襯隔。煎熬切戒火緊，則藥易焦而失力矣。初服微熱，勿怪。疾甚者，服過三日，當下利。疾去，利亦止。絶有效。

雷公云：凡使，勿令使蒼冥子，其形相似，只是服無效，時人多用雜之。其蒼冥子，色微赤，若修事十兩，以頭醋一鎰，煮盡醋爲度。別用黄牛乳汁浸一宿，至明看牛乳汁㊸黑，即是莨菪子，大毒。曬乾別搗重篩用。勿誤服，衝人心大煩悶，眼生暹火。

《別説》云：謹按：莨菪之功，未見如所説，而其毒有甚，煮一二日而牙絞汁服。亦暴乾爲末，小便中服。如方生，用者宜審之。



草蒿

味苦，寒，無毒。主㊹疥瘙痂痒惡瘡，殺虱，留熱在骨節間，明目。一名青蒿，一名方潰。生華陰川澤。

陶隱居云：處處有之。即今青蒿，人亦取雜香菜食之。

《唐本》注云：此蒿生挼傅金瘡，止疼痛，良也。

今按：陳藏器《本草》云：草蒿主㊺連，婦人血氣，腹内滿及大止血生肉，止疼痛，良也。

今按：陳藏器《本草》云：草蒿主鬼氣尸疰復㊺連，婦人血氣，腹内滿及冷熱久痢。秋冬用子，春夏用苗，并搗絞汁服。亦暴乾爲末，小便中服。如覺冷，用酒煮。又燒爲灰，紙八九重淋取汁，和石灰去息肉、黶子。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：葉似茵蔯蒿而背不白，高四尺許。四月、五月採苗，日乾。江東人呼爲犳蒿，爲其臭似犳，北人呼爲青蒿。

《爾雅》云：蒿，菣。釋曰：蒿一名菣。《詩·小雅》云：食野之蒿。陸機云：青蒿也。荆、豫之間，汝南、汝陰皆云菣。孫炎云：荆楚之間謂蒿爲菣。郭云：今人呼青蒿香中炙啖者爲菣是也。

《日華子》云：青蒿，補中益氣，輕身補虚，駐顔色，長毛髮，髮黑不老，兼去蒜髮，心痛，熱黄。生搗汁服并傅之，瀉痢。飯飲調末五錢匕，燒灰和石

灰煎，治惡毒瘡并莖亦用。又云：子味甘，冷，無毒。明目，開胃。炒用治勞，壯健人。小便浸之治惡瘡疥癬風疹，殺虱煎洗。又云：臭蒿子，涼，無毒。治勞，下氣開胃，止盜汗及邪氣鬼毒。又名草蒿。

《圖經》曰：草蒿，即青蒿也。生華陰川澤，今處處有之。春生苗，葉極細嫩，時人亦取雜諸香菜食之。至夏高三五尺。秋後開細淡黃花，花下便結子，如粟米大，八九月間採子，陰乾。根、莖、子、葉并入藥用，乾者炙作飲香尤佳。青蒿亦名方潰。凡使子勿使葉，使根勿使莖，四者若同，反以成疾。得童子小便浸之，良。治骨蒸熱勞爲最。古方多單用者。葛氏治金刃所傷。取青蒿搗傅上，以帛裹創血止即愈。崔元亮《海上方》：療骨蒸鬼氣。取童子小便五大斗澄過，青蒿五斗，八月採，帶子者最好，細剉，二物相和，內好大釜中，以猛火煎，取三大斗去滓，淨洗令乾，再瀉汁安釜中，以微火煎，可取二大斗，即取猪膽十枚相和，煎一大斗半，除火待冷，以新瓷器盛。每欲服時，取甘草二三兩熟炙，搗末，以煎和搗一千杵爲圓，空腹粥飲下二十圓止。

雷公云：凡使，惟中爲妙，到膝即仰，到腰即俯。使子勿使葉，使根勿使莖，四件若同使，翻然成痼疾。採得葉不計多少，用七歲兒七個溺浸七日七夜後，漉出，曬乾用之。

《食療》云：青蒿，寒。益氣長髮，能輕身補中，不老明目，煞風毒。搗傅瘡上，止血生肉。最早，春便生，色白者是。自然香醋淹爲菹，益人。治骨蒸，以小便漬一兩宿，乾，末爲圓，甚去熱勞。又，鬼氣，取子爲末，酒服之方寸匕，差。燒灰淋汁，和石灰煎，治惡瘡瘢癜鼈。

《百一方》：治蜂螫人。嚼青蒿傅瘡上，即差。

《斗門方》：治丈夫勞瘦。青蒿細剉，水三升，童子小便五升同煎，取一升半去滓，入器中煎成膏，圓如梧桐子大，空心，臨卧以温酒吞下二十圓。

《衍義》曰：草蒿，今青蒿也。在處有之，得春最早，人剔以爲蔬，根赤葉香。今人謂之青蒿，亦有所別也。但一類之中，又取其青色者。陝西、綏、銀之間有青蒿。在蒿叢之間，時有一兩窠，迥然青色，土人謂之爲香蒿。莖、葉與常蒿一同，但常蒿色淡青，此蒿色深青，故氣芬芳。恐古人所用以深青者爲勝，不然，諸蒿何嘗不青。

旋覆花



州隨

味鹹、甘，温、微冷利，有小毒。主結氣脅下滿，驚悸，除水，去五臟間寒熱，補中下氣，消胸上痰結，唾如膠漆，心脅痰水，膀胱留飲，風氣濕痹，皮間死肉，目中眵音嗤瞲音蔑，利大腸，通血脉，益色澤。一名戴椹，一名金沸草，一名盛椹。其根主風濕。五月採花，日乾，二十日

成。

陶隱居云：出近道下濕地，似菊花而大。又別有旋葍根，出河南，來北國亦有，形似芎藭，惟合旋葍膏用之，餘無所入，非此覆花根也。

《唐本》注云：旋覆根在中品。陶云：苗似薑，根似高良薑而細，此是山薑。證不是旋覆根。今復道從北國來，似芎藭，芎藭與高良薑全無仿佛爾。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：旋覆花，葉似水蘇，花黄如菊。今所在皆有，六月至九月採花。

《藥性論》云：旋覆花，使，味甘，無毒。主肋脅氣下，寒熱水腫，主治膀胱宿水，去逐大腹，開胃，止嘔逆不下食。

《爾雅》云：蕄，盜庚。注：旋葍。似菊。疏：復，一名盜庚也。

蕭炳云：旋覆用花，葍旋用根。

《日華子》云：無毒。明目，治頭風，通血脉。葉止金瘡血。

《圖經》曰：旋覆花，生平澤川谷，今所在有之。一二月已後生苗，多近水傍，大如紅藍而無刺，長一二尺已來，葉似柳，莖細。六月開花似菊花，銅錢大，深黄色。上黨田野人呼爲金錢花，七月、八月採花。暴乾，二十日成。今近都人家園圃所蒔金錢花，花、葉并如上説，極易繁盛，恐即旋覆也。張仲景治傷寒汗下後，心下痞堅，噫氣不除，有七物旋覆代赭湯；雜治婦人，有三物旋覆湯。胡洽有除痰飲在兩脅脹滿等疾，旋覆花圓用之者尤多也。

雷公云：凡採得後，去裏花蕊殼皮并蒂子，取花蕊蒸，從巳至午，曬乾用。

《外臺秘要》：《救急》續斷筋法：取旋覆花草根浄洗土搗，量瘡大小傅之。日一二易，以差爲度。又方：破斫筋斷者。以旋覆根搗汁瀝瘡中，仍用滓封瘡上，十五日，即斷筋便續。此方出蘇景仲家獠奴用，效。

《經驗後方》：治中風及壅滯。以旋覆花洗塵令浄，搗末，煉蜜圓如梧桐子大。夜卧以茶湯下五圓至七圓、十圓。

《梅師方》：治金瘡止血，搗旋覆花苗傅瘡即止。

《衍義》曰：旋覆花，葉如大菊，又如艾蒿。七八月有花，大如梧桐子，花淡黄緑，繁茂，圓而覆下，亦一異也。其香過如菊，行痰水，去頭目風。其味甘、苦、辛，亦走散之藥也。其旋花，四月、五月有花，别一種，非此花也。第八卷已具之。

圖經衍義本草卷之十六

❶拆：晦明軒本作『坼』。下仿此。
❷了：原作『子』，據晦明軒本改。
❸漬：原作『清』，據晦明軒本改。
❹毒：晦明軒本作『熱』。
❺採：晦明軒本作『正月二月採』。
❻旋：晦明軒本『旋』下有『添』字。
❼灸：晦明軒本作『灰』。
❽裂：原作『烈』，據晦明軒本改。
❾斗：晦明軒本作『升』。
❿天：原作『大』，據晦明軒本改。
⓫製：原作『刺』，據晦明軒本改。
⓬此：原作『比』，據晦明軒本改。

⑬曬：原作『麗』，據晦明軒本改。
⑭子：原與上『同』字誤倒，據晦明軒本乙正。
⑰肺：原作『脚』，據晦明軒本改。
⑯梅：晦明軒本作『深』。
⑰每：晦明軒本『每』下有『五兩』二字。
⑱虛：晦明軒本作『靈』。
⑲三：晦明軒本作『一二』。
㊴腹：晦明軒本『腹』下有『痛』字。
㉛毒：晦明軒本作『黃』。
㉒也易：晦明軒本作『乾乃』。
㉘朽：原作『柏』，據晦明軒本改。
㉞常：晦明軒本作『當』。
㊲勿：晦明軒本作『弗』。
㊴粗：原作『廢』，據晦明軒本改。
㉘湯：晦明軒本『湯』下有『何也』二字。
㉘近：原作『迫』，據晦明軒本改。
㊴本：晦明軒本作『尤』。
㊴偏：晦明軒本作『扁』。
㉛彈：原作『脾』，據晦明軒本改。
㉜熬：原作『然』，據晦明軒本改。
㊴止：晦明軒本作『上』。
㉞微：原作『徵』，據晦明軒本改。
㊲下：晦明軒本作『後』。
㊴二月：晦明軒本作『二八月』。
㊲治：原脱，據晦明軒本補。
㊳黃：晦明軒本作『苗』，連下讀。
㊴別：晦明軒本『別』下有『有』字。
㊵吸：晦明軒本作『泣』。
㊶主：原作『王』，據晦明軒本改。
㊷又：晦明軒本作『亦』。
㊷浸一宿，至明看牛乳汁：此九字原脱，據晦明軒本補。
㊹主：原作『王』，據晦明軒本改。
㊺復：晦明軒本作『伏』。

圖經衍義本草卷之十七

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部下品之上❶

藜蘆

州解





味辛、苦，寒、微寒，有毒。主蠱毒，咳逆，泄痢腸澼，頭瘍疥瘙惡瘡，殺諸蠱毒，去死肌，療噦逆，喉痹不通，鼻中息肉，馬刀爛瘡。不入湯。一

名葱苒，一名葱茭音毯，一名山葱。生太山山谷。三月採根，陰乾。黄連爲之使，反細辛、芍藥、五參，惡大黄。

陶隱居云：近道處處有，根下極似葱而多毛。用之止剔取根，微炙之。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：葉似鬱金、秦膠、蘘荷等，根若龍膽，莖下多毛。夏生冬凋枯。今所在山谷皆有。八月採根，陰乾。

《吴氏》云：藜蘆，一名葱葵，一名豐蘆，一名蕙葵。神農、雷公：辛，有毒。岐伯：鹹，有毒。季氏：大毒，大寒。扁鵲：苦，有毒。大葉，根小相連。

《范子》曰：藜蘆出河東，黄白者善。

《藥性論》云：藜蘆，能主上氣，去積年膿血，泄瀉，惡風瘡疥癬頭禿，殺蟲。

《圖經》曰：藜蘆，生太山山谷，今陝西、山南東西州郡皆有之。三月採苗。葉青，似初出棕心，又似車前。莖似葱白，青紫色，高五六寸，有黑皮裹莖，似棕皮。根似馬腸根，長四五寸許，黄白色。二月、三月採根，陰乾。有此二種：一種水藜蘆，莖葉大同，是生在近水溪澗石上，根鬚百餘莖，不中入藥用；今用者名葱白藜蘆，根鬚甚少，只是三❷二十莖，生高山者爲佳。均州土俗亦呼爲鹿葱。此藥大吐上膈風痰，暗風癲病，小兒齘齗，用錢匕一字，則惡吐人。又用通頂令人噦，而古今本草云療嘔逆，其效未詳。今萱草亦謂之鹿葱，其類全別。

雷公云：凡採去頭，用糯米泔汁煮，從巳至未，出，曬乾用。

《聖惠方》：治黑痣生於身面上。用藜蘆灰五兩，水一大碗，淋灰汁於銅器中盛，以重湯煮令如黑膏，以針微撥破痣處點之，不過三遍，神驗。

《千金翼》：治牙痛。内藜蘆末於牙孔中，勿咽汁，神驗。

《經驗後方》：治中風不語，喉中如拽鋸聲，口中涎沫。取藜蘆一分，天南星一個，去浮皮，却❸臍子上陷一個坑子，内入陳醋二橡斗子，四面用火逼令黄色，同一處搗，再研極細，用生麵爲圓如赤豆大。每服三圓，温酒下。

《百一方》：治黄疸。取藜蘆著灰中炮之，小變色搗爲末。水服半錢匕，小吐，不過數服。

《斗門方》：治疥癬。用藜蘆細搗爲末，以生油和傅之。

《簡要濟衆》：治中風不省人事，牙關緊急者。藜蘆一兩去蘆頭，濃煎防風湯浴過，焙乾碎切，炒微褐色，搗爲末。每服半錢，温水調下，以吐風涎爲效。如人行三里未吐，再服。

《衍義》曰：藜蘆，爲末，油❹調，治瘡，乳痓，中惡風，咳逆上氣，水腫，殺鬼疰蠱毒，破癥積，除脚膝痹痛，四肢拘攣，惡瘡疥蟲，殺鳥獸。一名野葛。

鈎吻　味辛，温，有大毒。主金折之青烟出者名固活。甚熱，不入湯。生傅音附高山谷及會稽東野。半夏爲之使，惡黄芩。

陶隱居云：五符中亦云鉤吻是野葛。言其入口則鉤人喉吻。或言：吻作挽字，牽挽人腸而絶之。蘡胡革切事而言，乃是兩物。野葛是根，狀如牡丹，所生處亦有毒，飛鳥不得集之，今人用含膏服之無嫌。鉤吻別是一草，葉似黄精而莖紫，當心抽花，黄色，初生既極類黄精，故以爲殺生之對也。或云鉤吻是毛茛，此本及後説參錯不同，未詳云何？又有一物名陰命，赤色，著木懸其子，生山海中，最有大毒，入口能立殺人。

《唐本》注云：野葛生桂州以南，村墟間巷間皆有。彼人通名鉤吻，亦謂苗名鉤吻，根名野葛，蔓生。人或誤食其葉者皆致死，而羊食其葉大肥，物有相伏如此。若巴豆，鼠食則肥也。陶云：飛鳥不得集之，妄矣。其野葛，以時新採者，皮白骨黄。宿根似地骨，嫩根如漢防己，皮節斷者良。正與白花藤根相類，不深別者，頗亦惑之。其新取者，折之無塵氣。經年已後則有塵起，根骨似枸杞，有細孔者。人折之則塵氣從孔中出，今折枸杞根亦然。經言折之青烟起者名固活爲良，此亦不達之言也。且黄精真如生龍膽，澤漆兩葉或四五葉相對，鉤吻蔓生，葉如柿葉。《博物志》云：鉤吻葉似鳧葵，并非黄精之類。毛茛是有毛，石龍芮何干❺鉤吻？

禹錫等按：《蜀本》秦鉤吻，主喉痹，咽中塞，身❻變，咳逆，葉❼温中。一名野葛者，亦如徐長卿、赤箭、鬼箭等，并一名鬼督郵。自謹按：鉤吻，一名除辛。生寒石山。二月、八月採。是一物。今鉤吻一名野葛，則野葛自有一種，明矣。且藥有名同而體異者極多，非獨此也。據陶注云：鉤吻葉似黄精而莖紫，當心抽花，黄色者是。蘇云：野葛出桂州，葉似柿葉，人食即死。冷水發其毒也。彼人以野葛飼人，勿與冷水。至肥大，以冷水飲之，至死懸尸於樹，汁滴地生菌子，收之名菌藥，烈於野葛。胡蔓葉細長光潤。

雷公云：凡使，勿用地精，苗莖與鉤吻同。其鉤吻治人身上惡瘡毒，效。其地精煞人，採得後，細剉搗了，研絞取自然汁入膏中，勿誤餌之。

《黄帝問天老》曰：天地所生，豈有食之死者乎？天老曰：太陰之精，名曰鉤吻，不可食之，入口即死。

《博物志》云：鉤吻，毒。桂心、葱葉涕解之。

農：辛。雷公：有毒，殺人。生南越山或益州。葉如葛，赤莖，大如箭，根黄，正月採。

《葛洪方》云：鉤吻與食芹相似，而生處無他草。其莖有毛，誤食之殺人。

《嶺表録異》

俗呼爲胡蔓草，誤食之。

陳藏器云：人食其葉，飲冷水即死。冷水發其毒也。彼人以野葛飼人，勿與冷水。至肥大，以冷水飲之，至死懸尸於樹，汁滴地生菌子，收之名菌藥，烈於野葛。胡蔓葉細長光潤。

雷公云：凡使，勿用地精，苗莖與鉤吻同。其鉤吻治人身上惡瘡毒，效。其地精煞人，採得後，細剉搗了，研絞取自然汁入膏中，勿誤餌之。

《黄帝問天老》曰：天地所生，豈有食之死者乎？天老曰：太陰之精，名曰鉤吻，不可食之，入口即死。

《博物志》云：鉤吻，毒。桂心、葱葉涕解之。



射干

射音夜**干**　味苦，平、微温，有毒。主咳逆上氣，喉痹咽痛，不得消息，散結氣，腹中邪逆，食飲大熱，療老血在心脾間，咳唾，言語氣臭，散胸中熱氣。久服令人虚。一名烏扇，一名烏吹，一名烏翣，一名草薑。生南陽川谷田野。三月三日採根，陰乾。

《唐本》注云：射干，此説者，是其鳶尾葉都似射干，而花紫碧色，不抽高莖，根似高良薑，根即鳶頭。陶説由跋都論此爾。

禹錫等按：《蜀本》云：射干，微寒。

《圖經》云：高二三尺。花黄實黑，根多鬚，皮黄黑，肉黄赤。今所在皆有。二月、八月採根，去皮，日乾用之。

陳藏器云：射干、鳶尾，按此二物相似，人多不分。射干，總有三物。佛經云：夜干貂儵，此是惡獸，似青黄狗，食人。郭云能緣木。又阮公詩云：夜干臨層城。此即是樹。今之射干殊高大者，本草射干，即人間所種爲花卉，亦名鳳翼，葉如鳥翅，秋生紅花，赤點。鳶尾亦人間多種，苗低下於射干，如鳶尾，春夏生紫碧花者是也。又注云：據此猶錯，夜干花黄，根亦黄色。

《藥性論》云：射干，使，有小毒。能治喉閉，水漿不入，能通女人月閉，治疰氣，消瘀血。

《日華子》云：消痰，破癥結，胸膈滿，腹脹，氣喘，痃癖，開胃下食，消腫毒，鎮肝明目。根❽亦有形似高良薑大小，赤黄色淡硬，五六七八月採。

《圖經》曰：射干，生南陽山谷田野，今在處有之，人家庭砌間亦多種植。春生苗，高二三尺。葉似蠻薑，而狹長横張，如翅羽狀，故一名烏翣，謂其葉耳。葉中抽莖，似萱草而强硬。六月開花，黄紅色，瓣上有細文。秋結實作房，中子黑色。根多鬚，皮黄黑，肉黄赤。三月三日採根，陰乾。陶隱居云：療毒腫方多作夜干。今射干❾作夜音。又云：別有射干，相似而花白莖長，似射人之執竿者。故阮公詩云：射干臨層城是也。此不入藥用。

蘇恭：射干，此説是鳶尾，葉都似射干，而花紫碧色，不抽高莖，根似高良薑而肉白，根即鳶頭也。又按《荀子》云：西方有木焉，名曰射干。莖長四寸，生於高山之上，而臨百仞之淵，其莖非能長也，所立者然。楊葆注云：當是草，而云木，誤也。今觀射干之形，其莖梗疏長，正似長竿狀，得名由此耳。而陶以夜音爲疑，且古字音呼固多相通，若漢官僕射主，射而亦音夜，非有別義也。又射干多生山崖之間，其莖雖細小，亦類木梗。故《荀子》名木，而蘇謂陶説爲鳶尾。鳶尾花亦不白，其白者自是射干之一類，非鳶尾

也。鳶尾布地而生，葉扁闊於射干。蘇云：花紫碧色，根如高良薑者是也。《本經》云：生九嶷⑩山谷，今在處有，大類蠻薑也。五月採。一云：九月、十⑪月採根，日乾。

雷公云：凡使，先以米泔水浸一宿漉出，然後用篁竹葉煮，從午至亥，漉出，日乾用之。

《外臺秘要》：治喉痹。射干一片，含汁差。

《肘後方》：治小兒疝發時，腫痛如刺。用生射干汁取下，亦可圓服之。

《衍義》曰：射干，此乃《荀子》所說：西方之木，名曰射干者也。注復引《本草》曰：不合以射干爲木。殊不知五行止於水、火、木、金、土而言之。故儒者以草、木皆木也，金、鉛皆金，糞、土皆土也，灰、火皆火也，水、池皆水。由是言之，即非佛經所說火宅喻之獸，及阮公所云臨層城者之木。況《本經》亦曰一名草薑，故知是草無疑。今治肺氣、喉痹爲佳。《日華子》曰：大小似高良薑，赤黃色。此乃得之。

蛇合

興州



蛇合合是含字　味苦，微寒，無毒。主驚癇，寒熱邪氣，除熱，金瘡疽痔，鼠瘻惡瘡頭瘍，療心腹邪氣，腹痛濕痹，養胎，利小兒。一名蛇銜。生益州山谷。八月採，陰乾。

陶隱居云：即是蛇銜。蛇銜有兩種，并生石上，當用細葉黃花者，處處有之。亦生黃土地，不必皆生石上也。

《唐本》注云：合字乃是含字。陶見誤本，宜改爲含。含、銜義同，見古本草也。

今按：陳藏器《本草》云：蛇銜，主蛇咬。種之，亦令⑫無蛇。今以草內蛇口中，縱傷人，亦不能有毒矣。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：生石上及下濕地。花黃白，人家亦種之，五月採苗，生用。

《藥性論》云：蛇銜，臣，有毒。能治丹疹，治小兒寒熱。

《日華子》云：蛇含，能治蛇蟲、蜂虿所傷，及眼赤，止血，煽風疹，癰腫。莖、葉俱用。又名威蛇。

《圖經》曰：蛇含，生益州山谷，今近道亦有之。生土石上，或下濕地。蜀中人家亦種之。一莖五葉或七葉。此有兩種，當用細葉黃色花者爲佳。八月採根，陰乾。《古今録驗方》治赤疹者，由冷濕搏於肌中，甚即爲熱，乃成赤疹。用蛇含草，搗令極爛，傅之差。赤古今諸丹毒瘡腫方通用之。又下有女青條云：蛇銜根也，生朱崖。陶隱居、蘇恭皆以爲若是蛇銜根，不應獨生朱崖。或云是雀瓢，即蘿摩之別名。或云二物同名，以相類故也。醫家鮮用，亦稀識別，故但附著於此。

雷公云：凡使，勿用有蘗尖葉者，號竟命草，其味別空，只酸澀，不入用。若誤服之，吐血不止，速服知時子解之。採得後，去根、莖，只取葉，細切曬

乾，勿令犯火。

《肘後方》：治金瘡。亦搗傅之，佳。又方：治蜈蚣螫人，蛇含草挼傅之。

《斗門方》：治産後瀉痢。用小龍牙根一握，濃煎服之，甚效。蛇含是也。

《抱朴子》云：蛇銜膏，連已斷之指。

晉《異苑》云：有田父見一蛇被傷，又見蛇銜一草著其瘡上。經日，傷蛇乃去，田父因取其草以治瘡，皆驗。遂名曰蛇銜草。

常山　味苦、辛，寒、微寒，有毒。主傷寒寒熱，熱發，温瘧鬼毒，胸中痰結，吐逆，療鬼蠱往來，水脹，灑灑惡寒，鼠瘻。一名互草。生益州川谷及漢中。八月採根，陰乾。畏玉札。細實者，呼爲雄鷄骨常山，用最勝。

陶隱居云：出宜都、建平。細實黄者，呼爲雄鷄骨常山，用最勝。

《唐本》注云：常山，葉似茗狹長，莖圓，兩葉相當。三月生白花，青萼。五月結實，青圓，三子爲房。生山谷間。高者不過三四尺。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：樹高三四尺，根似荆根，黄色而破，今出金州、房州、梁州，五月、六月採葉，名蜀漆也。

《藥性論》云：常山忌葱，味苦，有小毒。治諸瘧，吐痰涎，去寒熱。用小麥、竹葉三味合煮，小兒甚良。主瘧、灑灑寒熱不可進多，令人大吐，治項下瘤癭。

蕭炳云：得甘草，吐瘧。

《日華子》：忌菘菜。

《圖經》曰：文具蜀漆條下。

雷公云：凡使，春使莖、葉，夏秋冬一時，用使酒浸一宿，至明漉出，日乾，熬搗，少用，勿令老人、久病服之，切忌也。

《外臺秘要》：治瘧。常山三兩，以漿水三升浸經一宿，煎取一升，欲發前頓服，然後微吐。

《肘後方》：治瘧病。常山三兩搗末，以鷄子白和圓如梧桐子，空心三十圓。

《衍義》曰：常山，蜀漆根也。亦治瘧吐痰，如鷄骨者佳。

州明　州明　州海



蜀漆　味辛，平、微温，有毒。主瘧及咳逆寒熱，腹中癥堅，痞結，積聚，邪氣，蠱毒，鬼疰，療胸中邪氣，吐出之。生江林山川谷及蜀漢中。常山苗

也。五月採葉，陰乾。梧樓爲之使，惡貫衆。

陶隱居云：是常山苗，而所出又異者，江林山即益州江陽山名，故是同處爾。彼人採仍縈結作圓，得時燥者佳。

《唐本》注云：此草，日乾微萎，則把束使燥，色青白，堪用。若陰乾，便黑爛鬱壞矣。陶云作圓。此乃梌餅，非蜀漆也。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：五月採，日乾之。

《藥性論》云：蜀漆，使，畏棗吾，味苦，有小毒。常山苗也。能主治瘴、鬼瘧多時不差，去寒熱瘧，治温瘧寒熱，不可多進，令人吐逆。主堅癥，下肥氣，積聚。

蕭炳云：桔梗爲使。

《日華子》云：蜀漆治癥瘕瘕瘕。又名雞尿草、鴨尿草。李含光云：是常山莖也。八九月採。

《圖經》曰：蜀漆，生江林山川谷及蜀漢，常山苗也。常山生益州山谷及漢中，蜀漆根也。江林山即益州江陽山名，是同處耳。今京西、淮、浙、湖南州郡亦有之。葉似茗而葉⑬長，兩兩相當，莖圓有節。三月生紅花，青萼。五月結實，青圓，三子爲房。苗高者不過三四尺，根似荆，黄色。而海州出者，葉似桃⑭葉，八月有花，紅白色，子碧，似山楝子而小。五月採葉，八月採根，陰乾。此二⑮味爲治瘧之最要。張仲景蜀漆散：用蜀漆、雲母、龍骨等分，搗末，患者至發前，以漿水和半錢服之。温瘧加蜀漆半分，臨發時服一錢匕。今天台山出一種草，名土常山，苗葉極甘，人用爲飲香，其味如蜜，又名蜜香草，性亦凉，飲之益人，非此常山也。

雷公云：凡採得後，和根、苗。臨用時即去根，取莖并葉，同拌，甘草四兩，細剉用，拌水令濕同蒸。臨時去甘草，取蜀漆五兩，細剉，又拌甘草水匀，又蒸了任用，勿食木笋。

《衍義》曰：蜀漆，常山苗也。治瘧，多吐人。其他亦未見所長。此草也，慮歲久，人或別有異論，故預云。餘如《經》。

江寧府

甘遂



甘遂

味苦、甘，寒、大寒，有毒。

主大腹疝瘕腹滿，面目浮腫，留飲音癖宿食，破癥堅積聚，利水穀道，下五水，散膀胱留熱，皮中痞，熱氣腫滿。一名甘藁，一名陵藁，一名凌澤，一名主田。生中山川谷。二月採根，陰乾。瓜蒂爲之使，惡遠志，反甘草。

陶隱居云：中山在代郡。先第一本出太山，江東比來用京口者，大不相似。赤皮者勝，白皮者都下亦有，名草甘遂，殊惡，蓋謂贋音雁僞之草，非言草石之草也。

《唐本》注云：所謂草甘遂者，乃蚤休也，療體全別。真甘遂苗似澤漆

草，甘遂苗一莖，莖端六七葉，如蓖麻、鬼臼葉。生食一升亦不能利，大療癰疽蛇毒。且真甘遂皆以皮赤肉白，作連珠，實重者良。亦無皮白者，皮白乃是蚤休，俗名重臺也。

禹錫等按：《藥性論》云：京甘遂，味苦，能瀉十二種水腫，能治心腹堅滿，下水，去痰水，主皮肌浮腫。

《日華子》云：京西者上，汴、滄、吳者次，形似和皮甘草，節節切之。

《圖經》曰：甘遂生中山川谷，今陝西、江東亦有之，或云京西出者最佳，汴、滄、吳者爲次。苗似澤漆，莖短小而葉有汁，根皮赤肉白，作連珠。又有一種草甘似和皮甘草。二月採根，節切之，陰乾。以實重者爲佳。又有一種草甘遂，苗一莖，莖端六七葉，如蓖麻、鬼臼葉。用之殊惡，生食一升，亦不能下。唐注云：草甘遂即蚤休也。蚤休自有條。古方亦單用下水。《小品》療妊娠小腹滿，大小便不利，氣急，已服豬苓散[16]不差者，以甘遂散下之。太山赤皮甘遂二兩，和圓如大豆粒，多覺心下煩，得微下者，日一服之。下後還將豬苓散，不得下，日再服，漸加可至半錢匕，以微下爲度，中間將散也。豬苓散見豬苓條。

雷公云：凡採得後去莖，於槐砧上細剉，用生甘草湯、小薺苨自然汁，二味攪浸三日，其水如墨汁，更漉出，用東流水淘六七次，令水清爲度。漉出，於土器中熬令脆而用之。

《肘後方》：治卒腫滿，身面皆洪大。甘遂一分粉之，豬腎一枚分爲七臠，入甘遂於中，以火炙之令熟，一一[17]食至四五，當覺腹脅鳴，小便利。

《唐本》注云：此根似天門冬，一株下有十許根，皮赤黑，肉白，如芍藥，殊不似白芷。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：蔓生，枝端有五葉，今所在有之。

《藥性論》云：白斂，使，殺火毒，主癰腫亦效。

《衍義》曰：甘遂，甘，平、微寒，無毒。然《經》中不言。此藥專於行水，攻決爲用，入藥須斟酌。

白斂

味苦、甘，平、微寒，無毒。

主癰腫疽瘡，散結氣，止痛，除熱，目中赤，小兒驚癇，温瘧，女子陰中腫痛，下赤白，殺火毒。

一名白根，一名菟核，一名白草，一名崑崙。生幾[18]山山谷。二月、八月採根，暴乾。代赭爲之使[16]。

陶隱居云：近道處處有之。作藤生，根如白芷，破片以竹穿之，日乾。生取根搗，傅癰腫亦效。

《唐本》注云：此根似天門冬，一株下有十許根，皮赤黑，肉白，如芍藥，殊不似白芷。能主氣壅腫。

州滁



癮，腸風痔瘻，刀箭瘡，撲損，温熱瘧疾，血痢，湯火瘡，生肌止痛。

《圖經》曰：白斂，生衡山山谷，今江淮州郡及荆、襄、懷、孟、商、齊諸州皆有之。二月生苗，多在林中作蔓，赤莖，葉如小桑。五月開花，七月結實。根如鷄鴨卵，三五枚同窠，皮赤黑，肉白。二月、八月採根，破片暴乾。今醫治風，金瘡及面藥方多用之。濠州有一種赤斂，功用與白斂同，花實亦相類，但表裏俱赤耳。

《聖惠方》：治丁瘡，以水調白斂末傅瘡上。

《外臺秘要》：《備急》治火湯灼爛，用白斂末傅之。

《肘後方》：治發背，白斂末傅并良。

《衍義》曰：白斂、白及，古今服餌方少有用者，多見於斂瘡方中。二物多相須而行。

青葙子　味苦，微寒，無毒。主邪氣，皮膚中熱，風瘙身癢，殺三蟲，惡瘡疥虱，虛[20]蝕，下部蜃瘡。子名草決明，療唇口青。一名草蒿，一名萋蒿。生平谷道傍。三月採莖葉，陰乾。五月、六月採子。

陶隱居云：處處有。似麥柵花，其子甚細。後又有草蒿，《别本》亦作草藁。今生[21]主療殊相類，形名又相似極多，足爲疑，而實兩種也。

《唐本》注云：此草，苗高尺[22]許，葉細軟，花紫白色，實作角，子黑而扁光，似莧實而大，生下濕地，四月、五月採。荆、襄人名爲崑崙草。搗汁單服，大療温瘧甘蠱。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：葉細軟長，亦爲蔓。今所在下濕地有。



《藥性論》云：青葙子，一名草藁，味苦，平，無毒。能治肝臟熱毒衝眼，赤障青盲翳腫，主惡瘡疥瘙，治下部蟲蜃瘡。

《日華子》云：治五臟邪氣，益腦髓，明耳目，鎮肝，堅筋骨，去風寒濕痹，苗止金瘡血。

《圖經》曰：青葙子，生平谷道傍，今江淮州郡近道亦有之。二月内生青苗，長三四尺。葉闊似柳細軟，莖似蒿，青紅色。六月、七月内生花，上紅下白。子黑光而扁，有似萇菩。根似蒿根而白，直下獨莖生根。六月、八月採子。又有一種花黄，名陶珠術，苗亦相似，恐不堪用之。

雷公云：凡用，勿使思蒿子并鼠細[23]子，其二件真似青葙子，只是味不同。其思蒿子味距[24]，煎之有涎。凡用採。荆、襄人名爲崑崙草。搗汁單搗用之。

《廣利方》：治鼻衄血出不止。以青葙子汁三合，灌鼻中。

《三國志》云：《魏略》：初平中有青牛先生，常服青葙子，年如五六十者，人或識之，謂其已百歲有餘耳。

《衍義》曰：青葙子，《經》中并不言治眼，《藥性論》始言之。能治肝臟熱毒衝眼、赤障、青盲。蕭炳亦云理眼。《日華子》云益腦髓、明耳目，鎮肝。今人多用之治眼，殊不與《經》意相當。

藿音桓**菌**音郡　味鹹、甘，平、微温，有小毒。主心痛，温中，去長蟲白瘕音癖蟯音饒蟲，螯毒㉕毒，癰瘕，諸蟲，疽蝸，去蛔蟲、寸白，惡瘡。一名藿盧。生東海池澤及渤海章武。八月採，陰乾。得酒良，畏鷄子。

陶隱居云：出北來，此亦無有。形狀似菌，云鸛屎所化生，一名鸛菌。單末之，猪肉臛和食，可以遣蛔蟲。

《唐本》注云：藿菌，今出渤海蘆葦澤中鹹鹵地，自然有此菌爾，亦非是鸛屎所化生也。輕虚，表裏相似，與衆菌不同。療蛔蟲有效。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：今出滄州。秋雨以時即有，天旱及霖即稀。日乾者良。

《藥性論》云：藿菌，味苦。能除腹内冷痛，治白禿。

《食療》云：菌子，發五臟風，壅經絡，動痔病，昏多睡，背膊、四肢無力。又，菌子有數般，槐樹上生者良。野田中者，恐有毒，殺人。又，多發冷氣。

《外臺秘要》：治蛔蟲攻心如刺，吐清汁。藿蘆一兩揭末，羊肉臛和之，日一頓服佳。

《金匱玉函》云：菌仰卷及赤色，不可食。木耳青色及仰生者，不可食。


興州

白及

陶隱居云：近道處處有之。葉似杜若，根形似菱米，節間有毛。方用亦稀，可以作糊。

《唐本》注云：此物，山野人患手足皸音軍拆，嚼以塗之有效。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：葉似初生栟音并櫚音閭棕也及藜蘆。莖端生一臺，四月開生紫花。七月實熟，黄黑色，冬凋。根似菱，三角，白色，角頭生牙。今出申州。二月、八月採根用。

《吴氏》云：大寒。雷公：辛，無毒。

《藥性論》云：神農：苦。黄帝：辛。季氏：大寒。雷公：辛，無毒。

莖葉如生薑、藜蘆，十月華，直上，紫赤，根白連，二月、八月、九月採。

《藥性論》云：白及，使。能治結熱不消，主陰下痿，治面上黑疱，令人肌滑。

《日華子》云：味苦、辛，平、微寒，無毒。主癰腫惡瘡敗疽，傷陰死肌，胃中邪氣，賊風鬼擊，痱音肥緩不收，除白癜疥蟲。一名連及草。生北山川谷，又冤句及越山。紫石英爲之使，惡理石，畏李核、杏人。

《圖經》曰：白及，生北山川谷，又冤句及越山，今江淮、河、陝、漢、黔諸

州皆有之，生石山上。春生苗，長一尺許。似栟櫚及藜蘆，莖端生一臺，葉兩指大，青色。夏花開紫。七月結實，至熟黃黑色。至冬而葉凋。根似菱米，有三角，白色，角端生牙。二月、七月採根。今醫治金瘡及癰疽方中多用。

《經驗方》：治鼻衄不止甚者。白及爲末，津調塗山根上，立止。

大戟　味苦、甘，寒、大寒，有小毒。主蠱毒，十二水，腹滿急痛積聚，中風皮膚疼痛，吐逆，頸腋癰腫，頭痛，發汗，利大小腸。一名邛鉅。生常山。十二月採根，陰乾。反甘草。

陶隱居云：近道處處皆有，至猥賤也。

禹錫等按：《唐本》注云：畏菖蒲、蘆草、鼠屎。《蜀本圖經》云：苗似甘遂高大，葉有白汁，花黃。根似細苦參，皮黃黑，肉黃白。五月採苗，二月、八月採根用。

《爾雅》：蕎，邛鉅。注云：今本草大戟也。

大戟

河中府



信州



滁州



并州



《藥性論》云：大戟，使，反芫花、海藻，毒用菖蒲解之。味苦、辛，有大毒。破新陳，下惡血癖塊，腹內雷鳴，通月水，善治瘀血，能墮胎孕。

《日華子》云：小豆爲之使，惡署預。瀉毒藥，泄天行黃病溫瘧，破癥結。

《圖經》曰：大戟，澤漆根也。生常山，今近道皆有之。春生紅牙，漸長作叢，高一尺已來。葉似初生楊柳小團。三月、四月開黃紫花，團圓似杏花，又似蕪荑。根似細苦參，皮黃黑，肉黃白色，秋冬採根，陰乾。淮甸出者莖圓，高三四尺，花黃，葉至心亦如百合苗。江南生者葉似芍藥。醫家用治癮疹風，及風毒脚腫，并煮水熱淋，日再，三日愈。李絳《兵部手集方》療水病，無問年月深者，雖復脉惡亦主之。大戟、當歸、橘皮各一大兩切，以水二大升，煮取七分[26]，頓服。利二三斗，勿怪。至重，不過再服。禁毒食一年，水下後更服，永不作。此方傳於張尚客也。

雷公云：凡使，勿用附生者，若服冷泄氣不禁，即煎薺苨子湯解。夫採得後，於槐砧上細剉，與細剉海芋葉拌蒸，從巳至申，去芋葉，曬乾用之。

《太上八帝玄變經》：大戟必瀉。

澤漆

冀州



澤漆　味苦、辛，微寒，無毒。主皮膚熱，大腹水氣，四肢面目浮腫，丈夫陰氣不足，利大小腸，明目，輕身。一名漆莖，大戟苗也。生太山川澤。三月三日、七月七日採莖葉，陰乾。小豆爲之使，惡署預。

陶隱居云：此是大戟苗，生時摘葉有汁，故名澤漆，亦能嚙人肉。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：五月採，日乾用。

《藥性論》云：澤漆，使。治皮肌熱，利小便。

《日華子》云：澤漆，大戟苗也。生消痰退熱。此即大戟花。川澤中有。莖梗小，有葉花黄，葉似嫩菜，四五月採之。

《圖經》曰：澤漆，大戟苗也。生太山川澤，今冀州、鼎州、明州及近道亦有之。生時摘葉有白汁出，亦能嚙人，故以爲名。然張仲景治肺咳上氣，脉沉者，澤漆三斤，以東流水五斗，煮取一斗五升，然後用半夏半升，紫參、生薑、白前各五兩，甘草、黄芩、人參、桂各三兩，八物㕮咀之，内澤漆汁中，煎取五升。每服五合，日三，至夜服盡。

《唐本餘》：有小毒。逐水，主蠱毒。

《聖惠方》：治十種水氣。可用澤漆十斤，於夏間取莖、嫩葉，入水㉘一斗，研汁約二斗，於銀鍋内，慢火熬如稀餳，即止，瓷器内收。每日空心温酒調下一茶匙，以愈爲度。

茵芋

州絳



茵芋　味苦，温、微温，有毒。主五臟邪氣，心腹寒，羸瘦，如瘧狀，發作有時，諸關節風濕痹痛，療久風濕，走四肢，脚弱。一名芫花㉙，一名卑共。生太山川谷。三月三日採葉，陰乾。

陶隱居云：茵芋者出彭城，今近道亦有。莖葉狀如莽草而細軟，取用之皆連細莖。方用甚稀，惟以合療風酒㉚。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：苗高三四尺，葉似石榴短厚，莖赤。今似石南葉，三月㉛、四月採莖、葉，日乾。

《藥性論》云：茵芋，味苦、辛，有小毒。療人五臟寒熱似瘧，諸關節中風痹，拘急攣痛，治男子、女人軟脚毒風，治温瘧發作有時。

《日華子》云：治一切冷風，筋骨怯弱羸瘦。入藥炙用。出自海鹽。形似石南，樹生，葉厚，五六七月採。

《圖經》曰：茵芋，出太山川谷，今雍州、絳州、華州、杭州亦有之。春生苗，高三四尺，葉㉜赤，莖㉝似石榴而短厚，又似石南葉。四月開細白花，五月結實。三月、四月、七月採葉連細莖，陰乾用。或云日乾。胡洽治賊風，手

足枯痹，四肢拘攣。茵芋酒主之。其方：茵芋、附子、天雄、烏頭、秦艽、女萎、防風、防己、躑躅、石南、細辛、桂心各一兩，凡十二味切，以絹袋盛，清酒一斗漬之。冬七日，夏三日，春秋五日，藥成。初服一合，日三，漸增之，以微痹爲度。

赭音者**魁**　味甘，平，無毒。主心腹積聚，除三[34]蟲。生山谷。二月採。

陶隱居云：狀如小芋子，肉白皮黃，近道亦有。

《唐本》注云：赭魁，大者如升，小者如斗，葉似杜蘅，蔓生草木上。有小毒。陶所説者，乃土卵爾。不堪藥用，梁、漢人名爲黃獨，蒸食之，非赭魁也。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：苗蔓延生，葉似蘿摩，根若菝葜，皮紫黑，肉黃赤，大[35]者輪菌如升，小者若拳，今所在有之。據《本經》云無毒，而蘇云有小毒，又云陶所説者，梁、漢人蒸食之，則無毒明矣。乃陶説者爲是也。

陳藏器云：按土卵，蔓生，根如芋，人以灰汁煮食之，不聞有功也。



貫衆

州淄

貫衆　味苦[36]，微寒，有毒。主腹中邪熱氣，諸毒，殺三蟲，去寸白，破癥瘕，除頭風，止金瘡。花：療惡瘡，令人泄。一名貫節，一名虎卷，一名扁符，一名伯萍，一名貫渠，一名百名藥[35]藻。此謂草鴟頭。生玄山山谷及冤句少室山。二月、八月採根，陰乾。瞿菌爲之使。

陶隱居云：近道亦有。葉大如蕨。莖幹三棱。葉綠色似蕨，其根形色毛芒，全似老鴟頭，故呼爲草鴟頭。

禹錫等按：《爾雅》云：濼，貫衆。注：葉圓銳，莖毛黑，布地，冬不死，一名貫渠，《廣雅》云貫節，《蜀本》云：一名藻。又《圖經》云：苗似狗脊，狀如雉尾，根直多枝，皮黑肉赤，曲者名草鴟頭，療頭風用之。今所在山谷陰處有之。

《藥性論》云：貫衆，使。主腹熱。赤小豆爲使。殺寸白蟲。

《圖經》曰：貫衆，生玄山山谷及冤句少室山，今陝西、河東州郡及荆、襄間多有之，而少有花者。春生苗，小鷄翎，亦名鳳尾草。根紫黑色，形如大瓜，下有黑鬚毛，又似老鴟。《爾雅》云：濼舒若切，貫衆。郭璞注云：葉圓銳，莖毛黑，布地，冬不死。《廣雅》謂之貫節是也。三月採根，曬乾。荆南人取根爲末，水調服一錢匕，止鼻血效。

薤音蕘**花**　味苦[38]、辛，寒、微寒，有毒。主傷寒温瘧，下十二水，破積聚大堅癥瘕，蕩滌腸胃中留癖飲食，寒熱邪氣，利水道，療痰飲咳嗽。生咸陽川谷及河南中牟。六月採花，陰乾。

陶隱居云：中牟者，平時惟從河上來，形似芫花而極細，白色。比來隔[39]絶，殆不可得。

《唐本》注云：此藥苗似葫荽，莖無刺，花細，黄色，四月、五月收，與芫花全不相似也。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：苗高二尺許，生崗原上，今所在有之，見用雍州者好。

《藥性論》云：蕘花，使。治咳逆上氣，喉中腫滿，痃氣蠱毒，痃癖氣塊，下水腫等。

《衍義》曰：蕘花，今京、洛間甚多。張仲景《傷寒論》以蕘花治利者，以其行水也。水去則利止，其意如此。然今人用時，當以意斟酌，不可使過與不及也。仍須是有是證者方可用。

牙子

味苦、酸，寒，有毒。主邪氣熱氣，疥瘙惡瘍，瘡痔，去白蟲。一名狼牙，一名狼齒，一名狼子。生淮南川谷及冤句。八月採根，暴乾。中濕腐爛生衣，殺人。蕪荑爲之使，惡地榆、棗肌。

陶隱居云：近道處處有之，其根芽亦似獸之牙齒也。

禹錫等按：《蜀經》云：苗似蛇苺而厚大，深緑色。根萌芽若獸之牙。今所在有之。二月、三月採牙，日乾。

《藥性論》云：狼芽，使，味苦，能治浮風瘙癢，殺寸白蟲，煎汁洗惡瘡。

《日華子》云：殺腹臟一切蟲，止赤白痢，煎服。

《圖經》曰：牙子，即狼牙子。生淮南川谷及冤句，今江東、京東州郡多有之。苗似蛇苺而厚大，深緑色。根黑若獸之牙齒，故以名之。三月、八月採根，日乾。古方多用治蛇毒。其法：取獨莖狼牙搗，臘月猪脂和以傅上，立差。又楊炎《南行方》云：六月以前用葉，以後用根，生吮咀，以木葉裹之，煻火炮令熱，用熨瘡上，冷即止。張仲景治婦人陰瘡亦單用之。

《聖惠方》：治陰瘡洗方。用狼牙五兩細剉，水五升煮至三升，温洗之。

《外臺秘要》：范汪治寸白蟲方。狼牙五兩，搗末，蜜圓如麻子，宿不食，明旦以漿水下一合，服盡差之。又方：治金瘡。狼牙草莖葉熟搗傅貼之，兼止血。又方：治婦人陰蝕，若中燗傷。狼牙三兩㕮咀，以水四升煮，去滓，内苦酒如鷄子一杯，以綿濡湯瀝患處，日四五即愈。

《千金方》：治小兒陰瘡，濃煮狼牙草洗之。又治射工，即水弩子也。以狼牙葉冬取根，搗令熟傅之。

及己

味苦，平，有毒。主諸惡瘡疥痂瘙蝕，及牛馬諸瘡。

陶隱居云：今人多用以合瘡疥膏，甚驗。

《唐本》注云：此草一莖，莖頭四

葉，葉隙著白花。好生山谷陰虛軟地。根似細辛而黑，有毒。入口使人吐血。今以當杜蘅，非也。疥瘙必須用之。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：二月採根，日乾之。

《藥性論》云：玉支、躑躅一名。及己亦可單用，能治瘑疥。

《日華子》云：主頭瘡，白禿，風瘙，皮膚癢。可煎汁浸并傅。

羊躑躅


州海


州潤

羊躑躅　味辛，温，有大毒。主賊風在皮膚中淫淫痛，温瘧，惡毒諸痹，邪氣鬼疰蠱毒。一名玉支。生太行山川谷及淮南山。三月採花，陰乾。

陶隱居云：近道諸山皆有之。花、苗似鹿葱，羊誤食其葉，躑躅而死，故以爲名。不可近眼。

《唐本》注云：玉支、躑躅一名。陶於栀子注云：是躑躅子，名玉支。非也。花亦不似鹿葱，正似旋葍花，色黄者也。

今注：其苗樹生高三四尺，葉似桃葉，花似山石榴。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：樹生高二尺，葉似桃葉，花黄似瓜花。三月、四月採花，日乾。今所在有之。

《藥性論》：羊躑躅，惡諸石及麵，不入湯服也。

《圖經》曰：羊躑躅，生太行山川谷及淮南山，今所在有之。春生苗似鹿葱，葉似紅花，莖高三四尺。夏開花似陵霄、山石榴、旋葍輩，而正黄色，羊誤食其葉，則躑躅而死，故以爲名。三月、四月採花，陰乾。今嶺南、蜀道山谷遍生。皆深紅色如錦綉。然或云此種不入藥。古大方多用躑躅。如胡洽治時行赤散，及治五嗽四滿圓之類，及治風諸酒方皆雜用之。又治百病風濕等，魯王酒中亦用躑躅花。今醫方捋脚湯中多用之。南方治蠱毒下血，有躑躅花散，甚勝。

瓶香　謹按陳藏器云：生南海山谷，草之狀也。味寒，無毒。主天行時氣，鬼魅邪精等。并宜燒之。又於水煮，善洗水腫浮氣，與土薑、芥子等煎浴湯，治㊵風瘧，甚驗也。

三種《海藥餘》

釵子股　謹按陳氏云：生嶺南及南海諸山。每莖三十根，狀似細辛，味苦，平，無毒。主解毒癰疽，神驗。忠、萬州者佳。草莖功力相似，以水煎服。緣嶺南多毒，家家貯之。

宜南草　謹按《廣州記》云：生廣南山谷。有莢長二尺許，内有薄片似

紙，大小如蟬翼，主邪。小男女以緋絹袋盛一身㊶，佩之臂上，辟惡止驚。此草生南方，故作南北字。今人多以男女㊷，非也。宜男草者，即萱草是。

二十五種《陳藏器餘》

藒音挈**車香**　味辛，温。主鬼氣，去臭及蟲魚蛀蚘。生彭城。高數尺，白花。《爾雅》曰：藒車，芑音乞輿。郭注云：香草也。《廣志》云：黄葉白花也。

《海藥》：按《廣志》云：生海南山谷。陳氏云：主霍亂，辟惡氣，裹衣甚好。蛀者㊷，煎此香冷淋之，善辛㊹蛀蚘也。

井口邊草　主小兒啼，著母卧席下，勿令母知。

豚耳草　主溪毒射工。絞汁服，滓傅瘡上。

《百一方》：豚耳多種，未知何是？菘菜白葉者亦名豚耳。《顔氏家訓》：馬莧，一名豚㊼，馬齒莧也。又車前葉圓者，亦名豚耳。

朝生暮落花　主惡瘡疽蠱，疥癰蟻瘻等。并日乾。末和生油塗之。生糞穢處，頭如筆，紫色，朝生暮落，小兒呼爲狗溺臺，又名鬼筆菌。從地出者，皆主瘡疥。牛糞黑菌尤佳。更有燒作灰地，經秋雨生菌重臺，名仙帽，大主血。

街㊺**洞根**　味苦，平，無毒。主熱毒，蛇、犬、蟲、癰瘡等毒。功用同陳家白藥。苗蔓亦相似，嶺南恩州，枝㊻根，陰乾。

《海藥》：謹按《廣州記》云：生嶺南及海隅。苗蔓如土瓜，根相似，味辛，温，無毒。主一切毒氣及蛇傷，并取其根磨服之。應是著諸般毒，悉皆吐出。

千金鏁草　主蛇蝎蟲咬等毒。取草搗傅瘡上，生肌止痛。生江南，高二三尺也。

斷罐草　主丁瘡。合白牙堇耻六切，羊啼菜也菜、青苔、半夏、地骨皮、蜂窠、小兒髮、緋帛并等分作灰，五月採搗，和諸藥末服一錢匕，丁根出也。

猿杷草

草杷猿



燈花末　傅金瘡止血生肉，令瘡黑。今燭花落有喜事。不爾，得錢之兆也。

猿杷草　秋穗子并染皂，黑人鬢髮，令人不老。生山道傍。

《圖經》曰：猿杷草，主療丈夫血痢，不療婦人。若患積年疳痢即用其根，俗間頻服有效。患血痢，猿杷草二

斤，搗絞取汁一小升，內白麵半鷄子許和之，調令勻，空腹頓服之。極重者不過三服。若無生者，收取苗陰乾，爲散。患痢者取散一方寸匕，和蜜水半盞服之。

禹錫等云：蒴杷草，出近世，古方未見其用者。雖陳藏器嘗言其黑人鬚髮，令不老，生道傍。然未甚爲精至，謹用書於《本草圖經》外類篇首云。

百草灰　主腋臭及金瘡。五月五日採。露取之一百種陰乾。燒作灰，以井華水爲團，重燒令白，以醶醋和爲餅，腋下挾之，乾即易。當抽一身痛悶，瘡出即止。以水、小便洗之，不過三兩度。又主金瘡，止血生肌，取灰和石灰爲團，燒令白，刮傅瘡上。

産死婦人家上草　主小兒醋瘡，取之勿回顧，作浴湯洗之，不過三度，佳。

孝子衫襟灰　傅面黈。

靈床下鞋履　主脚氣。

虻母草　葉卷如實，中有血蟲，羽化爲虻，便能咬人。生塞北。草葉如葵，以葉合和桂，杵爲末傅人、馬，山行無復虻來。

故蓑衣結　燒爲灰，和油傅蠷螋溺瘡，佳。

故炊帚　主人面生白駁，以月蝕夜和諸藥燒成灰，和苦酒合爲泥傅之。

天羅勒　主溪毒。挼碎傅之瘡上。似天羅勒生江南平地。

毛蓼　主癰腫疽瘇瘻瘰癧。杵碎內瘡中，引膿血，生肌。亦作湯洗瘡，兼濯足治脚氣。生山足，似烏蓼，葉上有毛，根冬不死也。

蛇芮草　主蛇虺及毒蟲等螫。取根、葉搗傅咬處，當下黃水。生平地。葉似苦杖而小，節赤，高一二尺，種之辟蛇。又有一種草，莖圓似苧，亦傅蛇毒。

《百一方》：東關有草狀如苧，莖方節赤，挼傅蛇毒如摘却，亦名蛇芮草。二草總能主蛇，未知何者的是。有鼠芮草如菖蒲，出山石上，取根藥鼠立死。

萬一藤　主蛇咬。杵篩以水和如泥，傅癰上，藤蔓如小豆。生嶺南，亦名萬吉。

螺厭草　主癰腫風疹，脚氣腫。搗傅之。亦煮湯洗腫處。藤生石上似螺厭，微有赤色，背有少毛。

繼母草　主惡瘡。杵傅之。生塞北川原。有紫碧花，花有角，角上有刺，蒿之類也。亦名繼母藉。

甲煎　味辛，平，無毒。主甲疽瘡及雜瘡難差者，蟲蜂蛇蝎所螫疼，小兒頭瘡，吻瘡，耳後月蝕瘡。并傅之。合諸藥及美果花燒成灰，和蠟成口脂，所主與甲煎略同。三年者治蟲雜瘡及口旁噙瘡、甲疽等瘡。

金瘡小草　味甘，平，無毒。主金瘡，止血長肌，斷鼻中衄血。取葉挼碎傅之。又預和㊽石灰杵爲圓，日乾，臨時刮傅。亦煮服，斷血瘀及卒下血。生江南村落田野間下濕地，高一二寸許，如齊㊾葉短，春夏間有淺紫花，長一粳米也。

鬼釵草　味苦，平，無毒。主㊿蛇及蜘蛛咬。杵碎傅之。亦搗絞汁服。生池畔，葉有椏，方莖，子作釵脚，著人衣如針，北人呼爲鬼針。

圖經衍義本草卷之十七

---

❶草部下品之上：『之上』二字原脱，循本書文例補。按此題下原有本卷藥目，據全書例體删。

❷三：原作『二』，據晦明軒本改。

❸却：晦明軒本作『於』。

❹油：晦明軒本作『細』。

❺干：原作『十』，據晦明軒本改。

❻身：晦明軒本作『聲』。

❼葉：晦明軒本作『氣』，連上讀。

❽根：晦明軒本『根』下有『潤』字。

❾干：晦明軒本作『亦』。

❿嶷：原作『疑』，據晦明軒本改。

⓫十：原作『七』，據晦明軒本改。

⓬令：原作『今』，據晦明軒本改。

⓭葉：晦明軒本作『狹』。

⓮桃：晦明軒本作『楸』。

⓯二：原作『三』，據晦明軒本改。

⓰散：原作『敢』，據晦明軒本改。

⓱一一：晦明軒本作『旦』。

⓲幾：晦明軒本作『衡』。

⓳使：原脱，據晦明軒本補。

⓴虛：晦明軒本作『痔』。

㉑生：晦明軒本作『即』。

㉒尺：原作『天』，據晦明軒本改。

㉓細：晦明軒本作『紬』。

㉔距：晦明軒本作『阻』。

㉕螫毒：晦明軒本作『蛇螫』。

㉖分：晦明軒本作『合』。

㉗本：原作『入』，據晦明軒本改。

㉘水：晦明軒本作『酒』。

㉕芫花：晦明軒本作『莞草』。

㉟酒：晦明軒本『酒』下有『散』字。

㉑似石南葉，三月：晦明軒本作『出華州、雍州』。

㉒葉：晦明軒本作『莖』。

㉝莖：晦明軒本作『藥』。

㉞三：原作『二』，據晦明軒本改。

㉟大：原作『火』，據晦明軒本改。

㊱苦：原作『若』，據晦明軒本改。

㊲藥：晦明軒本作『樂』。下仿此。

㊳苦：原作『若』，據晦明軒本改。

㊴隔：原作『膈』，據晦明軒本改。

㊵治：原脱，據晦明軒本補。

㊶身：晦明軒本作『片』。

㊷女：晦明軒本『女』下有『字』字。

㊸蛀者：此上晦明軒本有『《齊民要術》云：凡諸樹木』九字。

㊹辛：晦明軒本作『辟』。

㊺街：晦明軒本作『衝』。

㊻枝：晦明軒本作『取』。

㊼豚：晦明軒本『豚』下有『耳』字。

㊽和：原作『知』，據晦明軒本改。

㊾齊：晦明軒本作『薺』。

㊿主：原作『生』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之十八

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部下品之下❶

何首烏

西京



何首烏　味苦、澀，微温，無毒。主瘰癧，消癰腫，療頭面風瘡，五痔，止心痛，益血氣，黑髭鬚，悦顔色。久服長筋骨，益精髓，延年不老。亦治婦人産後及帶下諸疾。本出順州南河縣，今嶺外江南諸州皆有。蔓紫，花黄白，葉如薯蕷而不光。生必相對，根大如拳，有赤白二種，赤者雄，白者雌。一名野苗，一名交藤，一名夜合，一名地精，一名陳知白。春夏採。臨用之以苦竹刀切，米泔浸經宿，暴乾。木杵臼搗之。忌鐵。今附。

禹錫等按：《日華子》云：味甘。久服令人有子。治腹臟宿疾，一切冷氣及腸風。此藥有雌雄，雄者苗葉黄白，雌者赤黄色。其藥本草無名，因何首烏者，順州河南縣人。祖能嗣，本名田兒，生而閹弱，年五十八，無妻子，一日醉卧野中，見田中藤，兩本異生，苗蔓相交，久乃解，解合三四。田兒心異之，掘根持問鄉人，無能名者。遂暴乾搗末酒服。七日而思人道，百日而舊疾皆愈。十年而生數男，後改名能嗣。又與子庭服，皆壽百六十歲。唐元和七年，僧文象遇茅山老人，遂傳其事。李翺因著方録云：又叙其苗如木藥，光澤，形如桃柳葉，其背偏，獨單皆生，不相對。有雌雄者：雌者苗色黄白，雄者黄赤。其生相遠，夜則苗蔓交，或隱化不見。春末、夏中、初秋三時，候晴明日兼雌雄採之。烈日暴乾。散服酒下，良。採時盡其根，乘潤以布帛拭去泥土，勿損皮，密器貯之，每月再暴。凡❸服偶日，二、四、六、八日是。服訖，以衣覆汗出，導引。尤忌猪、羊血，其叙頗詳，故載之。

《經驗方》：何首烏新採者，去皮

土❹後，用銅、竹刀薄切片，上甑如炊飯，蒸下用瓷石鍋。忌鐵。旁更別燒一鍋，常滿添水，候藥甑氣上，逐旋以熱水從上淋下，勿令滿溢，直候首烏絶無氣味，然後取下一匙頭汁，白湯亦可，此是藥之精英，與常不同。治骨軟風，腰膝疼，行履不得，遍身瘙癢。首烏大而有花紋者，同牛膝剉各一斤，以好酒一升，浸七宿，暴乾。於木臼内搗末蜜丸，每日空心食前酒下三五十丸。又方：治諸處皮裏面痛。首烏末、薑汁調成膏，痛處以帛子裹之，用炙鞋底熨之，妙。

《斗門方》：治瘰癧，或破不破，以至胸前者，皆治之。用九真藤取其根如鷄卵大，洗，生嚼，常服。覆瘡上，數服即止。其藥久服黑髮延年。或取其頭獲之九數者，服之乃仙矣。其葉如杏，其根亦類癧子，用之如神。又堪爲利術，伏沙子，自有法。一名何首烏，又名赤葛。

《王氏博濟》：治疥癬，滿身作瘡，不可治者。何首烏、艾等分，以水煎令濃，於盆内洗之，甚能解痛，生肌肉。

《何首烏傳》：昔何首烏者，順州南河縣人。祖名能嗣，父名延秀。能嗣常慕道術，隨師在山。因醉夜卧山野，忽見有藤二株，相去三尺餘，苗蔓相交，久而方解，解了又交。驚訝其異，至旦遂掘其根歸。問諸人，無識者。後有山老忽來。示之。答曰：子既無嗣，其藤乃異，此恐是神仙之藥，何不服之？遂杵爲末，空心酒服一錢。服數月似强健，因此常服，又加二錢。病軀。有緣者遇，傳之勿泄，最爾自如。明州刺史李遠傳録經驗：何首烏所出順❺州南河縣、韶州、潮州、恩州、賀州、廣州四會縣、潘州，已上出處爲上；邕州晋興縣、桂州、康州、春州、瓊州、高州、循州，已上所出次之。其仙草五十年者如拳大，號山奴，服之一年，髭鬢青黑；一百年如碗大，號山哥，服之一年，顔色紅悦；一百三❻十年如盆大，號山伯，服之一年，齒落重生；二百年如斗栲栳大，號山翁，服之一年，顔如童子，行及奔馬；三百年如三斗栲栳大，號山精，服之一年延齡，名夜合，四名地精，五名首烏。本出虔州，江南諸道皆有之。苗葉有光澤，又如桃李葉，雄苗赤。根遠不過三尺，春秋可採，日乾。去皮爲末，酒下最良。有疾即用茯苓湯下爲使。常杵末，新瓷器盛，服之忌猪肉血、無鱗魚，觸藥無力。此藥形大如拳連珠，其中有形鳥獸山嶽之狀，珍也。掘得去皮，生吃，得味甘甜，休糧。讚曰：神效助道，著在仙經。雌雄相交，夜合晝疏。服之去穀，日居月諸。返老還少，變安病軀。有緣者遇，傳之勿泄，最爾自如。明州刺史李遠傳録經驗：何首烏所出順❺州南河縣、韶州、潮州、恩州、賀州、廣州四會縣、潘州，已上出處爲上；邕州晋興縣、桂州、康州、春州、瓊州、高州、循州，已上所出次之。其仙草五十年者如拳大，號山奴，服之一年，髭鬢青黑；一百年如碗大，號山哥，服之一年，顔色紅悦；一百三❻十年如盆大，號山伯，服之一年，齒落重生；二百年如斗栲栳大，號山翁，服之一年，顔如童子，行及奔馬；三百年如三斗栲栳大，號山精，服之一年延齡，

純陽之體，久服成地仙。

《衍義》曰：何首烏，兼黑髭鬢，與蘿卜相惡，令❼人髭鬢早白，腸風熱多。

商陸

瀛翔府　并州



商陸　味辛、酸，平，有毒。主水脹疝❽瘕，痹，熨除癰腫，殺鬼精物，療胸中邪氣，水腫，痿痹，腹滿洪直，疏五臟，散水氣。如人形者有神。一名葛根，一名夜呼。生咸陽川谷。

陶隱居云：近道處處有。方家不甚乾用，療水腫，切生根，雜生鯉魚煮作湯。道家乃散用及煎釀，皆能去尸蠱，見鬼神。其實亦入神藥。花名葛花，尤良。

《唐本》注云：此有赤白二種，白者入藥用，赤者見鬼神，甚有毒，但貼腫外用❾。若服之傷人，乃至痢血不已而死也。

今注：商陸，一名白昌，一名當陸。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：葉大如牛舌而厚脆，有赤花者根赤，白花者根白。今所在有❿之。二月、八月採根，日乾。

《爾雅》云：遂薚，馬尾。《廣雅》曰：馬尾，商陸。《本草》云：別名薚。今關西亦呼爲薚，江東呼爲當陸。《釋文》云：如人形者有神。

《藥性論》云：當陸，使，忌犬肉，味甘，有大毒。能瀉十種水病，喉痹不通，薄切醋熬，喉腫處外傅之差。

《日華子》云：白章陸，味苦，冷，得大蒜良。通大小腸，瀉蠱毒，墮胎，協腫毒，傅惡瘡。赤者有毒。

《圖經》曰：商陸俗名章柳根，生咸陽山谷，今處處有之，多生於人家園圃中。春生苗，高三四尺，葉青如牛舌而長。莖青赤，至柔脆。夏秋開紅紫花，作朵。根如蘆菔而長，八月、九月內採根，暴乾。其用歸表。古方術家多用之，亦可單服。五月五日採根，竹箑盛，挂屋東北角陰乾百日，搗篩，井華水調服，云神仙所秘法。喉中卒被毒氣攻痛者。切根炙令熱，隔布熨之，冷輒易，立愈。其花，主人心昏塞，多忘喜誤。取花陰乾百日，搗末。日暮水服方寸匕，卧思念所欲事，即於眼中自覺。《爾雅》謂之遂薚，《廣雅》謂之馬尾，《易》謂之莧陸，皆謂此商陸也。然有赤、白二種，花赤者根赤，花白者根白。赤者不入藥，服食用白者。又一種名赤菖，苗、葉絶相類，不可用，服之傷筋消腎，須細辨之。

雷公云：凡使，勿用赤葛⓫。緣相似，其赤葛⓬花、莖有消筋腎之毒，故勿餌。章陸花白，年多後仙人採之用作脯，可下酒也。每修事，先以銅刀刮去上皮了，薄切，以東流水浸兩宿，然後

漉出，架甑蒸，以豆葉一重了，與章陸一重，如斯蒸從午至亥，出，仍去豆葉，只用豆代之。

《外臺秘要》：治水氣。商陸根白者去皮，切如小豆許，一大盞，以水三升，煮取一升已上。爛即取粟米一大盞煮成粥。仍空心服，若一日兩度服即恐利多，每日服一頓即微利，不得雜食。又方：治瘰癧、喉痹卒攻痛。搗生章陸根，捻作餅子，置瘰癧上，以艾炷於藥上灸三四壯。

《千金髓》：治水氣浮腫。白菖六兩，取汁半合，和酒半升，看大小相度與服，當利下水差。又方：卒暴癥，腫中有物如石，痛刺啼呼，若不治，百日死。多取商陸根搗汁，或蒸之，以布藉腹上，安藥勿覆，冷復易，晝夜勿息。

《經驗方》：治水疾。樟柳去粗皮，薄切暴乾爲末，用黄顙魚三頭，大蒜三瓣，緑豆一合，以水一大碗同煮，豆爛爲度，先將豆任意吃了，却以汁調藥末一錢匕，其水化爲氣消。

《梅師方》：治水腫不能服藥。商陸一升，羊肉六兩，以水一斗煮取六升，去滓，和肉、葱、豉作臛，如常法食之，商陸白者妙。

《孫真人食忌》：主一切熱毒腫。章陸根和鹽少許傅之，日再易。又方：主瘡中毒。切章陸根汁，熱布裹熨之，冷即易。

《斗門方》：治脚軟。用樟柳根細切如小豆大，煮令熟，更入緑豆同爛煮爲飯。每日如此修事服餌，以差爲度。其功最效。

張文仲：治石癰堅如石，不作膿者。生章陸根搗搽之，燥即易，取軟爲度。

威靈仙

味苦，温，無毒。主諸風，宣通五臟，去腹悶[13]冷滯，心膈痰水，久積癥瘕，痃癖氣塊，膀胱宿膿[14]惡水，腰膝冷疼，及療折傷。一名能消。久服之無瘟疫瘧。出商州上洛山及華山并平澤，不聞水聲者良。生先於衆草，莖方，數葉相對。花淺紫，根生稠密，歲久益繁，冬月丙丁戊己日採，忌茗。今附。



晉州



寧化軍



石州



并州

禹錫等按：《蜀本》云：九月末至十二月採，陰乾。餘月并不堪採。

《圖經》曰：威靈仙，出商州上洛山及華山并平澤，今陝西、河東、河北、京東、江湖州郡或有之。初生比衆草最先，莖梗如釵股，四棱。葉似柳葉，作層，每層六七葉，如車輪，有六層至七層者。七月內生花，淺紫或碧白色。作穗似莆臺子，亦有似菊花頭者。實青，根稠密多鬚似穀，每年亦朽敗，九月採根，陰乾。仍以丙丁戊己日採，以不聞水聲者佳。唐正元中，嵩陽子周君巢作《威靈仙傳》云：先時，商州有人重病，足不履地者數十年，良醫殫技莫能療，所親置之道傍，以求救者，遇一新羅僧見之，告曰：此疾一藥可活，但不知此土有否？因爲之入山求索，果得，乃威靈仙也。使服之，數日能步履。其後山人鄧思齊知之，遂傳其事。崔元亮《海上方》著其法云：採得，陰乾月餘，搗篩。温清酒和二錢匕，空腹服之。如人本性⑯殺藥，可加及六錢匕。利過兩行則⑯減之，病除方停服。其性甚善，不觸諸藥，但惡⑰茶及麵湯，以甘草、梔子代飲可也。

《唐本》云：腰腎脚膝積聚，腸內諸冷痛，積年不差者，服之無不立效。商州洛陽縣，九月末至十二月採，治⑱丈夫、婦人中風不語，手足不隨，口眼喎邪，筋骨節風，胎風頭風，暗風心風，風狂人，傷寒頭痛，鼻清涕，服經二度，傷寒即止，頭旋目眩，白痕風，極治大風，皮膚風癢，大毒熱毒風瘡，深治勞疾，連腰骨節風，繞腕風，言語澀滯，痰積，宣通五臟，腹內宿滯，心頭痰水，膀胱宿膿，口中涎水，好⑲吃茶滓，手足頑痺，冷熱氣壅，腰膝疼痛，久立不得，浮氣瘴氣，憎寒壯熱，頭痛尤甚，攻耳成膿而聾。又衝眼赤，大小腸秘，服此立通。飲食即住，黃疸，黑疸，面無顏色，瘰癧遍項，產後閉澀，背腰痛，曾經損墜，心痛，注氣膈氣，冷氣攻衝，腎臟風壅，腹肚脹滿，頭面浮腫，注毒脾、肺氣，痰熱咳嗽氣急，坐卧不安，疥癬等瘡，婦人月水不來，動經多日，血氣衝心，陰汗盜汗，鴉臭穢甚，氣冷膿宿水變病，微利不瀉人。服此四肢輕健，手足温暖，并得清涼。時商州有人患重足不履地，經十年不差。忽遇新羅僧見云：此疾有藥可理，遂入山求之，遺服數日，平復，後留此藥名而去。此藥治丈夫、婦人中風不語，手足不隨，口眼喎邪，筋骨節風，胎風頭風，暗風心風，風狂人，傷寒頭痛，鼻清涕，服經二度，傷寒即止，頭旋目眩，白痕風，極治大風，皮膚風癢，大毒熱毒風瘡，深治勞疾，連腰骨節風，繞腕風，言語澀滯，痰積，宣通五臟，腹內宿滯，心頭痰水，膀胱宿膿，口中涎水，好⑲吃茶滓，手足頑痺，冷熱氣壅，腰膝疼痛，久立不得，浮氣瘴氣，憎寒壯熱，頭痛尤甚，攻耳成膿而聾。又衝眼赤，大小腸秘，服此立通。飲食即住，黃疸，黑疸，面無顏色，瘰癧遍項，產後閉澀，背腰痛，曾經損墜，心痛，注氣膈氣，冷氣攻衝，腎臟風壅，腹肚脹滿，頭面浮腫，注毒脾、肺氣，痰熱咳嗽氣急，坐卧不安，疥癬等瘡，婦人月水不來，動經多日，血氣衝心，陰汗盜汗，鴉臭穢甚，氣

息不堪，勤服威靈仙，更用熱湯，盡日頻洗，朝以苦唾調藥塗身上内外，每日一次，塗之當得平愈。孩兒無辜，令母含藥灌之，痔疾閉澀，氣痢絞結，并皆治之。威靈仙一味洗焙爲末，好酒和令微濕，入竹筒内，牢塞口，九蒸九暴。如乾，添酒重洒之，以白飯⑳和丸如桐子大，每服二十至三十丸，湯酒下。

《衍義》曰：威靈仙，治腸風。根性快，多服疏人五臟真氣。

牽牛子



牽牛子　味苦，寒，有毒。主下氣，療脚滿水腫，除風毒，利小便。

陶隱居云：作藤生，花狀如藊豆，黄色。子作小房，實黑色，形如毬子，舊不著所出州土，今處處有之。二月種子，三月生苗，作藤蔓繞籬墻，高者或三二丈。其葉青，有三尖角。七月生花，微紅帶碧色，似鼓子花而大。八月結實，外有白皮，裹作毬，每毬内有子四五枚，如蕎麥大，有三棱，有黑白二種，九月後收之。又名金鈴。段成式《酉陽雜俎》云：盆甑草即牽牛子也。秋節後斷有三黑點，非白也，古人秘之，隱黑爲白爾。陶不見，但聞而傳之，謂實白之，狀如盆甑，其中子似龜，蔓如山芋，即此。

雷公云：草金鈴，牽牛子是也。凡使，其藥秋末即有實，冬收之。凡使曬乾㉑，却以水中淘，浮者去之，取沉者曬乾，拌酒蒸，從巳至未，曬乾，臨用舂去黑皮用。

《食療》云：多食稍冷，和山茱萸服之，去水病。

《聖惠方》：治水氣遍身浮腫，氣有小毒。能治痃癖氣塊，利大小便，除水氣虚腫，落胎。用牽牛子二兩，微炒，搗細末，烏㉒牛尿浸一宿，平旦入葱白一握，煎十餘沸去滓。空心分爲二服，水從小便中下。

《圖經》曰：牽牛子，舊不著所出州土，今處處有之。二月種子，三月生苗，作藤蔓繞籬墻，高者或三二丈。其葉青，有三尖角。七月生花，微紅帶碧色，似鼓子花而大。八月結實，外有白皮，裹作毬，每毬内有子四五枚，如蕎麥大，有三棱，有黑白二種，九月後收之。又名金鈴。段成式《酉陽雜俎》云：盆甑草即牽牛子也。秋節後斷有三黑點，非白也，古人秘之，隱黑爲白爾。陶不見，但聞而傳之，謂實白之，狀如盆甑，其中子似龜，蔓如山芋，即此。

雷公云：草金鈴，牽牛子是也。凡使，其藥秋末即有實，冬收之。凡使曬乾㉑，却以水中淘，浮者去之，取沉者曬乾，拌酒蒸，從巳至未，曬乾，臨用舂去黑皮用。

《食療》云：多食稍冷，和山茱萸服之，去水病。

《聖惠方》：治水氣遍身浮腫，氣有小毒。能治痃癖氣塊，利大小便，除水氣虚腫，落胎。用牽牛子二兩，微炒，搗細末，烏㉒牛尿浸一宿，平旦入葱白一握，煎十餘沸去滓。空心分爲二服，水從小便中下。

《肘後方》：治風毒脚氣，若脛已

滿，捻之没指者。取牽牛子搗，蜜丸如小豆大。每服五丸，生薑湯下，取令小便利亦可止。

《斗門方》：治風氣所攻，臟腑積滯。用牽牛子以童子小便浸一宿後，長流水上洗半日，却用生絹袋盛，挂於當風處令好乾。每日鹽湯下三十粒。極能搜風，亦善消虚腫。久服令人體清爽。

《王氏博濟》：治三焦氣不順，胸膈壅塞，頭昏目眩，涕唾痰涎，精神不爽。利膈丸：牽牛子四兩，半生半熟，不蛀皂莢塗酥炙二兩，爲末，生薑自然汁煮糊，丸如桐子大。每服三㉓十丸，荆芥湯下。又方：治産前滑胎。牽牛子一兩，赤土少許，研令極細。每覺轉痛頻，煎白榆皮湯調下一錢匕。又方：治男子、婦人五般積氣成聚。黑牽牛一斤，生搗末八兩，餘滓於新瓦上炒香熟，放冷再搗取四兩熟末十二兩拌匀，煉蜜和丸如桐子大。患積氣至重者三五十丸，煎陳橘皮、生薑湯下，臨卧空心服之。如二更至三更已來藥行時效應未動，再與三十丸投之，轉下積聚之物。常服十丸至十五丸，行氣甚妙。小兒十五已下至七歲已上，服五丸至七丸，年及五十已上不請服。

《簡要濟衆》：治大便澀不通。牽牛子半生半熟，搗爲散。每服二錢，煎薑湯調下。如未通再服，及以熱茶調下，量虚實，無時候，加減服之。

《衍義》曰：牽牛子，諸家之説紛紛不一，陶隱居尤甚。言花狀如藊豆，殊不相當。花朵如鼓子花，但碧色，日出開，日西合。今注又謂其中子類蕎麥，亦非也。蓋直如木猴梨子，但黑色，可微炒，搗取其中粉一兩，别以麩，炒去皮尖者。桃人末半兩，以熟蜜和丸如梧桐子，温水服三二十丸，治大腸風秘，壅熱結澀。不可久服，亦行脾腎氣故也。

蓖麻子　味甘、辛，平，有小毒。主水癥。水研二十枚服之，吐惡沫，加至三十枚。三日一服，差則止。又主風虚寒熱，身體瘡癢，浮腫，尸疰惡氣，笮取油塗之。葉：主脚氣，風腫不仁，搗蒸傅之。

蓖麻子



《唐本》注云：此人間所種者，葉似大麻葉而甚大，其子如蜱音卑，又名萆麻。今胡中來者，莖赤，樹高丈餘，子大如皂莢核，用之益良。油塗葉炙熱熨囟音信上，止衄尤驗也。唐本先附。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：樹生，葉似大麻大數倍，子殼有刺，實大於巴豆，青黄色斑，夏用莖、葉，秋收子，冬採根，日乾。胡中來者，莖、子更倍大。所在有之。又云：葉似葎草而

厚大。莖赤，有節如甘蔗。

《日華子》云：治水脹腹滿。細研水服，壯人可五粒。催生，傅產人手足心，產後速拭去。瘡痍疥癩亦可研傅。

《圖經》曰：蓖麻子，舊不著所出州郡，今在處有之。夏生苗，葉似葎草而厚大。莖赤有節如甘蔗，高丈許。秋生細花，隨便結實，殼上有刺，實類巴豆，青黃斑褐，形如牛蜱，故名。夏採莖、葉，秋採實，冬採根，日乾。胡中來者，莖子更大。崔元亮《海上方》：治風痰[24]鼻塌。蓖麻子七枚，研如膏，塗脚心，子及衣纔下，便速洗去。不爾腸出，即用此膏塗頂，腸當自入。

雷公云：凡使，勿用黑天赤利子，緣在地蔓上生，是顆兩頭尖有毒。藥中不用。其蓖麻子，形似巴豆，節節有黃黑斑點。凡使先須和皮用鹽湯煮半日，去皮取子，研過用。

《外臺秘要》：治半身不遂，失音不語。取蓖麻子油一升，酒一斗，銅鉢盛油，著酒中一日，煮之令酒、油熟，服之。又方：治水氣。取蓖麻子去皮研，令熟水解得三合。清旦一頓服之盡，日中當下青黃水。

《千金方》：治嶺南脚氣，從足至膝，脛腫滿，連骨疼者。蓖麻子葉切蒸薄裹，二三易即消。

《肘後方》：治一切毒腫疼痛不可忍者，搗蓖麻子傅之立差。又方：產難。取蓖麻子二枚，兩手各把一枚，須臾立下。

《經驗後方》：治風痰[24]鼻塌。蓖麻不拘多少，去皮拍爲二片，用黃連等分搥碎，二件用水一處浸七宿後，空心、日午、卧時只用浸者水吞下一片，水盡旋添勿令乾。服兩月後，吃大蒜猪肉試驗，如不發動，便是效也。若發動時，依前法再服，直候不發。如只腿脹，用針出毒物，累有神驗。

《修真秘旨》：治小兒丹瘤。蓖麻子五個去皮研，入麵一匙，水調塗之，甚效。

杜壬：治癘[25]風，手指攣曲，節間痛不可忍，漸至漸落方：蓖麻一兩去皮，黃連一兩剉如豆，以小瓶子入水一升，同浸。春夏三日，秋冬五日後，取蓖麻子一枚擘破，面東以浸藥水平旦時一服。漸加至四五枚，微利不妨。瓶中水少更添。忌動風食，累用得效。

又方：治咽中瘡腫。蓖麻子一枚去皮，朴消一錢，同研，新汲水作一服，連進二三服效。

初虞世：治湯火傷神妙。蓖麻子、蛤粉等分末研膏。湯損用油調塗，火瘡用水調塗。

蒴藿　味酸，温，有毒。主風瘙癮疹，身癢濕[25]痹，可作浴湯。一名堇草，一名芨。生田野，春夏採葉，秋冬採莖、根。今附。

陶隱居云：田野墟村中甚多。絶療風痹癢痛，多用薄洗，不堪入服，亦有酒漬根，稍飲之者。

《唐本》注云：此陸英也，剩出此條。《爾雅》云：菦，堇草。郭注云：烏頭苗也。檢三堇別名。又無此者，蜀人謂烏頭苗爲堇草。陶引此條，不知所出處。《藥對》及古方無蒴藿，惟

言陸英也。

今注：蒴藿條，《唐本》編在狼跋子之後，而與陸英條注解并云剩出一條。今詳陸英，味苦，寒，無毒。既此不同，難謂一種，蓋其類爾。今但移附陸英之下。

禹錫等按：《日華子》云：味苦，涼，有毒。治瘡癩風痹，并煎湯浸，并葉用。

《圖經》：文具陸英條下。

雷公云：凡使之，春用隔年花蕊，夏用根，秋冬并總用作煎，只取根，用銅刀細切，於柳木臼中搗取自然汁，緩緩於鍋子中煎如稀餳，任用也。

《外臺秘要》：治卒暴癥，腹中有物堅如石，痛欲死。取蒴藿根一小束，洗漉去水，細擘，以酒二升，漬三宿，暖温服五合至一升，日三，若欲速得服，於熱灰中温令藥味出服之。此方無毒，已愈十六人，神驗。藥盡復作服之。又方：治腰痛方，蒴藿葉，火燎，厚鋪床上，趁熱卧眠於上，冷復易之。冬月取根，春碎熬及熱準前用。并治風温濕冷痹及産婦患傷冷，腰痛不得動亦用。又方：治下部閉不通。取蒴藿根一把，搗汁水和，絞去滓。强人服一升。數用之，并治脚氣。

《千金方》：治嶺南脚氣，從足至膝脛腫，骨疼者。蒴藿根碎，和酒醋共三分，根一分合蒸熟，封裹腫上，一二三日即消。亦治不仁。又方：治頭風。取蒴藿根二升，酒二升，煮服之。

《梅師方》：治水腫，坐卧不得，頭面身體悉腫。取蒴藿根刮去皮，搗汁一合，和酒一合，暖空心服，當微吐利。又方：治一切疹。用煮蒴藿湯，和少酒塗，無不差。《姚氏方》同。

《孫真人食忌》：主卒脚腫漸上。以蒴藿莖、葉，埋熱灰中令熱，傅腫上，以水一升漬，須臾取汁飲，餘滓以封裹瘡。

《子母秘録》：治小兒赤遊行於身上，下至心即死。蒴藿煎汁洗之。

《衍義》曰：蒴藿，與陸英既性味及出産處不同，治療又别，自是二物，斷無疑焉。況蒴藿花白，子初青如緑豆顆，每朵如盞面大，又平生，有一二百子，十月方熟紅，豈得言剩？出此條，孟浪之甚也。

天南星



味苦、辛，有毒。主中

風，除痰，麻痹，下氣，破堅積，消癰腫，利胸膈，散血，墜胎。生平澤，處處有之。葉似蒟葉，根如芋，二月、八月採之。今附。

禹錫等按：陳藏器云：天南星，主金瘡，傷折，瘀血，取根碎傅傷處。生安東山谷。葉如荷，獨莖，最良。

《日華子》云：味辛烈，平，畏附子、乾薑、生薑。署撲損瘀血，主蛇蟲咬，傅疥癬惡瘡。入藥炮用，又名鬼蒟蒻。

《圖經》曰：天南星，《本經》不載所出州土，云生平澤，今處處有之。二月生苗，似荷梗，莖高一尺以來。葉如蒟蒻，兩枝相抱。五月開花似蛇頭，黄色。七月結子作穗似石榴子，紅色。根似芋而圓，二月、八月採根，亦與蒟蒻根相類，人多誤採。莖斑花紫是蒟蒻。一説天南星如本草所説，即虎掌草也。小者爲由跋，後人採用，乃別立一名爾。今天南星大者四邊皆有子，採時盡削去之。又陳藏器云：半夏高一二尺，由跋高一二寸，此正誤相反言也。今由跋苗高一二尺，莖似蒟蒻而無斑，根如鷄卵。半夏高一二寸，亦有盈尺者，根如小指正圓也。江南吴中又有白蒟蒻，亦曰鬼芋，根都似天南星，生下平澤極多，皆雜採以爲天南星，了不可辨。市中所收，往往是也。但天南星小，柔膩肌細，炮之易裂，差可辨爾。古方多用虎掌，不言天南星。天南星近出唐世，中風痰毒方中多用之。《續傳信方》治風痛，用天南星、蠷蹏花，并生時同搗，羅作餅子，甑上蒸去火毒，用瓷器合盛之冷，搗末，用朱砂一分研同拌。每服半錢，荆芥湯調下，每日空心、午時進一二服。

《勝金方》：治吐血。天南星一兩，剉如豆大，以爐灰汁浸二[25]宿，取出洗，焙[31]乾搗末，用酒磨自然銅下一錢，坑子，安雄黄一塊在内，用麵裹燒，候雄黄作汁，以盞子合定，出火毒去麵，研爲末，入麝香少許，拂瘡，驗。又方：治婦人一切風攻頭目痛。天南星一個，掘地坑子，火燒令赤，安於坑中，以醋一盞，以盞蓋之，不令[25]透氣，候冷取出爲末。每服一字，以酒調下，重者半錢[28]。又方：治驚風墜涎。天南星一個，重一兩，换酒浸七伏時取出，於新瓦上周迴炭火炙令乾裂[25]，置於濕地去火毒，用瓷器合盛之冷，搗末，用朱砂一分研同拌。每服半錢，荆芥湯調下，每日空心、午時進一二服。

《十全博救方》：治咳嗽。天南星一個大者，炮令裂，爲末。每服一大錢，水一盞，生薑三片，煎至五分，温服，空心、日午、臨卧時各一服。

《集效方》：治吐瀉不止，或取轉多，四肢發厥，虚風不省人事。服此四

肢漸暖，神識便省，回陽散：天南星爲末。每服三錢，入京棗三枚，同煎八分温服，未省再服。

初虞世：治破傷風入瘡强直。防風、天南星等分爲末，以醋調作靨貼上。

《譚氏方》：治小兒牙關不開。天南星一個，煨熱紙裹，封角休要透氣，於細處剪鷄頭大一竅子，透氣於鼻孔中，牙關立開。

羊蹄



羊蹄　味苦，寒，無毒。主頭禿疥瘙，除熱，女子陰蝕，浸淫疽痔，殺蟲。一名東方宿，一名連蟲陸，一名鬼目，一名蓄。生陳留川澤。

陶隱居云：今人呼名禿菜，即是蓄音之訛。《詩》云：言採其蓄。又一種極相似而味酸，呼爲酸摸根，亦療疥也。

《唐本》注云：實味苦、澀，平，無毒。主赤白雜痢。根味辛、苦，有小毒。《萬畢方》云：療蟲毒。今山野平澤，處處有之。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：生下濕地，高者三四尺。葉狹長，莖節間紫赤。花青白成穗，子三棱，夏中即枯。又有一種，莖、葉俱細，節間生子若芫蔚子，療痢乃佳。今所在有之。

《日華子》云：羊蹄根，治癬，殺一切蟲，腫毒，醋摩貼。葉治小兒疳蟲，殺胡夷魚、鮓魚、檀胡魚毒，亦可作菜食。

陳藏器云：酸摸，葉酸美。小兒折食其英。根主暴熱，腹脹。生搗絞汁服，當下痢，殺皮膚小蟲。葉似羊蹄，是山大黄。一名當藥。《爾雅》云：須蘜蕪。注云：似羊蹄而細，味酸可食。

《日華子》云：酸摸，味酸，凉，無毒。治小兒壯熱。生山崗。狀似羊蹄，葉小黄。

《圖經》曰：羊蹄，禿菜也。生陳留川澤，今所在有之。生下濕地。春生苗，高三四尺。葉狹長，頗似萵苣而色深。莖節間紫赤。花青白成穗，子三棱，有若芫蔚，夏中即枯。根似牛蒡而堅實。今人生採根，醋摩塗癬速效。其方以新採羊蹄根，不限多少，搗研，絞取汁一大升，白蜜半斤，同熬如稠餳煎，更用防風末六兩，溲和令可丸，大如梧子。用栝樓甘草酒下三二十丸，日二三，大佳。謹按《詩·小雅》：言採其遂。陸機云：遂，今人謂之羊蹄，似蘆菔而莖赤，一約[32]爲茹，滑而美也。多啖令人下氣。幽州人謂之遂，字或作蓄并耻六切。又有一種極相類，莖葉黄味酢，名酸摸。《爾雅》所謂須，蘜音孫蕪。郭璞云：蘜蕪似羊蹄，葉細味酢，可食。一名蓚音條是也。

《食療》：主癘。不宜多食。

《聖惠方》：治癮瘡風。用羊蹄菜毒。治小兒壯熱。生山崗。狀似羊蹄，葉小黄。

根，於生鐵上，以好醋磨，旋旋刮取，塗於患上，未差，更入硫黄少許，同磨塗之。又方：治大便卒澀結不通。用羊蹄根一兩剉，水一大盞，煎取六分去滓，温温頓服。

《外臺秘要》：治疥方：搗羊蹄根和猪脂塗上，或著鹽少許，佳。

《千金方》：喉痹卒不語。羊蹄獨根者，勿見風日及婦人、鷄、犬，以三年醋研和如泥，生布拭喉令赤，傅之。

《千金翼》：治漏瘤瘡，濕癬癢。浸淫日廣，癢不可忍，搔之黄水出，差後復發，取羊蹄，净去土，細切搗，以大酢和，净洗傅上，一時間以冷水洗之，日一傅，差。若爲末傅之，妙。

《斗門方》：治腸風痔瀉血。羊蹄根、葉爛蒸一碗來，食之立差。

《簡要濟衆》：治癬瘡久不差。羊蹄根搗絞取汁，用調膩粉少許如膏，塗傅癬上，三五遍即差。如乾，即猪脂調和[33]傅之。

菰根　大寒。主腸胃痼熱，消渴，止小便。



菰根

陶隱居云：菰根，亦如蘆根，冷利復甚也。

今按：《别本》注云：菰蔣草也。江南人呼爲茭草，秣馬甚肥。味甘，無毒。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：生水中，葉似蔗、荻，久根盤厚，夏月生菌細、堪啖，名菰菜。三年已上，心中生臺如藕，白軟，中有黑脉，堪啖，名菰首也。《爾雅》云：出隧，蘧蔬。釋曰：菌類也。一名出隧，一名蘧蔬。《廣雅》云：朝生，形如鬼蓋。郭云：似土菌，生菰草中。今江東唆[34]之甜滑者，氈氍毹者。《説文》云：菰，蔣也。張揖云：氍毹，毛席，取其音同。

孟詵云：菰菜，利五臟邪氣，酒皷面赤，白頭[35]，癧瘍，目赤等，效。然滑中，不可多食。熱毒風氣，卒心痛，可鹽醋煮食之。又云茭首，寒。主心胸中浮熱風。食之發冷氣，滋人齒，傷陽道，令下焦冷滑，不食甚好。

陳藏器云：菰菜，味甘，無毒。去煩熱，止渴，除目黄，利大小便，止熱痢，雜鯽魚爲羹，開胃口，解酒毒。生江東池澤，菰葑上如菌，葑是菰根，歲久浮在水上者。主火燒瘡，燒爲灰和鷄子白塗之。《吕氏春秋》曰：菜之美者，越路之菌是也。晋·張[36]翰見秋風起思之。又云：菰首，生菰蔣草心，至

秋如小兒臂，故云菰首。煮食之止渴。甘、冷，雜蜜食之發痼疾，無別功。更有一種小者，擘肉如墨，名烏鬱。人亦食之，止小兒水痢。

《日華子》云：茭首，微毒。多食發氣并弱陽，葉利五臟，食巴豆人不可食。

《圖經》曰：菰根，舊不著所出州土，今江湖陂澤中皆有之，即江南人呼爲茭草者。生水中，葉如蒲、葦輩，刈以秣馬，甚肥。春亦生笋，甜美堪啖，即菰菜也。又謂之茭白。其歲久者，中心生白薹如小兒臂，謂之菰手。今人作菰首，非是。《爾雅》所謂蘧蔬，注云：似土菌，生菰草中，正謂此也。故南方人至今謂菌爲菰，亦緣此義也。其薹中有墨者，謂之茭鬱。其根亦如蘆根，冷利更甚。二浙下澤處，菰草最多，其根相結而生，久則并土浮於水上，彼人謂之菰葑。刈去其葉，便可耕蒔。其苗有莖梗者，謂之菰蔣草。至秋結實，乃雕胡米也。古人以爲美饌，今饑歲人猶採以當糧。《西京雜記》云：漢太液池邊，皆是雕胡、紫籜、綠節、蒲叢之類。菰之有米者，長安人謂爲雕胡。葭蘆之米，解葉者紫籜。菰之有首者，謂之綠節是也。然則雕胡諸米，今皆不貴。大抵菰之種類皆極冷，不可過食，甚不益人。惟服金石人相宜耳。

陳藏器云：茭首，主心胸中浮熱，動氣不中，食之發冷，滋牙齒，傷陽道，令下焦冷，不食爲妙。

《食療》云：若丹石熱發，和鯽魚煮作羹食之。三兩頓即便差耳。

《外臺秘要》：治湯火所灼，未成瘡。取菰蔣根燒取灰，用鷄子黄和封之。

《廣濟方》：治毒蛇嚙方。菰蔣草根灰，取以封之，其草似燕尾是。

《子母秘録》：小兒風瘡久不差，燒菰蔣節末以傅之。

《衍義》曰：菰根，蒲類。四時取根搗，絞汁用。河朔邊人，止以此苗飼馬，曰菰蔣，及作薦。花如葦，結青子，細若青麻黄，長幾寸。彼人收之，合粟爲粥，食之甚濟饑，此杜甫所謂願作冷秋菰者是也。爲其皆生水中及岸際，多食亦令人利。

篇蓄



味苦，平，無毒，主浸淫疥瘙疽痔，殺三蟲，療女子陰蝕。生東萊山谷。五月採，陰乾。

陶隱居云：處處有，布地生，花節間白，葉細緑，人亦呼爲篇竹。煮汁與小兒飲，療蛔蟲有驗。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：葉如竹，莖有節，細如釵股。生下濕地，今所在有。二月、八月採苗，日乾。

《爾雅》云：竹，篇蓄。釋云：李巡云：一物二名也。孫炎引《詩·衛風》云：緑竹猗猗。郭云：似小藜，赤

莖節，好生道傍，可食，又殺蟲。陶注本草謂之萹竹是也。

《藥性論》云：萹竹，使，味甘。煮汁與小兒服，主蛔蟲等咬心，心痛面青，口中沫出，臨死者，取十斤細剉，以水一石煎，去滓成煎如飴。空心服，蟲自下，皆盡止。主患痔疾者，常取葉搗汁服，效。治熱黄，取汁頓服一升，多年者再服之，根一握洗去土，搗汁服之。若熱腫處，一升，惡丹石毒發，衝目腫痛，又傅熱腫，效。

《圖經》曰：萹蓄，亦名萹竹。出東萊山谷，今在處有之。春中布地生道傍，苗似瞿麥，葉細緑如竹，赤莖如釵股，節間花出甚細，微青黄色，根如蒿根，四月、五月採苗，陰乾。謹按《爾雅》云：竹，萹蓄。郭璞注云：似小藜，赤莖節，好生道傍，可食，又殺蟲。《衛詩》：緑竹猗猗。説者曰：緑王芻也。竹，萹竹也，即謂此萹蓄。方書亦單用治蟲。葛洪小兒蛔方，煮汁令濃，飲之即差。

《食療》云：蛔蟲心痛，面青，口中沫出，臨水取葉十斤，細切，以水三斗，煮如餳，去滓。通寒温，空心服三升，蟲即下。至重者再服，仍通宿勿食，來日平明服之。患治[37]，常取萹竹葉煮汁澄清，常用以作飯。又，患熱黄、五痔。搗汁頓服一升，重者再服。丹石發，衝眼目腫痛。取根一握，洗。搗，以少水，絞取汁服之。若熱腫處，搗根、莖傅之。

《外臺秘要》：治丹發疼痛。搗萹竹汁服一升，一兩服便差。若未差，再服效。

《千金翼》：治外痔。搗萹竹絞取汁，溲麵作餺飥，空心吃。日三度，常吃。

《肘後方》：惡瘡連痂癢痛，搗萹竹封痂，落即差。

《食醫心鏡》：治小兒蟯蟲攻下部癢。取萹竹葉一握，切，以水一升，煎取五合，去滓。空腹飲之，蟲即下，用其汁煮粥，亦佳。又方：治霍亂，吐痢不止。萹竹，豉汁中以五味調和，煮羹食之，佳。

《楊氏産乳》：治蟲[38]，狀如蝸牛，下部癢[37]食。取萹竹一把，水二升煮熟，五歲兒空腹服三五合，隔宿食，明早服之，尤佳。

州石

狼毒



狼毒　味辛，平，有大毒。主咳逆上氣，破積聚飲食，寒熱水氣，脅下積癖，惡瘡鼠瘻疽蝕，鬼精蠱[40]毒，殺飛鳥走獸。一名續毒。生秦亭山谷及奉高。二月、八月採根，陰乾。陳而沉水者良。大豆爲之使，惡麥句薑。

陶隱居云：秦亭在隴西，亦出宕昌。乃言止有數畝地生，蝮蛇食其根，故爲難得。亦用太山者，今用出漢中及建平。云與防葵同根類，但置水中沉者便是狼毒，浮者則防葵。俗用稀，

亦難得，是療腹内要藥爾。

《唐本》注云：此物與防葵都不同類，生處又別。狼毒今出秦州、成州，秦亭故在二州之界，其太山、漢中亦不聞有。但秦隴寒地，元無蝮蛇。復云數畝地生，蝮蛇食其根，謬矣。

今按：別本注云：與麻黄、橘皮、吴茱萸、半夏、枳實爲六陳也。又按狼毒，葉似商陸及大黄，莖、葉上有毛，根皮黄，肉白。以實重者爲良，輕者力劣。秦亭在隴西，奉高乃太山下縣。亦出宕昌及漢中、建平。舊經陶云：與防葵同根，以置水中，浮者即是狼毒，此不足爲信。假使葵，沉者即是狼毒，此不足爲信。假使防葵秋冬採者堅實，得水皆沉；狼毒春夏採者輕虚，得水乃浮爾。按此與防葵全別，生處不同，故不可爲比類。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：根似玄參，浮虚者爲劣也。

《藥性論》云：狼毒，使，味苦、辛，有毒。治痰飲癥瘕，亦殺鼠。

《圖經》曰：狼毒，生秦亭山谷及奉高，今陝西州郡及遼、石州亦有之。苗葉似商陸及大黄，根皮黄，肉白。二月開花，八月結實，八月、九月採，陰乾。以陳而沉水者良。

葛洪治心腹相連常脹痛者。用狼毒二兩，附子半兩，搗篩蜜丸如桐子大。一日服一丸，二日二丸，三日三丸，再一丸，至六日又三丸，自一至三常服即瘥。《千金》療惡疾。以狼毒、秦艽分兩等，搗末酒服方寸匕，日二，常服之差。

《聖惠方》：治乾癬，積年生痂，搔之黄水出，每逢陰雨即癢。用狼毒末塗之。

《集效方》：治臟腑内一切蟲病。川狼毒杵末，每服一大錢，用餳一皂子大，沙糖少許，以水同化，臨卧空腹服之。服時先吃微緊，取下蟲，效。

豼 音喜　**薟** 音枚　州海



花黄白色。

今按：《別本》注云：三月、四月採苗葉，暴乾。唐本先附。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：高二尺許，子青黄，夏採葉用，所在下濕地有之。

《本經》不著所出州郡，今處處有之。春生苗，葉似芥菜而狹長，文粗。莖高三二尺。秋初有花如菊。秋末結實，頗似鶴虱。夏採葉，暴乾用。近世多有單服者，云甚益元氣。蜀人服之法：五月五日、六月六日、九月九日採其葉，去根、莖、花、實，净洗，暴乾。入甑中，層層灑酒與蜜，蒸之又暴，如此九過則已。氣味極香美，熬，搗篩，蜜

丸，服之。云：治肝腎風氣，四肢麻痹，骨間疼，腰膝無力者，亦能行大腸氣。諸州所説，皆云性寒，有小毒，與《本經》意同。惟文州、高郵軍云性熱，無毒。服之補虚，安五臟，生毛髮，兼主風濕瘡，肌肉頑痹，婦人久冷，尤宜服之。用去粗莖，留枝、葉、花、實，蒸暴。兩説不同，豈單用葉乃寒而有毒；并枝、花、實則熱而無毒乎？抑繫二㊶地所産而然邪？

成訥云：江陵府節度使，進蒴藋丸方：臣有弟誁，年三十二中風，床枕五年，百醫不差。有道人鍾針者，因睹此患曰：可餌蒴藋丸必愈。其藥多生沃壤，高三尺許，節葉相對，五月已來收，每去地五寸剪刈，以温水洗泥土，摘其葉及枝頭。凡九蒸九暴，不必火燥，但取蒸爲度。仍熬搗爲末，丸如桐子大，空心温酒或米飲下二三十丸。服至二千丸，所患忽加㊷，不得憂慮，是藥攻之力。服至四千丸，必得復故。五千丸，當復丁壯。臣依法修合，與誁服，果如其言。鍾針又言：此藥與本草所述功效相異，蓋出處盛在江東，彼土人呼猪爲豨，呼臭爲蒴氣，緣此藥如猪蒴氣，故以爲名。但經蒸暴，蒴氣自泯，每當服後，須吃飯三五匙壓之。五月五日採者佳。奉宣付醫院詳録。

張詠云：知益州進豨蒴丸表：臣因換龍興觀，掘得一碑，内説修養氣術，并藥方二件。依方差人訪問採覓，其草頗有異，金棱銀綫，素根紫荄，對節而生。蜀號火炊，莖、葉頗同蒼耳。誰知至賤之中，乃有殊常之效。臣自吃至百服，眼目輕明。即至千服，髭鬢烏黑，筋力校健，效驗多端。臣本州有都押衙羅守一，曾因中風墜馬，失音不語。臣與十服，其病立痊。又和尚智嚴，年七十，忽患偏風，口眼喎邪，時時吐涎。臣與十服盡，亦便得瘥。今合一百劑，差職員史元奏進。

馬鞭草

主下部蟨瘡。

陶隱居云：村墟陌甚多。莖似細辛，花紫色，葉微似蓬蒿也。

馬鞭草



衡州

《唐本》注云：苗似狼牙及茭蔚，抽三四穗，紫花，似車前，穗類鞭鞘㊸，故名馬鞭，都不似蓬蒿也。

今按：陳藏器《本草》云：馬鞭草，主癥癖血瘕，久癆，破血。作煎如糖，酒服。若云似馬鞭鞘，亦未近之。其節生紫花，如馬鞭節。

禹錫等按：《蜀本》云：味苦，微寒，無毒。又《圖經》云：生濕地。花白色，抽三四穗，以七月、八月採苗，日乾。所在皆有之。

《藥性論》云：馬鞭草亦可單用。味苦，有毒。生搗水煎去滓，成煎如飴。空心酒服一匕。主破腹中惡血皆下，殺蟲良。

《日華子》云：味辛，凉，無毒。通

月經，治婦人血氣肚脹，月候不勻。似益母草，莖圓，并葉用。

《圖經》曰：馬鞭草，舊不載所出州土，今衡山、廬山、江淮州郡皆有之。春生苗似狼牙，亦類益母而莖圓，高二三尺。抽三四穗子，七月、八月採苗葉，日乾用。味甘、苦，微寒，有小毒。或云子亦通用，古方多用之。葛氏治卒大腹水病。用馬鞭草、鼠尾草各十斤，水一石，煮取五斗，去滓，再煎令稠厚，以粉和丸。一服二三大豆許，加四五豆，神良。

《聖惠方》：治白癜。用馬鞭草，不限多少爲末。每服食前，用荆芥、薄荷湯調下一錢匕。又方：治婦人月水滯澁不快，通結成瘕塊，肋脹大欲死。用馬鞭草根、苗五斤，剉細，水五斗，煎至一斗，去滓，別於淨器中熬成膏。每食前温酒調下半匙。

《外臺秘要》：治蠼螋尿。馬鞭草爛搗以封之，乾復更易差。

《千金方》：食魚鱠及生肉，在胸膈不化，必成癥瘕。搗馬鞭草汁飲之一升，生薑水亦得，即消。又方：治喉痹，躁腫連頰，吐氣數者，名馬喉痹。馬鞭草一握勿見風，截去兩頭，搗取汁服之。

《集驗方》：治男子陰腫大如升，核痛，人所不能治者。搗馬鞭草塗之。



苧根

寒。主小兒赤丹。其漬苧汁，療渴。

陶隱居云：即今績苧爾。又有山苧亦相似，可入用也。

《唐本》注云：《別録》云：根，安胎，貼熱丹毒腫有效。漚苧汁，主消渴

苧根

血，漬苧與産婦温服之。將苧麻與産婦枕之，止血暈。産後腹痛，以苧安腹上則止。蠶咬人毒入肉，取苧汁飲之。今以苧近蠶種，則蠶不生也。

禹錫等按：《蜀本》注云：苗高丈已來，南人剥其皮爲布，二月、八月採。江左山南皆有之。

《藥性論》云：苧麻根，使，味甘，平。主懷妊安胎。

《日華子》云：味甘，滑冷，無毒。治心膈熱，漏胎下血，産前後心煩悶，天行熱疾，大渴大狂，服金石藥人心熱，署毒箭蛇蟲咬。

《圖經》曰：苧根，舊不載所出州土，今閩、蜀、江、浙多有之。其皮可績布。苗高七八尺。葉如楮葉，面青背白，有短毛。夏秋間著細穗青花。其根黄白而輕虚，二月、八月採。又有一種山苧亦相似。

謹按陸機《草木疏》云：苧，一科數十莖，宿根在地中，至春自生，不須藏[44]種。荆、楊間歲三刈，官令諸園種之，歲再刈，便剥取其皮，以竹刮其表，厚處自脱，得裏如筋者煮

之，用緝。今江浙、閩中尚復如此。孕婦胎損方所須。又主白丹。濃煮水浴之，日三四差。韋宙療癰疽發背，初覺未成膿者。以苧根、葉熟搗傅上，日夜數易之，腫消則差矣。

《聖惠方》：治妊娠胎動欲墮，腹痛不可忍者。用苧根二兩剉，銀五兩，酒一盞，水一大盞㊺同煎，去滓。不計時候分温作二服。

《外臺秘要》：《備急》治白丹。苧根三斤，小豆四升，以水二斗，煮以浴三四遍，浸洗妙。

《肘後方》：丹者，惡毒之瘡，五色無常。苧根三斤，水三斗煮浴。每日取苧根如足塗之。又方：胎動不安。取苧根大指者一尺，㕮咀，以水五升，煮取三升，去滓服。

《斗門方》：治五種淋。用苧麻根兩莖打碎，以水一碗半，煎取半碗。頻服即通。大妙。

《梅師方》：治諸癰疽發背，或發乳房，初起微赤，不急治之即死。速消方：搗苧根傅之，數易。又方：治妊娠忽下黄汁如膠，或如小豆汁。苧根切二升，去黑皮，以銀一斤，水九升，煎取四升。每服入酒半升或一升煎藥，取一升，分作二服。

《衍義》曰：苧根，如蕁麻。花如白楊而長，成穗生，每一朵，凡數十穗，青白色。

白頭翁

州徐



州商



白頭翁　味苦，温，無毒、有毒。主温瘧狂易音羊寒熱，癥瘕瘕積聚，瘿氣，逐血止痛，療瘕㊻瘡。鼻衄。一名野丈人，一名明㊺王使者，一名榆㊽何草。生山谷及田野，四月採。

陶隱居云：處處有。近根處有白茸，狀似人白頭，故以爲名。方用亦療毒痢。

《唐本》注云：其葉似芍藥而大，抽一莖，莖頭一花，紫色，似木槿花，實大者如鷄子，白毛寸餘皆披下，似鬳頭，正似白頭老翁，故名焉。今言近根有白茸，陶似不識。太常所貯蔓生者，乃是女萎。其白頭翁根，甚療毒痢，似續斷而扁。

今按：《別本》注云：今處處有。其苗有風則静，無風而摇。與赤箭、獨活同也。又今驗此草叢生，狀如白薇，而柔細稍長。葉生莖頭如杏葉，上有細白毛。近根者有白茸，舊經陶注則未述其茸、莖、葉，唐注又云：葉似芍藥，實大如鷄子，白毛寸餘，此皆誤矣。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：有細毛，不滑澤，花蕊黄。今所在有之，二月採花，四月採實，八月採根，皆日乾。

《藥性論》云：白頭翁，使，味甘、苦，有小毒。止腹痛及赤毒痢，治齒痛，主項下瘤癧。又云：胡王使者，味苦，有毒。主百骨節痛，豚實爲使。

《日華子》云：得酒良。治一切風氣，及暖腰膝，明目，消贅子。功用同上，莖、葉同用之。

《圖經》曰：白頭翁，生嵩山山谷，今近京州郡皆有之。正月生苗作叢，狀如白薇，而柔細稍長。葉生莖端，上有細白毛，而不滑澤。近根有白茸，正似白頭老翁，故名焉。根紫色，深如蔓菁。二月、三月開紫花，黃蕊，五月、六月結實。其苗有風則靜，無風而搖，與赤箭、獨活同。七月、八月採根，陰乾用。今俗醫用合補下藥，服之大暖[49]，亦衝人。

《外臺秘要》：治陰癩。白頭翁根，生者不限多少，搗之。隨編[50]腫處以傅之，一宿當作瘡，二十日愈。

《肘後方》：小兒禿。取白頭翁根，搗傅一宿，或作瘡，二十日愈。

《衍義》曰：白頭翁，生河南洛陽界及新安土山中。性温。止腹痛，暖腰膝，《唐本》注及《藥性論》甚詳。陶隱居失於不審，宜其排叱也。新安縣界兼山野中，屢嘗見之，正如《唐本》注所説。至今本處山中人賣白頭翁丸，言服之壽考，又失古人命名之意。

甘蕉根

芭蕉花



甘蕉根



甘蕉根　大寒。主癰腫結熱。

陶隱居云：本出廣州，今都下、東間并有。根、葉無異，惟子不堪食爾，根搗傅熱腫甚良。又有五葉莓，生人籬援間，作藤，俗人呼爲籠草。取其根搗傅癰瘇亦效。

《唐本》注云：五葉即烏蘞草也。其甘蕉根，味甘，寒，無毒。搗汁服，主產後血脹悶，傅腫，去熱毒亦效。嶺南者子大，味甘，冷，不益人。北間但有花汁無實。

今注：此藥本出廣州。然有數種，其子性冷，不益人，故不備載。按此花葉，與芭蕉相似而極大，子形圓長及生青熟黃。南人皆食之，而多動氣疾。其根搗傅熱腫尤良。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：俗爲芭蕉，多生江南，葉長丈許，闊二尺餘，莖虛軟，根可生用，不入方藥。

《藥性論》云：甘蕉根，搗傅一切癰腫上，乾即更上，無不瘥者。

《日華子》云：生芭蕉根，治天行熱狂，煩悶消渴，患癰毒并金石發熱悶口乾人。并絞汁服，及梳頭長益髮，腫毒，游風，風疹，頭痛，并研署傅。又云：芭蕉油，冷，無毒。治頭風熱并女人髮落，止煩渴及湯火瘡。

《圖經》曰：甘蕉根，舊不著所出州郡。陶隱居云：本出廣州，江東并有。根、葉無異，惟子不堪食。今出二廣、閩中、川蜀者有花，閩、廣者實極美，可啖。他處雖多，而作花者亦少，近歲都下，往往種之甚盛，皆芭蕉也。蕉類亦多，此云甘蕉，乃是有子者，葉大抵與芭蕉相類，但其卷心中抽稈作花，初生大萼，如倒垂菡萏，有十數層，層皆作瓣，漸大則花出瓣中，極繁盛。紅者如火炬，謂之紅蕉。白者如蠟色，謂之水蕉。其花大類象牙，故謂之牙蕉。其實亦有青、黄之別，品類亦多，食之大甘美。亦可暴乾寄遠，北土得之，以爲珍果。閩人灰埋其皮，令錫滑，績以爲布，如古之錫衰焉。其根極冷，搗汁以傅腫毒，蓐婦血妨，亦可飲之。又芭蕉根，性亦相類，俚醫以治時疾，狂熱及消渴，金石發動躁熱，并可飲其汁。又芭蕉油治暗風癇病，涎作暈悶欲倒者，飲之得吐便瘥，極有奇效。取之用竹筒插皮中，如取漆法。

《食療》：主黄疸。子，生食大寒。止渴潤肺，發冷病。蒸熟暴之令口開，拍取人食之。性寒，通血脉，填骨髓。

《百一方》：發背欲死也，取根搗塗之。

《子母秘録》：治小兒赤遊，行於上下，至心即死。搗芭蕉根汁煎，塗之。

《衍義》曰：芭蕉，三年已上，即有花自心中出，一莖止一花，全如蓮花。葉亦相似，但其色微黄緑，從下脱葉。花心但向上生，常如蓮樣，然未嘗見其花心，剖而示之亦無蕊，悉是葉，但花頭常下垂。每一朵，自中夏開，直至中秋後方盡。凡三葉開則三葉脱落。北地惜其種，人故少用。縷其苗爲布。取汁，婦人塗髮令黑。餘説如《經》。

蘆根　味甘，寒。主消渴，客熱，止小便利。

陶隱居云：當掘取甘辛者，其露出及浮水中者，并不堪用也。

《唐本》注云：此草根，療嘔逆不下食，胃中熱，傷寒患者彌良。其花名蓬蘆音農，水煮汁服，主霍亂大善，用有驗也。

禹錫等按：《藥性論》云：蘆根，使，無毒。能解大熱，開胃，治噎噦不止。

《日華子》云：治寒熱，時疾，煩悶，妊孕人心熱，并瀉痢人渴。

《圖經》曰：蘆根，舊不載所出州土，今在處有之，生下濕陂澤中。其狀都似竹，而葉抱莖生，無枝。花白作穗若茅花。根亦若竹根而節疏。二月、八月採，日乾。用之當極取水底甘辛者，其露出及浮水中者，并不堪用。謹按《爾雅》謂：蘆根爲葭華。郭璞云：



蘆根

蘆，葦也，葦即蘆之成者，謂蒹爲蒹，與廉同，蒹似萑音完而細長，高數尺，江東人呼爲蒹。薕與荻同，荻者謂茨他敢切，爲虮五芭切。虮似葦而小，中實，江東呼爲烏薕音丘者，或謂之荻。荻至秋堅成，即謂之萑，其芭皆名苕徒雕切，其萌笋皆名蘧音繘。若然，所謂蘆葦，通一物也。所謂廉，今作蒹者是也。所言茨，人以當薪爨者是也。今人罕能別蒹茨與蘆葦。又北人以葦與蘆爲二物。水傍下濕所生者皆名葦；其細不及指，人家池圃所植者爲蘆。其幹差大，深碧色者，謂之碧蘆，亦難得。然則本草所用蘆，今北地謂葦者，皆可通用也。古方多單用。葛洪療嘔噦。切根水煮，頓服一升。《必效方》以童子小便煮服，不過三升差。其蓬茸，主卒得霍亂，氣息危急者。取一把煮濃汁，頓服二升瘥。兼主魚蟹中毒，服之尤佳。其笋，味小苦，堪食。法如竹笋，但極冷耳。

《唐本》：餘生下濕地。莖、葉似竹，花若荻花，二月、八月採根，日乾用之。

雷公云：凡使，須要逆水蘆。其根逆水生并黃泡肥厚者，味甘，採得後去節須并上赤黃了，細剉用。

《聖惠方》：治食馬肉中毒，癢痛。蘆根五兩切，以水八升，煮取二升，分爲三服。

《千金方》：治乾嘔噦噦，若手足厥冷。蘆根三斤濃煮汁，飲之。

《肘後方》：食鱸魚肝，鯸鮆魚中毒。剉蘆根煮汁一二升，飲之。

《梅師方》：食狗肉不消，心下堅，或脹脹口乾，忽發熱妄語。煮蘆根飲之。

《金匱玉函方》：治五噎心膈氣滯煩悶，吐逆不下食。蘆根五兩剉，水三大盞，煮取二盞，去滓。不計時候溫服。

鬼臼　味辛，溫、微溫，有毒。主殺蠱毒，鬼疰精物，辟惡氣不祥，逐邪，解百毒，療咳嗽喉結，風邪煩惑，失魄妄見，去目中膚翳，殺大毒，不入湯。

州齊

州舒





一名爵犀，一名馬目毒公，一名九臼，一名天臼，一名解毒。生九真山谷及冤句。二月、八月採根。畏垣衣。

陶隱居云：鬼臼如射干，白而味甘，温，有毒。主風邪，鬼疰，蠱毒，九臼相連，有毛者良。一名九臼，生山谷，八月採，陰乾。又似鈎吻。今馬目毒公如黃精，根臼處似馬眼而柔潤。鬼臼似射干、术輩，有兩種：出錢塘、近道者，味甘，上有叢毛，最勝；出會稽、吳興者，乃大，味苦，無叢毛，不如，

略乃相似而乖異毒公。今方家多用鬼臼，少用毒公，不知此郎復頓爾乖越也。

《唐本》注云：此藥生深山岩石之陰。葉如蓖麻、重樓輩。生一莖，莖端一葉，亦有兩歧者。莖枯爲一臼。假令生來二十年，則有二十臼，豈惟九臼耶？根肉皮鬚并似射干，今俗用皆是射干。及江南別送一物，非真者。今荆州當陽縣、硤州遠安縣、襄州深山，二州荆山縣山中并有之，極難得也。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：花生莖間，赤色。今出硤州、襄州深山，二月、八月採根，日乾用之。

《藥性論》云：鬼臼，使，味苦。能主尸疰，殗殜勞疾，傳尸瘦疾，主辟邪氣，逐鬼神。

《圖經》曰：鬼臼，生九真山谷及冤句，今江寧府、滁、舒、商、齊、杭、襄、硤州、荆門軍亦有之，多生深山岩石之陰。葉似蓖麻、重樓輩。初生一莖，莖端一葉，亦有兩歧者，年長一莖，莖枯爲一臼，二十年則二十臼也。花生莖間，赤色，三月開，後結實。根、肉、皮、鬚并似射干，當細別之。二月、八月採根，暴乾用。古方治五尸，鬼疰，百毒，惡氣方用之。一説鬼臼生深山陰地，葉六出或五出，如雁掌。莖端一葉如傘，蓋旦時東向，及暮則西傾，蓋隨日出没也。花紅紫如荔枝，正在葉下，常爲葉所蔽，未常見日。一年生一葉，既枯則爲一臼，及八九年則八九臼矣。然一年一臼生而一臼葉似邪蒿而細，科生三月中。莖可食，又可蒸，香美，味頗似莖蔞蒿。

雷公云：凡使，勿用紅蒿并邪蒿，舊苗死，前年之魁腐矣。而本草注謂二味真似角蒿，只是上香角短。採得，全似射干，今射干體狀雖相似，然臼形并於槐砧上細剉用之。

《外臺秘要》：凡齒齦宣露多是淺薄，大異鬼臼，鬼臼如八九天南星側比相疊，而色理正如射干。要者，當使人求苗採之，市中不復有也。

角蒿　味辛、苦，平，有小毒。主甘濕蜜諸惡瘡有蟲者。

《唐本》注云：葉似白蒿，花如瞿麥，紅赤可愛，子似王不留行，黑色作角，七月、八月採。唐本先附。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：葉似蛇床、青蒿等。子角似蔓菁，實黑細，秋熟，所在皆有之。

陳藏器云：蘼蒿，味辛，温，無毒。主破血下氣，煮食之似小薊。生高崗。鬼臼生深山陰地，葉六出或五出，如雁掌。莖端一葉如傘，蓋旦時東向，及暮則西傾，蓋隨日出没也。花紅紫如荔枝，正在葉下，常爲葉所蔽，未常見日。一名莪蒿。《爾雅》宿根先於百草。

云：莪，蘼。注：蘼蒿也。釋曰：《詩·小雅》云：菁菁者莪。陸機云：莪蒿也，一名蘼蕪。生澤田墐洳處。

開淡紅紫花，花大約徑三四分。花罷，結角子，長二寸許，微彎。苗與角治口齒絶勝。

馬兜鈴

滁州



信州



馬兜鈴 味苦，寒，無毒。主肺熱咳嗽，痰結喘促，血痔瘻瘡。生關中，藤繞樹而生。子狀如鈴，作四五瓣。今附。

禹錫等按：《藥性論》云：馬兜鈴，平。能主肺氣上急，坐息不得，主咳逆連連不可。

《日華子》云：治痔瘻瘡，以藥於瓶中燒熏病處，入藥炙用，是上青木香，獨行根子。越州七八月採。

《圖經》曰：馬兜鈴，生關中，今河東、河北、江淮、夔、浙州郡亦有之。春生苗如藤蔓，葉如山芋葉，六月開黄紫花，頗類枸杞花，七月結實棗許大如鈴，作四五瓣。其根名雲南根，似木香，小指大，赤黄色。亦名土青木香。七月、八月採實，暴乾。主肺病。三月採根，治氣下膈，止刺痛。

雷公云：凡使，採得後去葉并蔓了，用生絹袋盛，於東屋角畔懸。令乾了，擘作片，取向裹了[52]，去革膜，并令净，用子并皮。勿令去革膜不盡用之。

《聖惠方》：治五種蠱毒。用兜鈴根三兩爲末，分爲三貼，以水一盞，煎五分，去滓，頻服。當吐蠱出，未快再服，以快爲度。又方：草蠱術正因方及嶺南。人若行此毒，入人咽刺痛欲死者。用兜鈴苗一兩，爲末。以温水調下一錢匕，即消化，蠱出，效。

《外臺秘要》：崔氏蛇蠱，食飲中得之。咽中如有物，咽不下，吐不出，悶心熱。服兜鈴即吐出。又服麝香一錢匕，即吐蠱毒。

《簡要濟衆》：治肺氣喘嗽。兜鈴二兩，只用裏面子，去却殼，酥半兩，入碗内拌和匀，慢火炒乾，甘草一兩炙，二味爲末。每服一錢，水一盞，煎六分，温呷或以藥末含咽津，亦得。

《衍義》曰：馬兜鈴，蔓生，附木而上。葉脱時，鈴尚垂之，其狀如馬項鈴，故得名。然熟時則自折坼，間有子全者。採得時須八九月間。治肺氣喘急。

仙茅 味辛，温，有毒。主心腹冷氣不能食，腰脚風冷攣痹不能行，丈夫虚勞，老人失溺，無子，益陽道。久服通神强記，助筋骨，益肌膚，長精神，明目。一名獨茅根，一名茅瓜子，一名婆羅門參。《仙茅傳》云：十斤乳石，不及一斤仙茅，表其功力爾。生西域，又大庾嶺。亦云忌鐵及牛乳。二月、八月採根。今附。

禹錫等按：《日華子》云：治一切風氣，延年益壽，補五勞七傷，開胃下

仙茅


戎州


江寧府

氣，益房事。彭祖單服法：以米泔浸，去赤汁，出毒後，無妨損。

《圖經》曰：仙茅，生西域及大庾嶺，今蜀川、江湖、兩浙諸州亦有之。葉青如茅而軟，復稍闊，面有縱理，又似棕櫚。至冬盡枯，春初乃生。三月有花如梔子黄，不結實。其根獨莖而直，傍有短細根相附，肉黄白，外皮稍粗，褐色。二月、八月採根，暴乾用。衡山出者花碧，五月結黑子。謹按《續傳信方》叙仙茅云：主五勞七傷，明目，益筋力，填骨髓，益陽不倦。用時竹刀切，糯米泔浸。

雷公云：凡採得後，用清水洗令净，刮上皮，於槐砧上用銅刀切豆許大，却用生稀布袋盛，於烏豆水中浸一宿，取出用酒濕拌了蒸，從巳至亥，取出暴乾。勿犯鐵器，斑人鬚鬢。

《海藥》云：生西域。粗細有筋，或如筆管，有節文理。其黄色多涎。甚赤。《詩》云：隰有萇楚者即此也。方藥亦不復用。

《唐本》注云：此物多生溝渠隍塹之間。人取煮以洗風癢及諸瘡腫，極效。劍南人名紐[54]子根也。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：生平澤中。葉、花似桃，子細如棗核，苗長

羊桃

味苦，寒，有毒。主熛熱，身暴赤色，風水積聚，惡瘍，除小兒熱，去五藏五水大腹，利小便，益氣。可作浴湯。一名鬼桃，一名羊腸，一名長楚，一名御弋，一名銚[音姚]弋。生山林川谷及生田野。二月採，陰乾。

陶隱居云：山野多有。甚似家桃，又非山桃子。小細，苦不堪啖，花

弱即蔓生，不能爲樹。今處處有，多生溪澗。今人呼爲細子根，似牡丹。療腫。《爾雅》云：長楚，銚弋。郭云：今羊桃也。釋云：葉似桃，花白，子如小麥，亦似桃。陸機云：葉長而狹，華紫赤色。其枝莖弱，過一尺引蔓於草上。今人以爲汲灌，重而善没，不如楊柳也。近下根，刀切其皮，著熱灰中脫之，可韜筆管也。

陳藏器云：味甘，無毒。主風熱羸老。浸酒服之。生蜀川川谷中。草高一尺，葉長小，亦云羊桃根也。

《肘後方》：治傷寒毒攻手足痛，煮羊桃汁漬之，雜鹽豉尤好。

州黔



鼠尾草

鼠尾草　味苦，微寒，無毒。主鼠瘻寒熱，下痢膿血不止。白花者主白下，赤花者主赤下。一名勤音勀，一名瘦。用鼠尾草搗爲末，每服一錢，不計時候，以粥飲調下。

陶隱居云：田野甚多，人採作滋染皂。又用療下瘻，當濃煮取汁，令可丸服之，今人亦用作飲。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：所在下濕地有之。葉如蒿，莖端夏生四五穗，穗若車前，有赤、白二種花。七月採苗，日乾用之。《爾雅》云：勤，鼠尾。釋曰：可以染皂草也。一名鼠尾草，平。主諸痢。

《圖經》曰：鼠尾草，舊不載所出州土，云生平澤中，今所在有之，惟黔中人採爲藥。苗如蒿，夏生，莖端作四五穗，穗若車前，花有赤白二色。《爾雅》謂勤，鼠尾。云可以染皂草也。四月採葉，七月採花，陰乾。古治痢多用之。姚氏云：濃煮汁如薄飴，飲五合，日三，赤下用赤花，白下用白花，瘥。

《聖惠方》：治久赤白痢不瘥，羸瘦。用鼠尾草搗爲末，每服一錢，不計時候，以粥飲調下。

女青

女青　味辛，平，有毒。主蠱毒，逐邪惡氣，殺鬼，温瘧，辟不祥。一名雀瓢。蛇銜根也，生朱崖。八月採，陰乾。

陶隱居云：若是蛇銜根，不應獨生朱崖。俗用是草葉，別是一物，未詳孰是。術云：帶此屑一兩，則疫癘不犯，彌宜識真者。

《唐本》注云：此草即雀瓢也。葉似蘿摩，兩葉相對。子似瓢形，大如棗許也，故名雀瓢。根似白薇。生平澤。莖、葉并臭。其蛇銜根，都非其類。又《別録》云：葉嫩時似蘿摩，圓端大莖，實黑，莖、葉汁黄白。亦與前説相似。若是蛇銜根，何得苗生益州，根在朱崖，相去萬里餘也？《別録》云：雀瓢白汁，主蟲蛇毒，即女青苗汁也。

禹錫等按：《藥性論》云：女青，使，味苦，無毒。能治温瘧寒熱，蛇銜爲使。

《圖經》曰：文具蛇銜條下。

《肘後方》：辟瘟病。正月上寅日，搗女青末，三角絳囊盛，繫前帳中，大吉。

《子母秘録》：治小兒卒腹皮青黑赤，不能喘息。即急用此方，并治吐痢卒死，用女青末内口中酒服。亦治大人。

紫虚无[57]君《南嶽夫人内傳》：治卒死。搗女青屑一錢，安喉中。以水或酒送下，立活也。

故麻鞋底　水煮汁服之。解紫石英發毒，又主霍亂吐下不止，及解食牛馬肉毒，腹脹吐痢不止者。

今按：陳藏器《本草》云：故麻鞋底，主消渴。煮汁服之。鞋綱繩如棗大，婦人内衣有血者，手大鈎頭棘針二七枚，三物并燒作灰，以猪脂調傅狐刺瘡出蟲。唐本先附。

禹錫等按：陳藏器云：破草鞋和人亂髮燒作灰，醋和傅小兒熱毒遊腫。

陳藏器云：取麻鞋尖頭二七爲灰，歲朝井花水服之，又主遺溺。又故麻鞋底燒令赤，投酒煮粟穀汁中服之，主霍亂轉筋。

《外臺秘要》：《近效》尿床。取麻鞋綱帶及鼻根等，唯不用底，須七量，以水七升，煮取二升，分再服之。又方：治蜈蚣螫人。麻鞋履底炙以揩之，即瘥。

《千金方》：肛脱出。以炙麻履底，令人頻按，永瘥。又故麻鞋底、鱉頭各一枚，燒鱉頭搗爲末，傅肛門，將履底按入，即不出也。

《經驗方》：治鼻塞。燒麻鞋灰吹鼻中，立通。一名千里馬，麻鞋名也。

《廣利方》：治鼻衄血。鞋鞴作灰吹鼻孔中，立效。

劉寄奴草　味苦，温。主破血下脹。多服令人痢。生江南。

州滁



《唐本》注云：莖似艾蒿，長三四尺，葉似蘭草尖長，子似稗而細，一莖上有數穗，葉互生。

今按：《别本》注云：昔人將此草療金瘡止血，爲要藥，産後餘疾，下血止痛，極效。唐本先附。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：葉似菊，高四五尺，花白，實黄白作穗，蒿之類也。今出越州。夏收苗，日乾之。

《日華子》云：劉寄奴，無毒。治心腹痛，下氣，水脹血[58]氣，通婦人經脉癥結，止霍亂水瀉。又名劉寄奴。六七八月採。

《圖經》曰：劉寄奴草，生江南，今河中府、孟州、漢中亦有之。春生苗，莖似艾蒿，上有四棱，高三二尺已來。葉青似柳，四月開碎小黄白花，形如瓦松，七月結實，似黍而細，一莖上有數

穗，互生，根淡紫色似萵苣。六月、七月採，苗、花、子通而用之。

雷公云：採得後去莖、葉，只用實。凡使，先以布拭上薄殼皮令净，拌酒蒸，從巳至申出，暴乾用之。

《經驗方》：治湯火瘡至妙。劉寄奴搗末，先以糯米漿，鷄翎掃湯著處，後摻藥末在上，并不痛，亦無痕。大凡湯著處[59]，先用鹽末摻之，護肉[60]不壞，然後藥末傅之。

骨碎補　味苦，温，無毒。主破血止血，補傷折。生江南。根著樹石上，有毛，葉如菴蕳。江西人呼爲胡孫薑。一名石菴蕳，一名骨碎布。今附。

禹錫等按：《藥性論》云：骨碎補，使。能主骨中毒氣，風血疼痛，五勞六極，口手不收，上熱下冷，悉能主之。

陳藏器云：骨碎補，似石韋而一根，餘葉生於木。嶺南虔、吉亦有。本名猴薑。開元皇帝以其主傷折，補骨碎，故作此名耳。



《日華子》云：猴薑，平。治惡瘡蝕爛肉，殺蟲。細長。是樹上寄生草苗，似薑

《圖經》曰：骨碎補，生江南，今淮、浙、陝西、夔路州郡亦有之。根生大木或石上，多在背陰處，引根成條，上有黄毛及短葉附之。又有大葉成枝，面青緑色，有黄點，背青白色，有赤紫點。春生葉，至冬乾黄，無花實，惟用治耳聾。削作細條，火炮，乘熱塞耳，亦入婦人血氣藥用。又名石毛薑。

雷公云：凡使，採得後，先用銅刀刮去上黄赤毛盡，便細切，用酒[61]拌令潤，架柳甑蒸二日後出，暴乾用。又《乾寧記》云：去毛細切後，用生蜜拌蒸，從巳至亥，準前暴乾。搗末[62]用。炮猪腎空心吃治耳鳴，亦能正[63]諸雜痛。

《靈苑方》：治虚氣攻牙，齒痛血出，牙齦癢痛。骨碎補二兩，細剉，炒令黑色，杵末。依常盥漱後揩齒根下，良久吐之，臨卧用後睡，咽之無妨。

圖經衍義本草卷之十八

❶草部下品之下：『之下』二字原脱，循例補。按此題下原有本卷藥目，循全書體例删。
❷靳：晦明軒本作『勒』。
❸凡：原作『乾』，據晦明軒本改。
❹土：原脱，據晦明軒本補。
❺順：原作『幽』，據晦明軒本改。
❻三：晦明軒本作『五』。
❼與蘿卜相惡，令：此六字原作『與蘿蘭難零』，據晦明軒本改。
❽疝：原作『病』，據晦明軒本改。
❾用：原脱，據晦明軒本補。
❿有：原作『下』，據晦明軒本改。
⓫葛：晦明軒本作『菖』。
⓬葛：晦明軒本作『菖』。
⓭悶：晦明軒本作『内』。
⓮膿：原作『腮』，據晦明軒本改。
⓯性：原作『姓』，據晦明軒本改。
⓰則：原作『服』，據晦明軒本改。
⓱惡：原作『藥』，據晦明軒本改。
⓲治：晦明軒本作『出』。
⓳好：原作『毒』，據晦明軒本改。
⓴飯：晦明軒本作『蜜』。
㉑乾：原作『花』，據晦明軒本改。
㉒烏：原作『約』，據晦明軒本改。
㉓三：晦明軒本作『二』。
㉔痰：晦明軒本作『疾』。
㉕癘：原作『痢』，據晦明軒本改。
㉖濕：原作『滋』，據晦明軒本改。
㉗令：原作『冷』，據晦明軒本改。
㉘錢：晦明軒本『錢』下有『匕』字。
㉙裂：原作『烈』，據晦明軒本改。
㉚二：晦明軒本作『一』。
㉛焙：原作『培』，據晦明軒本改。
㉜一約：晦明軒本作一『可』字。
㉝和：原作『裡』，據晦明軒本改。
㉞唆：晦明軒本作『啖』。
㉟頭：晦明軒本作『癩』。
㊱張：原作『强』，據晦明軒本改。
㊲治：疑當作『痔』。
㊳蟲：晦明軒本作『蠱』。
㊴食：原作『合』，據晦明軒本改。
㊵蠱：原作『蟲』，據晦明軒本改。
㊶二：晦明軒本作『土』。
㊷加：原作『如』，據晦明軒本改。
㊸鞘：疑當作『稍』。下同。
㊹藏：晦明軒本作『栽』。
㊺水一大盞：此四字原脱，晦明軒本補。
㊻瘕：晦明軒本作『金』。
㊼明：晦明軒本作『胡』。
㊽楫：晦明軒本作『奈』。
㊾暖：晦明軒本作『效』。
㊿編：晦明軒本作『偏』。
(51)菁：晦明軒本作『青』。
(52)裹了：晦明軒本作『裹子』。
(53)因：晦明軒本『因』下有『國』字。
(54)紐：晦明軒本作『細』。
(55)故名：此二字原脱，據晦明軒本補。
(56)似：原脱，據晦明軒本補。
(57)虚无：晦明軒本作『靈南』。
(58)血：原作『也』，據晦明軒本改。
(59)處：原脱，據晦明軒本補。
(60)肉：原作『白』，據晦明軒本改。
(61)酒：晦明軒本作『蜜』。
(62)末：原作『中』，據晦明軒本改。
(63)正：晦明軒本作『止』。

圖經衍義本草卷之十九

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部下❶品之下

木賊


秦州

木賊　味甘、微苦，無毒。主目疾，退翳膜，又消積塊，益肝膽，明目，療腸風，止痢，及婦人月水不斷。得牛角鰓、麝香，治休息痢歷久不差。得禹餘糧、當歸、芎藭，療崩中赤白。得槐鵝、桑耳，腸風下血服之效。又與槐子、枳實相宜，主痔疾出血。出秦、隴、華、成諸郡近水地。苗長尺許，叢生。每根一莖，無花葉，寸寸有節，色青，陵❷冬不凋。四月採用之。新定。

《圖經》曰：木賊，生秦、隴、同、華間。味微苦，無毒。主明目，療風，止痢。所生山谷近水地有之。獨莖，苗如箭苛，無葉，長一二尺，青色，經冬不枯，寸寸有節，採無時。今醫用之最多，甚治腸痔多年不差，下血不止。木賊、枳殼各二兩，乾薑一兩，大黃一分，四味并剉一處，於銚子內炒黑色，存三分性，搗羅，溫粟米飲調，食前服二錢匕，甚效。

《廣利方》：治瀉血不止。木賊十二分，切，以水一升八合，煎取八合，去滓。空心溫分二服，如人行五里再服。

《衍義》曰：木賊，細剉，微微炒，搗爲末，沸湯點二錢，食前服，治小腸、膀胱氣，緩緩服必效。

蘆音爐❸草

味苦，平，無毒。主久咳上氣喘逆，久寒驚悸，痂疥白禿瘍氣，殺皮膚小蟲，可以染黃作金色。生青衣川谷。九月、十月採。畏鼠婦。

陶隱居云：青衣在益州西。

《唐本》注云：此草，葉似竹❹而細薄，莖亦圓小。生平澤溪澗之側，荊襄間。味微苦，無毒。主明目，療風，止痢。所生山谷近水地有之。獨莖，苗如箭苛，無葉，長一二尺，青色，經冬不枯，寸寸有節，採無時。今醫用之最多，甚治腸痔多年不差，下血不止。木賊、枳殼各二兩，乾薑一兩，大黃一分，四味并剉一處，於銚子內炒黑色，存三分性，搗羅，溫粟米飲調，食前服二錢匕，甚效。

《廣利方》：治瀉血不止。木賊十二分，切，以水一升八合，煎取八合，去滓。空心溫分二服，如人行五里再服。

《衍義》曰：木賊，細剉，微微炒，搗爲末，沸湯點二錢，食前服，治小腸、膀胱氣，緩緩服必效。

蘆音爐❸草

味苦，平，無毒。主久寒驚悸，痂疥白禿瘍氣，殺皮膚小蟲，可以染黃作金色。生青衣川谷。九月、十月採。畏鼠婦。

陶隱居云：青衣在益州西。

《唐本》注云：此草，葉似竹❹而細薄，莖亦圓小。生平澤溪澗之側，荊襄間。

蒲公草

蒲公草




蒲公草　味甘，平，無毒。主婦人乳癰腫。水煮汁飲之及封之，立消。一名構耨草。

《唐本》注云：葉似苦苣，花黃，斷有白汁❻，堪生食。生平澤田園中，四月、五月採之。

《圖經》曰：蒲公草，舊不著所出州土，今處處平澤田園中皆有之。春初生苗，葉如苦苣，有細刺。中心抽一莖，莖端出一花，色黃如金錢。斷其莖，有白汁，人亦啖之。俗呼爲蒲公英。語訛爲僕公罌是也。水煮汁以療婦人乳癰。又搗以傅瘡皆佳。又治惡刺及狐尿刺，搗取根、莖白汁塗之，惟多塗立差止。此方出孫思邈《千金方》，其序云：余以正觀五年七月十五日夜，以左手中指背觸著庭木，至曉遂患痛不可忍。經十日，痛日深，瘡日高大，色如熟小豆色。嘗聞長者之論有此方，遂依治之。手下則愈，痛亦除，瘡亦即差，未十日而平復。楊炎《南行方》亦著其效云。

《梅師方》：治產後不自乳兒，蓄積乳汁結作癰。取蒲公草搗傅腫上，日三四度易之。

穀精草　味辛，温，無毒。主療喉痹，齒風痛，及諸瘡疥。飼馬主蟲顙毛焦等病。二月、三月於穀田中採之。一名戴星草。花白而小圓似星。故有此名爾。今附。

禹錫等按：《日華子》云：涼。喂飼馬肥，二三月於田中生白花者，結水銀成沙子。

《圖經》曰：穀精草，舊不載所出州土，今處處有之。春生於穀田中，葉、莖俱青，根、花并白色。二月、三月内採花用，一名戴星草。以其葉細，花白而小圓似星，故以名爾。又有一種葉細，莖梗差長有節，根微赤，出秦隴間。古方稀用，今口齒藥多使之。

陳藏器云：味甘，平。亦入馬藥用之。

《集驗方》：治偏、正頭痛。穀精草一兩爲末，用白麵調攤紙花子上，貼痛處，乾又換。


府寧江


州泰

牛扁草　味苦，微寒，無毒。主身皮瘡熱氣，可作浴湯，殺牛虱小蟲，又療牛病。生桂陽山谷。

陶隱居云：今人不復識此，牛疫代代不無用之。既要牛醫家應用，而亦無知者。

《唐本》注云：此藥葉似三葉、石龍芮等。根如秦艽而細。生平澤下濕地，田野人名爲牛扁。療牛虱甚效。太常貯名扁特，或名扁毒。


州潞

禹錫等按：《蜀本圖經》云：葉似石龍芮、附子等。今出寧州。二月、八月採根，日乾。

《圖經》曰：牛扁，出桂陽山谷，今潞州、寧州亦有之。葉似三葦、石龍芮等。根如秦艽而細。多生平澤下濕地。二月、八月採以日乾。今亦稀用。

按《本經》云：殺牛虱小蟲。蘇恭注云：太常貯名扁特。今潞州上一種，名便特。六月有花，八月結實，採其根，搗末，油調，殺蟣虱。根苗主療大都相似。疑此即是牛扁，但扁、便不同，豈聲近而字訛乎？今以附之。

苦芙 音襖　微寒。主面目、通身漆瘡。

陶隱居云：處處有之。傖士莖切人取莖生食之。五月五日採，暴乾。燒作灰以療金瘡，甚驗。

《唐本》注云：今人以爲漏蘆，非也。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：子若猫薊。莖圓無刺。五月採苗，堪生啖，所在下濕地有之。

《藥性論》云：苦芙草亦可單用，味苦，無毒。

《日華子》云：苦芙，微寒。生食治漆瘡。五月五日採，暴乾。作灰傅面目、通身漆瘡，不堪多食。



酢漿草　味酸，寒，無毒。主惡瘡瘜瘦。搗傅之，殺諸小蟲。生道傍。

《唐本》注云：葉如細萍，叢生，莖頭有三葉。一名醋母草，一名鳩酸草。

今按：《別本》注云：生陰濕處，俗爲小酸茅。食之解熱渴。四月、五月採，陰乾。唐本先附。

臣禹錫等謹按：《蜀本圖經》云：葉似水萍，兩葉并大葉同枝端，黃色實黑。生下濕地，夏採葉用之。

《圖經》曰：酢漿草，俗呼爲酸漿，舊不載所出州土，云生道傍，今南中下濕地及人家園圃中多有之，北地亦或有生者。葉如水萍，叢生，莖端有三葉，葉間生細黃花，實黑。夏月採葉用。初生嫩時，小兒多食之。南人用揩鋭石器，令白如銀，色光艷。

昨葉何草　味酸，平，無毒。主口中乾痛，水穀血痢，止血。生上黨屋上，如蓬初生，一名瓦松。夏採，日乾。

《唐本》注云：葉似蓬，高尺餘。遠望如松纔生年久瓦屋上。

今按：《別本》注云：今處處有，皆入藥用。生眉髮膏爲要爾。唐本先附。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：六月、七月採苗，日乾之。

《聖惠方》：治頭風白屑。用瓦松暴乾，燒灰淋汁熱洗頭，不過五七度。

葫頭

揚州



葫音弱**頭**　味辛，寒，有毒。主癰腫風毒，摩傅腫上。搗碎，以灰汁煮成餅，五味調和爲茹食，性冷，主消渴。生戟人喉出血。生吴、蜀。葉似由跋、半夏，根大如碗，生陰地，雨滴葉下生子。一名蒟蒻。又有斑杖，苗相似，至秋有花直出，生赤子。其根傅癰腫毒，甚。根如葫頭，毒猛，不堪食。今附。

禹錫等按：《日華子》云：斑杖是也。

者，虎杖之别名。即前條虎杖是也。

《圖經》云：文具天南星條下。

夏枯草

滁州



夏枯草　味苦、辛，寒、無毒。主寒熱，瘰癧，鼠瘻，頭瘡，破癥，散癭結氣，脚腫濕痹，輕身。一名夕句，一名乃東，一名燕面。生蜀郡川谷。四月採。土瓜爲之使。

《唐本》注云：此草生平澤。葉似旋復，首春即生，四月穗出，其花紫白似丹參花，五月便枯。處處有之。

《圖經》曰：夏枯草，生蜀郡川谷，今河、淮、浙州郡亦有之。冬至後生，葉似旋復。三月、四月開花，作穗紫白色，似丹參花，結子亦作穗。至五月枯，四月採。

《簡要濟衆》：治肝虚目睛疼，冷泪不止，筋脉痛及眼羞明怕日。補肝散：夏枯草半兩，香附子一兩，共爲末。每服一錢，臘茶調下。無時候服。

《衍義》曰：夏枯草，今又謂之鬱臭。自秋便生，經冬不瘁。春開白花，中夏結子，遂枯。古方丸燒灰，合緊面藥。初生嫩時，作菜食之，須浸洗，淘去苦水，治瘰癧鼠漏。

燕蓂草

無毒。主眠中遺溺不覺。燒令黑，研水，進方寸匕。亦主噦氣，此燕窠中草燒末，用酒服半錢。亦治丈夫。新補。見陳藏器、《日華子》。

《千金方》：治婦人無故尿血。胡若先發於心，已有汁者，以胡燕窠末和水塗之，治不可遲，遍身即害人死。

鴨跖草

味苦，大寒，無毒。主寒熱癉瘧，痰飲丁腫，肉癥澼滯，小兒丹毒，發熱狂癲，大腹痞滿，身面氣腫，熱痢，蛇犬咬，癰疽等毒。和赤小豆煮，下水氣濕痹，利小便。生江東、淮南平地。葉如竹，高一二尺。花深碧，有角如鳥嘴。北人呼爲雞舌草，亦名鼻斫草，吴人呼爲跖。跖、斫聲相近也。一名碧竹子。花好爲色。新補，見陳藏器、《日華子》。

山慈菰根

有小毒。主癰腫，瘡

癭，瘰癧，結核等，醋摩傅之。亦剥人面皮，除皯黯。生山中濕地。一名金燈花。葉似車前，根如慈菰。零陵間又有團慈菰，根似小蒜，所主與此略同。新補。見陳藏器及《日華子》。❼

《經驗方》：貼瘡腫。以山慈菰，一名鹿蹄草，取莖、葉搗，爲膏，入蜜貼瘡口上，候清血出效。

苘實



苘音頃**實**　味苦，平，無毒。主赤白冷熱痢，散飲之。吞一分，破癰腫。《唐本》注云：一作蕑字。人取皮爲索者也。

今按：《別本》注云：今人作布及索、蕑麻也。實似大麻子，熱結癰腫無頭，吞之則爲頭居穴。九月、十月採實，陰乾。唐本先附。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：樹生，高四尺，葉似苧，花黄，實殼如蜀葵，子黑。古方用根。八月採實。

《圖經》曰：苘實，舊不載所出州土，今處處有之。北人種以績布及打繩索。苗高四五尺或六七尺，葉似苧而薄，花黄，實帶殼如蜀葵，中子黑色。九月、十月採實，陰乾用。古方亦用根。

《楊氏産乳》：治赤白痢。苘麻子一兩，炒令香熟爲末，以蜜漿下一錢，不過再服。

赤車使者

主風冷邪疰，蠱毒癥瘕，五臟積氣。

《唐本》注云：苗似香菜、蘭香，葉、莖赤，根紫赤色，生溪谷之陰，出襄州。八月、九月採根，日乾。唐本先附。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：根紫如葡根，生荆州、襄州山谷，二月、八月採。

《藥性論》云：赤車使者，有小毒。能治惡風冷氣，服之悦澤皮肌，好顔色。

雷公云：赤車使者，元名小錦枝。凡使并粗搗用，七歲童子小便拌了，蒸令乾，更曬。每修事五兩，用小兒溺一益❽爲度。

狼跋子

有小毒。主惡瘡蝸疥，殺蟲魚。

陶隱居云：出交、廣，形扁扁爾。搗以雜米投水中，魚無大小，皆浮出而死。人用苦酒摩療疥亦效。

《唐本》注云：此今京下呼黄環子爲之，亦謂度谷，一名就葛。陶云出交、廣，今交、廣送人太常正是黄環子，非餘物爾。

今按：《別本》注云：味苦，寒。藤生，花紫色。

屋遊

味甘，寒。主浮熱在皮膚，往來寒熱，利小腸膀胱氣。生屋上陰處。八月、九月採。

陶隱居云：此瓦屋上青苔衣，剥取煮服之。

今按：《別本》注云：無毒。主小兒癇熱時氣，煩悶止渴。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：古瓦屋北陰青苔衣也。

地錦草

滁州



地錦草　味辛，無毒。主通流血脉，亦可用治氣。生近道田野，出滁州者尤良。莖葉細弱，蔓延於地。莖赤，葉青紫色，夏中茂盛。六月開紅花，細實。取苗、子用之。絡石注有地錦，是藤蔓之類，雖與此名同，而其類全別。新定。

《圖經》曰：地錦草，生滁州及近道田野中。味辛，無毒。主通流血脉，亦治氣。其苗葉細弱，蔓遍地。莖赤，葉青赤，中夏茂盛。六月開紅花，細實。今醫家取苗、子用之。《本經》絡石條注中有地錦，與此同名，而別是一類也。

《經驗方》：治臟毒赤白。地錦草採得後，洗，暴乾爲末，米飲下一錢，立效。

敗船茹音如　平。主婦人崩中，吐痢血不止。

陶隱居云：此是大輻步典切除他盍切刮竹茹以捏直萌切漏處者。取乾煮之，亦燒作屑服之。

《千金方》：治婦人遺尿，不知出時。船故茹爲末，酒調服三錢。

《子母秘録》：治無故遺血溺。執❾中故竹茹乾末，酒服三錢匕，日三服。

燈心草　味甘，寒，無毒。根及苗主五淋。生煮服之。生江南滁州⓫，叢生。莖圓，江南⓫長直。人將爲席，敗席煮服更良。今附。

《經驗方》：治小兒夜啼。用燈心草燒灰，塗乳上與之。

《勝金方》：治破傷。多用燈心草爛嚼和唾貼之，用⓬帛裹，血立止。又方：治小蟲蟻入耳，挑不出者。以燈心浸油釣出蟲。

《衍義》曰：燈心草，陝西亦有。蒸熟，乾則拆取中心穰然燈者，是謂之熟草；又有不蒸者，但生乾剥取者，名生草。入藥宜用生草。

五毒草　味酸，平，無毒。根主癰疽，惡瘡毒腫，赤白游軫⓫，蟲蠶蛇犬咬，并醋摩傅焙⓮上，亦搗莖、葉傅之。恐毒入腹，亦煮服之。生江東平地。花、葉如蕎麥，根緊硬⓯似狗脊。一名五蕺，一名蛇罔。又別有蠶罔草，如苧麻與蕺同名也。新補。見陳藏器。

鼠麴草　味甘，平，無毒。調中益氣，止泄除痰，壓時氣，去熱嗽。雜米粉作糗，食之甜美。生平崗熟地，高尺餘，葉有白毛，黄花。《荆楚歲⓰時記》云：三月三日取鼠麴汁，蜜和爲粉，謂之龍舌餅，以壓時氣。山南人呼爲香

茅，取花雜櫸皮染褐，至破猶鮮。江西人呼爲鼠耳草。新補。見陳藏器、《日華子》。

列當　味甘，温，無毒。主男子五勞七傷，補腰腎，令人有子，去風血。煮及浸酒服之。生山南岩石上，如藕根。初生掘取陰乾。亦名栗當。一名草蓯蓉。今附。

《食醫心鏡》：主興陽事。栗當二斤，一名列當。搗篩末，以酒一斗浸經宿，隨性飲之。

馬勃　味辛，平，無毒。主惡瘡，馬疥。一名馬庀。生園中久腐處。

陶隱居云：俗人呼爲馬屁勃。紫色虚軟，狀如狗肺，彈之粉出。傅諸瘡，用之甚良也。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：此馬庀菌也。虚軟如紫絮絮，彈之紫塵出。生濕地及腐木上，夏秋採之。

《衍義》曰：馬勃，此唐韓退之所謂牛溲、馬勃，俱收并蓄者也。有大如斗者，小亦如升杓。去膜，以蜜揉拌，搗傅之。絞汁服，少以水調，呷，治喉閉咽痛。

屐音劇**屩**音變　鼻繩灰水服主噎哽，心痛胸滿。

今按：《別本》注云：屐屩，江南有之，北人不識，以桐木爲屐及屩也。用蒲爲蔥，用麻穿其鼻也，久著脚者堪入藥用。唐本先附。

禹錫等按：《蜀本圖經》云：取著經久遠欲爛斷者，水服之良。

質汗　味甘、温，無毒。主金瘡傷折，瘀血内損，補筋肉，消惡血，下血氣，婦人産後諸血結腹痛，内冷不下食。并酒消服之。亦傅病處。出西蕃，如凝血，蕃人煎甘草、松泪、櫻乳、地黄并熱血成之。今附。

陳藏器云：蕃人試藥，取兒斷一足，以藥内口中，以足蹋之，當時能走者，至良。

水蓼　主蛇毒，搗傅之。絞汁服，止蛇毒入内心悶。水煮漬捋脚，消氣腫。

蓧草　味甘，大寒，無毒。主濕痹，消水氣。合赤小豆煮食之，勿與鹽。主脚氣，頑痹，虚腫，小腹急，小便赤澀，搗葉傅毒腫。又絞取汁服之。主消渴。生水田中。似結縷，葉長，馬食之。《爾雅》云：蓧，蔓於。注云：生水中，江東人呼爲苗。《證俗》云：蓧，水草也。新補。見陳藏器。

《衍義》曰：蓧草，《爾雅》曰：苗音猶，蔓于。《左傳》亦曰：一薰一蓧，十年尚猶有臭者。是此草。

敗芒箔　無毒。主産婦血滿腹脹痛，血渴，惡露不盡，月閉，止⑰好血，下惡血，去鬼氣疰痛癥結，酒煮服之。亦燒爲末酒下，彌久著烟者佳。今東人作箔，多草爲之。《爾雅》云：芒似茅，可以爲索。新補。見陳藏器。

狗舌草　味苦，寒，有小毒。主蠱疥瘙瘡，殺小蟲。

《唐本》注云：葉似車前，無文理，抽莖，花黄白細，叢生渠塹濕地。

今按：《別本》注云：疥瘙風瘡，并皆有蟲。爲末和塗之即差。四月、五月採莖，暴乾。唐本先附。

海金沙



黔州

海金沙　主通利小腸。馬牙消、蓬沙共療傷寒熱狂。出黔中郡。七月收採。生作小株，才高一二尺。收採全科於日中暴之，令小乾，紙襯，以杖擊之，有細沙落紙上，旋收之，且暴且擊，以沙盡爲度。用之或丸或散。新定。

《圖經》曰：海金沙，生黔中山谷，湖南亦有。初生作小株，高一二尺。七月採得，日中暴令乾，以紙襯，擊取其沙，落紙上，旋暴旋擊，沙盡乃止。主通利小腸。亦入傷寒狂熱藥。今醫治小便不通，臍下滿悶方：海金沙一兩，臘面茶半兩，二味搗碾令⑱細。每服三錢，煎生薑甘草湯調下，服無時，未通再服。

萱草



萱草根　涼，無毒。治沙淋，下水氣，主酒疸，黄色通身者。取根搗絞汁服，亦取嫩苗煮食之。又主小便赤澀，身體煩熱。一名鹿蔥。花名宜男。

《風土記》云：懷妊婦人佩其花，生男也。新補。見陳藏器、《日華子》。

《圖經》云：萱草，俗謂之鹿蔥，處處田野有之。味甘而無毒。主安五臟，利心志，令人好歡樂，無憂，輕身明目。五月採花，八月採根用。今人多採其嫩苗及花跗作菜⑲。云：利胸隔甚佳。

嵇康《養生論》云：合歡蠲忿，萱草忘憂心中⑳。

《衍義》曰：萱草根，洗净研汁一大盞，生薑汁半盞相和，時時細呷，治大熱衄血。

格注草　味辛、苦，温，有大毒。主蠱疰諸毒疼痛等。生齊、魯山澤。

《唐本》注云：葉似蕨，根紫色，若紫草根。一株有二十許，二月、八月採根，五月、六月採苗，日乾。唐本先附。

《唐本餘》注云：《圖經》出齊州、兖州山谷間。

鷄窠中草 主小兒白禿瘡。和白頭翁花燒灰，臘月猪脂傅之。瘡先以酸泔洗，然後塗之。又主小兒夜啼，安席下，勿令母知。新補。見陳藏器、《日華子》。

《千金方》：治産後遺尿。故鷄窠中草燒作末，酒服二錢匕，即差。

鷄冠子 凉，無毒。止腸風瀉血，赤白痢，婦人崩中帶下，入藥炒用。新補。見陳藏器、《日華子》。

地椒 味辛，温，有小毒。主淋煠腫痛，可作殺蛀蟲藥。出上黨郡。其苗覆地蔓生，莖葉甚細，花作小朵，色紫白，因舊莖而生。新定。

草三棱根 味甘，平、温，無毒。療産後惡血，通月水，血結，墮胎，破積聚癥瘕，止痛利氣。一名鷄爪三棱。生蜀地。二月、八月採。今附。

合明草 味甘，寒，無毒。主暴熱淋，小便赤澀，小兒瘛病，明目，下水，止血痢，搗絞汁服。生下濕地，葉如四出花，向夜即葉合。新補。見陳藏器。

鹿藥 味甘，温，無毒。主風血，去諸冷，益老起陽。浸酒服之。生姑藏以西。苗、根并似黄精。根，鹿好食。今附。

敗天公 平。主鬼疰精魅。

陶隱居云：此人所戴竹笠之敗者也。取上竹燒，酒服之。

一十一種陳藏器餘

毛莨 鈎吻注陶云：鈎吻或是毛莨。蘇云：毛莨，是有毛石龍芮也。《百一方》云：菜中有水莨，葉圓而光，有毒。生水旁，蟹多食之。蘇云：又注，似水莨，無毛，其毛葭似龍芮而有毒也。

陰命 鈎吻注陶云：有一物名陰命，赤色，著木，懸其子。生海中，有毒。又云：海薑，生海中，赤色，狀如龍芮，亦大毒，應是此也，今無的識之者。

毒菌 地漿注陶云：山中多有毒菌，地漿解之。地生者爲菌；木生者爲檽。江東人呼爲蕈。《爾雅》云：中馗菌。注云：地蕈子也。或云地鷄，亦云獐頭。夜中光者有毒；煮不熟者有毒；煮訖照人無影者有毒；有惡蟲鳥從下過者有毒；欲爛無蟲者有毒；冬春無毒，及秋夏有毒者，爲蛇過也。

草禹餘糧 注陶云：南人又呼平澤中一藤如菝葜爲餘糧。言禹採此當糧，根如盞連綴，半在土上，皮如茯苓，肉赤，味澀，人取以當穀，不饑，調中止泄，健行不睡。云昔禹會諸侯，棄糧於地，化爲此草，故名餘糧。今多生海畔山谷之地。

鼠蓑草 莎草注陶云：别有鼠蓑

草，治體異此。有名無用條有蓑草，味苦，寒。主温瘧寒熱，酸斯利氣。生淮南山谷，即此也。

廉薑　杜若注陶云：若似廉，按廉薑，熱。主胃中冷，吐水不下食。似薑，生嶺南、劍南，人多食之。

注陶云：今俗按鹿目云：出嶺南，如鹿目，食之發冷痰，餘別無功。

草石蠶、蟲石蠶

用草根，黑色，按草石蠶，生高山石上，根如箸，上有毛，節如蠶，葉似卷柏。山人取浸酒，除風破血，主溪毒，煮食之。《本經》從蟲部出，復有蟲石蠶，已出《拾遺》。

諸草有毒

瓜瓠正苦有毒。檐溜滴著菜有毒。堇黄花害人。芹赤葉害人。菰首蜜食下痢。生葱不得雜白犬肉食之，令人九竅流血。食戎葵并鳥肉，令人面無顏色。食葵發狂犬咬。食葫葱、青魚令人腹生蟲。薤不得和牛肉食，成癥瘕瘕疾。婦人妊娠食乾薑，令胎肉消。生葱和鷄子食變嗽。蓼齏食生食，令氣奪乏，令陰痿。九月食霜下瓜，血必冬發。三月不得食陳菹，夏熱病發惡瘡。瓠牛踐苗子即苦。

漆姑草　杉木注陶云：葉細細，多生石間。按漆姑草，如鼠迹天㉑，生階墀間陰處，氣辛烈。主漆瘡，挼碎傅之，熱更易。亦主溪毒瘡。蘇云：此蜀羊泉，羊泉是大草非細者，乃同名耳。

鹿目　豆蔻注陶云：鹿目小冷。

梨豆　蚺蛇注陶云：蛇膽如梨豆，生江南。蔓如葛，子如皂莢子，作狸首文，故名梨豆。《爾雅》云：慮，涉子。人炒食之，一名虎涉，別無功。

圖經衍義本草卷之十九

---

❶下：原作『上』，據晦明軒本改。下『之下』二字原脱，據晦明軒本補。
❷陵：原作『棱』，據晦明軒本改。
❸音燼：原作一『音』字，在『蓋』字上，據晦明軒本改。
❹竹：原與下『薄』字互窳，據晦明軒本移正。
❺食：晦明軒本作『瘡』。
❻汁：原作『外』，據晦明軒本改。
❼略：原作『各』，據晦明軒本改。
❽益：晦明軒本作『溢』。按疑當作『鎰』。
❾執：晦明軒本作『船』。
❿滁州：晦明軒本作『濕地』。
⓫江南：晦明軒本作『細而』。
⓬用：原作『州』，據晦明軒本改。
⓭軫：晦明軒本作『疹』。
⓮焙：晦明軒本作『瘡』。
⓯緊硬：原作『桔梗』，據晦明軒本改。
⓰歲：原脱，據晦明軒本補。
⓱止：原作『上』，據晦明軒本改。
⓲令：原作『合』，據晦明軒本改。
⓳菜：晦明軒本作『菹』。
⓴心中：晦明軒本無此二字。
㉑天：晦明軒本作『大』。

圖經衍義本草卷之二十

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

木部上品

桂　味甘、辛，大熱，有小毒。主温中，利肝肺氣，心腹寒熱，冷疾，霍亂轉筋，頭痛腰痛，出汗，止煩止唾，咳嗽鼻齆，能墮胎，堅骨節，通血脉，理疏不足，宣導百藥，無所畏。久服神仙不老。生桂陽。二月、八月、十月採皮，陰乾。得人參、麥門冬、甘草、大黄、黄芩，調中益氣。得柴胡、紫石英、乾地黄，療吐逆。

《圖經》曰：菌桂，生交趾山谷；牡桂，生南海山谷；桂，生桂陽。舊經載此三種之異，性味、功用亦別，而《爾雅》但言梫木桂一種。郭璞云：南人呼桂，厚皮者爲木桂。蘇恭以謂牡桂即木桂，及單名桂者是也。今嶺表所出，則有筒桂、肉桂、桂心、官桂、板桂之名，而醫家用之罕有分別者。







桂

《藥性論》云：桂心，右❶亦名紫桂。殺草木毒，忌生葱。味苦、辛，無毒。主治九種心痛，殺三蟲，主破血，通利月閉，治軟脚，痹不仁，胞衣不下，除咳逆、結氣、擁腫，止腹内冷氣，痛不可忍，主下痢，治鼻息肉。

陶隱居云：按《本經》惟有菌、牡二桂，而桂用體，大同小異。今俗用便有三種。以半卷多脂者，單名桂，入藥最多，所用悉與前説相應。《仙經》并有三桂，常服食，以葱涕合和雲母，蒸化爲水者，正此種爾。今廣州者好，湘州、始興、桂陽縣即是小桂，亦有而不如廣州者，交州、桂州者，形段小，多脂肉，亦好。

陳藏器云：菌桂、牡桂、桂心，已上三色并同是一物。按桂林、桂嶺，因桂爲名，今之所生，不離此郡。從嶺以南際海，盡有桂樹，惟柳、象州最多。味既辛烈，皮又厚堅，土❷人所採，厚者必嫩，薄者必老。以老薄者爲一色，以厚嫩者爲一色。嫩既辛香，兼又筒卷。老必味淡，自然板薄。板薄者，即牡桂也，以嫩而易卷。

《日華子》云：桂心，治一切風氣，補五勞七傷，通心❸竅，利關節，益精明目，暖腰膝，破痃癖癥瘕，消瘀血，治風

痹骨節攣縮，續筋骨，生肌肉。

雷公云：凡使，勿薄者，要紫色厚者，去上粗皮，取心中味辛者使。每斤大厚紫桂，只取得五兩，取有味厚處，生用。如未用，即用重密熟絹❹并紙裹，勿令犯風。其州土只有桂草，無桂心。用桂草煮丹陽木皮，遂成桂心。凡使，即單搗用之。

《聖惠方》：治風頭痛，每欲天陰雨風先發者。用桂心一❺兩爲末，以酒調如膏，用傅頂上并額角。又方：治九種心痛妨悶。用桂心等分爲末，以酒一大盞，煎至半盞，去滓，稍熱服，立效。又方：治寒疝，心痛，四肢逆冷，全不欲食。用桂心一兩去皮，搗羅爲散。不計時候，熱酒調下一錢匕。又方：治産後惡血冲心痛，氣悶欲絶。用桂心二兩，搗羅爲散，狗膽汁和丸如櫻桃大。不計時候，熱酒磨下二丸。

《外臺秘要》：療小兒睡中遺尿不自覺。桂末、雄鷄肝等分，搗丸如小豆大。温水下，日三。

《千金方》：治中風，面目相引偏僻，牙拘❻急，舌不可轉。桂心以酒煮取汁，故布蘸揜病上，正即止，左喎搶右，右喎搶左，常用大效。又方：治卒中惡心痛。桂心八分，㕮咀，以水四升，煮取一升，分二服。

《肘後方》：治心腹俱脹痛，短氣欲死，或已絶。桂二兩，切，以水一升二合，煮取八❼合，去滓，頓服。又方：治中風，四肢逆冷，吐清水，宛轉啼呼者。取二兩㕮咀，以水三升，煮取二升，去滓適寒温盡服。

《梅師方》：蜀椒閉口者有❽毒，誤食之，便氣欲絶，或下白沫，身體冷急。煎桂汁服之，多飲冷水一二升，忽食飲吐漿，煎濃豉汁頓服之。又方：治産後血泄不禁止，餘血彌痛兼塊。桂心、乾薑等分，爲末，空心酒調服方寸匕。

《抱朴子》云：桂可以合葱涕蒸作水，亦可以竹瀝合餌之，亦可以龜腦和而服之，七年，能步行水上，長生不死。又云：趙他子服桂二十年，足下毛生，日行五百里，力舉千斤。

牡桂　味辛，温，無毒。主上氣咳逆，結氣，喉痹，吐吸，心痛，脅風脅痛温筋通脉，止煩出汗，利關節，補中益氣。久服通神，輕身不老。生南海山谷。

菌桂　味辛，温，無毒。主百病，養精神，和顔色，爲諸藥先聘通使。久服輕身不老，面生光華，媚好常如童子。生交趾、桂林山谷岩崖間，無骨，正圓如竹。立秋採。

《圖經》曰：文具桂條。

《列仙傳》曰：范蠡好食桂，飲水討藥，人世世見之。又曰：桂父，象林人，常服桂皮、葉，以龜腦和服之。韓終《采藥詩》曰：暗河之桂，實大如粟❾，得而食之，後天而老。

《别説》云：今交、廣商人所販，及醫家見用，唯陳藏器一説最近。然筒厚實，氣味重者，宜入治臟及下焦藥；輕薄者，宜入治頭目發散藥。故《本經》以菌桂養精神，以牡桂利關節，仲景《傷寒論》發汗用桂枝，桂枝者枝條，

非身幹也。取其輕薄而能發散。又有一種柳桂，乃桂之嫩小枝條也。尤宜入上焦藥。

《衍義》曰：桂，大熱。《素問》云：辛甘發散爲陽。故漢張仲景桂枝湯，治傷寒表虛，皆須此藥，是專用辛甘之意也。本草第一又云：療寒以熱藥。故知三種之桂，不取菌桂、牡桂者，蓋此二種，性止温而已，不可以治風寒之病。獨有一字桂，《本經》言甘、辛，大熱，此正合《素問》辛甘發散爲陽之説，尤知菌、牡二桂不及也。然《本經》止言桂，仲景又言桂枝者，蓋亦取其枝上皮，其木身粗厚處，亦不中用。今又謂之官桂，不知緣何而立名？慮後世爲別物，故書之。又有桂心，此則諸桂之心，不若一字桂也。

松脂　味苦、甘，温，無毒。主疽，惡瘡，頭瘍，白禿，疥瘙風氣，安五臟，除熱，胃中伏熱，咽乾，消渴，及風痹死肌。煉之令白。其赤者主惡痹。久服輕身，不老延年，一名松肪。



松脂

生太山山谷。六月採。

松實：味苦，温，無毒。主風痹寒氣，虛羸少氣，補不足。九月採，陰乾。

松葉：味苦，温。主風濕瘡，生毛髮，安五臟，守中，不饑延年。禹錫等按：《日華子》：松葉，無毒。

松節：温。主百節久風，風虛，脚痹疼痛。

松根白皮：主辟穀不饑。

《圖經》曰：松脂，生太山山谷，今處處有之。其用以通明如薰陸香顆者爲勝。道人服餌，或合茯苓、松柏實、菊花作丸，皆先煉治。其法用大釜加水置甑，用白茅藉甑底，又加黄砂於茅上，厚寸許可矣。然後布松脂於上，炊以桑薪，湯若減即添熱水，常令滿。候松脂盡入釜中，乃出之，投於冷水，既凝又蒸，如此三過，其白如玉，然後入藥，亦可單服。其實及根白皮，古亦有服食法，但今松實多作果品，餘不聞堪入藥。其花上黄粉名松黄，山人及時拂取，作湯點之甚佳，但不堪停久。

陶隱居云：採煉松脂法，并在服食方中，以桑灰汁或酒煮軟，挼内寒水中數十過，白滑則可用。其有自流出者，乃勝於鑿樹及煮用膏也。其實不可多得，推⑩葉止是斷穀所宜，細切如粟，以水及麵飲服之。亦有陰乾搗爲屑，丸服者。人患惡病，服此無不差。比來苦脚弱人，釀松節酒亦皆愈。松、柏皆有脂潤，又凌冬不凋，理爲佳物，但人多輕忽近易之爾。

禹錫云：按《藥性論》：松脂，使，味甘，平。殺蟲用之。主耳聾，牙有蚘孔，少許咬⑪之不落，蟲自死，能貼諸瘡膿血，煎膏生肌止痛，掏風。

蕭炳云：又有五葉者，一叢五葉如釵，名五粒松，道家服食絶粒，子如巴豆，新羅往往進之。

《日華子》云：松脂，潤心肺，下氣，除邪，煎膏治癆爛，排膿。又云：松葉，暖，無毒。炙署凍瘡，風濕瘡佳。又云：松節，無毒。治脚軟，骨節風。又云：松根白皮，味苦，温，無毒。補五勞，益氣。

《聖惠方》：絶穀升仙不食法：取松實搗爲膏，酒調下三錢，日三。則不饑渴飲水，勿食他物，百日身輕，日行五百里。又方：服松葉，令人不老，身生緑毛，輕身益氣，久服不已。絶穀不饑渴，松葉不以多少，細切更研，每日食前以酒調下二錢，亦可粥汁服之。初服稍難，久自便矣。

《外臺秘要》：《集驗》療齲齒。取松脂如錐，注齲孔内，須臾齲蟲緣松脂出。《梅師方》同。又方：治惡風疾。松脂煉，投冷水中，二十遍，蜜丸。服三兩，饑即服之，日三，鼻柱斷離者，二百日瘥。斷鹽及房室。又方：療歷節諸風，百節酸痛不可忍。松脂三十斤，煉五十遍。不能五十遍，亦可二十遍。用以煉酥三升温和松脂三升熟，攪令極稠。旦空腹以酒服方寸匕，日三。慎血腥、生冷、鮓物、果數食麵粥爲佳，愈。又方：松節酒，主歷節風，子，百瘥。又方：切松葉如末，酒服方寸匕，日三，四肢疼痛。松脂二十斤，酒五斗，漬三七日，服一合，日五六服。

《千金方》：治脚氣十二風痹，不能行，服更生散數劑及衆療不得力，服此一劑，便能行遠，不過兩劑。松葉酒：松葉六十斤，細剉叹咀，以水四石，煮取四斗九升，以釀五斗米如常法，别煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀，封頭七日，發，澄。飲之取醉，得此酒力者甚衆。

《梅師方》：治耳久聾。松脂三兩，煉巴豆一兩，和，熟搗可丸，通過以薄綿裹，内耳孔中，日一度易。

孫尚藥：治脚轉筋，疼痛攣急者。松脂二兩，細剉如米粒，乳香一錢，右件藥用銀、石器内慢火炒令焦，只留一分性，出火毒研細。每服一錢至二錢，熱木瓜酒調下。應是筋病，皆治之。

《鬼遺方》：治疥癬。松膠香研細，入少輕粉，凡疥癬上先用油塗了，搗取汁，銅器盛之，日煎令可日取之，

槐實　味苦、酸、鹹，寒，無毒。主五内邪氣熱，止涎唾，補五⓭傷，五痔，火瘡，婦人乳瘕，子臟急痛。以七月七

槐實



作丸，大如鼠屎，内竅中，三易乃愈。又墮胎。久服明目，益氣，頭不白，延年。枝，主洗瘡，及陰囊下濕癢。皮，主爛瘡。根，主喉痹，寒熱。生河南平澤。可作神燭。景天爲使。

《圖經》曰：槐實，生河南平澤，今處處有之。其木有極高大者。謹按：《爾雅》槐有數種，葉大而黑者名櫰，槐晝合夜開者名守宫槐，葉細而青緑者，但謂之槐，其功用不言有别。四月、五月開花，六月、七月結實，七月七日採嫩實，搗取汁作煎，十月採老實入藥。皮、根採無時。今醫家用槐者最多。春採嫩枝，煅爲黑灰以揩齒去蚛。燒青枝取瀝以塗癬。取花之陳久者，篩末飲服以治下血。折取嫩房角作湯以當茗。主頭風，明目，補腦。煮白皮汁以治口齒及下血，水令[14]黑子以變白髮。木上耳，取末服方寸匕，治大便血及五痔，脱肛等。皆常用有以[16]效者。

《藥性論》云：槐子，臣[16]，主治大[18]熱，難産。皮煮汁，淋陰囊墜腫氣痛。又云：槐白皮，味苦，無毒。能主治口齒風熱[18]䘌血。以煎漿水煮含之。煎淋浴男子陰疝卵腫。

陶隱居云：槐子，以相連多者爲好，十月前[18]採之。新盆盛，合泥百日，皮爛爲水，核如大豆。服之令腦滿，髮不白而長生。今處處有之。云七月取其子，未堅固，搗絞取汁。

《日華子》云：槐子，治丈夫、婦人陰瘡濕癢，催生。吞七枚。又云：槐皮，平，治中風皮膚不仁，喉痹，浸洗五痔并一切惡瘡，婦人産門癢痛及湯火瘡。煎膏，止痛長肉，消癰腫。

雷公云：凡採得後，去單子并五子者，只取二子、三子。以用銅錘捶破，烏牛乳浸一宿，蒸過用。

《千金方》：療胎赤眼。取槐木枝如馬鞭大，長二尺，作二段，齊頭麻油一匙置銅鉢中，旦使童子一人以其木研之，全瞑止，令仰卧，以塗向眼眦，日三度，瘥。

《千金翼方》：療腸痔，每大便常下血。槐樹上木耳取末，飲服方寸匕，日三服。

《百一方》：治中風，身直不得屈伸反覆者。取槐皮黄白者切之，以酒或水六升，煮取二升，去滓，適寒温，稍稍服之[20]。

《經驗方》：治下血。槐花、荆芥穗等分爲末，酒調下一錢匕。

《梅師方》：治痔有蟲咬穀道癢，或下膿血多。取槐白皮濃煮汁，安盆坐湯之虚其穀道，冷更暖，良久欲大便，當蟲出，不過三度即愈。如用末，綿裹内下部。

《食醫心鏡方》：治野鷄痔下血、腸風，明目方，嫩槐葉一斤，蒸如造炙法，取葉碾作末，如茶法煎呷之。

《廣利方》：治妊娠難産令易方。水吞槐子七枚，即出。

《廣濟方》：療牙齒疼痛。取槐樹白皮一握切，以酢一升煮，去滓，用㉑鹽少許，適寒温含之，日三易。

《子母秘録》：日月未足而欲産者。槐木東枝，令孕婦手把，即易産。

《産寶方》：療崩中不止，不問年月遠近方：槐耳燒作灰爲末，以酒服方寸匕。

《太清草木方》：槐者，虚星之精，以十月上巳日採子服之。去百病，長生通神。

《衍義》曰：槐實，止言實，今當分爲二。實本出莢中，若搗莢作煎者，當言莢也。莢中子，大如豆，堅而紫色者，實也。今本條不析出莢與莢中子，義㉒其用各別，皆疏導風熱。

槐花　味苦，平，無毒。治五痔，心痛，眼赤，殺腹臟蟲及熱，并腸風瀉血，赤白痢，并炒服。葉，平，無毒。煎湯治小兒驚癇，壯熱，疥癬及丁腫。皮、莖同用。

《圖經》曰：見槐實條下。

《簡要濟衆》：治婦人漏下血不絶。槐花鵝不以多少燒作灰，細研。食前温酒服二錢匕。



枸杞　味苦，寒。根大寒，子微寒，無毒。主五内邪氣，熱中消渴，周痹，風濕，下胸脅氣，客熱頭痛，補内傷大勞嘘吸，堅筋骨，强陰，利大小腸。久服堅筋骨，輕身不老，耐寒暑。一名杞根，一名地骨，一名羊乳，一名却暑，一名地輔，一名枸忌，一名地骨，一名西王母杖。生常山平澤及諸丘陵阪岸。冬採根，春夏採葉，秋採莖、實，陰乾。

《圖經》曰：枸杞，生常山平澤及丘陵阪岸，今處處有之。春生苗，葉如石榴葉而軟薄，堪食，俗呼爲甜菜。其莖幹高三五尺，作叢。六月、七月生小紅紫花。隨便結紅實，形微長如棗核。其根名地骨。春夏採葉，秋採莖、實，冬採根。謹按《爾雅》云：枸杞，檵。郭璞云：今枸杞也。《詩·小雅·四牡》云：集於苞杞。陸機疏云：一名苦杞，一名地骨。春生，作羹茹微苦。其莖似莓。子秋熟，正赤。莖、葉及子服之，輕身益氣。

《藥性論》云：枸杞，臣，子、葉同。能補益精血不足，易顏色，變白，明目，安神，令人長壽。葉和羊肉作羹，益人，甚除風，明目。若渴，可煮作飲，代茶飲之。白色無刺者良。

陶隱居云：今出堂邑，而石頭烽大㉒樓下最多。其葉可作羹，味小苦。俗諺云：去家千里，勿食蘿摩、枸杞。此言其補益精氣，强盛陰道也。蘿摩一名苦丸，葉厚大，作藤生，摘亦有白乳汁，人家多種之。可生啖，亦蒸煮食也。枸杞根、實，爲服食家用，其説甚美，仙人之杖，遠有旨乎。

禹錫云：按《爾雅疏》云：杞，一

名枸檵。郭璞云：今枸杞也。《詩·四牡》云：集於苞杞。陸機云：一名苦杞，一名地骨。春生作羹茹，微苦，其莖似莓，子秋熟，正赤，莖、葉及子，服之輕身益氣爾。

《抱朴子》云：家柴一名托盧，或名天精，或名却老，又名地骨。

《日華子》云：一名地仙苗，除煩益志，補五勞七傷，壯心氣，去皮膚、骨節間風，消熱毒，散瘡腫。

雷公云：凡使根，掘得後使東流水浸，以物刷上土了，然後待乾，破去心，用熟甘草湯浸一宿，然後焙乾用。其根若似物命形狀者上，春食葉，夏食子，秋冬食根并子也。

《食療》云：寒，無毒。葉及子并堅筋能老，除風，補益筋骨，能益人去虛勞。根主去骨熱，消渴。葉和羊肉作羹尤善益人。代茶法煮汁飲之，益陽事，能去眼中風癢赤膜，搗葉汁點之良。

《千金方》：治肝虛或當風眼泪等新病方。枸杞子最㉔肥者二升搗破，內絹袋置罐中，以酒一斗浸訖，密封勿泄氣，三七日，每旦開服，任往勿醉㉕。

《經驗方》：金髓煎枸杞子，不計多少。逐日旋採摘紅熟者，去嫩蒂子揀令潔淨，便以無灰酒於淨器浸之，須是瓮，用酒浸以兩月爲限，用蠟紙封閉緊密，無令透氣，候日數足漉出，於新竹器內盛貯，旋於沙盆中研令爛細，然後以細布濾過，候研濾皆畢，去滓不用，即并前漬藥酒及濾過藥汁攪勻，量銀鍋內多少升斗作番次，慢火熬成膏，切須不住手用物攪，恐粘底不勻，候稀稠得所，然后用淨瓶器盛之，勿令泄氣。每早辰温酒下二大匙頭，夜卧服之，百日中身輕氣壯，積年不廢，可以羽化。

《經驗後方》：治五勞七傷，庶事衰弱。枸杞葉半斤切，粳米二合，以石器㉖中相和，煮作粥，以五味末、葱白等調和食之。

孫真人《備急方》：治滿口齒有血。枸杞根爲末，煎湯，嗽後吃。又治上膈吐血妙。

《沈存中方》：陝西枸杞，長一二丈，其圍數寸，無刺，根皮如厚朴，甘美異於諸處，生子如櫻桃，全少核，暴乾如餅，極爛有味。

《外臺秘要方》：療眼暴天行腫癢痛。地骨皮三斤，水三斗，煮取三升，絞去滓，更内鹽二兩，煎取二升，傅目。或加乾薑二兩。

《治疽方》：凡患癰疽惡瘡，出膿血不止者。取地骨皮不拘多少净洗，先刮上面粗皮留之，再刮取細白穰，取粗皮同地骨一處煎湯，淋瘡上令膿血盡，以細穰貼之，有效。

《衍義》曰：枸杞當用梗皮，地骨當用根皮，枸杞子當用其紅實，是一物有三用。其皮寒，根大寒，子微寒，亦三等。此正是《孟子》所謂：性由杞柳之杞。後人徒勞分別，又爲之枸棘，茲强生名耳。凡杞，未有無棘者，雖大至有成架，然亦有棘。但此物小則多刺，大則少刺，還如酸棗及棘，其實皆一也。今人多用其子，直爲補腎藥，是曾未考究經意。當更量其虛實冷熱用

之。



乾州柏實



柏實　味甘，平，無毒。主驚悸，安五臟，益氣，除風濕痹，療恍惚，虛損吸吸，歷節腰中重痛，益血，止汗。久服令人潤澤美色，耳目聰明，不饑不老，輕身延年。生太山山谷。柏葉尤良。柏葉，味苦，微温，無毒。主吐血、衄血，痢血，崩中赤白，輕身益氣，令人耐寒暑，去濕痹，止饑。四時各依方面採，陰乾。柏白皮，主火灼，爛瘡，長毛髮。牡蠣及桂、瓜子爲之使，畏菊花、羊蹄、諸石及麵麪。

《圖經》曰：柏實，生太山山谷，今處處有之，而乾州者最佳。三月開花，九月結子，候成熟收採，蒸暴乾，春礪取熟人子用。其葉名側柏。密州出者尤佳。雖與他柏相類，而其葉皆側向而生，功效殊別。採無時。張仲景方療吐血不止者，柏葉湯主之。青柏葉一把，乾薑三片，阿膠一挺，炙，三味以水二升，煮一升，去滓，別絞馬通汁一升相和，合煎取一升，綿濾，一服盡之。

《藥性論》云：柏子仁，君，惡菊花，畏羊蹄草，味甘，辛。能治腰腎中冷，膀胱冷，濃宿水，興陽道，益壽，去頭風，治百邪鬼魅，小兒驚癇。又云側柏葉，君，與酒相宜，止尿血。味苦、辛，性行[27]。治冷風，歷節疼痛。

《唐本》注云：柏枝節煮釀酒，主風痹，歷節風，燒取末，療瘡疥及癩瘡良。今出陝州、宜州爲勝。

《日華子》云：柏子仁，治風，潤皮膚，此是側柏子，入藥微炒用。

雷公云：凡使，先以酒浸一宿，至明漉出，曬乾，却用黄精自然汁於日中煎，手不住攪，若天久陰，即於鐺中著水，用瓶器盛柏子仁，著火緩緩煮成煎爲度。每煎三兩柏子仁，用酒五兩浸乾爲度。

《聖惠方》：治時氣瘴疫。用社中西南柏樹東南枝，取曝乾，搗羅爲末，以水調下一錢匕。日三四服。《肘後方》同。又方：治大風疾，令眉鬚[27]再生。用側柏葉九蒸九暴，搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大。日三服，夜一服，熟水下五丸、十丸，百日即生。

《經驗後方》：治霍亂轉筋。先以裹脚，然後以柏樹木細剉，煮湯淋之。

《孫真人枕中記》云：採松柏法：嘗以三月、四月採新生松葉，可長三四寸許，并花蕊，取陰乾，細搗爲末。其柏葉，取深山岩谷中，採當年新生，可

長三二寸者，陰乾，細搗爲末，用白蜜爲丸如小豆大。常以月一十五日，日未出時，燒香東向，手持藥八十一丸，以酒下。服一年，延十年命；服二年，延二十年命。欲得長肌肉，加大麻、巨勝；欲心力壯健者，加茯苓、人參。此藥除百病，益元氣添五臟六腑，清明耳目，强壯不衰老，延年益壽，神驗。用七月七日露水丸之，更佳。服時乃咒曰：神仙真藥，體合自然。服藥入腹，天地齊年。咒訖服藥。斷諸雜肉、五辛。最切忌，慎之。

《姚氏方》：治鼠瘻腫核痛，未成膿。以柏葉傅著腫上，熬鹽著腫上熨，令熱氣下，即消。

《抱朴子》：漢武㉙帝時，獵者於終南山見一人，無衣服，身皆生黑毛。跳坑越澗如飛，乃密伺其所在，合圍取得，乃是一婦人。問之：言我是秦之宮人，關東賊至，秦王出降，驚走入山，饑無所食，泊欲饑死。有一老公，教我吃松柏葉、實，初時苦澀，後稍便吃，遂不復饑。冬不寒，夏不熱，此女是秦人，至成帝時，三百餘載也。

《列仙傳》曰：赤松子，好食柏實，齒落更生。

《別説》云：謹按陶隱居説：柏忌取冢墓上者，今云出乾州者最佳。則乾州柏茂大者，皆是乾陵所出，他處皆無大者，但取其州土所宜，子實氣味豐美可也。乾陵之柏，異於他處，其木未有無文理者，而其文多爲菩薩雲氣、人物鳥獸，狀極分明可觀。有盜得一株徑尺者，可直萬錢，關右人家，多以爲貴，宜其子實最佳。又以枝節燒油膏，傅惡瘡久不差有蟲者。牛馬畜産有瘡疥，名爲重病，以傅之。

《衍義》曰：柏，取儲以療馬瘍疥，今未見用松儲。老人虚秘，柏子仁、大麻子仁、松子仁等分，同研，溶白蠟丸桐子大。以少黄丹湯，服二三十丸，食前。嘗官陝西，每登高望之，雖千萬株，皆一一西指。蓋此木至堅之木，不畏霜雪，得木之正氣，他木不逮也。所以受金之正氣所制，故一一向之。

茯苓



西京茯苓

味甘，平，無毒。主胸脅逆氣，憂恚、驚邪、恐悸，心下結痛，寒熱，煩懣，咳逆，口焦舌乾，利小便，止消渴，好唾㉚，大腹淋瀝，膈中痰水，水腫淋結，開胸府，調臟氣，伐腎邪，長陰，益氣力，保神守中。久服安魂養神，不饑延年。一名茯菟。其有抱根者，名茯神。

茯神：平。主辟不祥，療風眩、風虚，五勞，口乾，止驚悸，多恚怒，善忘，開心益智，安魂魄，養精神。生太山山谷大松下。二月、八月採，陰乾。馬間爲之使，得甘草、防風、芍藥、紫石英、麥門冬共療五臟。惡白斂，畏牡蒙、地

榆、雄黄、秦艽、龜甲。

《圖經》曰：茯苓，生太山山谷，今泰華、嵩山皆有之。出大松下，附根而生，無苗、葉、花、實，作塊如拳在土底，大者至數斤，似人形、龜形者佳，皮黑，肉有白、赤二種。或云是多年松脂流入土中變成，或云假松氣於本根上生。今東人採之法：山中古松，久爲人斬伐者，其枯折槎枿，枝葉不復上生者，謂之茯苓。神仙方多單餌之。其法：取白茯苓五斤，去黑皮，搗篩，以熟絹囊盛，於三斗米下蒸之，米熟即止，曝乾又蒸，如此三過。乃取牛乳二斗和合，著銅器中，微火煮如膏，收之。每食以竹刀割取，隨性任飽服之，則不饑。如欲食，先煮葵菜汁飲之，任食無礙。舊説琥珀，是千年茯苓所化，一名江珠。張茂先云：今益州永昌出琥珀，而無茯苓。又云：燒蜂窠所作。二説張皆不能辨。按《南蠻地志》云：村邑多琥珀，云是松脂所化。又云：楓脂爲之，彼人亦不復知。地中有琥珀，則傍無草木，入土淺者五尺，深者或八九尺，大者如斛，削去皮，初如桃膠，久乃堅凝。其方人以爲枕，然古今相傳是松類，故附於茯苓耳。

《藥性論》云：茯苓，臣，忌米醋。能開胃止嘔逆，善安心神，主肺痿痰壅，治小兒驚癇，療心腹脹滿，婦人熱淋，赤者破結氣。又云：茯神，君，味甘，無毒。主驚癇，安神定志，補乏，主心下急痛堅滿，人虚而小腸不利，加而用之。其心名黄松節，偏治中偏風，口之[31]喎斜，毒風筋攣不語，心神驚掣，虚而健忘。

陶隱居云：按藥無馬間，或是馬莖，聲相近故也。今出鬱州，彼土人乃假研松作之，形多小虚赤不佳。自然成者，大如三四升器，外皮黑，細皺，内堅白，形如鳥獸、龜鱉者良。通神而致靈，和魂而煉魄，明竅而益肌，厚腸而開心，調榮而理胃，上品仙藥也。其有銜松根對度者爲茯神，是其次茯苓後結一塊也。仙方惟[32]云茯苓而無茯神，爲療既同，用之亦應無嫌。

《范子》云：茯苓出嵩高三輔。

《淮南子》云：下有茯苓，上有菟絲。注云：茯苓，千歲松脂也。菟絲生其上而無根。一名女蘿也。

《典術》云：茯苓者，松脂入地千歲爲茯苓，望松樹赤者下有之。

《廣志》云：茯神，松汁所作，勝茯苓。或曰：松根茯苓貫著之，生朱提漢陽縣。

《日華子》云：茯苓，補五勞七傷，安胎，暖腰膝，開心益智，止健忘，忌酸及酸物。

雷公云：凡採得後，去皮心神了，搗令細，於水盆中攪令濁[33]，浮者去之，是茯苓筋，若誤服之，令人眼中童子白[34]黑睛點小，兼盲目。甚忌之。

《聖惠方》：治面皯疱及産婦黑疱如雀卵色。用白茯苓末，蜜和傅之。

《經驗後方》：養老延年服茯苓方：華山挺子茯苓，研削如棗許大，令四方有角，安於新瓷瓶内，以好酒浸，以三重紙封其頭後，一百日開，其色當如餳糖。可日食二塊，百日後肌體潤澤，服一年後，可夜視物，久久食之，腸

化爲筋，可延年耐老，面若童顏。

孫真人《枕中記》：服百日，百病除，二百日夜如晝，二年後役使鬼神，四年後玉女來侍。

《抱朴子》：任子季服茯苓十八年，玉女從之，能隱能彰，不食穀，灸瘢滅，面生光玉澤。神仙服茯苓法：白茯苓去皮，酒浸十五日，漉出爲散。每服三錢，水調下，日三。

《衍義》曰：茯苓，乃樵斫訖[35]多年松根之氣所生。此蓋根之氣味，噎鬱未絶，故爲是物。然以[36]由土地所宜與不宜，其津氣盛者，方發泄於外，結爲茯苓，故不抱根而成物。既離其本體，則有苓之義。茯神者，其根但有津氣而不甚盛，故止能伏結於本根。既不離其本，故曰茯神。此物行水之功多，益心脾不可闕也。或曰松既樵矣，而根尚能生物乎？答曰：如馬勃菌、五芝、木耳、石耳之類，皆生於枯木、石、糞土之上，精英未淪，安得不爲物也。其上有菟絲，下有茯苓之説，甚爲輕信。

琥珀　味甘，平，無毒。主安五臟，定魂魄，殺精魅邪鬼，消瘀血，通五淋。生永昌。

《圖經》曰：文具茯苓條下。

《藥性論》云：琥珀，君。治百邪，衆珀之長，故號曰鑒珀。琥珀如血色，産後血疹痛。

陶隱居云：舊説云：是松脂淪入地，千年所化，今燒之亦作松氣。俗有琥珀中有一蜂，形色如生。《博物志》又云：燒蜂窠所作。恐非實，此或當蜂爲松脂所粘，因墜地淪没爾。亦有煮煆鷄子及青魚枕作者，并非真。惟以拾芥爲驗。俗中多帶之辟惡。刮屑服，療瘀血至驗。

陳藏器云：琥珀，止血生肌，合金瘡。和大黄、鱉甲，作散子，酒下方寸匕，下惡血，婦人腹内血盡即止。宋高祖時，寧州貢琥珀枕，碎以賜軍士傅金瘡。《漢書》云：出罽賓國，初如桃膠，凝乃成焉。

雷公云：凡用，紅松脂、石珀、水珀、花珀、物象珀、鑒珀、琥珀。紅松脂如琥珀，只是濁，太脆，文黄。水珀多無紅，色如淺黄，多粗皮皺。石珀如石重，色黄不堪用。花珀文似新馬尾松心文，一路赤，一路黄。物象珀其内自有物命，動此使有神妙。鑒珀，其珀是衆珀之長，故號曰鑒珀。琥珀如血色，熱於布上拭，吸得芥子者，真也。夫入藥中，用水調側柏子末，安於瓷鍋子中，安琥珀於末中了，下火煮，從巳至申，别有異光，别搗如粉重篩用。

《衍義》曰：琥珀，今西戎亦有之，其色差淡而明澈，南方者色深而重濁，彼土人多碾爲物形。若謂千年茯苓所化，則其間有沾着蜾蠃蜂蟻宛然完具者，是極不然也。多琥珀，實松脂所化然[37]耳。此説爲勝。但土地有所宜不宜[38]，故有能化有不能化者。

《通典》曰：南蠻、海南、林邑國、秦象郡、林邑縣，多出琥珀。松脂淪入地下，及傍不生草木，深八九尺，大如斛，削去皮成焉，初如桃膠，凝成乃堅復，光彩甚麗。

《外臺秘要》：治魚鯁骨横喉中，

琥珀珠一物，貫串着繩，推令前，入至鯁所，又復推以牽引出矣。又方：從高墜下，若爲重物所頓笮得瘀血。刮琥珀屑，酒服方寸匕。取蒲黄二三匕服，日四五度。

榆皮



榆皮　味甘，平，無毒。主大小便不通，利水道，除邪氣，腸胃邪熱氣，消腫。性滑利。久服輕身不饑，其實尤良。療小兒頭瘡痂疕。花，主小兒癇，小便不利，傷熱。一名零榆。生潁川山谷。二月採皮，取白暴乾，八月採實，并勿令中濕，濕則傷人。

《藥性論》云：榆白皮，滑。能主利五淋，治不眠，療齁。取白皮陰乾後，焙杵爲末。每日朝夜用水五合，末二錢，煎如膠服，瘥。

陶隱居云：此即今榆樹，剥取皮，刮除上赤皮，亦可臨時用之，性至滑利。初生莢人以作糜羹，令人多睡。嵇公所謂榆令人瞑也。斷穀，乃屑其皮并檀皮服之，即令人不饑。

孟詵云：生皮主暴患赤腫，以皮三兩搗，和三年醋滓，封之，日六七易，亦[39]治女人妬乳腫。服丹石人採葉生服一兩頓佳。子作醬食，能助肺，殺諸蟲下氣，令人能食，消心腹間惡氣，卒心痛，食之良。

《外臺秘要》：治渴，小便利非淋方。榆皮二片去黑皮，以水一斗，煮取五升。一服三合，日三服。

《千金方》：五色丹，俗名油腫。若犯多致死，不可輕之。以榆白皮末和鷄子白傅之。

《備急方》：療身體暴腫滿。榆皮搗屑，隨多少雜米作粥食，小便利。

《子母秘録方》：療妊娠胎死腹中，或母病欲下胎。榆白皮煮汁服二升。

《别説》云：謹按：榆白皮焙乾爲末，婦人妊娠臨月，日三服方寸匕。令産極易，生産下兒身皆塗之，信其驗也。又濕搗治如糊，用粘瓦石極有力，京東西北人，以石爲碓觜，每用此以膠之。

《衍義》曰：榆皮，今初春先生莢者是。去上皺澀乾枯者，將中間嫩處，剉、乾、磑爲粉，當歉歲，農將以代食，葉青嫩時收貯，亦用以爲羹茹。嘉祐年，過豐、沛，人闕食，鄉民多食此。

酸棗



酸棗　味酸，平，無毒。主心腹寒熱，邪結氣聚，四肢酸疼，濕痹，煩心不得眠，臍上下痛，血轉久泄，虚汗煩渴，補中，益肝氣，堅筋骨，助陰氣，令人肥

健。久服安五臟，輕身延年。生河東川澤。八月採實，陰乾，四十日成。惡防己。

《圖經》曰：酸棗，生河東川澤，今近京及西北州郡皆有之，野生，多在坡坂及城壘間。似棗木而皮細，其木心赤色，莖、葉俱青，花似棗花。八月結實，紫紅色，似棗而圓小味酸。當月採實，取核中仁，陰乾，四十日成。《爾雅》辨棗之種類曰：實小而酸，曰樲棗。《孟子》曰：養其樲棗。《孟子》曰：養其樲棗實也，樹所謂酸棗是也。

陶隱居云：今出東山間，云即是山棗樹子。子似武昌棗而味極酸，東人乃啖之以醒睡。

《唐本》注云：此即樲棗實也，樹大如大棗，實無常形，但大棗中味酸者是。《本經》惟用實，療不得眠，不言用仁。今方用其仁，補中益氣，自補中益肝已下，此爲酸棗仁之功能。又於下品白棘條中，復云用其實。今醫以棘實爲酸棗，大誤。今注陶云醒睡，而《經》云療不得眠。蓋其子肉味酸，食之使不思睡，核中仁，服之療不得眠，正如麻黃發汗，根節止汗也。此乃棘實，更非他物。若謂是大棗味酸者，全非也。酸棗小而圓，其核中仁微扁；大棗仁大而長，不類也。

《日華子》云：酸棗仁治膽下滿痛。

雷公云：酸棗仁，凡使，採得後曬乾，取葉重拌酸棗仁蒸半日子[40]，去尖皮了，任研用。

《聖惠方》：治膽虛，睡臥不安，心多驚悸。用酸棗仁一兩，炒令香熟，搗細爲散。每服二錢，竹葉湯調下，不計時候服。又方：治骨蒸勞，心煩不得眠臥。用酸棗仁一兩，水一大盞，半研絞取汁，下米二合煮粥，候熟下地黃汁一合，更候煮過。不計時候食之。

《外臺秘要》：療齒蟲腐爛，棘針二百枚，即是棗樹棘[41]朽落地者。以水二升，煎取一升含之，即瘥。

《簡要濟衆方》：治膽風毒氣，虛實不調，昏沉睡多。酸棗仁一兩生用，以生薑汁塗，炙令微焦，搗羅爲末。每服二錢，水七分，煎六分，無時温服。

《衍義》曰：酸棗，微熱，《經》不言用仁，仍療不得眠。天下皆有之，但以土產宜與不宜。嵩陽子曰：酸棗縣，即滑之屬邑。其木高數丈，味酸，醫之所重。今市人賣者皆棘子，此説未盡。殊不知小則爲棘，大則爲酸棗，平地則易長，居崖塹則難生。故棘多生崖塹上，久不樵則成榦，人方呼爲酸棗，更不言棘，徒以世人之意如此，在物則曷若是也。其實一本。以其不甚爲世所須，及礙塞行路，故成大木者少，多[42]爲人樵去。然此物纔及三尺，便開花結子，但窠小者氣味薄，木大者氣味厚，又有此別。今陝西臨潼山野所出者，亦好，亦土地所宜也，并可取仁。後有白棘條，乃是酸棗未長大時，枝上刺也。及至長成，其刺亦少，實亦大。故棗取大木，刺取小窠也，亦不必强分別爾。

蘗木　黃蘗也。味苦，寒，無毒。

檗木



主五臟腸胃中結熱，黃疸，腸痔，止泄痢，女子漏下赤白，陰傷蝕瘡，療驚氣在皮間，肌膚熱赤起，目熱赤痛，口瘡。久服通神。根，一名檀桓。主心腹百病，安魂魄，不饑渴。久服輕身延年，通神。生漢中山谷及永昌。惡乾漆。

《圖經》曰：檗木，黃檗也。生漢中山谷及永昌，今在處有之，以蜀中者爲佳。木高數丈，葉類茱萸及椿、楸葉，經冬不凋。皮外白，裏深黃色。根如松下茯苓作結塊。五月採皮，去皴粗，暴乾用。其根名檀桓。別有一種多刺而小，細葉者，名刺檗，不入藥用。又下品有小檗條，木如石榴，皮黃，子赤如枸杞，兩頭尖，人對以黃[43]，今醫家亦稀用。

《藥性論》云：黃檗，使，平。主男子陰痿，治下血如鷄肝片，及男子莖上瘡。屑末傅之。

陶隱居云：今出邵陵者，輕薄色深爲勝。出東山者，厚而色淺．其根於道家入木芝品，今人不知取服之。又有小樹，狀如石榴，皮黃而苦，俗呼爲子檗，亦主口瘡。

《梅師方》：治癰疽發背或發乳黃檗末，和鷄子白塗之。

《深師方》：療傷寒熱病口瘡。黃檗皮削去上粗皮，取裏好處薄削，以崖蜜漬之一宿，唯欲令濃，含其汁良久吐，更含[45]。若胸中熱，有瘡時，飲之五合尤佳。

《聖惠方》同。

《衍義》曰：檗木，今用皮，以蜜勻炙，與青黛各一分，同爲末，入生龍腦一字，研勻，治心脾熱。舌頭生瘡，當

摻瘡上，有涎即吐。又張仲景槀皮湯，無不驗。《傷寒論》中已著。



楮實

楮實　味甘，寒，無毒。主陰痿，水腫，益氣充肌膚，明目。久服不饑不老，輕身。生少室山。一名穀實。所在有之。八月、九月採實，日乾，四十日成。葉，味甘，無毒。主小兒身熱，食不生肌，可作浴湯。又主惡瘡，生肉。樹皮，主逐水，利小便。莖，主癮疹癢。單煮洗浴。皮間白汁，療癬。

《圖經》曰：楮實，生少室山，今所在有之。此有二種：一種皮有斑花文，謂之斑穀，今人用爲冠者；一種皮無花，枝葉大相類。但取其葉似葡萄葉，作瓣而有子者爲佳。其實初夏生，如彈大，青綠色，至六七月漸深紅色，乃成熟。八月、九月採，水浸去皮、穰，取中子，日乾。仙方單服其實。正赤時收取中子，陰乾。篩末，水服二錢匕，益久乃佳。醫方但貴楮實，餘亦稀用。俚俗或取其木枝中白汁，塗癬甚效。

《藥性論》云：皮木亦可單用。味甘，平，無毒。能治水腫氣滿。葉乾炒末，溲麵作餅飥食，主水痢。

陶隱居云：此即今穀樹也。仙方採搗取汁和丹用，亦乾服，使人通神見鬼。南人呼穀紙，亦爲楮紙，武陵人作穀皮衣，又甚堅好耐。

《日華子》云：楮實，壯筋骨，助陽氣，補虛勞，助腰膝，益顏色，皮斑者是楮，皮白者是穀。又云：楮葉，凉，無毒。治刺風身癢，此是斑穀樹。

雷公云：凡使，採得後用水浸三日，將物攪旋投水，浮者去之，然後日乾，却用酒浸一伏時了，便蒸，從巳至亥，出，焙令乾用。

《聖惠方》：治癬濕癢。用楮葉半斤，細切搗，封傅癬上。

《抱朴子》云：楮實赤者服之，老者成少，令人夜應徹視見鬼神。道士梁頓，年七十乃服之，更少壯，到百四十歲，能夜出行及走馬。

《修真秘旨》曰：服楮實者，轉[46]爲骨軟矣。

槐膠　主一切風，化涎，治肝臟風，筋脉抽掣，及急風口噤，或四肢不收，頑痹或毒風，周身如蟲行，或破[47]傷風，口眼偏斜，腰脊强硬。任作湯散丸煎，雜諸藥用之，亦可水煮和諸藥爲丸及作湯下藥。新定。

鑿　烏兮切

傳云：松脂千年爲琥珀，又千年爲茯苓，又千年爲琥珀同氣，爲用與琥珀同。補心安神，破血尤善。狀似玄玉而輕。出西戎來，而有此物。今西州南三百里望積中得者，大則方尺，黑潤而輕，燒之腥臭。高昌人名爲木鑿，謂玄玉爲石茯苓處見無此物。

礬。洪州土石間得者，燒作松氣，破血生肌與琥珀同，見風拆破，不堪爲器。量此二種及琥珀，或非松脂所爲也。有此差舛，今略論也。新見唐本。

陳藏器云：蘇於琥珀注後出礬功狀，按礬本功外，小兒帶之辟惡，磨滴目翳赤障等。

《太平廣記》云：《梁四公子傳》曰：交河之間平漬中，掘深一丈，下有礬珀，黑逾鈍㊽漆，或大如車輪。末服之，攻婦人小腸癥瘕㊾諸疾。

---

❶右：晦明軒本作『君』，屬上讀。
❷土：原作『大』，據晦明軒本改。
❸心：晦明軒本作『九』。
❹絹：原脱，據晦明軒本補。
❺一：晦明軒本作『二』。
❻拘：晦明軒本作『車』。
❼八：原作『大』，據晦明軒本改。
❽有：原脱，據晦明軒本補。
❾粟：晦明軒本作『栗』。
❿推：晦明軒本作『惟』。
⓫咬：原作『芠』，據晦明軒本改。
⓬度：晦明軒本作『過』。
⓭五：晦明軒本作『絶』。
⓮令：晦明軒本作『吞』。
⓯以：晦明軒本作『殊』。
⓰臣：原作『目』，據晦明軒本改。
⓱大：原作『之』，據晦明軒本改。
⓲熱：晦明軒本作『疳』。
⓳前：晦明軒本作『已日』。
⓴適寒温稍稍服之：此七字原脱，據晦明軒本補。
㉕用：原作『者』，據晦明軒本改。
㉜義：晦明軒本作『蓋』。
㉜大：晦明軒本作『火』。
㉔最：晦明軒本作『取』。
㉕醉：原作『藥』，據晦明軒本作『豉汁』。
㉖石器：晦明軒本作『豉汁』。
㉗行：晦明軒本作『澀』。
㉘鬢：原作『耳』，據晦明軒本改。
㉗武：晦明軒本作『成』。
㉗唾：晦明軒本作『睡』。
㉛之：晦明軒本作『面』。
㉜惟：原作『推』，據晦明軒本改。
㉗濁：原作『獨』，據晦明軒本改。
㉞白：晦明軒本作『并』。
㉗訖：原作『記』，據晦明軒本改。
㊱以：晦明軒本作『亦』。
㉗然：晦明軒本無『然』字。
㊳不宜：此二字原脱，據晦明軒本補。
㊴亦：原作『以』，據晦明軒本改。
㊵子：晦明軒本作『了』。
㊶棘：原脱，據晦明軒本補。
㊷少多：此二字原倒，據晦明軒本乙正。
㊾人對以黄：晦明軒本作『人剉以染黄』。
㊹蛔：晦明軒本作『疳』。
㊺含：原作『令』，據晦明軒本改。
㊻轉：晦明軒本作『輒』。
㊼破：原作『被』，據晦明軒本改。
㊽鈍：晦明軒本作『純』。
㊾癥：晦明軒本作『痕』。

圖經衍義本草卷之二十一

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

木部上品

乾漆



乾漆　味辛，温，無毒、有毒。主絶傷，補中，續筋骨，填髓腦，安五臟，五緩六急，風寒濕痹，療咳嗽，消瘀血，痞結，腰痛，女子疝瘕，利小腸，去蛔蟲。生漆，去長蟲。久服輕身耐老。生漢中川谷。夏至後採，乾之。半夏爲❶之使，畏鷄子，今又忌油脂。

《圖經》曰：乾漆、生漆，出漢中川谷，今蜀、漢、金、峽、襄、歙州皆有之。多高三二丈，皮白，葉似椿，花似槐子一若牛李，木心黄。六月、七月以竹筒釘入木中取之。崔豹《古今注》曰：以剛斧斫其皮開，以竹管承之，汁滴則成漆是也。乾漆是舊云用漆桶中自然乾者，狀如蜂房，孔孔隔者。今多用筒子内乾者，以墨如磬，堅若鐵石爲佳。《華佗傳》：彭城樊阿，少師事佗，求服食法。佗授以漆葉青黏散方，云服之去三蟲，利五臟，輕身益氣，使人頭不白。阿從其言，年五百餘歲。漆葉所在有之。青黏生於豐沛、彭城及朝歌。一名地節，一名黄芝。主理五臟，益精氣。本出於迷人入山者，見仙人服之，以告佗，佗以爲佳，語阿，阿秘之。近者人見阿之壽而氣力强盛，怪之，以問所服食，阿因醉亂誤説，人服多驗。

陶隱居云：今梁州漆最勝，益州亦有，廣州漆性急易燥。其諸處漆桶上蓋裏，自然有乾者，狀如蜂房，孔孔隔者爲佳。生漆毒烈，人以鷄子和服之去蟲，猶有嚙腸胃者。畏漆人乃故❷死。外氣亦能使身肉瘡腫，自别有療法。仙方用蟹消之，爲水煉服，長生。

《外臺秘要》：療蛔蟲，心痛，惡心吐水。乾漆熬搗蜜和丸。服十五丸，日再服。

《經驗方》：治婦人不曾生長，血氣，臟腑疼痛不可忍，及治丈夫元氣、小腸氣撮痛者。并宜服二聖丸：乾漆一兩爲末，濕漆一兩，先將濕漆入銚子内，熬如一食飯間已來住火，與乾漆末一處拌和丸如半皂子大。每服一丸，温酒吞下，無時。如元氣、小腸、膀胱氣痛，牙關緊急，但擊開牙關，温酒化一丸灌下必安。怕漆人不可服。

《簡要濟衆方》：治九種心痛及腹脅積聚滯氣。筒子乾漆二兩，搗碎炒烟出，細研，醋煮麵糊和丸如梧桐子大。每服五丸至七丸，熱酒下，醋湯亦得，無時服。

《杜壬方》：治小兒胃寒，蟲上諸證，危惡與癇相似。乾漆搗炒烟盡，白入蕪荑等分，爲細末。米飲調下一字

至一錢。

《衍義》曰：乾漆，若濕漆，藥中未見用，凡用者，皆乾漆耳。其濕者，在燥熱及霜冷時，則難乾。得陰濕，雖寒月亦易乾。亦物之性也。若沾漬人，以油治之。凡驗漆，惟稀者以物蘸起，細而不斷，斷而急收起。又塗於乾竹上，蔭之速乾者，并佳。餘如《經》。

五加皮



五加皮　味辛、苦，温、微寒，無毒。主心腹疝氣，腹痛，益氣，療躄，小兒不能行，疽瘡陰蝕，男子陰痿，囊下濕，小便餘瀝，女人陰癢及腰脊痛，兩脚疼痹風弱，五緩虚羸，補中益精，堅筋骨，强志意。久服輕身耐老。一名豺節。五葉者良。生漢中及冤句。五月、七月採莖，十月採根，陰乾。遠志爲之使，畏蛇皮、玄參。

《圖經》曰：五加皮，生漢中及冤句，今江淮、湖南州郡皆有之。春生苗，莖、葉俱青，作叢。赤莖又似藤蔓，長三五尺，上有黑刺。葉生五叉作簇者最多，爲次。每一葉下生一刺。三四月開白花，結細青子，至六月漸黑色。根若荆根，皮黄黑，肉白，骨堅硬。五月、七月採莖，十月採根，陰乾用。

《藥性論》云：五加皮有小毒。能破逐惡風血，四肢不遂，賊風傷人，軟脚腎腰，主多年瘀血在皮肌，治痹濕，内不足，主虚羸，小兒二❸歲不能行，用此便行走。

陶隱居云：今近道處處有，東間彌多。四葉者亦好。煮根莖釀酒，主益人。道家用此作灰，亦以煮石，與地榆并有秘法。

《日華子》云：明目，下氣，治中風，骨節攣急，補五勞七傷。葉治皮膚

《東華真人煮石經》：舜常登蒼梧山，曰：厥金玉之香草，朕用偃息正道。五加也。又異名曰金鹽。昔西域真人王屋山人王常言：何以得長久？何不食石蓄金鹽。母何以得長壽？何五加、地榆皆是煮石而餌得長生之藥也。昔尹公度聞孟綽子、童❹士固共相與言曰：寧得一把五加，不用金玉滿車。寧得一斤地榆，安用明月寶珠。母單服五加酒，以致不死，臨隱去佯託死，時人自莫之悟耳。張子聲、楊建始、王叔才、于出❺彦等，皆服此酒而房室不絶，得壽三百年，有子二十人。世世有得服五加酒散，而獲延年不死者，不可勝計。或只爲散以代湯茶而餌之，驗亦然也。大王君謂五加云：蓋天有五車之星精也。金應五胡❻，人應五德，位應五方，物應五車。故青精入莖，則有東方之液；白氣入節，則有西方之津；赤❼氣入華，則有南方之光；玄精入根，則有北方之飴；黄烟入皮，則有戊己之靈。

五神鎮主，相轉育成。用之者真仙，服之者反嬰也。



牡荆

牡荆實　味苦，温，無毒。主除骨間寒熱，通利胃氣，止咳逆，下氣。生河間、南陽、冤句山谷，或平壽、都鄉高岸上及田野中。八月、九月採實，陰乾。此有青、赤二種，以青者爲佳。謹按《登真隱訣》云：荆木之華葉，通神見鬼精。注云：尋荆有三種。直云荆木，即是今可作箠杖者，葉香，亦有花、子，子不入藥。方術則用牡荆，牡荆子入藥，北方人略無識其木者。

崔元亮《集驗方》：治腰脚蒸法：取荆葉不限多少，蒸令熟熱，置於瓮中，其下❽著火温之。以病人置於葉中，剩著葉蓋，須臾當汗出藥中旋旋吃飯，稍倦即止。便以綿衣蓋，避風，仍進葱豉酒及豆酒并得，以差爲度。



蔓荆

蔓荆實　味苦、辛，微寒、平、温，無毒。主筋骨間寒熱，濕痹拘攣，明目堅齒，利九竅，去白蟲、長蟲，主風頭痛，腦鳴，目泪出，益氣。久服輕身耐老，令人光澤，脂緻音雉。小荆實亦等。

《圖經》云：蔓荆實，舊不載所出州土，今近京及秦、隴、明、越州多有之。苗莖高四尺，對節生枝。初春因舊枝而生葉類小楝，至夏盛茂。有花作穗淺紅色，蕊黄白色，花下有青萼。至秋結實，斑黑，如梧子許大而輕虚。八月、九月採。一説作蔓生，故名蔓荆。而今所有，并非蔓也。

《藥性論》云：蔓荆子，臣。治賊風，能長髭髮。

陶隱居云：小荆即應是牡荆蔓荆❾。牡荆子大於蔓荆子，而反呼爲小荆，恐或以樹形爲言，復不知蔓荆樹若高大小。

《日華子》云：利關節，治赤眼，癇疾。注云：海鹽亦有大如豌豆，蒂有小輕軟蓋子。六七八月採。

雷公云：凡使，去蒂子下白膜一重，用酒浸一伏時後蒸，從巳至未，出

曬乾用。

《衍義》曰：蔓荆實，諸家所解，蔓荆、牡荆紛然不同。今既言蔓荆，明知是蔓生，即非高木也。況此牡荆，則是木上生者。況《漢書·郊祀志》所言，以牡荆莖爲幡竿。故知蔓荆即子大者是，又何疑焉。後條有欒荆，此即便是牡荆也。子青色，如茱萸，不言更立欒荆條。故文中云：本草不載⑩，亦無別名，但有欒花，功用又別，斷無疑焉。注中妄稱石荆當之，其説傳見穿鑿。

辛夷



辛夷　味辛，温，無毒。主五臟身體寒熱，風頭腦痛，面黈，温中解肌，利九竅，通鼻塞涕出，治面腫引齒痛，眩冒身兀兀如在車船之上者，生鬚髮，去白蟲。久服下氣，輕身明目，增年耐老。可作膏藥用之，去心及外毛。毛水煮，從巳至未，出，焙乾用。若治眼目中患，即一時去皮，用向裏實者。

雷公云：凡用之，去粗皮，拭上赤肉毛了，即以芭蕉水浸一宿漉出，用漿

寄生



桑上寄生

桑上寄生　味苦、甘，平，無毒。主腰痛，小兒背强㊀，癰腫，安胎，充肌膚，堅髮齒，長鬚眉，主金瘡，去痹，女子崩中，内傷不足，産後餘疾，下乳汁。其實明目，輕身通神。一名寄屑，一名寓木，一名宛童，一名蔦音鳥。生洪農川谷桑樹上。三月三日採莖、葉，陰乾。

《圖經》曰：桑寄生，出洪農山谷桑上，今處處有之。云是烏鳥食物，子

落枝節間，感氣而生。葉似橘而厚軟，莖似槐枝而肥脆。三四月生花，黃白色。六月、七月結實，黃色，如小豆大。三月三日採莖，葉陰乾。凡槲、櫟、柳、水楊、楓等上，皆有寄生，惟桑上者堪用。然殊難辨別，醫家非自採不敢用。或云斷其莖而視之，其色深黃并實中有汁稠粘者爲真。

《藥性論》云：桑寄生，臣。能令胎牢固，主懷妊漏血不止。

《日華子》云：助筋骨，益血脉。採人多在櫟樹上收，呼爲桑寄生。在桑上者極少，縱有，形與櫟樹上者亦不同，次即楓樹上，方同櫟樹上者，黃色。七月、八月採。

雷公云：凡使，在樹上自然生獨枝樹是也。採得，用銅刀和根、枝、莖細剉，陰乾任用。勿令見火。

《衍義》曰：桑寄生，新舊書云：今處處有之。從宦南北，實處處難得。豈歲歲稼穡摘踐之，苦而不能生邪？抑方宜不同也？若以爲鳥食物子落枝節間，感氣而生，則麥當生麥，穀當生穀，不當但生此一物也。又有於柔滑細枝上生者，如何得子落枝節間？由是言之，自是感造化之氣，別是一物。古人當日惟取桑上者，實假其氣耳。又云：今醫家鮮用，此極誤矣。今醫家非不用也，第以難得真桑上者。當⓫得真桑寄生，下咽必驗如神。向承乏吳山，有求藥於諸邑者，乃遍令人搜摘，卒不可得，遂以實告，甚不樂。蓋江南人謂之櫟。不敢以僞藥罔人。鄰邑有人，僞以他木寄生送之，服之逾月而死。哀哉！



杜仲

杜仲　味辛、甘，平、温，無毒。主腰脊痛，補中益精氣，堅筋骨，强志，除陰下癢濕，小便餘瀝，脚中酸疼，不欲踐地。久服輕身耐老。一名思仙，一名思仲，一名木綿。生上虞山谷及上黨、漢中。二月、五月、六月⓬採皮。惡蛇蜕皮、玄參。

《圖經》曰：杜仲，生上虞山谷及上黨、漢中，今出商州、成州、峽州近處大山中亦有之。木高數丈，葉如辛夷，亦類柘，其皮類厚朴，折之內有白絲相連。二月、五月、六月、九月採皮用。初生葉嫩時採食。主風毒脚氣及久積風冷，腸痔下血亦宜。乾末作湯。

《藥性論》云：杜仲，味苦。能治腎冷臂腰，病人虛而身强直，風也。腰不利，加而用。

《日華子》云：暖。治腎勞腰脊攣。入藥炙用。

雷公云：凡使，先須削去粗皮，用酥蜜和作一兩，多炙之盡爲度，炙乾了細剉用。凡修事一斤，酥二兩，蜜三兩，二味相合，令一處用之。

《聖惠方》：治卒患腰脚疼痛，補腎。杜仲一兩去粗皮，炙微黃剉，以水

二大盞，煎至一盞去滓，用羊腎一對，細切去脂膜，入藥中煮，次入薤白七莖，鹽、花椒、薑、醋等和作羹吃。空腹食之。

《勝金方》：治婦人胎臟不安，并産後諸疾，宜服杜仲丸。瓦上乾，於木臼中杵爲末，煮棗爲丸，如彈子大。每服一丸，爛嚼以糯米飲下。



楓香脂

楓香脂　味辛、苦，平，無毒。主癮疹風癢，浮腫齒痛。一名白膠香。主水腫，下水氣，煮汁用之。所在大山皆有。

《圖經》曰：楓香脂，舊不載所出州郡，云所在大山皆有，今南方及關陝多有之。似白楊，甚高大。其葉圓而作歧⓭，有三角而香。二月有花，白色。乃連著實，大如鴨卵。八月、九月熟，暴乾可燒。《南方草木狀》曰：楓實惟九真有之。用之有神，乃難得之物。其脂爲白膠香，五月斫爲坎，十一月採之。其皮性澀，止水痢。水煎飲之。任昉《述異記》曰：南中楓子鬼，楓木之老者爲人形，亦呼爲靈楓，蓋瘤癭也。至今越巫有得之者，以雕刻鬼神，可致靈異。下沉香條有楓香云，療風癮疹癢毒。與此相類，即一物也。

陳藏器云：楓皮本功外，性澀，止水痢。蘇云下水腫，水腫非澀藥所療，蘇爲誤爾。又云有毒，轉明其謬。水煎止下痢爲最。

《日華子》云：楓皮，止霍亂，刺風，冷風。煎湯浴之。

《衍義》曰：楓香，與松脂皆可亂乳香，尤宜區別。楓香微黄白色，燒之尤見真僞。兼能治風癮疹癢毒。水煎熱熏洗。

女貞



女貞實　味苦、甘，平，無毒。主補中，安五臟，養精神，除百疾。久服肥健，輕身不老。生武陵川谷，立冬採。

《圖經》曰：女貞實，生武陵川谷，今處處有之。《山海經》云：太山多真木，是此木也。其葉似枸骨及冬青，木極茂盛，凌冬不凋，實⓮細青白色。九月而實成，似牛李子。立冬採實，暴乾。其皮可以浸酒。或云：即今冬青木也。而冬青木肌理白，文如象齒，道家取以爲簡，其實亦浸酒，去風補血。

木蘭　味苦，寒，無毒。主身大熱在皮膚中，去面熱赤疱⓯酒皰，惡風癲

木蘭



疾，陰下癢濕，明耳目，療中風傷寒，及癰疽水腫，去臭氣。一名林蘭，一名杜蘭。皮似桂而香。生零陵山谷及太山。十二月採皮，陰乾。

《圖經》曰：木蘭，生零陵山谷及太山，今湖、嶺、蜀、川諸州皆有之。木高數丈，葉似菌桂葉，亦有三道縱文，皮如板桂，有縱橫文，香味劣於桂。此與桂枝全別，而韶州所生，乃云與桂同是一種。取外皮爲木蘭，中肉爲桂心。蓋是桂中之一種耳。十一月、十二月採，陰乾用。任昉《述異記》云：木蘭舟，在潯陽江中，多木蘭。又七里洲中有魯班刻木蘭舟，至今在洲中。今詩家云木蘭舟，出於此。

陶隱居云：零陵諸處皆有。狀如楠樹，皮甚薄而味辛香。今益州有皮厚，狀如厚朴，而氣味爲勝。今東人皆以山桂皮當之，亦相類。道家用合香亦好。

《外臺秘要方》：療面上皶皶皯黯方。木蘭皮一斤，細切，以三年酢漿漬之自⑯日，出，於日中曬搗末。漿水服方寸匕，日三。

《子母秘録方》：療小兒重舌。木蘭皮一尺，廣四寸，削去粗皮，用醋一升漬取汁，注重舌上。

蕤核



蕤核　味甘，温、微寒，無毒。主心腹邪結氣，明目，目赤痛，傷泪出，目腫眦爛，齆鼻，破心下結痰痞氣。久服輕身益氣，不饑。生函谷川谷及巴西。

《圖經》曰：蕤核，生函谷川谷及巴西，今河東亦有之。其木高五七尺，莖間有刺。葉細似枸杞而尖長，花白，子紅紫色，附枝莖而生，類五味子。六月成熟，五月、六月採實，去核殼陰乾。劉禹錫《傳信方》所著法最奇，云：眼風泪癢，或生翳，或赤眦，一切皆主之。宣州黄連搗篩末，蕤核人去皮碾爲膏，緣此性稍濕，末不得故耳。與黄連等分和合，取無蚛病乾棗三枚，割頭少許留之却核，以二物滿填於中，却取所割下棗頭，依前合定，以少綿裹之，惟薄綿爲佳。以大茶碗量水半碗，於銀器中，文武火煎取一鷄子以來，以綿濾，待冷點眼，萬萬不失。前後試驗數十人皆應，今醫家亦多用得效，故附之。

陶隱居云：今從北方來，云出彭城間。形如烏豆大，圓而扁，有文理，狀似胡桃桃核。今人皆合殼用爲分兩，此乃應破⑰取人秤之。醫方惟以藥⑱眼。《仙經》以合守中丸也。

雷公云：凡使，先湯浸去皮、尖，擘作兩片。用芒消、木通草二束，和蕤

人同水煮一伏時後瀝出，去諸般藥取蕤人，研成膏，任加減入藥中使。每修事四兩，用芒消一兩，木通草七兩。



丁香

丁香　味辛，温，無毒。主温脾胃，止霍亂擁脹，風毒諸腫，齒疳蟨。能發諸香。其根療風熱毒腫。生交、廣、南蕃。二月、八月採。

《圖經》曰：丁香，出交、廣、南蕃，今惟廣州有之。本類桂，高丈餘，葉似櫟，凌冬不凋。花圓細，黄色。其子出枝，蕊上如釘子，長三四分，紫色。其中有粗大如山茱萸者，謂之母丁香。二月、八月採子及根。又云：盛冬生花、子，至次年春採。

《藥性論》云：丁香，臣。能主冷氣腹痛。

《日華子》云：治口氣反胃，鬼疰蠱毒，及療腎氣、賁豚氣，陰痛，壯陽暖腰膝，治冷氣，殺酒毒，消痃癖，除冷勞。

雷公云：凡使，有雄雌。雄顆小，雌顆大，似懷棗核。方中多使雌，力大。膏煎中用雄，若欲使雄，須去丁蓋乳子，發人背癰也。

《簡要濟衆方》：治傷寒咳噫不止及噦逆不定。丁香一兩，乾柿蒂一兩，焙乾，搗羅爲末。每服一錢，煎人參湯下。

《千金方》：治乾霍亂，不吐不下方。丁香十四枚末，以熱湯一升和之，頓服。

《衍義》曰：丁香，《日華子》云治口氣。此正是御史所含之香。治胃寒及脾胃冷氣不和。有大者名母丁香，味尤佳。爲末，縫紗囊如小指，實末，內陰⑲中，主陰冷病，中病便已。

沉香

沉香　微温。療風水毒腫，去惡氣。





《圖經》曰：沉香、青桂香、鷄骨香、馬蹄香、煎香同是一本。舊不著所出州土，今惟海南諸國及交、廣、崖州有之。其木類椿、櫧，多節，葉似橘，花白。子似檳榔，大如桑椹，紫色而味辛。交州人謂之蜜香。若欲取之，先斷其積年老木根，經年其外皮榦俱朽爛，其木心與枝節不壞者即香也。細枝緊實未爛者，爲青桂。堅黑而沉水

者，爲沉香。半沉半浮與水面平者，爲鷄骨。最粗者，爲煎香。又云：沉香中形如鷄骨者，爲鷄骨香。形如馬蹄者，爲馬蹄香。然今人有得沉香奇好者，往往亦作鷄骨形，不必獨是煎香也。其又粗不堪藥用者爲生結黄熟香。其實一種，有精粗之異耳。并採無時。又薰陸香，形似白膠，出天竺、單于二國。《南方草木狀》如薰陸出大秦國，其木生於海邊沙上，盛夏木膠出沙上，夷人取得，賣與賈客，乳香亦其類也。

《廣志》云：南波斯國松木脂，有紫赤如櫻桃者名乳香，蓋薰陸之類也。今人無復別薰陸者，通謂乳香爲薰陸耳。治腎氣，補腰膝，霍亂吐下，衝惡中邪氣，五疰，治血，止痛等藥及膏煎多用之。然至黏難研，用時以繒袋挂於窗隙間，良久取研之乃不黏。又鷄舌香，出崑崙及交州以南。枝、葉及皮并似栗，花如梅花，子似棗核，此雌者也。雄者著花不實，採花釀之以成香。今醫家又一説云：按三省故事，尚書郎口含鷄舌香，以其奏事答對，欲使氣芬芬[20]也。而方家用鷄舌香療口臭者，亦緣此義耳。蘇合香生中臺川谷。蘇恭云：此香從西域及崑崙來，紫色，與真紫檀相似，而堅實，極芬香。其香如石，燒之灰白者好，今不復見。此等廣南雖有此而類蘇木，無香氣，藥中但用如膏油者，極芬烈耳。陶隱居以爲是《衍義》曰：沉香木，嶺南諸郡悉有之。其臭極甚，燒之可以辟邪惡，固知非此也。《梁書》云：天竺出蘇合香，是諸香汁煎之，非自然一物也。又有檀香，木如檀，生南海。消風熱腫毒，主心腹痛，霍亂，中惡鬼氣，殺蟲。有人[21]種，黄、白、紫之異。今人盛用之。真紫檀，舊在下品，亦主風毒。蘇恭云：出崑崙盤盤國，多在折枝枯幹中。或爲沉，或爲橋。多在折枝枯幹中。或爲沉，或雖不生中華，人間遍有之。檀木生江、淮及河朔山中。其木作斧柯者，亦檀香類，但不香耳。

陶隱居云：此香合香家要用，不入藥。惟療惡核毒腫，道方頗有用處。

《日華子》云：沉香，味辛，熱，無毒。調氣，補五臟，益精壯陽，暖腰膝，去邪氣，止轉筋，吐瀉，冷氣，破癥癖，冷風麻痺，骨節不任，濕風皮膚癢，心腹痛，氣痢。

雷公云：沉香，凡使須要不枯者，如鴉角硬重沉於水下爲上也，半沉者次也。去入丸散中用，須候衆藥出即入拌和用之。

《衍義》曰：沉香木，嶺南諸郡悉有之，旁海諸州尤多。交幹連枝，崗嶺相接，千里不絶。葉如冬青，大者合數人抱。木性虚柔，山民或以構茅廬，或蓋山民入山，見香木之曲幹斜枝，必以刀斫成坎，經年得雨水所漬，遂結香。或復以鋸取之，刮去白木，其香結爲斑點，遂名鷓鴣斑，燔之極清煎[22]。沉之良者，惟在瓊、崖等州，俗謂之角沉。黄沉乃枯木中得者，宜入藥用。依木皮而結者，謂之青桂，氣尤備。在土中歲久，不待刓剔而成者，謂之龍鱗。亦

有削之自卷，咀之柔韌者，謂之黄蠟沉，尤難得也。然《經》中止言療風水毒腫，去惡氣，餘更無治療。今醫家用以保和衛氣，爲上品藥，須極細爲佳。今人故多與烏藥磨服，走散滯氣，獨行則勢弱，與他藥相佐，當緩取效，有益無損，餘藥不可方也。薰陸香木，葉類棠梨。南印度界，阿吒釐國出，今謂之西香。南番者更佳，此即今人謂之乳香，爲其垂滴如乳。熔塌在地者，謂之塌香，皆一也。

薰陸香　微温。療風水毒腫，去惡氣伏尸。

《圖經》曰：文具沉香條下。

《唐本》云：薰陸香，微温。去惡氣，惡瘡。出天竺國及邯鄲。似松脂，黄白色，天竺者多白，邯鄲者夾緑色，香不甚。

《梅師方》：治齒蟲痛不可忍。嚼薰陸香咽其汁，立瘥。

鷄舌香　微温。療風水毒腫，去惡氣，療霍亂，心痛。

《圖經》曰：文具沉香條下。

禹錫云：按《藥性論》云：鷄舌香，使，味辛，無毒。入吹鼻散子中用，殺腦疳。入諸香中，令人身香。

《齊民要術》云：俗人以其似丁子，故爲丁子香。

《抱朴子》云：鷄舌香、黄連、乳汁煎，治目中之病。應邵漢官侍中，年老口臭，帝賜鷄舌香含之。

《外臺秘要方》：療齲齒方，煮鷄舌香汁含之，瘥。

檀香　熱，無毒。治心痛霍亂，腎氣腹痛。

《圖經》曰：文具沉香條下。

陶隱居云：白檀，消熱腫。

禹錫云：按陳藏器云：主心腹霍亂，中惡，鬼氣，殺蟲。白檀樹如檀，出海南。

《日華子》云：檀香，熱，無毒。治心痛霍亂，腎氣腹痛。濃煎服，水磨，傅外腎并腰腎痛處。

乳香　微温。療風水毒腫，去惡氣，療風癮疹瘡毒。

《圖經》曰：文具沉香條下。

禹錫云：蓋薰陸之類也。其性温。療耳聾，中風口噤，婦人血氣，能發酒，理風冷，止大腸泄澼，療諸瘡癰令内消。

《日華子》云：味辛，熱，微毒。下氣，益精，補腰膝，治腎氣，止霍亂，衝惡中邪氣，心腹痛，疰氣。煎膏止痛長肉，入丸散微炒殺毒，得不粘。

《博濟方》：治子死腹中。黄明乳香，以端午日午時或歲除夜收猪心血相和，研爲丸如鷄頭大，以紅絹袋盛，挂於門上。如患者，冷酒磨下一丸。又方：治急慢驚風。乳香半兩，甘遂半兩，同研細。每服半錢，用乳香湯調下，或小便調，妙。

《靈苑方》：治甲疽，腐肉裹甲膿血，疼痛不瘥，凡此疾，須剔去肉中甲，不治亦愈。或已成瘡不瘥用此法，乳香末，膽礬燒研，等分傅之，肉消愈。

降真香　出黔南。拌和諸雜香，燒烟直上天，召鶴得盤旋於上。

《海藥》云：徐表《南州記》云：生南海山。又云：生大秦國。味温，平，無毒。主天行時氣，宅舍怪異，并燒悉驗。又按《仙傳》云：燒之，或引鶴降。醮星辰，燒此香甚爲第一，度籙燒之，功力極驗。小兒帶之，能辟邪惡之氣也。

蘇合香　味甘，温，無毒。主辟惡，殺鬼精物，温瘧蠱毒，癲痓，去三蟲，除邪，令人無夢魘。久服通神明，輕身長年。生中臺川谷。

《圖經》曰：文具沉香條下。

陶隱居云：俗傳云是獅子屎，外國説不爾。今皆從西域來，真者難別，不復入藥，惟合好香。

《唐本》注云：此香從西域及崑崙來。紫赤色，與紫、真檀相似，堅實極芬香，惟重如石，燒之灰白者好。云是獅子屎，此是胡人誑言，陶不悟之。猶以爲疑也。

禹錫云：按《梁書》云：中天竺國出蘇合香，合是諸香汁煎之，非自然一物也。

陳藏器云：按獅子屎，赤黑色，燒之去鬼氣，服之破宿血，殺蟲。蘇合香，色黄白，二物相似而不同。人云：獅子屎是西國草木皮汁所爲，胡人將來，欲人貴之，飾其名爾。



藿香　微温。療風水毒腫，去惡氣，療霍亂心痛。

《圖經》曰：藿香，舊附五香條，不乃芬香，須黄色然後可收。又《金樓子》及《俞益期箋》皆云：扶南國人言：衆香共是一木。根便是栴檀，節是沉水，花是鷄舌，葉是藿香，膠是薰陸。詳《本經》所以與沉香等共條，蓋義出於此。然南中所有，乃是草類。《南方草木狀》云：藿香，榛生，吏民自種之，正相符合也。范曄和香方云：零藿虚燥。古人乃以合熏香。《本經》主霍亂，心痛。故近世醫方治脾胃吐逆爲最要之藥。

禹錫云：按《南州異物志》云：藿香出海邊國，形如都梁，可著衣服中。

《南方草木狀》云：味辛。榛生，吏民自種之，五六月採暴之，乃芬芳。出交趾、九息諸國。

《別説》云：謹按藿香《圖經》云：二月生苗，舊雖附五香條中，今詳枝梗殊非木類，恐當移入草部。

金櫻子　味酸，澁，平，温，無毒。療脾泄下痢，止小便利，澁精氣。久服令人耐寒，輕身。方術多用。云是今



金櫻子

之刺梨子。形似楹桲而小，色黄有刺，花白。在處有之。

《圖經》曰：金櫻子，舊不載所出州土，云處處有之，今南中州郡皆有，而以江西、劍南、嶺外者爲佳。叢生郊野中，夫類薔薇，有刺。四月開白花。夏秋結實，亦有刺，黄赤色，形似小石榴，十一月、十二月採。江南、蜀中人熬作煎，酒服，云補治有殊效。

禹錫云：按《蜀本》，方術多用，言是今之刺榆子，形如楹桲而小。今醫家用之甚佳。

《日華子》云：金櫻花，平。止冷熱痢，殺寸白、蛔蟲等。和鐵粉研，拔白髮，傅之再出黑者，亦可染髮。又云：金櫻東行根，平，無毒。治寸白蟲。剉二兩，入糯米三十粒，水二升，煎五合。空心服，須臾瀉下。

《孫真人食忌》云：金櫻子煎，經霜後，以竹夾子摘取，於木臼中，轉柞却刺，勿損之，擘爲兩片，去其子。以水淘洗過，爛搗入大鍋，以水煎，不得絶火。煎約水耗半，取出澄濾過，仍重煎似稀餳。每服一匙，用暖酒一盞調服。其功不可具載。

沈存中云：金櫻子，止遺泄，取其温且澀。世之用者，待紅熟取汁熬膏，大誤也。紅熟則却失本性，今取半黄時採用，妙。

《衍義》曰：金櫻子，經九月、十月熟時採。不爾，復令人利。

落雁木　謹按徐表《南州記》云：生南海山野中。藤蔓而生，四面如刀削，代州雁門亦有。藤蘿高丈餘，雁過皆綴其中，故曰落雁木。又云：雁銜至代州雁門，皆放落而生，以此爲名。



落雁木

詹糖香　微温。療風水毒腫，去惡氣伏尸。

陶隱居云：此香皆合香家要用，不止入藥。惟療惡核毒腫。詹糖出晉安、岑州。上真淳者難得，多以其皮及

蠹蟲屎雜之，惟軟者爲佳。餘香無真僞，而有精粗爾。

皋蘆葉　味苦，平。作飲止渴，除痰，不睡，利水，明目。出南海諸山。葉似茗而大。南人取作當茗，極重之。名之別也。《廣州記》曰：新平縣出皋蘆。名之別也。葉大而澀。又《南越志》曰：龍川縣出皋蘆。葉似茗，味苦澀，土人爲飲。南海謂之過羅，或曰物羅，皆夷語也。

《海藥》云：謹按《廣州記》云：出新平縣。狀若茶樹，闊大，無毒。主煩渴熱悶，下痰，通小腸淋，止頭痛。彼人用代茶，故人重之如蜀地茶也。

不凋木　味苦，温，無毒。主調中補衰，治腰脚，去風氣，却老變白。生太白山岩谷。樹高三尺，葉似椿，莖赤者毛，如棠梨。

牛奶藤　味甘，温，無毒。主荒年食之，令人不饑，取藤中粉食之，如葛根，令人髮落。牛好食之。生深山，大如樹。震燒木，主火，驚失心，煮服之。又取挂門户間，大厭火灾，此辟靈木也。

木蜜　味甘，平，無毒。止渴除煩，潤五臟，利大小便，去膈上熱。功用如蜜。樹生。南方枝、葉俱可啖。亦煎食如飴，今人呼白石木蜜。子名枳椇，味甘。《本經》云木蜜，非此，中汁如蜜也。崔豹《古今注》云：木蜜生南方，合體甜軟可啖，味如蜜，老枝煎取倍甜，止渴。

❶爲：原作『如』，據晦明軒本改。
❷故：晦明軒本作『致』。
❸二：晦明軒本作『三』。
❹童：晦明軒本作『董』。
❺出：晦明軒本作『世』。
❻胡：晦明軒本作『湖』。
❼赤：原作『亦』，據晦明軒本改。
❽下：原作『不』，據晦明軒本改。
❾蔓荆：晦明軒本無此二字。
❿載：原作『成』，據晦明軒本改。
⓫當：晦明軒本作『嘗』。
⓬六月：晦明軒本『六月』下有『九月』二字。
⓭歧：原作『岐』，據晦明軒本改。
⓮實：晦明軒本作『花』。
⓯疱：原作『皰』，據晦明軒本改。
⓰自：晦明軒本作『百』。
⓱破：原作『彼』，據晦明軒本改。
⓲藥：晦明軒本作『療』。
⓳陰：原作『云』，據晦明軒本改。
⓴芬：晦明軒本作『芳』。
㉑人：晦明軒本作『數』。
㉒煎：晦明軒本作『烈』。

圖經衍義本草卷之二十二

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

木部中品

桑根白皮



桑根白皮　味甘，寒，無毒。主傷中，五勞六極，羸瘦，崩中脉絶，補虚益氣，去肺中水氣，唾血熱渴，水腫腹滿臚脹，利水道，去寸白，可以縫金瘡。桑葉以夏秋再生採無時。出土上者殺人。續斷、麻子、桂心爲之使。葉，主除寒熱，出汗。汁解蜈蚣毒。桑耳，味甘，有毒。黑者主女子漏下赤白汁，血病癥瘕痕積聚，陰痛，陰陽寒熱，無子，療月水不調。其黄熟陳白者，止久泄，益氣，不饑。其金色者，治癖飲積聚，腹痛，金瘡。一名桑菌，一名木麥蜀本麥作麦詮荀切。五木耳，名檽音軟，益氣不饑，輕身强志。生犍爲山谷。六月多雨時採，即暴乾。

《圖經》曰：桑根白皮，《本經》不著所出州土，今處處有之。採無時。不可用出土上者，用東行根益佳。或云：木白皮亦可用。初採得，以銅刀剥去上粗❶皮，取其裏白切焙乾。其皮中青涎，勿使刮去，藥力都在其上。惡鐵及鉛，不可近之。桑葉以夏秋再生者爲上，霜後採之。煮湯淋漬手足，去風痹殊勝。桑耳，一名桑黄。有黄熟陳白者，又有金色者，皆可用，碎切，酒煎，主帶下。其實椹，有白、黑二種，暴乾。皆主變白髮。皮上白鮮，花亦名桑花，狀似地錢。刀削取炒乾，以止衄、吐血等。其柴燒灰淋汁，醫家亦多用之。桑上有蟲，主暴心痛，金瘡肉生不足。皮中白汁主小兒口瘡，傅之便愈。又以塗金刃所傷燥痛，須臾血止，更剥白皮裹之，令汁得入瘡中，良。冬月用根皮皆驗。白皮作綫，以縫金瘡腸出者，更以熱鷄血塗上。唐·安金藏剖腹用此法，便愈。《仙經》云：一切仙藥，不得桑煎不服。出《抱朴子》本名桑菌，一名木麥。五木耳，名檽，益氣，不饑，輕身强志。生山谷。六月多雨時採，即暴乾。

陶隱居云：東行桑根乃易得，而江邊多出土，不可輕信。桑耳斷穀方云：木檽，又呼爲桑上寄生，此云五木耳。而不顯四者是何木。按老桑樹，生燥耳。有黄者、赤白者，又多雨時，亦生軟濕者。人採以作菹，皆無復藥用。

陳藏器云：桑葉汁，主霍亂腹痛吐下。冬月用乾者濃煮服之，研取白汁合金瘡，又主小兒吻瘡。細剉，大釜中煎，取如赤糖，去老風及宿血。葉椹者名鷄桑，最堪入用。椹，利五臟、關節，通血氣。久服不饑。多收暴乾。搗末蜜和爲丸。每日服六十丸，變白不老。

禹錫云：按《藥性論》云：桑白皮，使，平。能治肺氣喘滿，水氣浮腫，

主傷絶，利水道，消水氣，虚勞客熱，頭痛，内補不足。桑耳，使。一名桑巨❷，又名桑黄。味甘、辛，無毒。能治女子崩中帶下，月閉血凝，産後血凝，男子痃癖，兼療伏血，下赤血。

孟詵云：桑根白皮煮汁飲，利五臟。又入散用，下一切風氣，水氣。又桑葉炙煎飲，止渴，如茶法。

《日華子》云：桑白皮，温。調中下氣，益五臟，消痰止渴，利大小便❸，開胃下食，殺腹臟蟲，止霍亂吐瀉，此即山桑根皮。又云：桑耳，温，微毒。止腸風瀉血，婦人心腹痛。

雷公曰：凡使，六❹年已上向東畔嫩根，採得後，銅刀剥上面黄薄皮一重，只取第二重白嫩青涎者，於槐砧上用銅刀剉了，焙令乾。勿使皮上涎落，涎是藥力。此藥惡鐵并鉛也。

《聖惠方》：治大風，頭面髭髮脱落。以桑柴灰熱湯淋取汁，洗頭面。以大豆水研取漿，解澤灰味，彌佳。次用熟水，入緑豆面濯之，取净。不過十度良。三日一沐頭，一日一洗面。

《外臺秘要方》：治偏風及一切風。桑樹枝剉一大升，用今年新嫩枝，以水一大斗，煎取二大升。夏用井中沉，恐酢壞。每日服一盞，空心服盡。又煎服，終身不患偏風。若預防風，能服一大升佳。又方：五痔，以桑耳作羹，空心下飯飽食之，日三食之。待孔卒痛如烏啄，取大小豆各一升，合搗作兩囊蒸之，及熱更互坐之，即瘥。

《千金方》：治口瘡白漫漫。取桑樹汁，先以髮拭口，次以汁傅之。

《肘後方》：治人少小鼻衄，小勞輒出。桑耳無多少，熬令焦，搗末。每衄發，以杏人❺塞鼻，數度即可。

《葛氏方》：卒小便多，消渴。入地三尺取桑根，剥取白皮，炙令黄黑，剉，以水煮之令濃，隨意飲之，亦可内取桑白皮汁傅之，效。

《子母秘録方》：治落胎下血不止。以桑木中蝎蟲燒末，酒服方寸匕，日二服。

《仙方》：桑根白皮條中言桑之為末，蜜丸桐子大。空心酒服四十丸，長服之，良。

《衍義》曰：桑根白皮條中言桑之用稍備，然獨遺烏椹，桑之精英盡在於此。採摘，微研，以布濾去滓，石器中熬成稀膏，量多少入蜜，再熬成稠膏，取桑柴灰研傅瘡上，佳。

《經驗方》：治咳嗽甚者，或有吐血殷鮮。桑根白皮一斤，米泔浸三宿，净刮上黄皮，剉細，入糯米四兩，焙乾。一處搗爲末。每服米飲調下一二錢。

《經驗後方》：治肺毒瘡如大風疾。緑雲散：桑葉好者，净洗，熟蒸一宿後，日乾爲末。水調二錢❻。

《廣濟❼方》：治瀉血不止。桑耳一大兩，熬令黑，水一大升三合，煎取六大合，去滓。空心分温三服。

《錢相公方》：治落胎下血不止。以桑木中蝎蟲燒末，酒服方寸匕，效。

《子母秘録方》：治蜈蚣及蜘蛛毒。取桑白皮汁傅之，效。

貯瓷器中。每抄一二錢，食後、夜卧，以沸湯點服。治服金石發熱渴，生精神，及小腸熱，性微凉。



竹葉

竹葉　篁竹葉，篁音謹味苦，平、大寒，無毒。主咳逆上氣，溢筋，急惡瘍，殺小蟲，除煩熱，風痙，喉痹，嘔吐。根，作湯，益氣止渴，補虚下氣，消毒。汁，主風痙。實，通神明，輕身益氣。生益州。淡竹葉，味辛，平，大寒。主胸中痰熱，咳逆上氣。瀝，大寒。療暴中風，風痹，胸中大熱，止煩悶。皮箔，微寒。主嘔噦，温氣，寒熱，吐血，崩中，溢筋。苦竹葉及瀝，療口瘡，目痛，明目，利九竅。竹笋《蜀本》作諸笋，味甘，無毒。主消渴，利水道，益氣。可久服。

《圖經》曰：篁竹、淡竹、苦竹，《本經》并不載所出州土，今處處有之。竹之類甚多，而入藥者惟此三種，人多不能盡別。謹按《竹譜》，篁字音斤，其竹堅而促節，體圓而質勁，皮❽白如霜，大者宜刺船，細者可爲笛。然今之刺船者❾多用桂竹。作笛者有一種，亦不名篁竹。苦竹亦有二種：一種出江西及閩中，本極粗大，笋味甚苦，不可啖；一種出江浙，近地亦時有，肉厚而葉長闊，笋微有苦味，俗呼甜苦笋，食品所最貴者，亦不聞入藥用。淡竹肉薄，節間有粉，南人以燒竹瀝者，醫家只用此一品，與《竹譜》所説大同小異。竹實今不復用。

陶隱居云：竹類甚多，此前一條云是篁竹，次用淡竹葉，最勝。又有實中薄殼者，名甘竹，笋爲佳，於藥無用。凡竹、篁竹，并以笋爲佳，於藥無用。凡取竹瀝，惟用淡竹、苦竹、篁竹爾。竹實出藍田，江東乃有花而無實，而頃來斑斑有實，狀如小麥，堪可爲飯。

禹錫云：按《藥性論》云：淡竹葉，味甘，無毒。主吐血，熱毒風，壓丹石毒，主消渴。竹燒瀝治卒中風，失音不語，苦者治眼赤。又云：青竹筎，使，味甘。能止肺痿唾血，鼻衄，治五痔。

《日華子》云：淡竹并根，味甘，冷，無毒。消痰，治熱狂煩悶，中風失音不語，壯熱頭痛，頭旋并懷妊人頭旋倒地，止驚悸，温疫迷悶，小兒驚癇天吊。莖葉同用。又云：苦竹，味苦，冷，無毒。治不睡，止消渴，解酒毒，除煩熱，發汗，治中風失音。作瀝，功用與淡竹同。

孟詵云：笋，寒。主逆氣，除煩熱，又動氣發冷癥，不可多食。越有蘆及箭笋，新者稍可食，陳者不可食。其淡竹及中母笋雖美，然發背悶脚氣。

《外臺秘要方》：療凡脱折折骨諸瘡腫者，慎不可當風及多自扇，若中風則發痓，口噤殺人。若已中風，覺頸强，身中急束者，急服此方，竹瀝飲二

三升。若已口噤者，以物强開，内之。忌冷飲食及酒。竹瀝卒煩難得，可合十許束併燒中央⑩承取，投之可活。

《千金方》：治時氣五六日，心神煩躁不解。用竹瀝半盞，新水半盞，相和令匀。非時服。

《孫真人食忌方》：卒得惡瘡不識者，燒苦竹葉和鷄子黄傅。

《食醫心鏡》云：理心煩⑪悶，益氣力，止渴。苦笋熟煮，任性食之。又苦竹笋主消渴，利水道，下氣，理風熱短⑫氣。取蒸煮食之。又簵竹⑬笋，主消渴，風熱，益氣力，發氣眼，蒸煮炒任食。

《簡要濟衆方》：頭瘡。大笋殼葉燒爲灰，量瘡大小，用灰調生油傅，入少膩粉佳。

《産書》云：治妊娠誤⑭有失墜，忽推築著疼痛。新青竹筎二合，好酒一升，煮筎三五沸，分三度服。

《衍義》曰：竹葉，凡諸竹與笋，性皆微寒，故知葉其用一致。《本經》不言笋及苦竹性，若⑩取瀝作油，亦不必强擇也。張仲景竹葉湯，用淡竹笋，難化，不益脾。鄰家一小兒，方二歲，偶失照管，壯熱、喘粗、不食、多睡、仰頭、呻吟、微嘔逆、瞑目、多驚，凡三五日，醫作慢驚治之；治不對病，不愈。忽然其母誤將有巴豆食藥作驚藥，化五丸如麻子大，灌之。良久，大吐。有物粗如小指，乃三日前臨階曝者乾箭笋。是夜諸證皆定，次日但以和氣藥調治，遂安。其難化也如此。《經》曰：問而知之者謂之工。小兒不能問，故爲難治，醫者當審謹也。

吴茱萸

味辛，温、大熱，有小毒。主温中下氣，止痛，療寒、逐風邪，開腠理，去痰冷，腹内絞痛，諸冷實不消，中惡，心腹痛，逆氣，利五臟。根，殺三蟲。根白皮，殺蟯蟲，治喉痹，咳逆，止泄注，食不消，女子經産餘血，療白癜。一名藙。生上谷川谷及冤句，今處處有之，江浙、蜀漢尤多。

木高丈餘，皮青緑色。葉似椿而闊厚，紫色。三月開花紅紫色。七月、八月結實似椒子，嫩時微黄，至成熟則深紫。九月九日採，陰乾。《風土記》曰：俗尚九月九日謂爲上九，茱萸到此日，氣烈熟色赤，可折其房以插頭，云辟惡氣禦冬。又《續齊諧記》曰：汝





吴茱萸

南桓景，隨費長房學。長房謂曰：九月九日汝家有灾厄，宜令急去，家人各作絳囊盛茱萸以繫臂上，登高飲菊花酒，此禍可消。景如言，舉家登高山，夕還見鷄、犬一時暴死。長房聞之曰：此代之矣。故世人每至此日，登高飲酒，戴茱萸囊，由此耳。世傳茱萸氣好上，言其衝膈，不爲服食之藥也。張仲景治嘔而胸滿者，茱萸湯主之。吴茱萸一升，棗二十枚，生薑一大兩，人參一兩，以水五升，煎取三升。每服七合，日三，乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之。

禹錫云：按《藥性論》云：吴茱萸，味苦、辛，大熱，有毒。能主心腹疾，積冷，心下結氣，疰心痛，治霍亂轉筋，胃中冷氣，吐瀉腹痛不可勝忍者可愈，療遍身痛痹，冷食不消，利大腸擁氣。削皮能療漆瘡，主中惡，腹中刺痛，下痢不禁，治寸白蟲。

孟詵云：茱萸，主心痛，下氣，除嘔逆，臟冷。又患風瘙癢痛者。取茱萸一升，清酒一升，和煮四五沸。冷服⑰之半升，日三服，得少汗瘥。謹按殺鬼疰氣。又開目者不堪食。又魚骨在人腹中刺痛，切，以水、酒各一升，漬一宿。平旦分再服。凡茱萸皆用細根，東北陰者良。若稍大如指已上者，皆不任用。

《千金翼方》：産後虚羸，盜汗，時時煮一盞汁服之止。又骨在肉中不出者，嚼封之，骨當爛出。脚氣衝心，可和生薑汁飲之，甚良。

雷公云：凡使，先去葉、核并雜物了，用大盆一口，使鹽水洗一百轉，自然無涎，日乾，任入丸散中用。修事十兩，用鹽二兩，研作末，投東流水四斗中，分作一百度洗，别有大效。若用醋煮，即先沸醋三十餘沸，後入茱萸，待醋盡，曬乾。每用十兩，使醋一鎰爲度。

《聖惠方》：治陰毒傷寒，四肢逆冷，宜熨。以茱萸一兩，桃人一兩，和炒令茱萸焦黑後，去茱萸，取桃人去皮尖，研細，葱白三莖，煨熟，以酒浸，温分三服。

《經驗方》：治脾元氣發歇痛不可忍者。茱萸一兩，米醋煮爛，細研爲膏，丸如梧桐子大，椒湯下七丸，空心。

《兵部手集方》：治醋心，每醋氣之，候消乃止也。又方：治癰疽發背及發乳房。茱萸一升，搗之，以苦酒和，貼病上。

《千金方》：治寸白蟲。茱萸根洗去土四兩，切，以水、酒各一升，漬一宿。平旦分再服。凡茱萸皆用細根，東北陰者良。若稍大如指已上者，皆不任用。

《千金翼方》：産後虚羸，盜汗，時時齊齊惡寒。茱萸一鷄子大，以酒三升，漬半日，煮服。

《肘後方》：治中風不能語。豉、茱萸各一升，水五升，煮取二升，稍稍服之。

《經驗方》：補水氣藥。赤茱萸二兩，米醋煮爛，細研爲膏，丸如梧桐子大，椒湯下七丸，空心。

《兵部手集方》：治醋心，每醋氣

上攻如醉⑱醋。茱萸一合，水三盞，煎七分，頓服。縱濃亦强服。

《楊氏産乳方》：療中惡心痛。吴茱萸五合，以酒三升，煮三沸，分三服。

《衍義》曰：吴茱萸，須深湯中浸去苦烈汁，凡六七過，始可用。今文與注及注中藥法皆不言，亦漏落也。此物下氣最速，腸虚人服之愈甚。





檳榔

檳榔　味辛，温，無毒。主消穀逐水，除痰癖，殺三蟲、伏尸，療寸白。生南海。

《圖經》曰：檳榔，生南海。今嶺外州郡皆有之。大如桃榔，而高五七丈，正直無枝，皮似青桐，節如桂竹。葉生木巔，大如楯頭，又似甘蕉葉。其實作房，從葉中出，傍有刺若棘針，重叠其下。一房數百實，如鷄子狀，皆有皮殼。肉滿殼中，正白。味苦澁，得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之，則柔滑而甘美。嶺南人啖之以當果實。其俗云：南方地温，不食此無以祛瘴癘。此有三四種，有小而味甘者，名山檳榔。有大而味澁核亦大者，名猪檳榔。最小者名蒟子。其功用不説有別。又云：尖長而紫文者名檳，圓而矮者名榔，檳力小，榔力大。今醫家不復細分，但取作鷄心狀、存坐正穩心不虚、破之作錦文者爲佳。其大腹，與檳榔相似，但莖、葉、根、幹小異，并皮收之，謂之大腹檳榔。或云：檳榔難得真者，今貨者多大腹也。

陶隱居云：此有三四種。出交州，形小而味甘。廣州以南者，形大而味澁。核亦有大者，名猪檳榔。作藥皆用之。又小者，南人名蒟子，俗人呼爲檳榔孫，亦可食。

《唐本》注云：檳榔生者極大，停數日便爛。今入北來者，皆先灰汁煮熟，仍火熏使乾，始堪停。其中仁主腹脹，生搗末服，利水穀道。傅瘡，生肌肉止痛。燒爲灰，主口吻白瘡。生交州、愛州及崑崙。

禹錫云：按《藥性論》云：白檳榔，君，味甘，大寒。能主宣利五臟六腑擁滯，破堅滿氣，下水腫，治心痛，風血積聚。

《海藥》云：陶弘景云：向陽曰檳榔，向陰曰大腹。味澁，温，無毒。主賁豚諸氣，不消⑲。《脚氣論》云：以沙牛尿一盞，磨一枚，空心暖服，治脚氣壅毒，水腫浮氣。

雷公云：凡使，取好存坐穩、心堅文如流水，碎破内文如錦文者妙。半白半黑并心虚者，不入藥用。凡使須別檳與榔，頭圓身形矮毗者是榔，身形

大紫文粗者是檳。檳力小，榔力大。欲使先以刀刮去底，細切。勿經火，恐無力效。若熟使，不如不用。

《聖惠方》：治胎動腰痛搶心，或有血下。用一兩爲末，非時水煮葱白濃汁，調下一錢匕。

《外臺秘要方》：若脚氣，非冷非熱，老人、弱人脹滿者。檳榔仁爲末，以檳榔殼汁或茶飲、或豉汁中調服方寸匕，甚利。

《經驗方》：治金瘡。白檳榔、黄連少許爲末，傅之即瘥。

《梅師方》：治酸心。檳榔四兩，橘皮二兩，細搗爲散。空心生蜜湯下方寸匕。

《孫真人食忌方》：治嘔吐。以白檳榔一顆，煨，橘皮十分，炙爲末。水一盞，煎半盞服。

《簡要濟衆方》：治諸蟲在臟腑久不差。檳榔[20]半兩，炮，搗爲末。每服一錢至二錢，葱、蜜煎湯調下，空心服。又方：治脚氣衝心。白檳榔一個，鷄心大者爲末，童子小便、生薑汁、温酒共半盞調，作一服。

《廣利方》：治脚氣衝心腹，悶亂不識人。白檳榔子二分，爲末。分三貼，空心暖小便五大合調服，日再服。

《御藥院方》：治痰涎。檳榔爲末，白湯點一錢。

《衍義》曰：檳榔，二書所説甚詳。今人又取尖長者入藥，言其快鋭速效。屢嘗試之，果如其説。

梔子



味苦，寒、大寒，無毒。主五内邪氣，胃中熱氣，面赤酒疱，鼻白瘾，赤瘾瘡瘍，療目熱赤痛，胸心大小腸大熱，心中煩悶，胃中熱氣。一名木丹，一名越桃。生南陽川谷。九月採實，暴乾。

《圖經》曰：梔子，生南陽川谷，今南方及西蜀州郡皆有之。木高七八尺。葉似李而厚硬，又似樗蒲子。二三月生白花，花皆六出，甚芬香，俗説即西域詹匐也。夏秋結實如訶子狀，生青熟黄，中仁深紅。九月採實，暴乾。南方人競種以售利。《貨殖傳》云：卮茜千石，亦比千乘之家。言獲利之博也。此亦有兩三種，入藥者山梔子，方書所謂越桃也。皮薄而圓小，刻房七棱至九棱者佳。其大而長者，乃作染色。又謂之伏尸梔子，不堪入藥用。張仲景《傷寒論》及古今諸名醫治發黄，皆用梔子、茵蔯、香豉、甘草等四物作湯飲。又治大病起勞復，皆用梔子、鼠矢等湯，并小利而愈。其方極多，不可悉載。

陶隱居云：解玉支毒。處處有。亦兩三種小異，以七棱者爲良。經霜乃取之，今皆入染用。

禹錫云：按《藥性論》云：山梔子，殺蜜蟲毒。去熱毒風，利五淋，羊

中惡，通小便，解五種黃病，明目，治時疾，除熱及消渴口乾，目赤腫病。

雷公云：凡使，勿用顆大者，號曰伏尸梔子，無力。須要如雀腦，并鬚長有九路赤色者上。凡使，先去皮、鬚了，取仁，以甘草水浸一宿，漉出焙乾，搗篩如赤金末用。

《食療》云：治下鮮血。梔子仁燒灰，水和一錢匕，服之，量其大小多少服之。

《千金方》：治火瘡未起。梔子仁灰，麻油和封之，厚乃佳。已成瘡，燒白糖灰粉之燥，即瘥。

《肘後方》：治霍亂，心腹脹痛，煩滿短氣，未得吐下，若轉筋。燒梔子二七枚研末，熟水調服。

《梅師方》：治熱毒下血，或因食物發動。以三十枚擘，水三升，煎取一升，去滓服。又方：治熱病新瘥，早起及多食復發。以十枚，水三升，煎取一升，去滓。温服。卧令微汗，若食不消，加大黄三兩。又方：治傷寒瘥後交接發動，因欲死，眼不開，不能語。梔子三十枚，水三升，煎取一升，服。

《勝金方》：治婦人臨産痢。不限多少燒灰，細末。空心熟水調一匙頭，甚者不過五服。

《孫尚方》[21]：治傷寒下痢後更煩，按之心下軟者，虚煩也。梔子十四枚，擘破，豉四合，二味以水四升，煎梔子取二升半，内豉更煎取一升，去滓，分再服，得吐餘勿服，嘔有癰膿者不可服，嘔膿盡乃愈。

《衍義》曰：梔子，仲景治發汗吐下後，虚煩不得眠。若劇者，必反覆顛倒[22]，心中懊憹，梔子豉湯治之。虚，故不用大黄，有寒毒故也。梔子雖寒無毒，治胃中熱氣，既亡血、亡津液，腑臟無潤養，内生虚熱，非此物不可去，張仲景《傷寒論》已著。又治心經留熱，小便赤澀，去皮山梔子火炮、大黄、連翹、甘草炙，等分末之，水煎三二錢匕，服之無不效。

紫礦騏驎竭　味甘、鹹，平，有小毒。主五臟邪氣，帶下，止痛，破積血，金瘡生肉，與騏驎竭二物大同小異。

禹錫云：按《日華子》云：紫礦，無毒。治驢馬蹄漏，可熔補。又云：騏驎竭，暖，無毒。得密陀僧良。治一切惡瘡疥癬，久不合者傅此藥，性急亦不可多使，却引膿。

《圖經》曰：騏驎竭，舊不載所生州土，今出南蕃諸國及廣州。木高數丈，婆娑可愛。葉似櫻桃而有三角。其脂泪從木中流出，滴下如膠飴狀，久而堅凝乃成竭，赤作血色，故謂之血竭。採無時。其味鹹而氣腥者，是海母血，不可用。真竭微鹹而甘，作梔子氣味。舊説與紫礦大都相似，而別是一物，功力亦殊。今按段成式《酉陽雜俎》云：紫礦出真臘國，國人呼爲勒



紫礦騏驎竭

佉。亦出波斯國。木高丈許，枝幹繁鬱，葉似橘柚，冬不凋落。三月花開，不結子。每有霧露微雨沾濡其枝條，則爲紫礦。

雷公云：騏驎竭，凡使勿用海母血，真似騏驎竭，只是味鹹并腥氣。其騏驎竭，味微鹹、甘，似栀子氣是也。欲使，先研作粉重篩過，臨使，安於丸散或膏中，任使用，勿與衆藥同搗，化作飛塵也。

《聖惠方》：産後血暈不知人及狂語。騏驎竭一兩，細研爲末，非時温酒調二錢匕。

《廣利方》：治金瘡血不止兼痛，騏驎竭末傅之，立止。

《衍義》曰：紫礦，如糖霜結於細枝上，累累然，紫黑色，研破則紅。今人用造綿烟脂，邇來亦難得。

龍腦香及**膏香**　味辛、苦，微寒一云温、平，無毒。主心腹邪氣，風濕積聚，耳聾，明目，去目赤膚翳。出婆律國。形似白松脂，作杉木氣，明淨者善。久經風日或如雀屎者不佳。云合糯一作粳米炭、相思子貯之則不耗。膏主耳聾。



龍腦香

《圖經》曰：龍腦香，出婆律國。相傳云：其木高七八丈，大可六七尺圍，如積年杉木狀，旁生枝，葉正圓而背白，結實如豆蔻，皮有甲錯，香即木中脂。似白松脂，作杉木氣。膏乃根下清液耳，亦謂之婆律膏。段成式《酉陽雜俎》説：此木有肥瘦，瘦者出龍腦香，其香在木心。波斯斷其木剪取之。肥者出婆律膏，於木端流出，斫木作坎而承之。兩説大同而小異。今海南龍腦，多用火煠成片，其中亦容雜僞。入藥惟貴生者，狀若梅花瓣，甚佳也。

《唐本》注云：樹形似杉木。言婆律膏，是樹根下清脂。龍腦，是根中乾脂。子似豆蔻，皮有甲錯㉓，香似龍腦。味辛。尤下惡氣，消食散脹滿，香人口。舊云出婆律國。藥以國爲名，即杉脂也。江南有杉木，未經試。或方土無脂，猶甘蕉無實。唐本先附。

《經驗方》：治急中風，目瞑牙噤，無門下藥者。以中指點散子揩齒三二十，揩大牙左右，其口自開。如得下藥，龍腦、天南星等分爲末，鉢内研，自五月五日午時合出者，只用一字至半

藥，獨行則勢弱，佐使則有功，於茶爾㉗相宜，多則掩茶氣味，萬物中香無出其右者。西方抹羅短吒國，在南印度境，有羯布羅香。榦如松株，葉異，濕時無香。採乾之後，折之，中有香，狀類雲母，色如冰雪，此龍腦香也。蓋西方亦有。

食茱萸



食茱萸　味辛、苦，大熱，無毒。功用與吴茱萸同。少爲劣爾。療水氣用之乃佳。

《圖經》曰：食茱萸，舊不載所出州土，云功用與吴茱萸同，或云：即茱萸中顆粒大，經久色黄黑，堪啖者是，今南北皆有之。其木亦甚高大，有長及百尺者。枝莖青黄，上有小白點。葉正類油麻，花黄。蜀人呼其子爲艾子，蓋《禮記》所謂藙者。元艾聲訛故云耳。宜入食羹中，能發辛香，然不可多食，多食衝眼，兼又脱髮，採無時。

《唐本》注云：皮薄開口者是。雖名爲食茱萸，而不堪多啖之也。

陳藏器云：食茱萸，殺鬼魅及惡蟲毒，起陽，殺牙齒蟲痛。唐本先附。又云：《經》已有吴茱萸，云是口折者。且茱萸南北總有，以吴地爲好，所以有吴之名。兩處俱堪入食，若充藥用，要取吴者。

禹錫云：按《藥性論》云：畏紫石英。治冷痹，腰脚軟弱，通身刺痛，腸風，痔疾，殺腸中三蟲，去虚冷。

《孫真人食忌》云：六月、七月勿食，傷人氣，發瘡疾。

《勝金方》：治蛇咬毒。茱萸一兩，爲末，冷水調。分爲三服，立瘥。

蕪荑　味辛，平，無毒。主五内邪氣，散皮膚、骨節中淫淫温行毒，去三蟲，化食，逐寸白，散腸中嗢嗢喘息。一名無始，一名蔽瑭上音殿，下音唐。生晋山川谷。三月採實，陰乾。



蕪荑

《圖經》云：蕪荑，生晋山川谷，今近道亦有之。大抵榆類而差小，其實亦早成，此榆乃大，氣臭如犰。《爾雅·釋木》云：無姑，其實夷。郭璞云：無姑，姑榆也。生山中，葉圓而厚，剥取皮合漬之，其味辛香，所謂蕪荑也。又《釋草》云：莁荑，蔱蘠。注云：一名白蕢，而與《本經》一名蔽音殿瑭音唐相近。蘇恭云：蔱蘠，蔽瑭，字之誤也。然莁荑草類，蕪荑乃木也，明是二物。或氣類之相近歟。三月採實，陰乾。

殺蟲方中多用之。今人又多取作屑，以苄五味，其用陳者良。人收藏之，多以鹽漬，則失氣味，此等不堪入藥，但可作食品耳。

《藥性論》云：蕪荑，使，味苦、辛。能主積冷氣，心腹癥痛，除肌膚節中風，淫淫如蟲行。

陶隱居云：今惟出高麗，狀如榆莢，氣臭如狐，人皆作醬食。性殺蟲，置物中辟蛀，但患其臭。

陳藏器云：作醬食之。主五鷄病，除瘡癬。其氣膻者良，此山榆人也。

孟詵云：主五臟、皮膚、肢節邪氣。又和白蜜治濕癬，和沙牛酪療一切瘡。陳者良。可少食之，傷多發熱心痛，爲辛故也。秋天食之尤宜人。長食治五痔，諸病不生。

《日華子》云：治腸風痔瘻，惡瘡疥癬。

《海藥》云：謹按《黄㊷州記》云：生大秦國，是波斯蕪荑也。味辛，温，無毒。治冷痢，心氣，殺蟲止痛，又婦人子宮風虛，孩子疳瀉。得訶子、豆蔻良。

《食療》云：散腹㊸中氣痛，又和馬酪可治癬。作醬甚香美，功尤勝於榆人。陳者良。又殺中惡蠱毒。

《外臺秘要方》：治膀胱氣急，宜下氣。蕪荑，又㊹和食鹽末，二物等分，以綿裹如棗大，内下部，或下水惡汁并下氣，佳。

《千金方》：主脾胃有蟲，食即痛，面黄無色，疼痛無時，必效。以石州蕪荑仁二兩，和麵炒，令黄色，爲末，非時米飲調一錢匕，瘥。

《衍義》曰：文具枳實條下。

陳藏器云：其根皮主野鷄病。末小蕪荑即榆莢也。揉取仁，醞爲醬，味尤辛。入藥，當用大蕪荑，别有種。然小蕪荑醞造多假以外物相和，不可不擇去也。治大腸寒滑及多冷氣，不可缺。

枳殼　味苦、酸，微寒，無毒。主風癢麻痹，通利關節，勞氣咳嗽，背膊悶倦，散留㊺結胸膈痰滯，逐水，消脹滿，大腸風，安胃，止風痛。生商州川谷。九月、十月採，陰乾。用當去瓤核乃佳。此與枳實主療稍别，故特出此條。今附。



枳殼

脹虛，關膈擁塞。根，浸酒煎含，治齒痛，消痰，有氣加而用之。

《日華子》云：健脾開胃，開五臟，下氣，止嘔逆，消痰，治反胃，霍亂，瀉痢，消食，破癥結痃癖，五膈氣，除風，明目及肺氣水腫，利大小腸，皮膚癢，痔腫可炙熨，入藥浸軟，剉，炒令熟。

雷公云：凡使，勿用枳實，緣性效不同。若使枳殼，取辛苦腥并有隙油，能消一切痛，要陳久年深者爲上。用時先去瓤，以麩炒過，待麩焦黑遂出，用布拭上焦黑，然後單搗如粉用。

《千金方》：主口僻眼急風。枳茹刮取上青爲末，欲至瓤上者得茹五升，微火灼，去濕氣。以酒三升，漬，微火暖令得藥味[33]，遂性飲之。

《肘後方》：治中風身直，不得屈伸者。刮枳樹皮一升，酒二升，漬一宿，服五合至一升，酒盡再作。

《食醫心鏡方》：治水氣皮膚癢及明目。枳殼一兩，杵末，如茶法煎呷之。

《經驗後方》：治風疹癢不止。枳殼三兩，麩炒微黃，去瓤爲末。每服二錢，非時水一中盞，煎至六分，去滓服。

《梅師方》：治一切瘡。以水煮枳殼爲煎塗之。

《博濟方》：治遠年日近腸風下血不止。枳殼燒成黑灰存性，羊脛炭爲末，枳殼末五錢，炭末三錢，和勻。用濃米飲一中盞調下，空心服，五更初一服。如人行五里，再服。當日見效。

《必效方》：瘦胎散：昔胡陽公主不可忍。枳殼四兩，甘草二兩，爲七枚立定。發即熨之。

《杜壬方》：進枳殼四兩，甘草二兩，爲難產，方士[34]進枳殼四兩，甘草二兩，爲末。每服空心大錢匕，如茶點服。自五月後一日一服，至臨月不惟易產，仍無胎中惡病。忌登高厠。



枳實

主大風在皮膚中如麻豆苦癢，除寒熱結，止痢，長肌肉，利五臟，益氣輕身，除胸脅痰癖，逐停水，破結實，消脹滿，心下急痞痛逆氣，脅風痛，安胃氣，止溏泄，明目。生河內川澤。九月、十月採，陰乾。

《圖經》曰：枳實，生河內川澤，枳殼，生商州川谷，今西京、江湖州郡皆有之，以商州者爲佳。如橘而小，高亦五七尺。葉如梔，多刺。春生白花，至秋成實。九月、十月採，陰乾。舊說七月、八月採者爲實，九月、十月採者爲殼。今醫家多以皮厚而小者爲實，實殼。皆以翻肚如盆口唇狀、須完大者爲殼，陳久者爲勝。近道所出者，俗呼臭橘，不堪用。張仲景治心下堅大如盤，水飲所作，枳實朮湯主之。枳實七枚，朮三兩，以水一斗，煎取三升，分三服，腹中軟即消。

陶隱居云：今處處有。採破令乾用之。除中核，微炙令香。亦如橘皮，以陳者爲良。枳樹莖及皮，療水脹，暴

風骨節疼急。枳實，俗方多用，道家不須。

陳藏器云：枳實根皮主痔，末服方寸匕㉟。凡《本經》採實用，九月、十月，不如七月、八月，物厚且辛。舊云江南爲橘，江北爲枳。今江南俱有枳、橘，江北有枳無橘。此是自種別，非關變也。

禹錫云：按《藥性論》云：枳實，臣，味苦、辛。解傷寒結胸。入陷胸湯用，主上氣喘咳，腎内傷冷，陰陽㊱而有氣，加而用之。

《外臺秘要方》：塗風疹。取枳實以醋漬令濕㉟，火炙令熱，適寒温用熨上，即消。

《千金方》：治胸痹氣壅滿，心膈不利。枳實二兩，麩炒微黄，爲末。非時以清粥飲調下二錢。《聖惠方》同。

又方：治積痢脱肛。枳實，滑鑽著柄，蜜塗，火炙令暖，更易熨肛，以年月日久新。枳實爲末，煉蜜丸如桐子大，空心飲下二十丸。

《濟衆方》：治傷寒後，卒胸膈閉痛。枳實一味剉，麩炒黄爲末。服二錢，米飲調下，日二服。

《廣利方》：治小兒久痢淋瀝，水穀不消。枳實六分搗末，以飲汁調二錢匕，二歲服一錢。

《子母秘録方》：治婦人陰腫堅痛。用半斤，碎炒令熱，故帛裹熨，冷即易之。

《衍義》曰：枳殼，枳實，一物也。小則性酷而速，大則性詳而緩。故張仲景治傷寒倉卒之病，承氣湯中用枳實，此其意也。皆取其疏通决泄、破結實之義。他方但導敗風壅之氣，可常服者，故用枳殼。

厚朴

味苦，温、大温，無毒。主中風傷寒，頭痛，寒熱，驚悸，氣血痹，死肌，去三蟲，温中益氣，消痰下氣，療霍亂及腹痛脹滿，胃中冷逆，胸中嘔不止，泄痢淋露，除驚，去留熱，心煩滿，厚腸胃。一名厚皮，一名赤朴。其樹名榛，其子名逐折。療鼠瘻，明目，益氣。生交趾、冤句。三月、九月採皮，陰乾。薑爲之使，惡澤瀉、寒水石、消石。





《圖經》曰：厚朴，出交趾、冤句，今京西、陝西、江淮、湖南、蜀川山谷中往往有之，而以梓州、龍州者爲上。木高三四丈，徑一二尺。春生葉如槲葉，四季不凋。紅花而青實。皮極鱗皴而厚，紫色多潤者佳，薄而白者不堪。三

月、九月、十月採皮，陰乾。《廣雅》謂之重皮。方書或作厚皮。

《藥性論》云：厚朴，臣，忌豆。食之者動氣。味苦、辛，大熱。能主療積年冷氣，腹內雷鳴虛吼，宿食不消，除痰飲，去結水，破宿血，消化水穀，止痛，大温胃氣，嘔逆酸水，主心腹滿，病人虛而尿白。

陶隱居云：今出建平、宜都。極厚、肉紫色爲好，殼薄而白者不如。用之削去上甲錯皮，俗方多用，道家不須。今注出梓州、龍州者最佳。

禹錫云：按吴氏云：厚朴，神農、岐伯、雷公：苦，無毒。季氏：小温。范子，厚朴，出洪農。

《日華子》云：健脾，主反胃，霍亂轉筋，冷熱氣，瀉膀胱、泄五臟一切氣，婦人産前、産後腹[38]臟不安[39]，調關節殺腹藏蟲，除驚，去煩悶，明耳目。入藥去粗皮，薑汁炙，或薑汁炒用。又名烈朴。

雷公曰：凡使，要用紫色味辛爲好，或丸散，便去粗皮。用酥炙過。修一斤用酥四兩，炙了[40]細剉用。若湯飲中使用，自然薑汁八兩炙，一升爲度。

《聖惠方》：治霍亂。製之以薑汁，火上炙，令香，爲末。非時新水調下二錢匕，佳。

《梅師方》：治水穀痢久不瘥。厚朴三兩，黄連三兩，剉，水三升，煎取一升。空心服。

《子母秘録方》：治月水不通。厚朴三兩，以水三升，煎取一升，爲三服，空心。不過三四劑，瘥。

《衍義》曰：厚朴，今西京伊湯[41]縣及商州亦有。但薄而色淡，不如梓州者厚而紫色有油，味苦，不以薑製，則棘人喉舌。平胃散中用，最調中。至今此藥盛行，既能温脾胃氣，又能去冷氣，爲世所須也。

《唐本》注云：《爾雅·釋木》云：檟，苦荼。注：樹小似梔子。冬生葉，可煮作羹飲。今呼早採者爲茶，晚取者爲茗，一名荈，蜀人名之苦荼。生山南漢中山谷。

陳藏器云：茗、苦荼，寒。破熱氣，除瘴氣，利大小腸。食之宜熱，冷食，殊不同也。

《圖經》曰：茗、苦荼，舊不著所出州郡，今閩浙、蜀荆、江湖、淮南山中皆有之。《爾雅》所謂之苦荼。郭璞云：大小似梔子，冬生葉，可煮作羹飲。今呼早採者爲茶，晚取者爲茗。一名荈，蜀人謂之苦荼是也。今通謂之茶。春中始生嫩葉，茶、荼聲近，故呼之。春中採葉，蒸焙去苦水，末之乃可吃。與[42]古所

茗、苦荼茗

味甘、苦，微寒，無毒。主瘿瘕，利小便，去痰熱、渴，令人少睡。春採之。苦荼，主下氣，消宿食。作飲，加茱萸、葱、薑等良。



茗苦荼茗

即聚痰。茶是茗嫩葉㊸，搗成餅，并得火良。久食令人瘦，去人脂，使不睡。

唐本先附。

《茶譜》云：蒙山有五頂，頂有茶園，其中頂曰上清峰。昔有僧人病冷且久，遇一老父謂曰：蒙之中頂茶，當以春分之先後，多聚人力，俟雷之發聲，併手採摘，三日而止。若獲一兩，以本處水煎服，即能祛宿疾，二兩當限前無疾，三兩固以換骨，四兩即爲地仙矣。

《外臺秘要方》：治卒頭痛如破，非中冷，非中風，其病是胸膈有痰，厥氣上衝所致，名爲厥頭痛。吐之即差。單煮茗，作飲二三升，適冷暖，飲一二升，須臾吐，吐畢又飲，能如此數過，劇者須吐膽汁乃止，不損人，待渴即瘥。

《食醫心鏡方㊹》：主赤白痢及熱毒痢。好茶一斤，炙搗末，濃煎一二盞吃。如久患痢，亦宜服。

《經驗方》：治陰囊上瘡。用蠟面茶爲末，先以甘草煎水，洗後用貼，妙。

《別説》云：謹按《圖經》云：今閩浙、蜀荆、江湖、淮南山中皆有之，唯建州北苑數處産，此性味獨與諸方略不同。今亦獨名臘茶，研治作餅，日得火愈良。或用芽、葉，爲末收貯，微若見大便更，不可久收。

《衍義》曰：茗、荈、苦荼，今茶㊺也。其文有陸羽《茶經》、丁謂《北苑茶録》、毛文錫《茶譜》、蔡宗顔《茶山節對》，其説甚詳。然古人謂其芽爲雀舌、麥顆，言其至嫩也。又有新芽一發，便長寸餘，微粗如針。惟芽長爲上品，其根幹、水土力皆有餘故也。如雀舌、麥顆又下品，前人未盡識，誤爲品題。唐人有言曰：釋滯消壅，一日之利暫佳，斯言甚當，飲茶者宜原其始終。又晉温嶠上表，貢茶千斤，茗三百斤。郭璞曰：早採者爲茶，晚採者爲茗。茗或曰荈㊻，葉老者也。

秦皮　味苦，微寒、大寒，無毒。主風寒濕痹，洗洗寒氣，除熱，目中青翳白膜，療男子少精，婦人帶下，小兒癇，身熱。可作洗目湯。久服頭不白，輕身，皮膚光澤，肥大有子。一名岑皮，一名石檀。生廬江川谷及菟句。二月、八月採皮，陰乾。大戟爲之使，惡吴茱萸。





《圖經》曰：秦皮，生廬江川谷及菟句，今陝西州郡及河陽亦有之。其木大都似檀，枝幹皆青緑色。葉如匙頭許大而不光。并無花實，根似槐根。二月、八月採皮，陰乾。其皮有白點而不粗錯，俗呼爲樗木。取皮漬水便碧

色，書紙看之青色，此爲真也。

《外臺秘要方》：治赤眼及睛上瘡。秦皮一兩，清水一升，於白碗中浸，春夏一食時以上，看碧色出，即以箸頭纏綿，仰卧點所患眼，仍先從大眦中滿眼著，微痛不畏，良久，三五飯之間，即側卧瀝却熱汁。每日十度已上著，不過兩日瘥。

《沈存中方》：秦皮，治天蛇毒，似癩而非癩也。天蛇，即草間黄花蜘蛛是也。人被其螫，仍爲露水所濡，乃成此疾。遂煮汁一斗，飲之瘥。

圖經衍義本草卷之二十二

❶粗：原作『下』，據晦明軒本改。
❷巨：晦明軒本作『臣』。
❸便：晦明軒本作『腸』。
❹六：晦明軒本作『十』。
❺人：晦明軒本『人』下有『大』字。
❻錢：晦明軒本『錢』下有『匕』字。
❼濟：晦明軒本作『利』。
❽皮：原作『成』，據晦明軒本改。
❾可爲笛。然今之刺船者：此九字原脱，據晦明軒本補。
⓫央：原作『灰』，據晦明軒本改。
⓬煩：原作『原』，據晦明軒本改。
⓭短：晦明軒本作『脚』。
⓮竹：原脱，據晦明軒本補。
⓯誤：原作『俱』，據晦明軒本改。
⓰若：原作『苦』，據晦明軒本改。
⓱於：晦明軒本『於』下有『喉』字。
⓲服：原作『酢』，據晦明軒本改。
⓳醉：晦明軒本作『釅』。
⓴不消：晦明軒本『不』上有『宿食』二字。
㉑榔：原脱，據晦明軒本補。
㉒孫尚方：晦明軒本作『孫尚藥』。
㉓倒：原脱，據晦明軒本改。
㉔錯：原作『醋』，據晦明軒本改。
㉕睡：原作『腫』，據晦明軒本改。
㉖名：晦明軒本作『各』。
㉗中：晦明軒本作『驚』。
㉘爾：晦明軒本作『亦』。
㉙黄：晦明軒本作『廣』。
㉚腹：原作『願』，據晦明軒本改。
㉛又：晦明軒本作『搗』。
㉜留：原作『瘤』，據晦明軒本改。
㉝肌：原作『風』，據晦明軒本改。
㉞味：原作『末』，據晦明軒本改。
㉟士：原作『上』，據晦明軒本改。
㊱匕：原脱，據晦明軒本補。
㊲陽：晦明軒本作『痿』。
㊳濕：原作『温』，據晦明軒本改。
㊴腹：原作『風』，據晦明軒本改。
㊵安：原脱，據晦明軒本補。
㊶了：原作『子』，據晦明軒本改。
㊷湯：晦明軒本作『陽』。
㊸與：原脱，據晦明軒本補。
㊹葉：原作『蒸』，據晦明軒本改。
㊺方：晦明軒本無『方』字。
㊻茶：原脱，據晦明軒本補。
㊼兖：晦明軒本作『尺充切』三小字。

圖經衍義本草卷之二十三

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

木部中品

秦椒





秦椒　味辛，温，生温熟寒，有毒。主風邪氣，温中除寒痹，堅齒髮，明目，療喉痹，吐逆，疝瘕，去老血，産後餘疾腹痛，出汗，利五臟。久服輕身，好顏色，耐老增年通神。生太山川谷及秦嶺上，或琅琊。八月、九月采實。惡栝蔞、防葵，畏雌黄。

《圖經》曰：秦椒，生太山川谷及秦嶺上或琅琊，今秦、鳳間、及明、越、金、商州皆有之。初秋生花，秋末結實，九月、十月采。陶隱居云：似椒而大，色黄黑，或呼大椒。蘇恭云：葉及莖、子都似蜀椒，但實細味短。《爾雅》云：檓，大椒。郭璞云：椒叢生，實大者名爲檓。《詩·唐風》云：椒聊且。陸機疏云：椒似茱萸，有針刺。莖葉堅而滑。蜀人作茶，吴人作茗，皆合煮其葉以爲香。今成皋諸山謂之竹葉椒，其木亦如蜀椒，少毒熱，不中合藥，可著飲食中。又用蒸鷄、豚最佳。

《藥性論》云：秦椒，君，味苦、辛。能治惡風遍身，四肢痛痹，口齒浮腫摇動，主女人月閉不通，治産後惡血痢，多年痢，主生髮，療腹中冷痛。

陶隱居云：今從西來。形似椒而大，色黄黑，味亦頗有椒氣。或呼爲大椒。又云：即今樛樹。而樛子是猪椒，恐謬。樛，居虬切。

孟詵云：秦椒，温。滅瘢，長毛，去血。若齒痛，醋煎含之。又損瘡中風者，以麵作餛飩，灰中燒之使熱，斷使口開，封其瘡上，冷即易之。又法：去閉口者❶水洗，麵拌煮作粥。空腹吞之，以飯壓之，重者再服。

《傷寒類要》：治膏癚，其人飲少小便多方：秦椒一分出汗，瓜蒂二分末。水服方寸匕，日三服。

《續千金方》：治蟲入耳。椒末一錢，醋半盞，浸良久，少少灌耳，蟲自耳出。

《衍義》曰：秦椒，此秦地所出者，故言秦椒。大率椒株皆相❷似，秦椒但葉差大，椒粒亦大而紋低，不若蜀椒皺紋高爲異也。然秦地亦有蜀種椒。如此區別。

山茱萸

山茱萸　味酸，平、微温，無毒。主心下邪氣，寒熱，温中，逐寒濕痹，去三蟲，腸胃風邪，寒熱疝瘕，頭風，風氣

山茱萸





去來，鼻塞，目黃，耳聾，面疱❸，温中下氣，出汗，强陰益精，安五臟，通九竅，止小便利。久服輕身，明目，强力長年。一名蜀棗，一名鷄足，一名魁音妓實。生漢中山谷及琅琊、冤句、東海承縣。九月、十月采實，陰乾。使，惡桔梗、防風、防己。

《圖經》曰：山茱萸，生漢中山谷及琅琊、冤句、東海承縣，今海州亦有之。木高丈餘，葉似榆，花白。子初熟未乾，赤色，似胡蘇子，有核，亦可啖；既乾，皮甚薄。九月、十月采實，陰乾。

吴普云：一名鼠矢。葉如梅，有刺毛。二月花如杏。四月實如酸棗，赤。五月采實。似此小異也。

陶隱居云：出近道諸山中大樹。子初熟未乾，赤色，亦可啖；既乾，皮甚薄，當以合核爲用爾。

禹錫等按：《藥性論》云：山茱萸，使，味鹹、辛，大熱。治腦骨痛，止月水不定，補腎氣，興陽，堅長陰莖，添精髓，療耳鳴，除面上瘡，主能發汗，止老人尿不節。

《日華子》云：暖腰膝，助水臟，除一切風，逐一切氣，破癥結，治酒鼾。

雷公云：凡使，勿用雀兒蘇，真似山茱萸，須去内核。每修事去核子，一片❹取内❺皮用，只秤成四兩已來，緩火熬之方用。能壯元氣，秘精。核能滑精。

《衍義》曰：山茱萸，與吴❻茱萸甚不相類。山茱萸色紅，大如枸杞子。吴茱萸如川椒，初結子時，其大小亦不



紫葳 音威

味酸，微寒，無毒。主婦人産乳餘疾，崩中，癥瘕血閉，寒熱羸瘦，養胎。茎、葉：味苦，無毒。主痿蹶，益氣。名凌霄花。生西海川谷及山陽。

《圖經》曰：紫葳，凌霄花也。生西海川谷及山陽，今處處皆有，多生山中，人家園圃亦或種蒔。初作藤蔓生，依大木，歲久延引至巔而有花。其花黄赤，夏中乃盛。陶隱居云：《詩》有

過椒，色正青。得名則一，治療又不同，未審當日何緣如此命名。然山茱萸能養腎臟，無一不宜。《經》與《注》所説備矣。

苕之華。郭云凌霄。又蘇恭引《爾雅·釋草》云：苕，陵苕❼。郭云又名陵霄。按今《爾雅》注：苕，云而無陵霄之説，豈古今所傳書有異同邪？又據陸機及孔穎達疏義亦云：苕，一名陵時。本草乃是鼠尾草之別名，郭又謂苕爲陵時。本草云：今紫葳無陵時之名，而鼠尾草有之。乃知陶、蘇所引，是以陵時作陵霄耳。又陵霄，非是草類，益可明其誤矣。今醫家多采其花乾之，入婦人血崩風毒藥，又治少女血熱風毒，四肢、皮膚生癮疹，并行經脉方：陵霄花不以多少，搗羅爲散。每服二錢，温酒調下，食前服，甚效。

《藥性論》云：紫葳，臣，一名女葳，畏鹵鹹，味甘。主熱風風癇，大小便不利，腸中結實，止産後奔血不定，淋瀝，安胎。

《日華子》云：根，治熱風身癢，游風風疹，治瘀血帶下。花、葉功用同。

《斗門方》：治暴耳聾。凌霄葉，爛杵自然汁，灌耳内，瘥。

《衍義》曰：紫葳，今蔓延而生❽，謂之爲草。又有木❾身，謂之爲木。又爲金銀焊藥。出肅州以西平澤及山谷中。形似黄礬而堅實。有夾立瘥。又主牛馬急黄黑汗，水研三二兩灌之，須物而上。然幹不逐冬斃，亦得木之多也，故分入木部爲至當。唐·白樂天詩：有木名凌霄，擢秀非孤標。由是地作之。其樹高大，皮、葉似白楊、青桐、桑輩，故名胡桐律。律❿、泪聲訛也。《西域傳》云：胡桐泪，出肅州以西平澤及山谷中，今西蕃亦有商人貨之者。相傳其木甚高大，皮似白楊、青桐、檟麥根爲紫葳，何得復用莖、葉？此説其葉初生似柳，漸大則似桑、桐者。其葉津液淪入地中，與大石相著，冬月采得之，狀如黄礬、薑石，味極鹹苦，得水便消，如消石也。古方稀用，今治口齒家爲最要之物。一名胡桐律。律、泪聲近也。然有一種木律極相類，不堪用也。

《日華子》云：治風蚰牙齒痛。有二般：木律不中入藥用；石律形如小石片子，黄土色者爲上。即中入齒藥用，兼殺火毒并麵毒。

《海藥》云：謹按《嶺表記》云：主



胡桐泪　味鹹、苦，大寒，無毒。主大毒熱，心腹煩滿，水和服之，取吐。

風疳蟲齒牙疼痛，骨槽風勞，能軟一切物。多服令人吐。作律字非。

猪苓



猪苓　味甘、苦，平，無毒。主疫音瘧，解毒蠱疰不祥，利水道。久服輕身耐老。一名豨猪屎。生衡山山谷及濟陰冤句。二月、八月采，陰乾。

《圖經》云：猪苓，生衡山山谷及濟陰冤句，今蜀州、眉州亦有之。舊説是楓木苓，今則不必楓根下，乃有生土底，皮黑作塊似猪糞，故以名之。又名地烏桃。二月、八月采，陰乾。削去皮，肉白而實者佳。《莊子》謂之豕橐。司馬彪注云：一名苓，根似猪矢，治渴。

《藥性論》云：猪苓，臣，微熱。解傷寒温疫大熱，發汗，主腫脹滿，腹急痛。

陶隱居云：舊云是楓樹苓，其皮至黑作塊，似猪屎，故以名之。肉白而實者佳，削去黑皮用。

禹錫云：按吴氏云：猪苓，神農：甘；雷公：苦，無毒，甘⓫。

雷公云：凡採得，用銅刀削去粗皮一重，薄切，下東流水浸一夜，至明漉出，細切，以升麻葉對蒸一日，出，去升麻葉，令净，曬乾用。

《外臺秘要》：治妊娠患子淋。猪苓五兩，一味末，以白湯三合服方寸匕，漸至二匕，日三夜二。

《子母秘録》：治妊娠從脚上至腹腫，小便不利，微渴。猪苓五兩末，以熟水服方寸匕，日三服。

《楊氏産乳》：療通體遍身腫，小便不利。猪苓令五兩，搗篩，煎水三合。調服方寸匕，加至二匕。

《衍義》曰：猪苓，行水之功多。久服必損腎氣，昏人目。果欲久服者，更宜詳審。

烏藥



烏藥　味辛，温，無毒。主中惡心腹痛，蠱毒疰忤鬼氣，宿食不消，天行疫癘，膀胱肭腎間冷氣攻衝背膂，婦人血氣，小兒腹中諸蟲。其葉及根，嫩時采作茶片，炙碾煎服，能補中益氣，偏止小便滑數。生嶺南邕、容州及江南。樹生似茶，高丈餘。一葉三椏，葉青陰白。根色黑褐，作車轂形，狀似山芍藥根，又似烏樟根。自餘直根者不堪。

一名旁其。八月採根。

《圖經》曰：烏藥，生嶺南邕、容州及江南，今台州、雷州、衡州亦有之，以天台者爲勝。木⑫似茶櫃，高五七尺。葉微圓而尖，作三椏，面青背白。五月開細花，黄白色。六月結實如山芍藥。然根有而有極粗大者，又似釣樟根。二種：嶺南者，黑褐色而堅硬；天台者，白而虚軟，并八月採。根以作車轂形如連珠狀者佳。或云：天台出者香白可愛，而不及海南者力大。

禹錫云：按《日華子》云：治一切氣，除一切冷，霍亂及反胃吐食瀉痢，癰癤疥癬，并解冷熱，其功不可悉載。猫、犬百病，并可磨服。

《斗門方》：陰毒傷寒。烏藥子一合，炒令黑烟起，投水中，煎三五沸，服一大盞，候汗出回陽立可。

《衍義》曰：烏藥，和來氣少，走泄多，但不甚剛猛。與沉香同磨作湯點，治胸腹冷氣，甚定當。

没藥

味苦，平，無毒。主破血止痛，療金瘡杖瘡，諸惡瘡痔漏，卒下血，目中翳暈痛膚赤。生波斯國。似安息香，其塊大小不定，黑色。



《圖經》曰：没藥，生波斯國，今海嶺⑫諸國及廣州或有之。木之根株皆如橄欖，葉青而密。歲久者，則有膏液流滴在地下，凝結成塊，或大或小，亦類安息香。採無時。今方多用治婦人血暈及臍腹疠⑭刺者。内傷痛楚，又治血暈及臍腹疠⑭刺者。没藥一物，研細，温酒調一錢，便止。又治歷節諸風，骨節疼痛，晝夜不可忍者。没藥半兩，研，虎腦⑮骨三兩塗酥炙黄色，先搗羅爲散，與没藥同研令細。温酒調二錢，日三服，大佳。

禹錫云：按《藥性論》云：没藥單用亦得。味苦、辛。能主打撲損，心腹血瘀，傷折踒跌，筋骨瘀痛，金刃所損，痛不可忍。皆以酒投飲之。良。

《日華子》云：破癥結，宿血，消腫毒。

《海藥》云：謹按徐表《南州記》：生波斯國，是彼處松脂也。狀如神香，赤黑色。味苦、辛，温，無毒。主折傷馬墜，推陳置新，能生好血。凡服皆須研爛，以熱酒調服。

《衍義》曰：没藥，大概通滯血。打撲損疼痛，皆以酒化服。血滯則氣壅淤，氣壅淤則經絡滿急，經絡滿急故痛且腫。凡打撲著肌肉須腫脹者，經絡傷，氣血不行壅淤，故如是。

龍眼

味甘，平，無毒。主五臟邪氣，安志厭食，除蟲去毒。久服强魂聰明，輕身不老，通神明。一名益智。其大者似檳榔。生南海山谷。

陶隱居云：廣州別有龍眼，似荔枝而小，非益智，恐彼人別名，今者爲

龍眼



益智爾。食之并利人。

《唐本》注云：益智似連翹子頭未開者。味甘、辛。殊不似檳榔。其苗、葉、花、根，與豆蔻無別，惟子小爾。龍眼一名益智，而益智非龍眼也。其龍眼樹似荔枝，葉若林檎，花白。子如檳榔，有鱗甲，味甘、酸。

《衍義》曰：龍眼，《經》曰：一名益智。今專爲果，未見入藥，《補注》不言。《神農本草》編入木部中品，果部中復不曾收入。今除爲果之外，別無龍眼。若謂爲益智子，則專調諸氣，今果者。按《今注》云：甘味歸脾，而能益智，此說甚當。

菴摩勒



菴摩勒　味苦、甘，寒，無毒。主風虛熱氣。一名餘甘。生嶺南交、廣、愛等州。

《圖經》曰：菴摩勒，餘甘子也。生嶺南交、廣、愛等州，今二廣諸郡及西川蠻界山谷中皆有之。

《衍義》曰：菴摩勒者是此，蓋西度有之。

禹錫云：按《藥性論》云：鬼箭，解金石毒，爲末，作湯點服。佛經中謂菴摩勒，餘甘子也。

衛矛



衛矛　味苦，寒，無毒。主女子崩中下血，腹滿汗出，除邪，殺鬼毒蠱疰，通月經，破癥結，止血崩帶下，殺腹臟蟲及產後血咬肚痛。一名鬼箭。生霍山山谷。八月採，陰乾。

《圖經》曰：衛矛，鬼箭也。出霍山山谷，今江淮州郡或有之。三月以後生莖，苗長四五尺許。其榦有一羽，狀如箭翎。葉亦似山茶，青色。八月、十一月、十二月采條莖，陰乾。其木亦名狗骨。《崔氏方》療惡疰在心，痛不可忍，有鬼箭羽湯。《集驗方》療卒暴心痛，或中惡氣毒痛，大黃湯亦用鬼箭，皆大方也。

禹錫云：按《藥性論》云：鬼箭，使，一名衛矛，有小毒。能破陳血，能落胎，主中惡腰腹痛、百邪鬼魅。

《日華子》云：鬼箭羽，味甘、澀。中惡腹痛，去白蟲，消皮膚風毒腫，令

雷公云：凡使，勿用石茆，根頭真似鬼箭，只是上葉不同，味各別。採得後只使箭頭用，拭上赤毛，用酥緩炒過用之。每修事一兩，用酥一分，炒酥盡爲度。

《外臺秘要》：治乳無汁。鬼箭五兩，水六升，煎取四升。一服八合，日三服，大效。

《衍義》曰：衛矛，所在山谷皆有之，然未嘗於平陸地見也。葉絶少，其莖黄褐色，若檗皮，三面如鋒刃。人家多燔之遺崇。方家用之亦少。



海桐皮

海桐皮　味苦，平，無毒。主霍亂中惡，赤白久痢，除甘蜇疥癬，牙齒蟲痛，并煮服及含之。水浸洗目，除膚赤。堪作繩索，入水不爛。出南海以南山谷。似梓一作桐白皮。

《圖經》曰：海桐皮，出南海以南山谷，今雷州及近海州郡亦有之。葉如手大，作三花尖。皮若梓⑱白皮而堅韌，可作繩，入水不爛。不拘時月採之。古方多用浸酒治風蹶。

禹錫云：按《日華子》云：温。治血脉麻痹疼痛，及目赤。煎洗。

《傳信方⑱》：南唐筠州刺史王紹顔撰《續傳信方》著其法云：頃年予在姑熟之日，得腰膝痛不可忍。醫以腎臟風毒攻刺，諸藥莫療。因覽《傳信方》備有此驗。立修制一劑，便減五分。步履便輕，故録之耳。海桐皮二兩，牛膝、苓蒥、羌活、地骨皮、五加皮各一兩，甘草半兩，薏苡人一兩，生地黄十兩，八物净洗，焙乾細剉，生地黄以蘆刀子切，用綿一兩都包裹，入無灰酒二斗浸，冬二七日，夏一七日，候熟。空心食後，日午晚卧時一杯，長令醺醺。合時不用添減，禁毒食。

虎杖



虎杖　根微温。主通利月水，破留血癥結。

《藥性論》云：虎杖，使。一名大蟲杖也。味甘，平，無毒。主治大熱煩躁，止渴利小便，壓一切熱毒，暑月和甘草煎，色如琥珀可愛，堪看，嘗之甘美。

陶隱居云：田野甚多，此狀如大馬蓼，莖斑而葉圓。及主暴癥，酒漬根

服之也。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：生下濕地，作樹，高丈餘，其莖赤，根黃。二月、八月採根，日乾。所在有之。

《爾雅》云：蔹，虎杖。注云：似紅草而粗大，有小刺，可以染赤。

《日華子》云：治產後惡血不下，心腹脹滿，排膿，主瘡癰癰癘毒，女人血運，撲損瘀血，破風毒結氣。又名酸杖，一名斑杖。

雷公云：凡使，勿用天藍并斑猫根，其二味根形味相似，用之有誤。採得後細剉，却用上虎杖露浥乾用。

《外臺秘要》：治卒暴癰癤，腹中有物硬如石，痛刺晝夜，若不治之，百日內死。取虎杖根，勿令影臨水上，可得石餘許，洗乾搗作末，稌米五升，炊飯內攪之，好酒五斗漬，封候藥消飯浮，可飲一升半，勿食鮭魚、鹽。癤常⑲出。亦可但取其一斗乾，搗酒漬飲之，從少起，日三，亦佳。此治癤，乃勝諸大藥。

《肘後方》：治時疫傷寒毒，攻手足腫，疼痛欲斷方。用虎杖根剉，水煮，適寒温，以漬手足，令踝上有水尺許止之。《傷寒類要》同。

《集驗方》：治五淋。虎杖不計多少爲末，每服二錢，用飯飲下，不拘時候。

《衍義》曰：虎杖根，微苦，《經》不言味。此草藥也。《蜀本圖經》言作木高丈餘，此全非。虎杖大率皆似寒菊，然花、葉、莖、蕊差大爲異。仍莖、葉有淡黑斑。自六月七月旋旋開花，至九月中方已，花片四出，其色如桃花，差大，外微深。陝西山麓水次甚多。今天下暑月多煎根汁爲飲。不得甘草，則不堪飲。《藥性論》云：和甘草煎，嘗之甘美。其味甘，即是甘草之味，非虎杖也。論其攻治，則甚當矣。

倉。

五倍子



《圖經》曰：五倍子，舊不著所出州土，云在處有之，今以蜀中者爲勝。生膚木葉上，七月結實，無花。其木青黃色。其實青，至熟而黃。大者如拳，內多蟲。九月採子，暴乾。生津液最佳。

陳藏器序云：五倍子，治腸虛泄痢，熟湯服。

《博濟方》：治風毒上攻眼，腫癢澀痛，不可忍者，或上下瞼眦赤爛，浮翳、瘀肉侵睛。神效驅風散：五倍子一兩半，同杵末。每服二錢，水二盞，銅、石器內煎及一盞澄滓，熱淋洗。留滓二服，又依前煎淋洗。

齒宣疳蟨，肺臟風毒流溢皮膚，作風濕癬瘡，瘙癢膿水，五痔下血不止，小兒面鼻疳瘡。一名文蛤。在處有。其子色青，大者如拳，內多蟲。一名百蟲

大能明眼目，去澀癢。

《經驗後方》：治小兒吐不定。五倍子二個，一生一熟，甘草一握，用濕紙裹，炮過，同搗末。每服米泔調下半錢匕，瘥。

《衍義》曰：五倍子，今染家亦用。口瘜瘡，以末摻之，便可飲食。

蜜蒙花



蜜蒙花　味甘，平、微寒，無毒。主青盲膚翳，赤目[20]多眵泪，消目中赤脉，小兒麩豆及疳氣攻眼。生益州川谷。樹高丈餘。葉似冬青葉而厚，背色白有細毛。二月、三月採花。

《圖經》曰：蜜蒙花，生益州川谷，今蜀[21]中州郡皆有之。木高丈餘。葉似冬青葉而厚，背白色有細毛，又似[22]橘葉。花微紫色。二月、三月採花，暴乾用。此木類而在草部，不知何至於此。

雷公云：凡使，先揀令净，用酒浸一宿，漉出候乾，却拌蜜令潤，蒸從卯至酉出，日乾。如此拌蒸三度，又却日乾用。每修事一兩，用酒八兩浸，待色變，用蜜半兩蒸爲度。此元名小錦花。

《衍義》曰：蜜蒙花，利州路甚多。葉，冬亦不凋，然不似冬青。蓋柔而不光潔，而不深緑，花細碎，數十房成一朵，冬生春開。此木也，今居草部，恐未盡。

墨　味辛，無毒。止血生肌膚，合金瘡，主産後血運崩中，卒下血，醋摩服之。亦主眯目，物芒入目，摩點瞳子止[20]。又止血痢及小兒客忤，搗篩和水温服之。好墨入藥，粗者不堪。

《衍義》曰：墨，松之烟也。世有以粟草灰僞爲者，不可用。須松烟墨方可入藥。然惟遠烟爲佳。今高麗國每貢墨於中國，不知用何物合和，不可入藥；此蓋未達不敢嘗之義。又治大吐血，好墨細末二錢，以白湯化阿膠清調，稀稠得所，頓服，熱多者尤相宜。又鄜、延界内有石油，燃之烟甚濃，其煤可爲墨，黑光如漆，松烟不及。其識又曰延川石液者是，不可入藥，當附於此。

棘刺花　味苦，平，無毒。主金瘡内漏。冬至後百二十日採之。實，主明目，心腹痿痹，除熱，利小便。生道傍，四月採。一名菥蓂，一名馬朐，一名刺原。又有棗針，療腰痛，喉痹不通。

陶隱居云：此一條又相違越，恐李[24]言多是，然復道其花一名菥蓂，此恐别是一物，不關棗針也。今俗人皆用天門冬苗，吾亦不許，門冬苗乃是好作飲，益人，正自不可當棘刺爾。

禹錫云：按《蜀本》注云：棘有赤白二種。《切韵》曰：棘，小棗也。田野間多有之，叢高三二尺，花、葉、莖、

實俱似棗也。

《聖惠方》：治小兒一切疳。用刺針、瓜蒂等分末，吹入鼻中，日二。

安息香　味辛、苦，平，無毒。主心腹惡氣，鬼疰。出西戎。似松脂，黃黑色，爲塊。新者亦柔韌音刃。禹錫云：按蕭炳云：燒之去鬼來神。段成式《酉陽雜俎》云：安息香樹，出波斯國，波斯呼爲辟邪樹。長三丈，皮色黃黑。葉有四角，二月開花，黃色，花心微碧，不結實。刻其樹皮，其膠如飴，名安息香。六七月堅凝乃取之。燒之通神，辟衆惡。

《海藥》：謹按《廣州記》云：生南海波斯國，樹中脂也，狀若桃膠，以秋月採之。又方云：婦人夜夢鬼交，以臭黃合爲丸，燒薰丹穴，永斷。又主男子遺精，暖腎，辟惡氣。

松羅　味苦、甘，平，無毒。主嗔怒邪氣，止虛汗，頭風，女子陰寒腫痛，療痰熱溫瘧，可爲吐湯，利水道。一名女蘿。生熊耳山川谷松樹上。五月採，陰乾。

《圖經》曰：文具桑寄生條下。

陶隱居云：東山甚多，生雜樹上，而以松上者爲真。《毛詩》云：蔦與女蘿，施於松上。蔦是寄生，以桑上者爲真，不用松上者，此互有異同爾。

禹錫云：按《藥性論》云：松蘿，使，味苦、辛，微熱。治寒熱，能吐胸中客熱痰涎，去頭瘡，主項上瘤癭。

《日華子》云：令人得眠。

大腹　微温，無毒。主冷熱氣攻心腹，大腸壅毒，痰膈，醋心，并以薑鹽同煎，入疏氣藥良。所出與檳榔相似，補腎氣，益精髓。一名棘針，一名棘刺。生雍州川谷。

《圖經》曰：文具檳榔條下。

禹錫云：按《日華子》云：下一切驚風，天吊，鎮心明目，去諸風熱，療金瘡，止血，滋養五臟。一名竹膏。人多燒諸骨及葛粉等雜之。按《臨海志》云：生天竺國，今諸竹内，往往得之。

《衍義》曰：天竹黃，自是竹内所生，如黃土著竹成也。涼心經，去風熱，作小兒藥尤宜，和緩故也。

天竺黃　味甘，寒，無毒。主小兒驚風，天吊，鎮心明目，去諸風熱，療金瘡，止血，滋養五臟。一名竹膏。人多燒諸骨及葛粉等雜之。按《臨海志》云：生天竺國，今諸竹内，往往得之。

陶隱居云：東山甚多，生雜樹上，真，不用松上者，此互有異同爾。

禹錫云：按《藥性論》云：松蘿，中風痰壅，卒失音不語，小兒客忤及癇痰。此是南海邊竹内塵沙結成者。

《衍義》曰：天竹黃，自是竹内所生，如黃土著竹成也。涼心經，去風熱，作小兒藥尤宜，和緩故也。

白棘　味辛，寒，無毒。主心腹痛，癰腫潰膿，止痛，決刺結，療丈夫虛損，陰痿精自出，補腎氣，益精髓。一名棘針，一名棘刺。生雍州川谷。

《圖經》曰：白棘，棘針也。生雍州，棘刺花生道傍，今近京皆有之。叢高三四尺，花、葉、莖、棘，小棗也。而有赤白二種。蘇恭云：實都似棗，而赤白如粉，子、葉與赤棘同，赤棘氣，止霍亂，通大小腸，建脾開胃調中。白棘，莖白如棘上，宜先酒洗，仍以大豆汁洗，方可中時復有之，亦爲難得耳。然有鉤、直二種：直者宜入補藥，鉤者入癰腫藥。用。

針，採無時。花，冬至後百二十日採。實，四月採。

《衍義》曰：白棘，一名棘針，一名棘刺。按《經》如此甚明。諸家之意，强生疑惑，今略不取，求其《經》而可矣。其白棘，乃取其肥盛，紫色，枝上有皺薄白膜先剥起者，故曰白棘。取白之意，不過如此。其棘刺花，乃是棘上所開花也，餘無他義。今人燒枝取油，塗垢髮，使垢解。

仙人杖　味鹹，平，一云冷，無毒。主噦氣嘔逆，辟痞，小兒吐乳，大人吐食，并水煮服，小兒驚癇及夜啼，安身伴睡良。又主痔病，燒爲末，服方寸匕。此是筍欲成竹時立死者，色黑如漆，五六月收之。苦笙竹多生此。又別一種仙人杖，味甘，小温，無毒。久服長生，堅筋骨，令人不老。作茹食之，去痰癖，除風冷。生劍南平澤。葉似苦苣，叢生。新補，見陳藏器、《日華子》。

毗梨勒　味苦，寒，無毒。功用與菴摩勒同。出西域及嶺南交、愛等州，戎人謂之三果。

《唐本》注云：樹似胡桃，子形亦似胡桃。核似訶梨勒，而圓短無棱，用亦同法。唐本先附。

《日華子》云：下氣，止瀉痢。

鬱金香　味苦，温，無毒。主蠱野諸毒，心氣鬼疰，鴉鵲等臭。陳氏云：其香十二葉，爲百草之英。按《魏略》云：生大秦國。二月、三月有花，狀如紅藍；四月、五月採花，即香也。今附。

禹錫云：按陳藏器云：鬱金香，草也。十二葉爲貫，採以煮之用爲鬯，爲百草之英，合而釀酒，以降神也。以此言之，則草也，不當附於木部。

《衍義》曰：合歡花，其色如今之蘸暈綫，上半白，下半肉紅，散垂如絲，葉至夜則合，又謂之夜合花。陳藏器、《日華子》皆曰皮殺蟲，又曰續筋骨。《經》中不言。

紫藤　味甘，微温，有小毒。作煎如糖下水良。花捼碎拭酒醋白腐壞。其中人熬令香著酒中，令不子作角。其皮。今附。江東呼爲招豆藤，皮著敗，酒敗者用之亦正。四月生紫花可愛，人亦種之。

合歡　味甘、平，無毒。主安五臟，利心志，令人歡樂無憂。久服輕身明目，得所欲。生益州山谷。

《圖經》曰：合歡，夜合也。生益州山谷。州山谷，今近京雍、洛間皆有之，人家多植於庭除間。木似梧桐，枝甚柔弱。葉似皂莢、槐等，極細而又密，互相交結。每一風來，輒似相解了，不相牽綴。其葉至暮而合，故一名合昏。五月花發，紅白色，瓣上若絲茸，然至秋而實作莢，子極薄細。採皮及葉用，不拘時月。

伏牛花　味苦、甘，平，無毒。療久風濕痹，四肢拘攣，骨節疼痛。作湯，主風眩頭痛，五痔下血。一名隔虎

刺花。花黃色，生蜀地，所在皆有。三月採。伏牛花，生蜀地，所在皆有，今惟益、蜀近郡有之，多生川澤中。葉青細，似黃檗葉而不光。莖赤有刺。花淡黃色，作穗，似杏花而小。三月採，陰乾。

天竺桂　味辛，温，無毒。主腹内諸冷，血氣脹，功用似桂。皮薄不過烈。生西胡國。今附。

《海藥》：按《廣州記》云：生南海山谷。補暖腰脚，破産後惡血，治血痢腸風，功力與桂心同，方醫家少用。

折傷木　味甘、鹹，平，無毒。主傷折筋骨疼痛，散血補血，産後血悶，止痛。酒、水煮濃汁飲之。生資州山谷。

《唐本》注云：藤生繞樹上㉕，葉似茜草葉而光厚。八月、九月採莖，日乾。唐本先附。

桑花　暖，無毒。建脾澀腸，止鼻洪，吐血，腸風，崩中帶下。此不是桑椹花，即是桑樹上白癬，如地錢花樣。又主盜汗，書云止鹹。未試。

《聖惠方》：治膀胱虛熱，下砂石，澀痛，利水道，燒灰研，食前温酒調下一錢匕。

梫木　味苦，平，無毒。破産後血，煮服之。葉搗碎封蛇咬，亦洗瘡癬。樹如石榴，葉細，高丈餘。四月開花，白如雪。生江東、林筵間。

倒挂藤　味苦，無毒。主一切老血及産後諸疾，結痛血上欲死。煮汁服。生深山。如懸鈎有逆刺，倒挂於樹葉尖而長也。

故木砧　一名百味。無毒。主人病後食勞復。取發當時來參病人行止脚下土如錢許，男病左，女病右，和砧上垢，及鼠頭一枚，無即以鼠屎三七，煮服之，神效。又卒心腹痛。取砧上垢，著人鞋履底悉穿，又栅几上屑，燒傅吻上噦瘡。

---

❶者：原作『煮』，據晦明軒本改。
❷相：原作『用』，據晦明軒本改。
❸疱：原作『炮』，據晦明軒本改。
❹片：晦明軒本作『斤』。
❺内：晦明軒本作『肉』。
❻吴：原脱，據晦明軒本補。
❼陵苕：此二字原脱，據晦明軒本補。
❽生：原作『且』，據晦明軒本改。
❾木：原作『本』，據晦明軒本補。
❿律：原脱，據晦明軒本補。
⓫甘：晦明軒本無『甘』字。
⓬木：原作『味』，據晦明軒本改。
⓭嶺：晦明軒本作『南』。
⓮疔：原作『病』，據晦明軒本改。
⓯腦：晦明軒本作『脛』。
⓰一：晦明軒本作『三』。
⓱梓：原作『桐』，據晦明軒本改。
⓲傳信方：此誤，下文當爲『圖經』所引。
⓳常：晦明軒本作『當』。
⓴目：晦明軒本作『澀』。
㉑蜀：原作『一』，據晦明軒本改。
㉒又似：原作『二』，據晦明軒本改。
㉓止：晦明軒本作『上』。
㉔李：晦明軒本作『俚』。
㉕繞樹上：原作『統木』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之二十四

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

木部下品

巴豆



巴豆　味辛，温，生温熟寒，有毒。主傷寒温瘧寒熱，破癥癖痕結聚堅積，留飲痰癖，大腹水脹，蕩滌五臟六腑，開通閉塞，利水穀道，去惡肉，除鬼毒蠱疰邪物，殺蟲魚，療女子月閉，爛胎，金瘡膿血，不利丈夫陰，殺斑猫毒。可煉餌之，益血脉，令人色好，變化與鬼神通。一名巴椒。生巴郡川谷。八月採，陰乾。用之去心、皮。芫花爲之使，惡薏草，畏大黄、黄連、藜蘆。

《圖經》曰：巴豆，出巴郡川谷。今嘉、眉、戎州皆有之。木高一二丈。葉如櫻桃而厚大，初生青，後漸黄赤，至十二月葉漸凋，二月復漸生，至四月舊葉落盡，新葉齊生，即花發成穗，微黄色。五六月結實作房，生青，至八月熟而黄白，類白豆蔻，漸漸自落，即收之。一房共有三瓣，一瓣有實一粒，一房共實三❶粒也。文，隱起如綫，一道至兩三道。彼土人呼爲金綫巴豆，最爲上等，它處稀有。陶隱居云：出巴郡。似大豆，最能瀉人，新者佳，用之皆去心皮，乃秤。又熬令黄黑，别搗如膏，乃和丸散爾。道方亦有煉餌法，服之乃言神仙。人子，顆小似棗核，兩頭尖。巴與豆即用，剛子勿使。凡修事巴豆，敲碎，以麻油并酒等可煮巴豆了，研膏後用。

《唐本》注云：樹高丈餘。葉似櫻桃葉，頭微赤，十二月葉漸凋，至四月落盡，五月葉漸生，七月花，八月結實，九月成，十月採。其子三枚共蒂，各有殼裏。出眉州、嘉州者良。

陳藏器曰：巴豆，主癥癖痃氣，痞滿，腹内積聚，冷氣血塊，宿食不消，痰飲吐水。取青黑大者，每日空腹服一枚，去殼，勿令白膜破，乃作兩片，并四邊不得有損缺，吞之，以飲壓令下。少間腹内熱如火，痢出惡物。雖痢不虚，若久服亦不瀉。白膜破者棄之。

《日華子》云：通宣一切病，泄瀉滯，除風補勞，健胃開脾，消痰破血，排膿消腫毒，殺腹臟蟲，治惡瘡息肉及疥癩丁腫。凡合丸散，炒不如去心膜煮五度，換水各煮一沸。

雷公云：凡使巴之與豆及剛子，須在仔細認，勿誤用，殺人。巴顆小緊實，色黄；豆即顆有三棱，色黑；若剛子，顆小似棗核，兩頭尖。巴與豆即用，剛子勿使。凡修事巴豆，敲碎，以麻油并酒等可煮巴豆了，研膏後用。每修事一兩，以酒、麻油各七合。盡爲度。

《聖惠方》：治中風口喎。巴豆七枚，去皮爛研。喎左塗右手心，喎右塗

左手心，仍以暖水一盞，安向手心，須臾即便正，洗去藥并頻抽掣中指。又方：治牙疼。用巴豆一粒，煨至黃熟，去殼，用蒜一瓣，切一頭，作蓋，剜去中心，可安巴豆在內，以蓋子合之。用綿裹，隨患處左右塞耳中。

《外臺秘要》：文仲❷方，主唯腹大動搖水聲，皮膚黑，名曰水腫❸。巴豆九十枚去心、皮，熬令黃，搗丸如小豆大。水下二丸，以利爲度。勿飲酒。

《千金方》：治寒癖宿食，久飲不消，大便秘。巴豆仁一升，清酒五升，煮三日三夜，研令大熟，合酒微火煎之，丸如胡豆大。每服一丸，水下。欲吐者，服二丸。

《千金翼》：治小兒身腫，并手足腫兼癮疹。巴豆五十枚去皮、心，以水二升，煎取一升，用綿於湯中隨手拭之。

《經驗方》：治耳卒聾。巴豆一粒，蠟裹，針刺令通透用，塞耳中。又方：治箭鏃入骨不可拔。取巴豆微熬，與蜣螂同研，塗所傷處，斯須痛定，微癢忍之，待極癢不可忍，便撼動箭鏃，即拔之，立出。

《十全方》：治疥瘡。巴豆十粒，火炮過黃色，去皮膜，右順手研如麵，入酥少許，臘粉少許，同研勻，爪破，以竹篦子點藥，不得落眼裏及外腎上。如熏炙着外腎，以黃丹塗，甚妙。



蜀椒



蜀椒　味辛，温、大熱，有毒。主邪氣咳逆，温中，逐骨節皮膚死肌，寒濕痹痛，下氣，除六腑寒冷，傷寒温瘧大風汗不出，心腹留飲宿食，腸澼下痢，泄精，女子字乳餘疾，散風邪瘕結，水腫黃疸，鬼疰蠱毒，殺蟲、魚毒。久服之頭不白，輕身增年。開腠理，通血脉，堅齒髮，調關節，耐寒暑，可作膏藥。多食令人乏氣，口閉者殺人。一名巴椒，一名蘑蕪蘑蕪音唐，蘑音毅。生武都川谷及巴郡。八月採實，陰乾。杏仁爲之使，畏款冬。

《圖經》曰：蜀椒，生武都川谷及巴郡，今歸、峽及蜀川、陝洛間人家多作園圃種之。高四五尺，似茱萸而小，有鋒刺。葉堅而滑，可煮飲食，甚辛香。四月結子，無花，但生於葉間，如小豆顆而圓，皮紫赤，八月采實，焙乾。此椒，江淮及北土皆有之，莖、實都相類，但不及蜀中者，皮肉厚、腹裏白、氣味濃烈耳。

《藥性論》云：椒目，使，治十二種水氣。味苦、辛，有小毒。主和巴豆、菖蒲、松脂以蠟溶爲筒子，內耳中，抽腎氣虛，耳中如風水鳴，或如打鐘磬之

聲，若暴聾，一日一易，若神驗。

《唐本》注云：椒目，味苦，寒，無毒。主水腹脹滿，利小便。今椒出金州西城者最佳。

《日華子》云：漢椒，破癥結，開胃，治天行時氣温疾，産後宿血，治心腹氣，壯陽，療陰汗，暖腰膝，縮小便。椒目主膀胱急。又云：椒葉，熱，無毒。治賁豚，伏梁氣及内外腎鈞，并霍亂轉筋。

雷公云：一名南椒。凡使，須去目及閉口者不用，其椒子先須酒拌令濕蒸，從巳至午，放冷密蓋，除向下火四畔，無氣後取出，使入瓷器中盛，勿令傷風用也。

《聖惠方》：治因熱取涼睡，有蛇入口中挽不出。用刀破蛇尾，内生椒三二粒，裹著，須臾即出。

《外臺秘要》：治瘡腫。生椒末、麵、釜下土末之，以大醋和，傅之。

《千金方》：有人陰冷，漸漸冷氣入陰囊腫滿，恐死，日夜疼悶不得眠。取生椒擇之洗淨，以布帛裹著丸囊，令厚半寸，須臾熱氣大通，日再易之，取蟲出❹差。

《孫真人方》：十月勿食椒，食之損氣傷心，令人多忘。又方：治心腹俱痛。以布裹椒薄注上火，熨令椒汗出，良。

《斗門方》：治腹内虚冷，久服駐顔。用生椒擇去不拆者，除其黑子，用四十粒，以漿水浸經一宿，盡令口合，空心新汲水下。去積年冷，暖臟腑，久服則能駐顔，黑髮，明目，令人思飲食，妙。

《勝金方》：治好食生茶。用椒末不限多少，以糊丸如梧桐子大，茶下十丸。

《衍義》曰：蜀椒，須微炒使汗出，又須去附紅黄殼。去殼之法：先微炒，乘熱入竹筒中，以梗椿❺之。播取紅，如未盡，更揀，更椿，以盡爲度。凡用椒須如此。其中子謂之椒目，治盜汗尤功。將目微炒，搗爲極細末，用半錢匕，以生猪上脣煎湯一合，調，臨睡服，無不效。蓋椒目能行水，又治水蠱。

皂角



皂莢



味辛、鹹，温，有小毒。主風痹死肌邪氣，風頭淚出，利九竅，殺精物，療腹脹滿，消穀，除咳嗽，囊結，婦人胞不落，明目，益精。可爲沐藥，不入湯。生雍州川谷及魯鄒縣，如猪牙者良。九月、十月採莢，陰乾。柏實爲之使，惡麥門冬，畏空青、人參、苦參。

《圖經》曰：皂莢，出雍州川谷及

魯鄒縣，今所在有之，以懷、孟州者爲勝。木極有高大者。此有三種：《本經》云：形如猪牙者良。陶隱居云：長六寸，圓厚節促直者，皮薄多肉味濃，大好。今醫家作疏風氣丸、煎多用長皂莢，治齒及取積藥多用猪牙皂莢，所用雖殊，大抵性味不相遠。

《唐本》注云：此物有三種：猪牙皂莢最下，其形曲戾薄惡，全無滋潤，洗垢不去；其尺二寸者，粗大長虛而無潤；若長六七寸，圓厚促直者，皮薄多肉，味濃大好。

禹錫云：按《藥性論》云：皂莢，使。主破堅癥，腹中痛，能墮胎。又曰：將皂莢於酒中，取盡其精，於火內煎之成膏，塗帛，貼一切腫毒，兼能止疼痛。

陳藏器云：鬼皂莢作浴湯，去風瘡疥癬，挼葉去衣垢，沐頭長髮❻。生江南澤畔，如皂莢，高一二尺。

《日華子》云：通關節，除頭風，消痰，殺勞蟲，治骨蒸，開胃及中風口噤。入藥去皮、子，以酥炙用。

雷公云：凡使，須要赤膩肥并不蚛者，然用新汲水浸一宿了，用銅刀削上粗皮，用酥反覆炙，酥盡爲度。然出及子，塗好醋炙令焦，爲末一錢匕，巴豆七枚去油、膜，二件以淡醋及研好墨，爲丸如麻子大，每服三丸，食後陳橘皮湯下，日三服。隔一日增一丸，以利爲度。如常服，消酒食。

《梅師方》：治霍亂轉筋。皂莢末，吹一小豆入鼻中，得噦便瘥。

《孫真人方》：治大小便不通，關格不利。燒皂莢細研，粥飲下三錢，立通。

《簡要濟衆方》：治中風口噤不開，用白梅揩齒，口開即灌藥，吐出風涎差。

《靈苑方》：治急喉閉，逡巡不救方：以皂莢去皮、子，生半兩爲末。每服少許，以箸頭點腫處，更以醋調藥末，厚傅項下，須臾便破，少血出，即煮沸，服一升，日三服，頻作。

《經驗方》：治食氣遍身黃腫，氣喘，食不得，心胸滿悶。不蛀皂角去皮及子，塗好醋炙令焦，爲末一錢匕，巴豆七枚去油、膜，二件以淡醋及研好墨，爲丸如麻子大，每服三丸，食後陳橘皮湯下，日三服。隔一日增一丸，以利爲度。

《梅師方》：治霍亂轉筋。皂莢末，吹一小豆入鼻中，得噦便瘥。

《孫真人方》：治大小便不通，關格不利。燒皂莢細研，粥飲下三錢，立通。

《外臺秘要》：治卒中風口喎。以皂角五兩，去皮爲末，以三年大醋和。左喎塗左，右喎塗右，乾更傅之，差。又方：溺死一宿者尚活，搗皂角綿裹，內下部，須臾出水即活。

《千金方》：鼸鼻。炙皂角末如小豆，以竹管吹入鼻中。

《肘後方》：卒腫滿身面洪大。皂莢去皮、子，生半兩爲末。每服少許，酒一斗漬，合器

愈。

《孫尚藥方》：治卒中風，昏昏若醉，形體昏❼悶，四肢不收，或倒或不倒，或口角似利，微有涎出，斯須不治，便爲大病，故傷人也。此證風涎潮於上，膈痹氣不通，宜用救急稀涎散。猪牙皂角四挺，須是肥實不蚛，削去黑皮，晋礬一兩，光明通瑩者，二味同搗羅爲細末，再研爲散。如有患者，可服半錢，重者三字匕，温水調灌下。不大嘔吐，只是微微涎稀冷，出或一升二升。當時惺惺，次緩而調治。不可便大段吐之，恐過傷人命。累經效，不能盡述。

《感應神仙傳》：崔言者，職隸左親騎軍，一旦得疾，雙眼昏，咫尺不辨人物，眉髮自落，鼻梁崩倒，肌膚有瘡如癬，皆爲惡疾，勢不可救。因爲洋州駱谷子歸寨使，遇一道流，自谷中出，不言名姓，授其方曰：皂角刺一二斤爲灰，蒸久曬研爲末。食上濃煎大黄湯調一錢匕，服。一旬鬚髮再生，肌膚悦潤，愈，眼目倍常明。得此方後却入山，不知所之，又鐵砧以煅金銀，雖百十年不朽，以捶皂莢，則一夕碎破。

《衍義》曰：皂莢治卒中風，昏昏若醉，或倒或不皮、仁。將骨浸軟，煮熟，以糖漬之，可食。主宣導五臟風熱壅。其莢不蚛肥者，微炙，爲末一兩，入生白礬末半兩，用新摘訶子五枚，甘草一寸，皆碎破，臘粉半兩。風涎潮塞氣不通，温水調一二錢。但過咽關，須吐涎。凡用白礬者，分隔下涎也。又暑中濕熱時，或久雨，合蒼术服，辟温疫邪濕氣。



訶梨勒

訶梨勒　味苦，温，無毒。主冷氣，心腹脹滿，下食。生交、愛州。

《圖經》曰：訶梨勒，生交、愛州，今嶺南皆有，而廣州最盛。株似木椧，花白。子似栀子，青黄色，皮肉相著。七月、八月實熟時採，六路者佳。《嶺南異物志》云：廣州法性寺佛殿前有四五十株，子極小而味不澀，皆是六路。每歲州貢，只以此寺者。寺有古井，木根醮水，水味不苦❽。每子熟時，水同煎，色若新茶。今其寺舊木猶有六七株。古井亦在。南海風俗尚貴此湯，然煎之不必盡如昔時之法也。劉禹錫《傳信方》云：予曾苦赤白下，諸藥服遍久不差，轉爲白膿。令狐將軍傳此法：用訶梨勒三枚上好者，兩枚炮取皮，一枚生取皮，同末之，以沸漿水一兩合服之，淡水亦得。若空水痢，加一錢匕甘草末；若微有膿血加二匕；若血多加三匕，皆效。

《藥性論》云：訶梨勒，使，亦可單用，味苦、甘。能通利津液，主破胸膈結氣，止水道，黑髭髮。

《日華子》云：消痰下氣，除煩治水，調中，止瀉痢，霍亂，賁豚腎氣，肺

氣喘急，消食開胃，腸風瀉血，崩中帶下，五膈氣，懷孕未足月人漏胎，及胎動欲生，脹悶氣喘。并患痢人後分急痛，并産後陰痛，和蠟燒熏及熱煎湯熏，通手後洗。

禹錫云：按蕭炳云：苦、酸。下宿物，止腸澼久泄，赤白痢。波斯舶上來者，六路，黑色，肉厚者良。

雷公云：凡使，勿用毗梨勒、矾梨勒、榔精勒、雜路勒，若訶梨勒文只有六路。或多或少，并是雜路勒，毗路勒個個毗，雜路勒皆圓路，文或八路至十三路，號曰榔精勒，多澁，不入用。凡修事，先於酒内浸，然後蒸一伏時。其訶梨勒，以刀削路，細剉，焙乾用之。

《經驗方》：治嗽氣，嗽久者亦主之。生訶梨一枚，含之咽汁。差後口爽，不知食味，却煎檳榔湯一碗服之，立便有味。此知連州銀坑官成密❾方。

《外臺秘要》：治一切風痰，風霍亂，食不消，大便澁。訶梨三枚，搗取皮。和酒頓服，三五度良。

《廣濟方》：治嘔逆不能食。訶梨勒皮二兩，去核，熬爲末，蜜和丸梧桐子大。空心服二十丸，日二服。

《孫真人方》：治常患氣。訶梨三枚，濕紙裹煨，紙乾即剥去核，細嚼。以生乳一升，下之，日三服。

《衍義》曰：訶梨勒，氣虛人亦宜。緩緩煨熟，少服。此物雖澁腸，而又泄氣，蓋其味苦澁。柳花亦宜貼灸瘡。皮、葉療瘡，面熱黑，痂疥惡瘡，金瘡。一名柳絮。葉，主馬疥痂瘡。取煎煮以洗馬疥，立愈。又療心腹内血，止痛。實，主潰癰，逐膿血。子汁，療渴。生琅邪川澤。

陶隱居云：柳，即今水楊柳也。





柳花

味苦，寒，無毒。主風水黄疸，面熱黑，痂疥惡瘡，金瘡。一名柳絮。葉，主馬疥痂瘡。取煎煮以洗馬疥，立愈。又療心腹内血，止痛。實，主潰癰，逐膿血。子汁，療渴。生琅邪川澤。

陶隱居云：柳花熟，隨風狀如飛雪。陳元方以爲譬，當用其未開時。子亦隨花飛，正應水氣，蓋其味苦澁。柳花亦宜貼灸瘡。皮、葉療瘡，痂，面熱黑，痂疥惡瘡，金瘡。一名柳絮。葉，主馬疥痂瘡。取煎煮以洗馬疥，立愈。又療心腹内血，止痛。實，主潰癰，逐膿血。子汁，療渴。生琅邪川澤。

陶隱居云：柳，即今水楊柳也。

使。主止血，治濕痹，四肢攣急，膝痛。

《日華子》曰：葉治天行熱病，丁瘡，傳尸骨蒸勞，湯火瘡，毒入腹熱悶，服金石藥人發大熱悶，并下水氣。煎膏，續筋骨，長肉止痛。牙痛煎含，枝煎汁可消食也。

漆瘡。

禹錫云：按《藥性論》云：苦柳花，

《外臺秘要》：治黄疸。柳枝以水一斗，煮取濃汁半升，服令盡。

《衍義》曰：柳華，《經》曰味苦，即是初生有黄蕊者也。及其華乾，絮方出，又謂之柳絮。收之，貼灸瘡及爲茵褥。絮之下連小黑子，因風而起，得水

濕處便生，如地丁之類，多不因種植，於人家庭院中自然生出，蓋亦如柳絮兼子而飛。陳藏器之説是。然古人以絮爲花，陶隱居亦曰：花隨風，狀如飛雪。誤矣。《經》中有實及子汁，諸家不解，今人亦不見用。注：釋氏謂柳爲尼俱律陀木，其子極細，如人妄因極小，妄果至大，是知小黑子得因風而起。



楝實

楝實　味苦，寒，有小毒。主温疾傷寒，大熱煩狂，殺三蟲，疥瘍，利小便水道。一名金鈴子，俗呼爲苦楝。根，微寒。療蛔蟲，利大腸。生荆山山谷。

《圖經》曰：楝實，即金鈴子也。生荆山山谷，今處處有之，以蜀川者爲佳。木高丈餘，葉密如槐而長。三四月開花，紅紫色，芬香滿庭間。實如彈丸，生青熟黄，十二月採實。其根採無時。

陶隱居云：處處有。俗人五月五日皆取葉佩之，云辟惡。其根以苦酒摩塗疥，甚良。煮汁作糜食之，去蛔蟲。

《唐本》注云：此有兩種：有雄有雌，雄者根赤，無子，有毒，服之多使人有子，微毒。用當取雌者。

禹錫云：按《藥性論》云：楝實，亦可單用。主人中大熱狂，失心躁悶，作湯浴，不入湯服。

《日華子》云：楝皮，苦，微毒。治游風熱毒，風疹惡瘡疥癩，小便⑩壯熱，并煎湯浸洗。服食須是生子者⑪。雌樹皮一兩，可入五十粒糯米煎煮，殺毒，瀉多以冷粥止，不瀉以熱葱粥發。無子雄樹，吐瀉殺人。

雷公云：凡采得後曬乾，酒拌浸令濕，蒸，待上皮軟，剥去皮，取肉去核。勿單用。其核碎椎，用漿水煮一伏時了。如用使肉，即不使核，使核即不使肉。又花落子，謂之石茱萸。

《外臺秘要》：治長蟲。楝實，淳苦酒中漬宿，以綿裹，塞穀道中三寸許，日易之。

《經驗方》：小兒穀蟲，定疼痛。抵聖散：以苦楝二兩，白蕪荑半兩，爲末，水一盞，末一錢，煎取二分，放冷，待發時服之。又方：治丈夫臟氣傷，膀胱連小腸等氣。金鈴子一百個，温湯浸過去皮，巴豆二百個捶微破，麵二升，同於銅鍋内炒，金鈴子赤熟爲度，放冷取出，去核爲末。每服三錢，非時熱酒、醋湯調服并得，其麵、巴豆不用也。

椿木



椿木　葉味苦，有毒。主洗瘡疥，風疽。水煮藥汁用之。皮，主甘苷。立於途，匠者不顧是也。并採無時。

《唐本》注云：二樹形相似，樗木疏、椿木實爲別也。

陳藏器云：樗木，味苦，有小毒。皮主赤白久痢，口鼻中疳蟲，去疥蜚，主鬼疰傳尸，蠱毒下血。根皮去鬼氣，取一握細切，以童兒小便二升，豉一合，宿浸，絞取汁，温⑫一沸。三五日一度服。葉似椿，北人呼爲山椿，江東人呼爲虎目。葉脱處有痕，如白樗，散木也。唐本先附。

禹錫云：按《藥性論》云：樗白皮，使，味苦，微熱，無毒。能治赤白痢，腸滑，痔疾，瀉血不住。

蕭炳云：樗皮，主疳痢，得地榆同療之，根皮尤良，俗呼爲虎眼樹。《本經》椿木，殊不相似。

樗木



樗木　根、葉，尤良。

《圖經》曰：椿木、樗木，舊并不載所出州土，今南北皆有之。二木形榦大抵相類，但椿木實而葉香可啖，樗木疏而氣臭，膳夫亦能熬去其氣。北人呼樗爲山椿，江東人呼爲鬼目，葉脱處有痕，如樗蒲子又如眼目，故得此名。其木最爲無用，《莊子》所謂吾有大木，人謂之樗，其大本擁腫，不中繩墨，小枝曲拳，不中規矩。立於途，匠者不顧是也。并採無時。

《唐本》注云：二樹形相似，樗木疏、椿木實爲別也。

陳藏器云：樗木，味苦，有小毒。皮主赤白久痢，口鼻中疳蟲，去疥蜚，主鬼疰傳尸，蠱毒下血。根皮去鬼氣，取一握細切，以童兒小便二升，豉一合，宿浸，絞取汁，温⑫一沸。三五日一度服。葉似椿，北人呼爲山椿，江東人呼爲虎目。葉脱處有痕，如白樗，散木也。唐本先附。

禹錫云：按《藥性論》云：樗白皮，使，味苦，微熱，無毒。能治赤白痢，腸滑，痔疾，瀉血不住。

蕭炳云：樗皮，主疳痢，得地榆同療之，根皮尤良，俗呼爲虎眼樹。《本經》椿木，殊不相似。

《日華子》云：樗皮，温，無毒。止瀉及腸風，能縮小便。入藥蜜炙用。

雷公云：椿木根，凡使根，不近西頭者上。及不用莖、葉，只用根，采出拌生葱蒸半日，出生葱，細剉，用袋盛挂屋南畔，陰乾用。偏利溺澀也。

《肘後方》：治小兒頭生白禿，髮不生出。椿、楸、桃葉心取汁，傅之，大效。

《經驗方》：治臟毒赤白痢。香椿淨洗刷⑫，剥取皮，日乾，爲末。飲下一錢，立效。

《楊氏産乳方》：療疳痢困重。樗白皮搗麵拌作小顆子。日曬少時，又拌，凡三過，水煮至熟，加鹽、醋、酒亦得，頻服，多少量兒大小。

《衍義》曰：椿木葉，椿、樗皆臭。但一種有花結子，一種無花不實。世以無花不實，木身大，其榦端直者爲椿。椿用木葉。其有花而莢，木身小，榦多迂矯⑭者爲樗。樗用根、葉、莢。故曰未見椿上有莢者，惟樗木上有。又有樗鷄，故知古人命名曰不言椿鷄，

而言樗鷄者，以顯有鷄者爲樗，無鷄者爲椿，其義甚明。用椿木葉，樗木根、葉、莢者，宜依此推窮。



郁李人



郁李人　味酸，平，無毒。主大腹水腫，面目四肢浮腫，利小便水道。根，主齒齦腫，齲丘禹切齒，堅齒，去白蟲。一名爵李，一名車下李，一名棣。生高山川谷及丘陵上。五月、六月採根。

《圖經》曰：郁李人，《本經》不載所出州土，但云生高山川谷及丘陵上，今處處有之。木高五六尺，枝條、花、葉皆若李，惟子小若櫻桃，赤色而味甘酸，核隨子熟。六月採根并實，取核中仁用。陸機《草木疏》云：棠棣，即郁李也。一名雀梅，亦曰車下李。所在山中皆有。其花或白或赤，六月中成實如李子，可食。今近京人家園圃植一種，枝莖作長條，花極繁密而多葉，亦謂之郁李，不堪入藥用。

《藥性論》云：郁李人，臣，味苦、辛。能治腸中結氣，關格不通。根治齒痛，宣結氣，破結聚。

陶隱居云：山野處處有。子熟赤色，亦可啖之。

《日華子》云：郁李人。通治五臟，膀胱急痛，宣腰胯冷膿，消宿食，下氣。又云：根，凉，無毒。治小兒熱發，作湯浴，風蚰牙，濃煎含之。

雷公云：凡採得，先湯浸，却削上尖、去皮令净，用生蜜浸一宿，漉出陰乾，研如膏用。

韋宙《獨行方》：療脚氣浮腫，心腹滿，大小便不通，氣急喘息者。以郁李人十二個，搗碎，水研取汁，薏苡人搗碎如粟米，取三合，以汁煮米作粥。空腹食之，佳。

《必效方》：療癖。取車下李人，微湯退去皮及并人者，與乾麵相拌，搗之爲餅。如猶乾和淡水，如常搜麵作餅，大小一如病人掌。爲二餅，微炙使黄，切⑮令至熟。空腹食一枚，當快利。如不利，更食一枚，或飲熱粥汁，以利爲度。若至午後痢不止，即以醋飯止之。利後當虚。病未盡者，量力一二日更進一服，以病盡爲限。小兒亦以意量之，不得食酪及牛、馬肉等。無不效。

《食療》云：氣結者，酒服人四十九粒，更瀉尤良。又破癖氣，能下四肢水。

《外臺秘要》：張文仲治齲齒。以郁李根白皮，水煮濃汁含之。冷即易，吐出蟲。

《楊氏産乳方》：療身體腫滿水氣

急，卧不得。郁李人一大合搗爲末，和麥麵搜作餅子與吃，入口即大便通，利氣，便差。

《衍義》曰：郁李人，其子如御李子，至紅熟堪啖，微澁。其人，湯去皮，研極爛，入生龍腦，點赤目。陝西甚多。根煎湯，漬風蚛牙。





莽草

莽草　味辛，苦，温，有毒。主風頭癰腫，乳癰疝瘕，除結氣疥瘙。殺蟲魚。療喉痹不通，乳難。頭風癢，可用沐，勿令入眼。一名葪，一名春草。生上谷山谷及冤句。五月採葉，陰乾。

《圖經》曰：莽草，亦曰菵草。出上谷及冤句，今南中州郡及蜀川皆有之。木若石南而葉稀，無花實。五月、七月採葉，陰乾。一説藤生，繞木石間。古方治風毒痹厥諸酒，皆用菵草。今醫家取其葉煎湯，熱含少頃間吐之，以治牙齒風蚛甚效。此木也，而《爾雅·釋草》云：葪，春草。郭璞云：一名芒，芒、菵，音近故爾。然謂之草者，乃蔓生者是也。

《藥性論》云：菵草，臣。能治氣[16]疽，疝氣腫墜凝血，治瘰癧，除濕風，不入湯服。主頭瘡白禿，殺蟲。與白斂、赤小豆爲末，鷄子白調如糊，貼[17]毒腫，乾即更易上。

陶隱居云：今東間處處皆有，葉青新烈者良。人用搗以和米，内水中，魚吞即死浮出，人取食之無妨。莽草字亦作菵字，今俗呼爲菵草也。菵，音罔。

《日華子》云：治皮膚麻痹，并濃煎湯淋。風蚛牙痛，喉痹，亦濃煎汁含，良。

雷公云：凡使，采得後便取葉細剉，又，生甘草、水蓼二味并細剉，用生稀絹袋盛毒木葉，於甑中，上甘草、水蓼同蒸一日，去諸藥二件，取出曬乾用之。勿用尖有攣生者。

《聖惠方》：治牙齒蚛孔，疼痛及有蟲。用菵草爲末，綿裹内蚛孔中，或於痛處咬之，低頭吐津勿咽之，疼痛便定。又方：治瘰癧發腫堅結成核。菵草一兩爲末，鷄子白和傅於帛上，貼之，日二易之，差。

《肘後方》：治癰瘡未潰。菵草末，鷄子白塗紙厚貼上，燥復易，得痛良。又風齒疼，頰腫。用五兩，水一斗煮取五升，熱含漱吐之，一日盡。

《周禮》：翦氏掌除蠹物，以菵草熏之則死。

《衍義》曰：莽草，今人呼爲菵草。《本經》一名葪，春草。諸家皆謂爲草，今居木部，《圖經》亦然。今世所用者，皆木葉也。如石南，枝、梗乾則縐，揉之，其嗅如椒。《爾雅·釋草》云：葪，春草。釋曰：今莽草也。與《本經》合，今當具言之。石南條中，陶隱居注云：似菵草，凌冬

不凋。誠木無疑。



黃藥根

黃藥根　味苦，平，無毒。主諸惡腫瘡瘻，喉痹，蛇犬咬毒。取根研服之，亦含亦塗。藤生，高三四尺，根及莖似小桑，生嶺南。

《圖經》曰：黃藥根，生嶺南，今夔、峽[18]州郡及[19]明、越、秦、隴州山中亦有之，以忠、萬州者爲勝。藤生，高三四尺，根及莖似小桑，十月採根。秦州出者謂之紅藥子，葉似蕎麥，枝梗赤色，七月開白花，其根初採濕時紅赤色，暴乾即黃。開州興元府又産一種藥子，大抵與黃[20]藥相類。主五臟邪氣，治肺壓熱，除煩躁，亦入馬藥用。春採根，暴乾。



槲若

槲若　味甘、苦，平，無毒。主痔，止血，療血痢，止渴。取脉炙用之。皮，味苦。水煎濃汁，除蠱及瘻，俗用甚效。

《圖經》曰：槲若，《本經》不載所出州土，今處處山林多有之。木高丈餘，若即葉也，與櫟相類，亦有斗，但小不中用耳。不拘時採。其葉并皮用。

葛洪洗諸敗爛瘡、乳瘡，并用此皮。

禹錫云：按《藥性論》云：斛皮亦可單用。主治惡瘡，煎湯洗之良。

《日華子》云：槲皮，味澀。能吐瘰癧，澀五臟。

《聖惠方》：治冷淋，小腸不利，莖中急痛。用斛葉搗末，每服三錢，水一盞，葱白七寸，煎六分，去滓，食前温服。又方：治螻蛄咬。用斛葉燒灰細研，以泔別浸斛葉，取洗瘡拭之，内少許灰於瘡中，立效。

《簡要濟衆方》：治吐血。斛葉不拘多少搗末，每服二錢，水一盞，煎取一斗，煎取五升，去滓，更煎如膏，和酒服，立差。

《子母秘録》：治小兒及大人赤白痢。新斛皮一斤，去黑皮，細切，以水五七分，和滓服。

《衍義》曰：槲若，亦有斗，但不及櫟木，雖堅而不堪充材。葉微炙，炒槐

花減槲葉之半，同爲末，米飲調服，治初得腸風及血痔，熱多者尤佳。亦堪爲炭，但不及櫟木。

桐葉



桐葉　味苦，寒，無毒。主惡蝕瘡著陰。皮，主五痔，殺三蟲，療賁豚氣病。花㊀，主傅猪瘡。飼猪，肥大三倍。生桐柏山谷。

《衍義》曰：《經》注不指定是何桐，致難執用。今具四種桐，各有治療，條其狀列於後：一種白桐，可斫琴者，葉三杈，開白花，亦不結子。

《藥性論》云：皮能治五淋，沐髮，去頭風，生髮。一種荏桐，早春先開淡紅花，狀如鼓子花成筒子，子或作桐油。

《日華子》云：桐油，冷，微毒。一種梧桐，四月開淡黃小花，一如棗花。枝頭出絲，墮地成油，沾漬衣履。五六月結桐子。今人收炒作果，動風氣。此是《月令》清明之日，桐始華者。一種岡桐，無花，不可作琴，體重。

無食子　味苦，温，無毒。主赤白痢，腸滑，生肌肉。出西戎。一名没石子。

《唐本》注云：生沙磧間。樹似櫟。

今注：一名没石子也。出波斯國。主小兒疳蟲，能黑髭髮，治陰瘡，陰汗，温中和氣。唐本先附。

禹錫云：按《藥性論》云：無食子，使。治大人、小兒大腹冷，滑痢不禁。

《海藥》云：謹按徐表《南荆記》云：波斯國，大小如藥子。味温、平，無毒。主腸虚冷痢，益血生精，烏髭髮，和氣安神，治陰毒痿。燒灰用。張仲景使治陰汗，取燒灰，先以微温湯浴了，即以帛微裹後傅灰囊上，甚良。波斯每食以代果，番胡呼爲没食子，今人呼墨食子。轉謬矣。

雷公云：墨石子，凡用勿令犯銅、鐵，并被火驚者。顆小、文細，上無枚㉓米者妙。用漿水於砂盆中，或硬青石上研令盡，却焙乾研了用，勿搗，能爲烏犀色。

《宫氣方》：治小兒久痢不效。没石子二個切，熬令黄色，研作餛飩食之。

《衍義》曰：無食子，今人合他藥染髭。

雷丸　味苦、鹹，寒、微寒，有小毒。主殺三蟲，逐毒氣，胃中熱。利丈夫，不利女子。作摩膏，除小兒百病，逐邪氣惡風汗出，除皮中熱結積蠱毒，白蟲、寸白自出不止。久服令陰痿。一名雷矢，一名雷實。赤者殺人。生石城山谷及漢中土中。八月採根，暴

乾。荔實、厚朴爲之使，惡葛根。

《藥性論》云：雷丸，君，惡蓄根，味苦，有小毒。能逐風。芫花爲使。主癲癎狂走，殺蛔蟲。

陶隱居云：今出㉔建平、宜都間。累累相連如丸。《本經》云利丈夫，《別録》云久服陰痿，於㉕事相反也。

《唐本》注云：雷丸，竹之苓也。無有苗蔓，皆零無相連者。今出房州、金州。

禹錫云：按范子云：雷矢出漢中，色白者善。

吴氏云：雷丸，神農：苦。黄帝、岐伯、桐君：甘，有毒。扁鵲：甘，無毒。季氏：大寒。

雷公云：凡使，用甘草水浸一宿了，銅刀刮上黑皮，破作四五片。又用甘草湯浸一宿後蒸，從巳至未，出，日乾。却以酒拌，如前從巳至未蒸，日乾用。

《經驗前方》：下寸白蟲。雷丸一味，水浸軟去皮切，焙乾爲末。每有病者，五更初，先食炙肉少許，便以一錢匕藥，稀粥調半錢服之，服時須六衙及上半月日，蟲乃下。

胡椒　味辛，大温，無毒。主下氣温中去痰，除臟腑中風冷。生西戎。

形如鼠李子，調食用之，味甚辛辣。

禹錫云：按《日華子》云：調五臟，止霍亂，心腹冷痛，壯腎氣，及主冷痢，殺一切魚、肉、鱉、蕈毒。

《海藥》云：謹按徐表《南州記》：生南海諸國。去胃口氣虚冷，宿食不消，霍亂氣逆，心腹卒痛，冷氣上衝。和氣，不宜多服，損肺。一云向陰者澄茄，向陽者胡椒也。

雷公云：凡使，只用内無皺殼者，用力大。漢椒使殼，胡椒使子。每修事，即於石糟中碾碎成粉。

《食療》云：治五臟風冷，冷氣心腹痛，吐清水，酒服之佳。亦宜湯服。若冷氣，吞三七枚。

《衍義》曰：去胃中寒痰，吐水，食已即止，甚驗。過劑則走氣。大腸寒滑亦用，須各以他藥佐之。

蘇方木　味甘、鹹，平，無毒。主破血。産後血脹悶欲死者，水煮，苦酒煮五兩，取濃汁服之效。

《唐本》注云：此木用染色者。出南海、崑崙來，交州、愛州亦有。樹似菴羅，葉若榆葉而無澀，抽條長丈許，花黄，子生青熟黑。

陳藏器云：蘇方，寒。主霍亂嘔逆，及人常嘔吐，用水煎服之。破血當以酒煮爲良。唐本先附。

雷公云：凡使，去上粗皮并節子。若有中心文横如紫角者，號曰木中尊色，其效倍常百等。須細剉了重篩，拌細條梅枝蒸，從巳至申出，陰乾用。

《肘後方》：治血運。蘇方三兩細剉，水五升，煮取二升，分再服，差。若無蘇方，取緋衣煮汁服亦得。

《海藥》云：謹按徐表《南海記》：生海畔。葉似降，木若女槙。味平，無毒。主虚勞血癖氣壅滯，産後惡露不安怯起，衝心腹中攪痛，及經絡不通，男女中風，口噤不語。宜此法，細研乳頭香，細末方寸匕，酒煎蘇方，去滓，調

服，立吐惡物，差。

白楊樹皮　味苦，無毒。主毒風脚氣腫，四肢緩弱不隨，毒氣游易在皮膚中，痰癖等，酒漬服之。取葉圓大，蒂小，無風自動者。

《圖經》曰：白楊，舊不載所出州土，今處處有之，北土尤多，人種於墟墓間。株大葉圓如梨，皮白，木似楊，故名白楊。採其皮無時。

《衍義》曰：白楊，陝西甚多，永、耀間居人修蓋，多此木也。然易生根，斫木時碎札入土即生根，故易以繁植，非止墟墓間，於人家舍前後及夾道，往往植之，土地所宜爾。風纔至，葉如大雨聲，葉梗故如是。又謂無風自動，則無此事。

桄榔子　味苦，平，無毒。主宿血。其木似栟櫚堅硬。斫其内有麵，大者至數斛，食之不饑。其皮堪作綆。生嶺南山谷。今附。

《圖經》曰：桄榔，生嶺南山谷，今二廣州郡皆有之，人家亦植於庭除間。其木似栟櫚而堅硬，斫其間有麵，大者至數石，食之不饑。其皮至柔，皮㉖韌可以作綆。其子作穗生木端，不拘時月採之。

《海藥》：謹按《嶺表録》云：生廣南山谷。樹身、皮、葉與蕃棗、檳榔等小異。然葉下有髮如粗馬尾，廣人用織巾子。木皮内有麵，食之極有補益，虚羸乏損，腰脚無力，久服輕身辟穀。《録異》云：桄榔蓋以此也。

《唐本》注云：此樹所在皆有，多生溪澗水側。葉似栲而狹長。樹大者連抱，高數仞，皮極粗厚。殊不似檀。俗人取煮汁，以療水及斷痢，取小㉗葉挼貼火爛瘡，有效。

《衍義》曰：櫸木皮，今人呼爲櫸柳。然葉似柳非柳，謂槐非槐。木最大者，高五六十尺，合二三人抱。湖南、北甚多，然亦下材也，不堪爲器用。嫩皮，取以緣栲栳與箕唇。

釣樟根皮　主金瘡止血。

陶隱居云：出桂陽、邵陵諸處，亦呼作鳥樟，方家少用，而俗人多識此。刮根皮屑以療金瘡，斷血易合，甚驗。

《唐本》注云：釣樟，生郴州山谷。樹高丈餘。葉似楠音南葉而尖長，背有赤毛，若楠枇杷葉。八月、九月採根皮，日乾也。

千金藤　主一切血毒諸氣，霍亂中惡，天行虚勞瘧瘴，痰嗽不利，癰腫，蛇犬毒，藥石發，癲癇，悉主之。生北地者，根大如指，色黑似漆；生南土者，黄赤如細辛。今附。

陳藏器云：有數種，南北名模不同，大略主痰相似，或是皆近於藤。生北地者，根大如指，色似漆；生南土者，黄赤如細辛。南北所用若取的稱，未知孰是？其中有草，今并入木部，草部亦重載也。

南燭枝葉　味苦，平，無毒。止泄

除睡，强筋益氣力。久服輕身長年，令人不饑，變白去老。取莖、葉搗碎漬汁，浸粳米九浸、九蒸、九暴，米粒緊小正黑如蟿珠，袋盛之可適遠方。日進一合，不饑，益顏色，堅筋骨，能行。取汁炊飯名烏飯，亦名烏草，亦名牛筋。言食之健如牛筋也。色赤名文燭。生高山，經冬不凋。今附。

《圖經》曰：南燭，《本經》不載所出州土，云生高山，今惟江東州郡有之。株高三五尺。葉類苦楝而小，陵冬不凋。冬生紅子作穗。人家多植庭除間，俗謂之南天燭。不拘時採其枝、葉用。亦謂之南燭草木。其種是木而似草，故號爲之。

禹錫云：按《日華子》云：黑飯草，益腸胃。搗汁浸蒸，曬乾服。又名南燭也。

無患子皮　有小毒。主浣垢，去面黑，喉痹，内喉中，立開。又主飛尸。子中人，燒令香，辟惡氣，其子如漆珠。生南谷大樹。一名噤婁，一名桓。今附。

《日華子》云：無患子皮，平。

《纂文》：無患，木名也。實可以去垢，核黑如蟿。問櫨木曰：無患何也？答曰：昔有神巫曰無患，此木能作符，劾百鬼，則以此木爲棒殺之。世人相傳，以此木爲衆鬼所惡，競取爲器，用以厭鬼，故號無患也。

《衍義》曰：無患子，今釋子取以爲念珠，出佛經。惟取紫紅色小者佳。今入藥絶少，西洛亦有之。

圖經衍義本草卷之二十四

梓白皮　味苦，寒，無毒。主熱，去三蟲，療目中疾。葉，搗傅猪瘡，飼猪，肥大三倍。生河内山谷。

陶隱居云：此即梓樹之皮。梓亦有三種，當用拌素不腐者。葉療手脚火爛瘡。桐葉及此以肥猪之法未見，應在商丘子《養猪經》中。

《日華子》云：煎湯洗小兒壯熱，一切瘡疥，皮膚瘙癢。梓樹皮有數般，惟楸梓佳，餘即不堪用。

《圖經》曰：梓白皮，生河内山谷，今近道皆有之。木似桐而葉小，花紫。

《爾雅》曰：椅，梓。郭璞注云：即楸也。《詩·鄘風》云：椅、桐、梓、漆。陸機云：梓者，楸之疏理，白色而生子者爲梓，梓實桐皮曰椅，大同而小異也。又一種鼠梓，一名楔，亦楸之屬也。

❶三：原作『二』，據晦明軒本改。
❷仲：原作『中』，據晦明軒本改。
❸腫：晦明軒本作『蠱』。
❹出：晦明軒本作『消』。
❺椿：晦明軒本作『春』。下同。
❻沐頭長髮：原作『沐髮長頭』，據晦明軒本改。
❼昏：原作『措』，據晦明軒本改。
❽苦：晦明軒本作『鹹』。
❾密：原作『蜜』，據晦明軒本改。
❿便：晦明軒本作『兒』。
⓫者：原脱，據晦明軒本補。
⓬温：晦明軒本作『煎』。
⓭刷：原作『別』，據晦明軒本改。
⓮矯：晦明軒本作『矮』。
⓯切：晦明軒本作『勿』。
⓰氣：晦明軒本作『風』。

⑰貼：原作「叶」，據晦明軒本改。
⑱峽：原脱，據晦明軒本補。
⑲及：原作「義」，據晦明軒本改。
㉑黄：原脱，據晦明軒本補。
㉑肺：原作「脚」，據晦明軒本改。
㉒花：原作「梧杞」二字，據晦明軒本改。
㉓枚：晦明軒本作「柭」。
㉔出：原作「亦」，據晦明軒本改。
㉕於：原脱，據晦明軒本補。
㉖皮：晦明軒本作「堅」。
㉙小：晦明軒本作「嫩」。
㉚南：晦明軒本作「山」。
㉛作：原作「似」，據晦明軒本改。
㉜楸：原作「椒」，據晦明軒本改。
㉝楸：原作「椒」，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之二十五

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

木部下品

橡實



橡實　味苦，微温，無毒。主下痢，厚腸胃，肥健人。其殼爲散煮汁服，亦主痢，并堪染用。一名杼斗。所在山谷中皆有。

《圖經》曰：橡實，櫟木子也。《本經》不載所出州土，云所在山谷皆有，今亦然。木高二三丈。三四月開黄花，八九月結實。其實爲皂斗，槲、櫟皆有斗，而以櫟爲勝。不拘時採。其皮并實用。《爾雅》云：櫟，其實梂❶。釋曰：櫟，似樗之木也。梂，盛實之房也。其實橡也，有梂匯自裹。《詩·秦風》云：山有苞櫟。陸機云：秦人謂柞櫟爲櫟。又《唐風》云：集於苞栩。陸機云：今柞櫟也。徐州人謂櫟爲杼，或謂之栩。今京洛及河内謂櫟亦爲杼。五方通語也。然則，柞櫟也，杼栩也，栩也，皆橡櫟之通名也。

《日華子》云：櫟樹皮，平，無毒。治水痢，消瘰癧，除惡瘡。橡斗子，澀腸止瀉。煮食，可止饑，御歉歲。殼，止腸風，崩中帶下，冷熱瀉痢，并染鬚髮。入藥并搗，炒焦用。

雷公云：凡使，去粗皮一重，取橡實蒸，從巳至未出，剉作五片用之。

孫真人《枕中素❷》云：橡實子非果非穀而最益人，服食未能斷穀，啖之尤佳。無氣而受氣，無味而受味，消食止痢，令人强健不極。

《衍義》曰：橡實，櫟木子也。葉如栗葉，在處有。但堅而不堪充材，亦

木之性也。山中以椿人爲糧，然澀腸。木善爲炭，他木皆不及。其殼堪染皂。若曾經雨水者，其色淡，不若不經雨水者。槲亦有殼但少，而不及櫟木所實者。



益智子

益智子　味辛，温，無毒。主遺精虚漏，小便餘瀝，益氣安神，補不足，安三焦，調諸氣。夜多小便者，取二十四枚碎，入鹽同煎服，有奇驗。按《山海經》云：生崑崙國。

《圖經》曰：益智子，生崑崙國，今嶺南州郡往往有之。葉似蘘荷，長丈餘。其根傍生小枝，高七八寸，無葉，花萼作穗生其上，如棗許大。皮白，中人黑，人細者佳。含之攝涎唾。採無時。盧循爲廣州刺史，遺劉裕益智粽，裕答以續命湯，是此也。

禹錫云：按陳藏器云：止嘔噦。《廣志》云：葉似蘘荷，莖如竹箭，子從心出，一枝有十子，上有小枝，高八九尺，無葉萼。子叢生，大如棗。中瓣黑，皮白，核小者名益智。含之攝涎穢。出交趾。

顧微《廣州記》云：益智，葉如蘘荷，莖如竹箭，子從心出，一枝有十子，子肉白滑。四破去之，或外皮，蜜煮爲粽，味辛。



鼠李

鼠李　主寒熱，瘰癧瘡。皮，味苦，微寒，無毒。主除身皮熱毒。一名牛李，一名鼠梓，一名椑音卑。生田野，採無時。

《圖經》曰：鼠李，即烏巢子也。《本經》不載所出州土，但云生田野，今蜀川多有之。枝、葉如李。子實若五味子，色黧黑，其汁紫色，味甘、苦，實熟時採，日乾。九蒸，酒漬服，能下血。其皮採無時。一名牛李。

《唐本》注云：此藥一名趙李，一名皂李，一名烏槎。樹皮主諸瘡，寒熱毒痹。子主牛馬六畜瘡中蟲，或生搗傅之，或和脂塗，皆效。

《食療》云：微寒。主腹脹滿。其根有毒，煮濃汁含之治蠹齒。并疳蟲蝕人脊骨者，可煮濃汁灌之良。其肉，主脹滿穀脹，和麵作餅子，空心食之，少時當瀉。其煮根汁，亦空心服一盞，治脊骨疳。

椰子皮　味苦，平，無毒。止血，療鼻衄，吐逆霍亂，煮汁服之。殼中肉，益氣去風。漿，服❸之主消渴，塗頭

椰子皮



益髮令黑。生安南。樹如棕櫚，子殼可爲器。《交州記》曰：椰子中有漿，飲之得醉。

《海藥》云：謹按《交州記》云：生南海，狀若海棕。實名椰子，大如碗許大，外有粗皮，如大腹子、豆蔻之類。內有漿似酒，飲之不醉。主消渴，吐血，水腫，去風熱。雲南者亦好。武侯❹討雲南時，并令將士剪除椰樹，不令小邦有此異物。多食動氣也。

《衍義》曰：椰子，開之有汁如乳，極甘香，自別是一種氣味。但微虛。紋若婦人裙褶，其味亦如其塊瓤，形如瓜蔞，上有細壠起，亦白色，與瓤、糖煎爲果汁，色如白酒，其味如瓤，然謂之酒者，好事者當日强名之。取其殼爲酒器，如酒中有毒則酒沸起。今人皆漆其裏，則全失用椰子之意。

紫荊木



紫荊木　味苦，平，無毒。主破宿血，下五淋，濃煮服之。

間種者，花艷可愛。

《圖經》曰：紫荊，舊不著所生州郡，今處處有之，人多於庭院間種植。木似黃荊，葉小無椏，花豔紫可愛。或云田氏之荊也。至秋子熟，如小珠，名紫珠。江東林澤間尤多。

禹錫云：謹按陳藏器云：紫珠，汁服。亦煮汁洗瘡腫，除血長膚。一名紫荊。

樹似黃荊，葉小無椏，非田氏之荊也。至秋子熟，正紫，圓如小珠。生江東，林澤間有之。

《日華子》云：紫荊木，通小腸。皮、梗同用。花功用亦同。

南藤



南藤　味辛，温，無毒。主風血，補衰老，起陽，强腰脚，除痹，變白，逐冷氣，排風邪。亦煮汁服，亦浸酒。冬月用之。生依南樹，故號南藤，莖如馬鞭有節，紫褐色。一名丁公藤。生南山山谷。

《圖經》曰：南藤即丁公藤也。生南寒。主解諸毒物，癰疽喉痹，飛尸蠱毒，腫瘿，蛇虺、蟲、蠶、狂犬等毒，并煮木，故名南藤。苗如馬鞭有節，紫褐

色，葉如杏葉而尖。採無時。此下又有千金藤云：生北地者根如指，色黑似漆。生南土者，黄赤如細辛。又有榼藤子，生廣南山林間。木如通草藤，三年方熟，紫黑色。一名象豆。醫家稀用，故附於其類。

《南史》：解叔謙，雁門人。母有疾，夜於庭中稽顙祈告，聞空中云：得丁公藤治即差。訪醫及本草皆無。至宜都山中，見一翁伐木，云是丁公藤，療風。乃拜泣求得之及漬酒法。受畢，失翁所在。母疾遂愈。

杉木



杉木　微温，無毒。主療漆瘡。

《圖經》曰：杉木，舊不載所出州土，今南中深山中多有之。木類松而勁直，葉附枝生，若刺針。《爾雅》云：柀煔。郭璞注云：煔似松，生江南。可以爲船及棺材，作柱埋之不腐也。又人家常用作桶板，甚耐水。醫師取其節煮汁，浸捋脚氣，殊效。

唐·柳柳州纂《救三死方》云：元和十二年二月得脚氣，夜半痞絶，脅有塊，大如石，且死，因大寒不知人三日，家人號哭。滎陽鄭洵美傳杉木湯，服半食頃大下，三下氣通塊散。取前件杉木節一大升，橘葉切一大升，此地無葉，可以皮代之，大腹檳榔七枚，合子碎之，童子小便三大升，共煮取一大升半，分兩服。若一服得快利，即停後服。已前三死，真死矣。會有教者，皆得不死。恐他人不幸有類余病，故傳焉。又杉菌，出宜州，生積年杉木上，若菌狀。云：味苦，性微温。主心脾氣疼及暴心痛。採無時。

陶隱居云：削作柿煮，以洗漆瘡。無不即差。又有鼠查，生去地高尺餘許，煮以洗漆多差。又有漆姑，葉細細，多生石邊。亦療漆瘡。其鷄子及蟹，并是舊方。

《唐本》注云：杉材木，水煮汁，浸捋脚氣腫滿。服之療心腹脹痛，去惡氣。其鼠查、漆婦❺有别功，列出下品。

禹錫云：按《日華子》云：味辛。治風毒，賁豚，霍亂，止氣。并煎湯服并淋洗，須是油杉及臭者良。

《衍義》曰：杉榦端直，如松不凋，但葉闊成枝。廬山有萬於杉寺，此杉也。作屑煮汁，浸洗脚氣腫滿。

接骨木



接骨木　味苦、甘，平，無毒。主

折傷，續筋骨，除風癢，齲齒，可作浴湯。一名蒴藿。

《唐本》注云：葉如陸英，花亦相似。但作樹高一二丈許，木輕虛無心。斫枝插便生，人家亦種之。一名木蒴藿。所在皆有之。唐本先附。

禹錫云：按陳藏器云：接骨木，有小毒。根皮主痰飲，下水腫及痰癚。煮服之，當利下及吐，不可多服。葉主癚。小兒服三葉，大人服七葉，并生搗絞汁服，得吐爲度。《本經》云：無毒，誤也。

《產書》云：治產後心悶，手脚煩熱，氣力欲絶，血運連心頭硬，及寒熱不禁。接骨木破之如算子一握，以水一升，煎取半升，分温兩服。或小便數，惡血不止，服之即差。此木煮之三遍，其力一般。此是起死人方。

木鱉子　味甘，温，無毒。主折傷，消結腫惡瘡，生肌，止腰痛，除粉刺黑黯，婦人乳癰，肛門腫痛。藤生，葉有五花，狀如薯蕷，葉青色面光，花黄。其子似栝蔞而極大，生青，熟紅，肉上有刺。其核似鱉，故以爲名。出朁州及南中。七八月採之。



木鱉子

《圖經》曰：木鱉子，出朗州及南中，今湖、嶺諸州及杭、越、全、岳州亦有之。春生苗，作蔓，葉有五花，狀❻如山芋，青色面光。四月生黄花，六月結實，似栝蔞而極大，生青，熟紅，肉上有刺。其核似鱉，故以爲名。每一實，其核三四十枚，八月、九月採。嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食之。

禹錫云：按《日華子》云：醋摩消腫毒。

《孫用和方》：治痔，以木鱉子三枚，去皮杵碎，砂盆内研如泥，以百沸湯一大碗，以上入盆器内，坐上薰之至通，手即洗，一日不過二三次。

《衍義》曰：木鱉子，蔓生，歲一枯。葉如蒲桃，實如大栝蔞，熟則紅黄色，微有刺，不能刺人。今荆南之南皆有之。九月、十月熟，實中之子曰木鱉子。但根不死，春旋生苗，其子一頭尖者爲雄。凡植時，須雌雄相合，麻縷纏定；及其生也，則去其雄者，方結實。



釣藤

釣藤　微寒，無毒。主小兒寒熱，十二驚癎。

《圖經》曰：釣藤，《本草》不載所出州土，蘇恭云：出梁州，今亦興元府有之。春生苗，葉細莖長，節間有刺若釣鈎。字或作吊。葛洪治小兒方多用之。其赤湯治卒得癎，用吊藤、甘草

炙各二分，水五合，煮取二合。服如小棗大，日五夜三。大良。又《廣濟》及《崔氏方》療小兒驚癇諸湯飲，皆用吊藤皮。

《藥性論》云：釣藤，臣，味甘，平。能主小兒驚啼，瘈瘲熱擁。

《日華子》云：治客忤胎風。

陶隱居云：出建平。亦作釣藤字。惟療小兒，不入餘方。

《唐本》注云：出梁州。細❼長，莖間有刺，若釣鉤者是。

《衍義》曰：釣藤，中空，二《經》不言之。長八九尺，或一二丈者。湖南、北，江南、江西山中皆有。小人有以穴隙間致酒瓮中盜取酒，以氣吸之，酒既出，涓涓不斷。專治小兒驚熱。

棕櫚子　平，無毒。澀腸，止瀉痢腸風，崩中帶下及養血。皮，平，無毒。止鼻洪吐血，破癥，治崩中帶下，腸風赤白痢，入藥燒灰用，不可絶過。

《衍義》曰：棕櫚木，今人旋爲器。皮燒爲黑灰，治婦人血露及吐血，仍佐之他藥。每歲剮取棕皮，不爾束死。花如魚子，渫熟，淹爲果。

雷公云：治崩中帶下。

《圖經》曰：棕櫚，亦曰栟櫚。出嶺南及西川，江南亦有之。木高一二丈，傍無枝條。葉大而圓，歧生枝端。有皮相重，被於四傍，每皮一匝爲一節。二旬一採，轉復生上。六七月生黄白花。八九月結實，作房如魚子，黑色。九月、十月採其皮木用。《山海經》曰：石脆一作翠之山，其木多棕是也。



棕櫚子

芫花　味辛、苦，温、微温，有小毒。主咳逆上氣，喉鳴喘，咽腫，短氣，蠱毒，鬼瘧，疝瘕，癰腫，殺蟲魚，消胸中痰水，喜音戲唾，水腫，五水在五臟皮膚，及腰痛下寒毒肉毒。久服令人虚。一名去水，一名毒魚，一名杜芫。其根名蜀桑根，療疥瘡。可用毒魚。生淮源川谷。三月三日採花，陰乾。决明爲之使，反甘草。

《圖經》曰：芫花，生淮源川谷，今在處有之。宿根舊枝莖紫，長一二尺。



芫花

根入土深三五寸，白色，似榆根。春生苗、葉，小而尖，似楊柳枝葉。二月開紫花，頗似紫荊而作穗，又似藤花而細。三月三日採，陰乾。其花須未成蕊，蒂細小，未生葉時收之。葉生花落，即不堪用。《吳晉本草》云：芫花一名敗葉❽，一名兒草，一名黃大戟。葉有紫、赤、二月生青葉，加厚則黑。白者。三月實落盡，葉乃生是也。而今絳州出者花黃，謂之黃芫花。漢·太倉公淳于意治臨淄女子薄吾蟯瘕，爲病腹大，上膚黃粗，循之戚戚然，意飲以芫花一撮，即出蟯可數升，病遂愈。蟯音饒。

陶隱居云：近道處處有，用之微熬，不可近眼。

《藥性論》云：芫花，使，有大毒。能治心腹脹滿，去水氣，利五臟，寒痰涕唾如膠者，主通利血脈，治惡瘡，風痹濕，一切毒風，四肢攣急，不能行步，能❾瀉水腫脹滿。

《日華子》云：療嗽，癖癥瘕。所在有，小樹子在陂澗傍，三月中盛花，淺紫色。

張仲景方：治太陽中風，吐下嘔逆者，可攻，十棗湯主之。芫花熬、甘遂、大戟三物等分，停各篩末。取大棗十枚，水一升半，煮取八❿合，去滓，納諸藥。强人一錢匕，羸人半錢匕，溫服之。不下，明旦更加半匕，下後糜粥自養，病懸飲者亦主之。

《經驗方》：治痔瘻有頭方：用芫花入土根不限多少，以淨水洗却，入木臼搗，用少許水絞取汁，於銀、銅器內慢火煎成膏，將絲綫於膏內度過繫痔，繫時微痛，候心躁落時，以紙拈子入膏藥於竅內，永除根本，未落，不得使水。然不及青木香。又主金瘡止血，亦療淋用之。

《三國志》云：魏初平中，有青牛先生常服芫花，年如五六十，人或親識之，謂其已百餘歲矣。

枳椇音止矩　味甘，平，無毒。主頭風，小腹拘急。一名木蜜。其木皮，温，無毒。主五痔，和五臟。以木爲屋，屋中酒則味薄，此亦奇物。

《圖經》曰：陸機云：枸，枝枸也。木似白楊，所在山中皆有，枝枸不直，啖之甘美如飴。八九月熟，謂之木蜜。本從南方來。能敗酒。若以爲屋柱，則一屋之酒皆薄。

《唐本》注云：其樹徑尺，木名白石，葉如桑柘，其木作房，子似珊瑚，核在其端，又如癩漢指頭。

禹錫云：按《蜀本》云：字或單⓫作枸音矩，云木名，出蜀，近酒能薄酒味，江南人呼謂之木蜜也。

紫真檀　味鹹，微寒。主惡毒，風毒。

陶隱居云：俗人摩以塗風毒諸腫，亦效。然不及青木香。又主金瘡止血，亦療淋用之。

《唐本》注云：此物出崑崙盤四國也。雖不生中華，人間遍有之也。

陳藏器云：檀樹如檀。出海南。本功外，心腹痛，霍亂，中惡，鬼氣，殺蟲。

禹錫云：謹按《日華子》云：紫真檀無毒。

《千金方》：治一切腫。用紫檀細碎，大醋和傅腫上。

《梅師方》：治金瘡止血。急刮紫真檀末，傅之。

烏臼木　根皮味苦，微温，有毒。主暴水，癥結積聚。《唐本》注云：樹高數仞，葉似梨、杏。花黄白。子黑色。

陳藏器《本草》云：烏臼葉好染皂。子多取壓爲油，塗頭令黑變白，爲燈極明。服一合，令人下痢，去陰下水。唐本先附。

禹錫云：按《日華子》云：烏臼根皮，凉。治頭風，通大小便。以慢火炙令脂汁盡，黄乾後用。

《斗門方》：治大便不通。用烏臼木方停一寸來，劈破，以水煎取小半盞，服之立通。不用多服。其功神聖，兼能取水。

鹽麩子　味酸，微寒，無毒。除痰飲瘴瘧，喉中熱結喉痹，止渴，解酒毒黄疸，飛尸蠱毒，天行寒熱，痰嗽，變白，生毛髮。取子乾搗爲末食之，嶺南人將以防瘴。樹白皮，主破血，止血，蠱毒，血痢，殺蛔蟲。并煎服之。根白皮，主酒疸⑫。搗碎，米泔浸一宿，平旦空腹温服一二升。葉如椿，生吴、蜀山谷。子秋熟爲穗，粒如小豆。上有鹽似雪，食之酸鹹止渴。一名叛奴鹽。

陳藏器云：蜀人謂之酸桶。《博物志》云：酸桶，七月出穗，蜀人謂之主音，穗上有鹽著，可爲羹，亦謂之酢桶矣，吴人謂之烏臼鹽也。

禹錫云：按陳藏器云：子主頭風耳聾有驗。餘如《經》。

楠材　微温。主霍亂吐下不止。

陶隱居云：削作柿煮服之，卒急，無他藥，用此。

禹錫云：按《日華子》云：味辛，温，無毒。止腸風瀉血，又主痢後熱渴，作飲服之，令人得睡，入藥炒用。取汁度絲使得易絡。花，凉，無毒。治腸風瀉血并赤白痢，炒用。作湯代茶吃，治風。

《衍義》曰：木槿，如小葵，花淡紅色，五葉成一花，朝開暮斂。花與枝兩用。湖南、北人家多種植爲籬障。餘如《經》。

木槿　平，無毒。止腸風瀉血，又主痢後熱渴，作飲服之，令人得睡，入藥炒用。取汁度絲使得易絡。花，凉，無毒。治腸風瀉血并赤白痢，炒用。作湯代茶吃，治風。

《衍義》曰：木槿，如小葵，花淡紅色，五葉成一花，朝開暮斂。花與枝兩用。湖南、北人家多種植爲籬障。餘如《經》。

柘木　味甘，温，無毒。主補虚損。取白皮及東行根白皮，煮汁釀酒，主風虚耳聾，勞損虚羸瘦，腰腎冷，夢與人交接泄精者。取汁服之，無刺者良。主婦人崩中血結，及主瘧疾，兼堪染黄。

《衍義》曰：柘木，裏有紋，亦可旋爲器。葉飼蠶曰柘蠶，葉梗，然不及桑葉。東行根及皮，煮⑫汁釀酒，治風虚船場，皆此木也。緣木性堅而善居水。久則多中空，爲白蟻所穴。

石南　味辛、苦，平，有毒。主養腎氣，內傷陰衰，利筋骨皮毛，療脚弱，五臟邪氣，除熱。女子不可久服，令思男。實，殺蠱毒，破積聚，逐風痹。一名鬼目。生華陰山谷。二月、四月採葉，八月採實，陰乾。五加皮爲之使。

《圖經》曰：石南，生於石上，株極有高大南北皆有之。生於石上，株極有高大者。江湖間出者，葉如枇杷葉，有小刺，凌冬不凋。春生白花成簇。秋結細紅實。關隴間出者，葉似莽草，青黃色，背有紫點，雨多則併生，長及二三寸。根橫細，紫色。無花實，葉至茂密。南北人多移以植庭宇間，陰翳可愛，不透日氣。入藥以關中葉細者良。二月、四月採葉，四月採實，陰乾。

禹錫按：《蜀本》云：終南斜谷近石處甚饒。今市人多以瓦韋爲石韋，以石韋爲石南，不可不審之。

《藥性論》云：石南，臣。主除熱，惡小薊，無毒。能添腎氣，治軟脚，煩悶痛，殺蟲，能逐諸風，雖能養腎，又令人陰痿。

《衍義》曰：石南，葉狀如枇杷葉之小者，但背無毛，光而不皺。正二月間開花。冬有二葉爲花苞，苞既開，中有十五餘花，大小如椿花，甚細碎。每一苞約彈許大，成一球。一花六葉，一朵有七八球，淡白綠色，葉末微淡赤色。花既開，蕊滿花，但見蕊，不見花。所用出鳳州。樹高如冬青，不凋。出深山。人云多服損壽，以其逐風損氣故也。不當以藤天蓼爲主，既云木蓼，豈更藤生？自有藤蓼爾。唐本先附。

陳藏器《本草》云：木天蓼，今時所用出鳳州。樹高如冬青，不凋。出深山。人云多服損壽，以其逐風損氣故也。不當以藤天蓼爲主，既云木蓼，豈更藤生？自有藤蓼爾。

禹錫按：《藥性論》云：天蓼，味苦、辛，微熱，無毒。能治中賊風，口面喎斜，主冷疾癖氣塊，女子虛勞。

木天蓼　味辛，温，有小毒。主蠱毒鬼疰鬼魅，邪氣在臟中，除咳逆寒熱。一名凌泉，一名大就。生蜀郡山谷。三月、四月開花，似柘花。五月採子，子作球形似苘，其球子可藏，作果啖之。亦治諸冷氣。蘇恭云作藤蔓生者，自是藤天蓼也。又有一⑭種小天蓼，生天目山、四明山，木如梔子，冬不凋。然則，天蓼有三種，雖其狀不同，而療體甚相似也。

黃環　味苦，平，有毒。主蠱毒鬼疰鬼魅，邪氣在臟中，除咳逆寒熱。一名凌泉，一名大就。生蜀郡山谷。三月採根，陰乾。鳶尾爲之使，惡茯苓、防己。

陶隱居云：似防己，亦作車輻理解。《蜀都賦》云青珠黃環者，或云是大戟花，定非也。用甚稀，市人尠有識

者。

《唐本》注云：此物，襄陽、巴西人謂之就葛。作藤生，根亦葛類，所云似防己，作車輻解者近之。人取葛⑮，誤得食之，吐痢不止，用土漿解乃差，此真黄環也。餘處亦稀，惟襄陽大有。《本經》用根。今云大戟花非也。其子作角生，似皂角。花、實與葛同時矣。今園庭種之，大者莖徑六七寸，所在有之。謂其子名狼跋子。今太常科劍南來者⑯，乃鷄屎葛根，非。

禹錫云：按《藥性論》云：黄環，使，惡乾薑，大寒，有小毒。治上氣急，寒熱及百邪。

溲音搜**疏**　味辛、苦，寒、微寒，無毒。主身皮膚中熱，除邪氣，止遺溺，通利水道，除胃中熱，下氣。可作浴湯。一名巨骨。生熊耳川谷及田野故丘墟地。四月採。漏蘆爲之使。

陶隱居云：李云，溲疏一名楊櫨，一名牡荆，一名空疏。皮白中空，時時有節。子似枸杞子，冬月熟，色赤，味甘、苦。末代乃無識者。此實真也。非人籬援之楊櫨也。李當之此説，於論牡荆，乃不爲大乖，而濫引溲疏，恐斯誤矣。又云：溲疏與空疏亦不同。《唐本》注云：溲疏，形似空疏，樹作熊耳。熊耳，山名，都無

恐是別物，非小蘗也。唐本先附。

莢蒾音迷　味甘、苦，平，無毒。主三蟲，下氣消穀。

《唐本》注云：葉似木槿及似榆，作小樹，其子如溲疏，兩兩相并，四四相對，而色赤味甘。煮樹枝汁和作粥，甚美，以飼小兒殺蛔蟲。不入方用。陸機《草木疏》名擊蒾，一名羿先。蓋檀、榆之類也。所在山谷有之。

今注：陳藏器《本草》云：莢蒾，主六畜瘡中蛆，煮汁作粥灌之，蛆立出。皮堪爲索。生北土山林間。唐本先附。

楓柳皮楓音風　味辛，大熱，有毒。主風，齲齒痛。出原州。

《唐本》注云：葉似槐，莖赤根黄。子六月熟，緑色而細。剥取莖皮用之。唐本先附。

陳藏器云：性澀。止水痢。蘇云下水腫，腫非澀藥所治有殊，蘇爲誤矣。

赤爪木　味苦，寒，無毒。主水痢，風頭身癢。生平陸，所在皆有。實味酸，冷，無毒。汁服，主水痢，沐頭及洗身上瘡癢。

《唐本》注云：小樹生，高五六尺。葉似香菜，子似虎掌，爪大如小林梢[20]，一名羊扶，一名鼠查。

樺木皮　味苦，平，無毒。主諸黄疸，濃煮汁飲之良。堪爲燭者，木似山桃，取脂燒辟鬼。今附。

《衍義》曰：樺木皮，燒爲黑灰，合他藥治乍[21]風毒。及取皮上有紫黑花子、鐙。

榼藤子　味澀、甘，平，無毒。主蠱毒，五痔，喉痹及小兒脱肛，血痢，并燒灰服。瀉血宜服一枚，以刀剜内瓤，熬研爲散。空腹熱酒調二錢，不過三服必效。又宜入澡豆末，除黡黯，其殼用貯丹藥，經載不壞。按《廣州記》云：生廣南山林間，樹如通草藤也。三年方始[22]熟，紫黑色。一名象豆。今附。

樒實上音匪　味甘，無毒。主五痔，去三蟲蠱毒，鬼疰。生永昌。

《唐本》注云：今出東陽諸郡，食其葉似香菜，子似虎掌，入藥炙用。

陶隱居云：今出東陽諸郡，食其果食之，愈。過多則滑腸。

《衍義》曰：樒實，大如橄欖，殼色紫褐而脂[20]，其中子有一重粗黑衣，其仁黄白色，服久漸甘美。五痔人常如子，療寸白蟲。

禹錫云：按《日華子》云：治飛尸，入藥炙用。

欒荆　味辛、苦，温，有小毒。主大風，頭面手足諸風，癲癇狂痓，濕痹寒冷疼痛。俗方大用之，而本草不載，亦無別名。但有欒花，功用又別，非此花也。

《唐本》注云：按其莖、葉都似石南，乾亦反卷，經冬不死，葉上有細黑點者，真也，今雍州所用者是。而洛州乃用石荆當之，非也。唐本先附。

禹錫云：按《藥性論》云：欒荆

子，君，惡石膏，味甘、辛，微熱，無毒。能治四肢不遂，主通血脉，明目，益精光。決明爲使。

扶移木皮　味苦，平，有小毒。去風血，脚氣疼痹，踠損瘀血，痛不可忍。取白皮火炙，酒浸服之，和五木皮煮作湯，捋脚氣疼腫，殺瘕陟生切蟲風瘙。燒作灰置酒中，令味正，經時不敗。生江南山谷。樹大十數圍，無風葉動華反而後合。《詩》云：棠棣之華偏其反。亦名栘楊。崔豹云：栘楊，圓葉弱蒂，微風大搖。新補，見陳藏器。

藥實根　味辛，温，無毒。主邪氣，諸痹疼酸，續絶傷，補骨髓。一名連木。生蜀郡山谷。採無時。

《唐本》注云：此藥子也，當今盛用，胡㉔名那綻，出通州、渝州。《本經》用根。恐誤載根字。子，味辛，平，無毒。主破血，止痢，消腫，除蠱疰蛇毒。崗子㉕生，葉似杏，花紅白色，子肉味酸甘，用其核仁。

欒華　味苦，寒，無毒。主目痛淚出，傷眦，消目腫。生漢中川谷。五月採。決明爲之使。

《唐本》注云：此樹，葉似木槿而薄細，花黄似槐而小長大。子殼似酸漿，其中有實如熟豌豆，圓黑堅硬，堪染黄色，甚鮮好。

蔓椒　味苦，温，無毒。主風寒濕痹，歷節疼，除四肢厥氣，膝痛。一名豕椒，一名猪椒，一名㕮椒，一名狗椒。生雲中川谷及丘冢間。採莖、根，煮釀酒。

陶隱居云：山野處處有，俗呼爲繆，似椒黨，小不香爾。一名稀椒。可以蒸病出汗也。

感藤　味甘，平，無毒。調中益氣，主五臟，通血氣，解諸熱，止渴，除煩悶，治腎鈞氣。如木防己。生江南山谷。如鷄卵大，斫藤斷，吹氣出一頭，其汁甘美如蜜。葉生研，傅蛇㉗咬瘡。一名甘藤。甘、感聲近，又名甜藤也。新補，見陳藏器、日華子。

赤樫木　無毒。主剥驢馬血入肉之。其木中脂，一名樫乳，入合質汗用之。生河西沙地。皮赤色，葉細。今附。

《唐本》注云：此樹，葉似木槿而小長大。子殼似酸漿，其中有實如熟豌豆，圓黑堅硬，堪染黄色，甚鮮好。

蔓椒　味苦，温，無毒。主風寒濕痹，歷節疼，除四肢厥氣，膝痛。一名豕椒，一名猪椒，一名㕮椒，一名狗椒。生雲中川谷及丘冢間。採莖、根，煮釀酒。

陶隱居云：山野處處有，俗呼爲繆，似椒黨，小不香爾。一名稀椒。可以蒸病出汗也。

感藤　味甘，平，無毒。調中益氣，主五臟，通血氣，解諸熱，止渴，除煩悶，治腎鈞氣。如木防己。生江南山谷。如鷄卵大，斫藤斷，吹氣出一頭，其汁甘美如蜜。葉生研，傅蛇㉗咬瘡。一名甘藤。甘、感聲近，又名甜藤也。新補，見陳藏器、日華子。

赤樫木　無毒。主剥驢馬血入肉之。其木中脂，一名樫乳，入合質汗用之。生河西沙地。皮赤色，葉細。今附。

《唐本》注云：此樹，葉似木槿而小長大。子殼似酸漿，其中有實如熟豌豆，圓黑堅硬，堪染黄色，甚鮮好。

突㉘厥白　味苦。主金瘡，生肉止痛㉙，補腰續筋。出突厥國，色白如灰，乃云石灰，共諸藥合成之。夷人以合金瘡，中國用之。

今注：醫家見用經效者，潞州出焉。其根黄白色，狀似茯苓而虚軟。苗高三四尺，春夏葉如薄荷。花似牽

牛而紫，上有白棱。二月、八月採根，暴乾。今附。

賣子木　味甘、微鹹，平，無毒。主折傷血内溜，續絶，補骨髓，止痛，安胎。生山谷中。

《圖經》曰：賣子木，《本經》不載所出州土，注云出劍南、邛州，今惟渠州有之。每歲出[30]貢，謂之賣子木。

婆羅得　味辛，温，無毒。主冷氣塊，温中，補腰腎，破痃癖，可染髭髮令黑。樹如柳，子如菴音卑麻。生西國。今附。

《海藥》云：謹按徐氏云：生西海波斯國。似中華柳樹也，方家多用。

甘露藤　味甘，温，無毒。主風、血氣諸病。久服調中温補，令人肥健，好顏色，止消渴，潤五臟，除腹内諸冷。一名肥藤，人服之生嶺南。藤蔓如箸，一名肥藤，人服之得肥也。新補。見陳藏器、《日華子》。

大空　味辛、苦，平，有小毒。主三蟲，殺蟣虱。生山谷中。取根皮作末，油和塗，蟣虱皆死。

《唐本》注云：根皮赤。葉似楮，小圓厚。作小樹，抽條高六七尺。出襄州山谷，所在亦有，秦隴人名爲獨空。唐本先附。

水楊葉　嫩枝，味苦，平，無毒。主久痢赤白，搗和水絞取汁，服一升，日二，大效。

今注：水楊葉，圓闊而赤，枝條短硬，多生水岸旁。樹與楊柳相似，既生水岸，故名水楊。唐本先附。

楊櫨木　味苦，寒，有毒。主疽瘻惡瘡，水煮葉汁洗瘡，立差。生籬垣間。一名空疏。所在皆有。唐本先附。

檬子　味辛辣如椒。主游蠱，飛尸著喉口者，刺破以子揩之令血出，當下涎沫。煮汁服之，去暴冷腹痛，食不消，殺腥物。木高大，莖有刺。新補。見陳藏器。

柞木皮　味苦，平，無毒。治黄疸病，皮燒末，服方寸匕。生南方，葉細，幹多迂矮者爲檬。檬用根、葉、莢。故今之作梳者是。新補。見陳藏器、《日華子》。

黄櫨　味苦，寒，無毒。除煩熱，解酒疸目黄，煮服之。亦洗湯火、漆瘡

及赤眼。堪染黄色。生商洛山谷，葉圓木黄，川界甚有之。新補。見陳藏器、《日華子》。

柯樹皮　味辛，平，有小毒。主大腹水病。取白皮作煎，令可圓如梧桐子大。平旦三圓，須臾又一圓。一名木奴。南人用作大船者也。

《海藥》云：謹按《廣志》云：生廣南山谷。《臨海志》云：是木奴樹，主乳[31]氣，採皮以水煮，去滓復煉，候凝結丸得爲度。每朝空心飲下三圓，浮氣、水腫并從小便出。故波斯家用爲船舫也。

敗扇　主蚊子。新造屋柱下四隅埋之，蚊永不入，燒爲末和粉粉身上，主汗，彌敗者佳。

罌子桐子　有大毒。壓爲油，毒鼠主死，摩疥癬蟲瘡毒腫。一名虎子桐，似梧桐，生山中。

石荆　欒荆注蘇云：用當欒荆，非也。按石荆似荆而小。生水傍，作灰汁沐頭生髮。《廣濟方》云：一名水荆。主長髮是也。

木黎蘆　漏蘆注陶云：漏蘆一名鹿驪。生南山，人用苗，北人用根。功在本經。木梨蘆有毒，非漏蘆，樹生如茱萸，樹高三尺，有毒。殺蟲，山人以瘡疥用之。

圖經衍義本草卷之二十五

❶捄：晦明軒本作『梂』。
❷素：晦明軒本作『記』。
❸服：原作『水』，據晦明軒本改。
❹侯：原作『俠』，據晦明軒本改。
❺婦：晦明軒本作『姑』。
❻狀：原作『葉』，據晦明軒本改。
❼細：晦明軒本『細』上有『葉』字。
❽葉：晦明軒本作『華』。
❾能：原作『治』，據晦明軒本改。
❿八：原作『大』，據晦明軒本改。
⓫單：原作『車』，據晦明軒本改。
⓬疸：原作『瘴』，據晦明軒本改。
⓭煮：原『煮』上衍『主』字，據晦明軒本删。
⓮一：原作『三』，據晦明軒本改。
⓯葛：晦明軒本『葛』下有『根』字。
⓰者：原脱，據晦明軒本補。
⓱掘：原脱，據晦明軒本補。
⓲此：原『此』上衍『枸』字，據晦明軒本删。
⓳注：原作『按』，據晦明軒本改。
⓴梢：晦明軒本作『檎』。
㉑乍：晦明軒本作『肺』。
㉒始：原作『如』，據晦明軒本改。
㉓脂：晦明軒本作『脆』。
㉔胡：原作『調』，據晦明軒本改。
㉕崗子：晦明軒本作『樹』。
㉖火：晦明軒本作『爛』。
㉗蛇：晦明軒本『蛇』下有『蟲』字。
㉘突：原作『哭』，據晦明軒本改。
㉙痛：晦明軒本作『血』。
㉚出：晦明軒本作『土』。
㉛乳：晦明軒本作『浮』。

圖經衍義本草卷之二十六

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

人部

髮髮 音被　味苦，温、小寒，無毒。主五癃關格不通，利小便水道，療小兒癇，大人痓，仍自還神化。合鷄子黄煎之，消爲水，療小兒驚熱。

陶隱居云：李云是童男髮。神化之事，未見別方。今俗中嫗母，爲小兒作鷄子煎用髮雜熬，良久得汁與小兒服，去痰熱，治百病。而用髮皆取其父梳頭亂者爾。不知此髮髮，審是何物？且髮字書記所無，或作蒜音，人今呼斑髮爲蒜髮，書家亦呼亂髮爲髽，恐髮即舜音也。童男之理，未或全明。

《唐本》注云：此髮根也，年久者用之神效。即髮字誤矣。既有亂髮及頭垢，則闕髮明矣。又頭垢功劣於髮髮，猶去病用陳久者梳及船茹、敗天翁、蒲席皆此例。甄立言作鬠，亦髮也，字書無髮字，但有髮髽。髽，髮美貌，作丘權音，有聲無質，則髮爲真者也。

禹錫云：按《蜀本》云：《本經》云李云神化之事，未見別方。按《異苑》云：人髮變爲鱔魚。神化之異，應此者也。

《日華子》云：髮，温。止血悶血運，金瘡傷風，血痢，入藥燒灰，勿令絶過。煎膏，長肉消瘀血也。

陳藏器云：生人髮挂果樹上，烏鳥不敢來食其實。又人逃走，取此❶髮如鷄子大，鹽湯三升和服之，不吐再服。去痰熱，治百病。而用髮皆取其父梳頭亂者爾。不知此髮髮，審是何物？且髮字書記所無，或作蒜音，人今呼斑髮爲蒜髮，書家亦呼亂髮爲髽，恐髮即舜音也。童男之理，未或全明。

《衍義》曰：髮髮與亂髮，自是兩等。髮髮味苦，即陳舊經年歲者。如橘皮皆橘也，而取其陳者。狼毒、麻黄、吴茱萸、半夏、枳實之類，皆須陳者，謂之六陳，入藥更良。敗蒲亦然，此用髮之義耳。今人又謂之頭髮。其亂髮條中，自無用髮之義，此二義甚明，亦不必如此過謂搜索。

亂髮 微温。主咳嗽，五淋，大小便不通，小兒驚癇，止血。鼻衄，燒之吹内立已。

陶隱居云：此常人頭髮爾，與髮髮療體相似。

《唐本》注云：亂髮灰，療轉胞，小便不通，赤白痢，哽噎，鼻衄，癰腫，狐尿刺，尸疰，丁腫，骨疽雜瘡。

禹錫云：按《藥性論》云：亂髮，使，味苦。能消瘀血，關格不通，利水道。

《外臺秘要》：治霍亂煩躁。燒亂髮如鷄子大，鹽湯三升和服。

《經驗方》：孩子熱瘡。亂髮一團梨許大，鷄子黄煮熟，二物相和，於銚子内炭火上熬，初甚乾，少頃髮焦，遂有液出，旋取置一瓷盞中，以液盡爲度。取此液傅熱瘡上，即以苦參粉粉之。

《梅師方》：治鼻衄出血，眩冒欲死。燒亂髮細研，水服方寸匕，須❷更吹鼻中，差。

《簡要濟衆方》：治小兒重舌欲死。以亂髮灰細研，以半錢傅舌下。日不住用之。

蘇學士云：亂髮、露蜂房、蛇蜕皮各燒灰存性，每味取一錢匕，酒調服。治瘡口久不合神驗。

老唐云：收自己亂髮，洗淨，乾，每一兩入椒五十粒，泥封固，入爐大火一煅如黑糟，細研。酒服一錢匕，髭髮長黑。

《衍義》：文具髮髭髮條下。

人乳汁　主補五臟，令人肥白悦澤。

陶隱居云：張蒼常服人乳，故年百歲餘，肥白如瓠。

《唐本》注云：《別録》云：首生男乳，療目赤痛多淚，解馬肝牛肉毒，合豉濃汁服之神效。又取和雀屎，去目赤胬肉。

《日華子》云：人乳，冷。益氣，治瘦悴，悦皮膚，潤毛髮，點眼止淚。并療赤目，使之明潤也。

《衍義》曰：人乳汁，治目之功多，何也？人心生血，肝藏血，肝受血則能視。蓋水入於經，則其血乃成。又曰：上則爲乳汁，下則爲月水，故知乳汁則血也。用以點目，豈有不相宜者。

《外臺秘要》：傷寒病，欲令不勞酪之類，不可多食。雖曰牛、羊乳，然亦不出乎陰陽造化爾。西戎更以駝、馬乳❹爲酥酪。老人患口瘡不能食，飲人熱乳，甚良。

《聖惠方》：治卒中風不語，舌根强硬。陳醬五合，三年者妙，人乳汁五合，二件相和研，以生布絞取汁。不計時候，少少與服，良久當語。

《金匱方》：啖蛇❺牛肉殺人，何以知之，啖蛇❻，毛髮向後順者是也。食之欲死，飲人乳汁一升立可❼。

頭垢　主淋閉不通。

陶隱居云：術云：頭垢浮針，以入藥燒用。齒垤，温。和黑虱研塗，出箭頭并惡刺，破癰腫。

葛稚川：治乳癰。取人牙齒燒灰細研，酥調貼癰上。

李世績：治箭頭不出及惡刺，以肥膩故爾。今當用悦澤人者，其垢可丸。又主噎，亦治勞復。

禹錫云：按《藥性論》云：頭垢治噎。酸漿水煎膏，用之立愈。

《日華子》云：温。治中蠱毒及蕈毒，米飲或酒化下，并得以吐爲度。

《外臺秘要》：傷寒病，欲令不勞復。頭垢燒，水丸如梧桐子大，飲服一丸。

《千金方》：治百邪鬼魅。水服頭垢一小豆大。

故腻頭巾　無毒。天行勞復，渴，浸取汁，暖服一升。又方：主食自死鳥獸肝中毒。取故頭巾垢一錢匕，熱湯中烊服之。三年頭帛，主卒心痛，沸湯取汁飲，以頭帛於閉處，碗覆之，同時開愈。頭帛即縛髻帛也。

人牙齒　平。除勞治瘧，蠱毒氣。入藥燒用。齒垤，温。和黑虱研塗，出箭頭并惡刺，破癰腫。

葛稚川：治乳癰。取人牙齒燒灰細研，酥調貼癰上。

李世績：治箭頭不出及惡刺，以齒垤和鶴❽虱研傅之。

人屎　寒。主療時行大熱狂走，解諸毒，宜用絶乾者搗末。沸湯沃服之。東向圊厠溺坑中青泥，療喉痹，消癰腫，若已有膿即潰。

陶隱居云：交廣俚人，用焦銅爲箭鏃射人，傷皮便死，惟飲屎汁即差。而射猪、狗不死，以其食糞故也。時行大熱，飲屎汁亦差。今近城寺別塞空罌口，内糞倉中，久年得汁，甚黑而苦，名爲黄龍湯，治温病垂死皆差。

《唐本》注云：人屎，主諸毒，卒惡熱黄悶欲死者。新者最效，須與水和服之。其乾者燒之烟絶，水漬飲汁，名破棺湯。主傷寒熱毒，水漬飲彌善。破丁腫開，以新者封之，一日根爛。

禹錫云：按《日華子》云：糞清，浸滲取汁。冷。臘月截淡竹，去青皮，浸滲取汁。治天行熱狂、熱疾、中毒、并惡瘡、蕈毒，取汁服。浸皂角、甘蔗，治天行熱疾。

《外臺秘要》：治骨蒸熱，非其人莫浪傳。取屎乾者，燒令外黑，内水中澄清，每旦服一小升，薄色❾小便服一小升，以差爲度。既常服，新作大坑，燒二升，夜以水三升漬之，稍稍減服。小便用童子者。

《斗門方》：治熱病及時疾，心躁狂亂奔走，狀似癲癎，言語不定，久不得汗，及時疾不知人事者。以人中黄不以多少，入大罐内，以泥固濟，大火煅半日，去火，候冷取出，於地上以盆蓋之，又半日許，細研如麵。新汲水調下三錢。或未退再作，差。

《姚氏方》：毒箭有三種：交廣夷俚用焦銅作箭鏃。嶺北諸處以蛇毒螫尿數升，亦多差，合葱、豉作湯，彌佳。

《唐本》注云：尿，主卒血攻心，被物汁，著筒中漬箭鏃。煎服之，一服一升。又便鬪膿沸爛而死。若中之者，諸藥不差者。服之皆下并以傅之亦可療❿，惟此最妙。又一種用射菌以塗箭鏃，人中之亦困，若著實血片塊，二十日即出也。亦主久嗽上氣失聲。尿坑中竹木，主小兒齒不生，處不死，近腹亦宜急治。今葛氏方，是射菌者耳。

正旦刮塗之生。

陳藏器云：尿，寒。主明目，益聲，潤肌膚，利大腸，推陳致新，去咳嗽肺痿，鬼氣瘂病。彌久停臭者佳。恐冷，當以熱物和温服。久臭溺，浸蜘蛛咬，於大瓮中坐浸；仍取烏鷄屎炒，浸末三兩匙於坑中，以新汲水調勻，良久，侯⓫澄清，與時行大熱狂渴須水人飲之，差。今世俗謂之地清，然飲之勿極意，恐過多耳。又治一切癰癤熱毒腫，膿血未潰，疼痛不任。用乾末、麝香各半錢，同研細，抄一豆大，津唾貼瘡心，醋麵錢子貼定，膿潰出，去藥。

人溺　療寒熱頭疼，温氣。童男者尤良。

陶隱居云：若人初得頭痛，直飲⓬打内有瘀血。主癥積滿腹，諸藥不差者。服之皆下血片塊，二十日即出也。亦主久嗽上氣失聲。尿坑中竹木，主小兒齒不生，正旦刮塗之生。

陳藏器云：尿，寒。主明目，益聲，潤肌膚，利大腸，推陳致新，去咳嗽肺痿，鬼氣瘂病。彌久停臭者佳。恐冷，當以熱物和温服。久臭溺，浸蜘蛛咬，於大瓮中坐浸；仍取烏鷄屎炒，浸

酒服。不爾，恐毒入内。

《日華子》云：小便，凉。止勞渴嗽，潤心肺，治血悶熱狂，撲損瘀血運絶及困乏，揩灑皮膚治皸裂，能潤澤人。蛇、犬等咬，以熱尿淋患處。難産及胞衣不下，即取一升，用薑、葱各一分，煎三兩沸，乘熱飲，便下。吐血、鼻洪，和生薑一分絞汁，并壯健丈夫小便一升，乘熱頓飲，差。

《楊氏産乳》：療傷胎血結心腹痛。取童子小便，日服二升，差。

《衍義》曰：人溺，須童男者。産後温一杯飲，壓下敗血惡物。有飲過七日者；過多，恐久遠血臟寒，令人發滯病，人亦不覺。氣血虚無熱者，尤不宜多服。此亦性寒，故治虚勞方中同。

婦人月水　解毒箭并女勞復。新補，見陶隱居。

陳藏器云：經衣，主金瘡血涌出，取衣熱炙熨之。又燒末傅虎、狼傷瘡，燒末酒服方寸匕，日三。主箭鏃入腹。

《梅師方》：治丈夫熱病差後，交接復發，忽卵縮入腸，腸中絞痛欲死。燒女人月經赤衣爲灰，熟水調方寸匕服。

孫真人方：治霍亂困篤，取童女月經衣和血燒灰，和酒服方寸匕。

扁鵲云：治陰陽易傷寒。燒婦人月經衣，熟水服方寸匕。

天靈蓋　味鹹，平，無毒。主傳尸，尸疰，鬼氣伏連，久瘴勞瘧，寒熱無時者。此死人頂骨十字解者，燒令黑，細研，白飲和服，亦合諸藥爲散用之。

陳藏器云：彌腐爛者入用。有一片如三指闊，此骨是天生天賜，蓋謂一身之骨，未合即未有，只有囟門。取得後，用塘灰火罨一夜。待腥穢氣出盡，却用童兒溺，於瓮鍋子中煮一伏時滿，漉出。於屋中掘一坑，可深一尺，置天靈蓋於中一伏時，其藥魂歸神妙。陽人使陰，陰人使陽。

《外臺秘要》：治犬咬，衆治不差，毒攻人煩亂，喚已作犬聲者。燒灰爲末，以水服方寸匕，以活。

《别説》云：謹按天靈蓋，《神農本經》人部惟髮髮一物外，餘皆出後世醫家，或禁術之流，奇怪之論，殊非仁人之用心。世稱孫思邈有大功於世，以殺命治命，尚有陰責，況於是也。近數見醫家用以治傳尸病，未有一效者。言⑬《本經》不用，未爲害也。殘忍傷神，又不急於取效，苟有可易，仁者宜盡心焉。苟不以是説爲然，決爲庸人之所惑亂。設云非此不可，是不得已，則宜以年深塵泥所漬朽者爲良。

人髭　唐·李勣嘗疾。醫診之云：得鬚灰服之，方止。太宗遂自剪髭，燒灰賜服之，復令傅癰瘡，立愈。故白樂天云：剪鬚燒藥賜功臣。仁宗皇帝賜吕夷簡。古人有語，髭可治疾，今朕剪髭與之合藥，表朕意。

人血　主羸病人皮肉乾枯，身上麩片起。又狂犬咬，寒熱欲發者，并刺熱血飲之。

人肉　治瘵疾。

人膽　主鬼氣，尸疰，伏連。

---

❶此：晦明軒本作『此』。
❷須：晦明軒本『須』下有『臾』字。
❸如乳：此二字原誤倒，據晦明軒本乙正。
❹乳：原作『汁』，據晦明軒本改。
❺蛇：原作『此』，據晦明軒本改。
❻蛇：晦明軒本『蛇』下有『者』字。
❼可：晦明軒本作『愈』。
❽鶴：晦明軒本作『里』。
❾色：晦明軒本作『晚』。
❿療：原作『食』，據晦明軒本改。
⓫侯：晦明軒本作『俟』。
⓬飲：原作『欲』，據晦明軒本改。
⓭言：晦明軒本作『信』。

圖經衍義本草卷之二十七

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

獸部上品

龍骨



龍骨　味甘，平、微寒，無毒。主心腹鬼疰，精物老魅，咳逆，泄痢膿血，女子漏下，癥瘕堅結，小兒熱氣驚癇，療心腹煩滿，四肢痿枯，汗出，夜卧自驚，恚怒，伏氣在心下，不得喘息，腸癰內疽陰蝕，止汗，縮小便，溺血，養精神，定魂魄，安五臟。白龍骨，療夢寐泄精，小便泄精。禹錫等按：泄精通用藥云：白龍骨，平，微寒。齒，主小兒、大人驚癇，癲疾狂走，心下結氣，不能喘息，諸痙，殺精物，小兒五驚、十二癇，身熱不可近，大人骨間寒熱。又殺蠱毒。得人參、牛黃良，畏石膏。禹錫等謹按：驚邪通用切瘥子用切，身熱如火，腹中堅及熱泄。久服輕身，通神明，延年。生晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死龍處。採無時。畏乾漆、蜀椒、理石。

《圖經》曰：龍骨并齒、角，出晉地河東州郡多有之。或云是龍蛻，實非死骨，得脊腦，作白地錦文，舐之著舌者良。齒小強，猶有齒形。角強而實。採無時。李肇《國史補》云：春水時至，魚登龍門，蛻其骨甚多，人採以爲藥，而有五色者。《本經》云：出晉地。龍門又是晉地，豈今所謂龍骨者，乃此魚之骨乎？或云骨有雄雌，細文而廣者是雌，粗文而狹者是雄。凡入藥，五色具者尤佳，黃白色者次，黑色者下。皆不得經落不淨處，則不堪用。骨、齒

醫家常用，角亦稀使。石❶晉時鎮州接邢臺界，嘗❷鬥殺一龍，鄉豪有曹寬者見之，取其雙角，角前有一物如藍色，文如亂錦，人莫之識。曹寬未經年爲寇所殺，鎮帥俄亦被誅。又云：海上人言龍每生二卵，一爲吉吊。吉吊多與鹿游，或於水邊遺瀝，值流槎則粘著木枝，如蒲槌狀，其色微青黃，復似灰色，號紫稍花，坐湯多用之延齡。

《藥性論》云：龍骨，君，忌魚，有小毒。逐邪氣，安心神，止冷痢及下膿血，女子崩中，帶下，止夢中精，夜夢鬼交，治尿血，虛而多夢紛紜，加而用之。

陶隱居云：今多出梁、益間，巴中亦有。骨欲得脊腦，作白地錦文，舐之著舌者良。齒小强，猶有齒形。角强而實。又有龍腦，肥軟，亦斷痢。云皆是龍蛻，非實死也。此❸來巴中，數得龍胞，吾自親見，形體具存，云療産後餘疾，正當未服。

《唐本》注云：龍骨，今并出晉地，生硬者不好，五色具者良。其青、黃、赤、白、黑，亦應隨色與腑臟相會，如五芝、五石英、五石脂等輩。而《本經》不論，莫知所以。

《日華子》云：龍骨，止瀉痢，渴疾，懷孕漏胎，腸風下血，崩中帶下，鼻洪，吐血，止汗。又云：海上人言龍每生二卵，一爲吉吊。吉吊多云：龍齒，澀，涼。治煩悶，癲癎，熱狂，辟鬼魅。

《外臺秘要》：療傷寒已八九日至十餘日，大煩渴，熱盛而三焦有瘡蠆者，多下，或張口吐舌呵吁，目爛，口鼻鼻中，立止。

《姚氏方》：治小便出血。末龍骨二方寸匕，水調温服之，日二服，差。

《姚和衆方》：治小兒因痢脱肛。白龍骨粉，撲之。

《楊文公談苑》：澤州山中多龍骨。蓋龍蛻於土中，崖崩多得之，體骨、頭角皆全。

《衍義》曰：龍骨，諸家之説，紛然不一，既不能指定，終是臆度。西京潁陽縣民家，忽崖壞，得龍骨一副，支體頭角悉具，不知其蛻也？其斃也？若謂蛻斃，則是有形之物，而又生不可得見，死方可見；謂其化也，則其形獨不能化。然《西域記》中所説甚詳，但未

敢據憑。萬物所稟各異，造化不可盡知，莫可得而詳矣。孔子曰：君子有所不知，蓋闕如也。妄亂穿鑿，恐誤後學。治精滑及大腸滑，不可闕也。



麝香

麝香　味辛，温，無毒。主辟惡氣，殺鬼精物，温瘧蠱毒，癇痙，去三蟲，療諸凶邪鬼氣，中惡，心腹暴痛，脹急痞滿，風毒，婦人産難，墮胎，去面皯（音孕）、目中膚翳。久服除邪，不夢寤魘寐，通神仙。生中臺川谷及益州、雍州山中。春分取之，生者益良。

《圖經》曰：麝香，出中臺山谷及益州、雍州山中，今陝西、益、利、河東諸路山中皆有之，而秦州、文州諸蠻中尤多。形似獐而小，其香正在陰前皮内，别有膜裹之。春分取之，生者益良。此物極難得真。蠻人採得，以一子香，刮取皮膜，雜肉餘物，裹以四足膝皮，共作五子。而土人買得，又復分揉一爲二三，其僞可知。惟生得之，乃當全真耳。蘄、光山中，或時亦有，然其香絶小，一子纔若彈丸，往往是真香，蓋彼人不甚能作僞耳。

《藥性論》云：麝香，臣，禁食大蒜，味苦、辛。除百邪魅鬼，疰心痛，小兒驚癇客忤，鎮心安神，以當門子一粒，丹砂相似，細研，熟水灌下。止小便利，能蝕一切癰瘡膿。入十香丸，令人百毛九竅皆香。

陶隱居云：麝形似獐，常食柏葉，又啖蛇，五月得香，往往有蛇皮骨，故麝香療蛇毒。今以蛇蛻皮裹麝香彌子臍閉滿，其麝自於石上，用蹄尖彈香，則是相使也。其香正在麝陰莖前皮内，别有膜裹之。今出隨郡、義陽、晉熙諸蠻中者亞之。出益州者形扁，仍以皮膜裹之。一子真香，分揉作三四子，刮取血膜，雜以餘物，大都亦有精粗，破看一片，毛共在裏中者爲勝，因兹狂定❺，雜諸群中，遂亂投彼人以爲誌。若於諸羌夷中得者多真好，燒當門沸良久即好。今惟得活者，自看取之，必當全真爾。生香，人云是精溺凝作之，殊不爾。麝夏月食蛇、蟲多，至寒香滿，入春患急痛，自以脚剔出之，著屎溺中覆之，皆有常處。人有遇得，乃至一斗五升也。用此香乃勝殺取者。帶麝非但香，亦辟惡。以真者一子，置頸間枕❹之，辟惡夢及尸疰鬼氣。

《日華子》云：辟邪氣，殺鬼毒，蠱氣，癘疾，催生墮胎，殺臟腑蟲，制蛇蠶咬、沙虱、溪瘴毒，吐風痰，内子宫，暖水臟，止冷帶疾。

雷公云：凡使，多有僞者，不如不用。其香有三等：一者名遺香，是麝子臍閉滿，其麝自於石上，用蹄尖彈香，價與明珠同也。二名膝香，收得此香，落處一里草木不生并焦黄。人若採得甚堪用。三名心結香，被大獸驚心破了，因兹狂定❺，雜諸群中，遂亂投水。被人收得，擘破見心，流在脾上，結作一大乾血塊，可隔山間❻早聞之

香，是香中之次也。凡使麝香，并用子日開之，不用苦細研篩用之也。

段成式《酉陽雜俎》云：水麝臍中，惟水瀝一滴於斗水中，用灑衣，衣至敗其香不歇。每取以針刺之，捻❼以真雄黄，則合香氣倍於肉麝。天寶初，虞人獲，詔養之。

《楊文公談苑》：公嘗言：商汝山多群麝，所遺糞常就一處，雖遠逐食，必還走之，不敢遺迹他所，慮爲人獲，人反以是求得，必絶❽群而取之。麝絶愛其臍，每爲人所逐，勢急即投巖，舉爪剔裂其香，就縶而死，猶拱四足保其臍。李商隱詩：投巖麝退香。許渾云：尋麝採生香。

《廣利方》：治中惡客忤垂❾死。麝香一錢，重研，和醋二合服之，即差。

又方：治小兒驚啼，發欬不定。用真好麝香研細。每服清水調下一字，日三服。量兒大小服。

《楊氏産乳方》：療中水氣，已服藥未平。除麝香如大豆三枚，細研，奶汁調，分爲四五服。

《衍義》曰：麝每糞時，須聚糞，及有遺麝氣，遂爲人獲，亦物之一病爾。此獵人云。餘如《經》。

牛黄





牛黄　味苦，平，有小毒。主驚癎寒熱，熱盛狂痓，除邪逐鬼，療小兒百病，諸癎熱，口不開，大人狂癲，及墮胎。久服輕身增年，令人不忘。生晉地平澤，於牛得之，即陰乾百日，使時燥，無令見日月光。人參爲之使，得牡蠣良。惡龍骨、地黄、龍膽、菖蒲利耳目，畏牛膝。

《圖經》曰：牛黄，出晉地平澤，今出登、萊州，他處或有，不甚佳。凡牛有黄者，毛皮光澤，眼如血色，時復鳴吼。又好照水，人以盆水承之，伺其吐出，乃喝迫，即墮落水中，既得之，陰乾百日。一子如鷄子黄大，其重叠可揭，輕虚而氛香者佳。然此物多僞，今人試之，皆揩摩手甲上，以透甲黄者爲真。又云：此有四種：喝迫而得者名生黄；其殺死而在角中得者，名角中黄；心中剥得者，名心黄，初在心中如漿汁，取得便投水中，沾水乃硬，如碎蒺藜或皂莢子是也；肝膽中得之者，名肝黄，大抵皆不及喝迫得者最勝。凡牛之入藥者，水牛、犉牛、黄牛取乳及造酥、酪、醍醐等，然性亦不同，水牛乳凉，犉牛乳温，其肉皆寒也。其自死者皆不可食。其酥以合諸膏，摩風腫，腕跌血瘀，則牛酥爲强，醍醐尤佳。又有底野迦，是西戎人用諸膽和合作之，狀似久壞丸藥，赤黑色，今南海或有之。又中品有牛角鰓，用水牛、黄牛久在糞土中爛白者，主赤白下，燒灰末服之。

陶隱居云：舊云神山出入鳴吼者有之，伺其出角上，以盆水承而吐之，即墮落水中。今人多皆就膽中得之。

多出梁、益。一子如鷄子黃大，相重疊。藥中之貴，莫復過此。

《唐本》注云：牛黃，今出萊州、密州、淄州、青州、嵩州、戎州。牛有黃者，必多吼喝，迫而得之，謂之生黃，最佳。黃有三種：散黃粒如麻豆；慢黃若鷄卵中黃糊，在肝膽；圓黃爲塊，形有大小，并在肝膽中。多生於犉特牛，其吴牛未聞有黃也。

禹錫云：按《藥性論》云：牛黃，君，惡常山，畏乾漆，味甘。能辟邪魅，安魂定魄，小兒夜啼，主卒中惡。

《日華子》云：牛黃，涼。療中風失音，口噤，婦人血噤，驚悸，天行時疾，健忘，虚乏。

雷公云：凡使，有四件：第一是生神黃，賺得者；次有角黃，是取之者；又有小⑩黃，是病死後，識者剥之，擘破其心，其黃在心中，如濃黃醬汁，採得便投於水中，黃沾水復硬，如碎蒺藜子，許如豆者，硬如帝珠子；又有肝黃，其牛⑪身上光，眼如血色，多玩弄好照水，自有夜光，恐懼人，或有人别採之，可有神妙之事。凡用，須先單搗，細研如塵，却絹裹，又有黃嫩牛皮裹，安於井面上，去水三四尺已來一宿，至明方取用之。

吴氏云：牛黃，無毒。牛出入呻者有之，夜光走角中，牛死入膽中，如鷄子黃。

《聖惠方》：初生兒至十⑫日口噤。以牛黃少許細研，淡竹瀝調下一字，灌之。更以猪乳點口中，差。又方：治小兒腹痛夜啼。用牛黃如小豆大，乳汁化服。又臍下書一田字，差。

《廣利方》：治孩子驚癇不知，迷悶，嚼舌，仰目。牛黃一大豆研，和蜜水服之。

姚和衆：治小孩初生三日，去驚邪，辟惡氣。牛黃一大豆許，細研，以赤蜜酸棗許熟研，以綿蘸之，令兒吮之，一日令盡。

《衍義》曰：牛黃，亦有駱駝黃，皆西戎所出也。駱駝黃極易得，醫家當審别考而用之，爲其形相亂也。黃牛黃輕鬆，自然微香，以此爲異。蓋又有牦牛黃，堅而不香。

熊脂



味甘，微寒、微温，無毒。主風痹不仁筋急，五臟腹中積聚，寒熱羸瘦，頭瘡白禿，面皯疱，食飲吐嘔。久服强志，不饑，輕身，長年。生雍州山谷。十一月取。

《圖經》曰：熊脂并膽，出雍州山谷，今雍、洛、河東及懷、衛山中皆有之。熊形類犬豕，而性輕健，好攀緣，上高木，見人則顛倒自投地而下。冬多入穴而藏蟄，始春而出。脂謂之熊白，十一月取之，須其背上者。寒月則有，夏月則無。其腹中肪及他處脂，煎煉亦可作藥而不中啖。膽，陰乾用。然亦多僞，欲試之，取粟顆許，滴水中，一道若綫不散者爲真。其足蹯，爲食珍之貴，古人最重之，然膸之難熟，多

食之令人耐寒。腦髓作油摩頭，可去白屑。有痼疾者不可食熊，令人終身不愈。熊惡鹽，食之則死。

陶隱居云：此脂即是熊白，是背上膏，寒月則有，夏月則無。其腹中肪及身中膏，煎取可作藥，而不中啖。今東西諸山縣皆有之，自是非易得物爾。痼疾不可食熊肉，令終身不除愈。

《唐本》注云：熊膽，味苦，寒，無毒。療時氣熱盛變爲黄疸，暑月久痢，疳䘌，心痛，疰忤。腦，療諸聾。血，療小兒客忤。脂，長髮令黑，悦澤人面；酒煉服之，差風痹。凡言膏者，皆脂消已後之名，背上不得言膏。《左傳義》云：膏肓者，乃是鬲肓，文誤有此名。陶言背膏，同於舊説也。

禹錫云：按《藥性論》云：熊膽，臣，惡防己、地黄。主[15]小兒五疳，殺蟲，治惡瘡[14]。又云：熊脂，君。能治面上䵟䵳及治瘡。

《日華子》云：熊白，凉。治五腫風[15]，補虚損，殺勞蟲。脂，强心。腦髓，去白禿風屑，療頭旋并髮落。掌，食可御風寒，此是八珍之數。膽，治疳瘡，耳鼻瘡及諸疳疾。

雷公云：凡收得，煉過，就器中安生椒，每一斤熊脂入生椒十四個，煉了，去脂革并椒，入瓶中[16]。

《食療》云：熊脂，微寒，甘滑。冬中凝白時取之，作生，無以偕也。脂入拔白髮膏中用，極良。脂與猪脂相和燃燈，烟入人目中，令失光明。緣熊脂烟損人眼光。肉，平，味甘，無毒。主風痹筋骨不仁。若腹中有積聚寒熱者，食熊肉永不除差。其骨煮湯浴之，主歷節風，亦主小兒客忤。膽，寒，主時氣盛熱，疳䘌，小兒驚癇。十月勿食，傷神。小兒驚癇瘈瘲，熊膽兩大豆許，和乳汁及竹瀝服并得，去心中涎，良。

《聖惠方》：治小兒疳瘡，蟲蝕鼻。用熊膽半分，湯化調塗於鼻中。熊掌得酒、醋、水三件煮，熟即嗔大如皮球，食之耐風寒。

《外臺秘要》：療蜎心痛。熊膽如大豆，和水服，大效。又方：五十年痔[17]不差。塗熊膽取差，神效。

《千金翼》：療髮黄。熊脂塗髮，梳之散頭，入床底，伏地一食頃，即出，便盡黑，不過一升脂驗。

《食醫心鏡》：療脚氣，風痹不仁，五緩，筋急。熊肉半斤，於豉汁中和薑、椒、葱白、鹽、醬作腌臘。空腹食之。又方：主中風，心肺風熱，手足不隨及風痹不任，筋脉五緩，恍惚煩躁。熊肉一斤，切，如常法調和作腌腊[18]。空腹食之。

《斗門方》：治水弩射人。熊膽塗之。更以雄黄同用酒摩服之，即愈。

象牙



象牙　無毒。主諸鐵及雜物入

肉，刮取屑細研，和水傅瘡上，及雜物刺等立出。齒，主癇病，屑爲末，炙令黃，飲下。肉，味淡。不堪啖。多食令人體重。主禿瘡，作灰和油塗之。睛⑲，主目疾，和乳滴目中。胸前小橫骨，令人能浮水，作灰酒服之。身有百獸肉，皆自有分段，惟鼻是其本肉，餘并雜肉。

《圖經》曰：象牙，舊不著所出州郡，《爾雅》云：南方之美者，有梁山之犀、象焉。今多出交趾，潮、循州亦有之。彼人捕得，爭食其肉，云肥脆堪作炙。或云象有十二種肉，配十二辰屬，惟鼻是其肉。又膽不附肝，隨月在諸肉間。淳化中，上苑一馴象斃，太宗命取膽不獲，使問徐鉉，鉉曰：當在前左足，既而剖足果得。又問其故，鉉曰：象膽隨四時，今其斃在春，故知左足也。世傅荆蠻山中亦有野象。蓋《左氏傳》所謂楚師燧象以奔吳軍，是其事也。然楚、粵之象皆青，惟西竺、弗⑳林、大食諸國乃多白象。樊綽《雲南記》、平居誨《于闐行程記》皆言其事。象牙，主諸物刺人肉，刮取屑細研，和水傅瘡上，刺立出。咽中刺，則水調飲之。舊牙梳屑尤佳。齒及肉、目睛等，醫方亦或有用者。

禹錫云：按《日華子》云：象牙，平。治小便不通，生煎服之。小便多，燒灰飲下。膽，明目及治疳。

《太平廣記》：安南有象，能知人曲直。有鬥訟者，行立而嗅之，有理者則過，無理者，以鼻卷之，擲空數丈，以牙接而刺之，以水洗牙，飲之愈疾。象膽隨四時在四腿，春在前左，夏在前右，如龜定體，鼻端有爪可拈針，肉有十二般，惟鼻是本肉。胸前小骨，灰之酒服，可令人能浮水出沒。食其肉，令人體重。古訓云：象孕五歲始産。

《肘後方》：治箭并針㉑折在肉中。細刮象牙屑，以水和傅上，即出。

《簡要濟衆方》：主小兒誤爲諸骨及魚骨刺入肉不出。水煮白梅肉，爛㉒研後，調象牙末，厚傅有刺處，自軟。

《海藥》：謹按《內典》云：象出西國，有二牙、四牙者，味寒。主風癇熱，骨蒸勞，諸瘡等，并皆宜生屑入藥，琥珀、竹膏、真珠、犀角、牛黃等良。西域重之，用飾床座。中國貴之，以爲笏。崑崙諸國有象，生於山谷，每遇解牙，人不可取，崑崙以白木爲牙易之。《酉陽雜俎》云：生文理必國富。又云：龍與象，六十歲骨方足。

《衍義》曰：象牙，取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者，非口內食齒。齒別入藥。令爲象笏者，是牙也。

白膠　味甘，平、温，無毒。主傷中勞絶，腰痛羸瘦，補中益氣，婦人血閉無子，止痛安胎，療吐血下血，崩中不止，四肢酸疼，多汗淋露，折跌傷損。折言舌，跌音迭。久服輕身延年。一名鹿角膠。生雲中。煮鹿角作之。得火良，畏大黃。

《圖經》曰：文具阿膠條下。

禹錫云：按《藥性論》云：白膠，又名黃明膠，能主男子腎臟氣衰虛勞損。婦人服之令有子，能安胎，去冷，治漏下赤白，主吐血。

《食療》云：傅腫四邊，中心留一孔子，其腫即頭自開也。治咳嗽不差者，黄明膠炙令半焦爲末，每服一錢匕，人參末二錢匕，用薄豉湯一盞八分，葱少許，入銚子煎一兩沸後，傾入盞，遇咳嗽時呷三五口後，依前温暖，却准前咳嗽時吃之也。

《外臺秘要》：療虚勞尿血㉓。乾膠三兩炙，搗末。酒二升和，温服。又方：治凡腫已潰、未潰者。以膠一片，水漬令軟納納然，腫毒大小，貼當頭上開孔，若已潰還合者，膿當披膠，急撮之，膿皆出盡。未有膿者，腫當自消矣。又方：補虚勞，益髓長肌，悦顔色，令人肥健。鹿角膠炙，搗爲末。酒服方寸匕，日三服。

《千金方》：治耳中有物不可出。以麻繩剪令頭散，傅好膠，著耳中物上，粘之令相著，徐徐引出。

《肘後方》：治妊娠卒下血。以酒煮膠二兩，消盡頓服。

《斗門方》：治肺破出血，忽嗽血不止者。用海犀膏一大片，於火上炙，令焦黄色後，以膠㉔塗之。又炙膠塗，令通透可碾爲末，用湯化三大錢匕，放冷服之，即血止。水膠是也，大驗。

《譚氏小兒方》：治小兒面上瘡。豆子瘢法：黄明膠慢火炙爲末，温酒調服一錢匕。出者服之無瘢，未出服之瀉下。又治小兒火燒瘡滅瘢痕，黄明膠小鷄翎掃之。

阿膠　味甘，平、微温，無毒。主心腹内崩，勞極洒洒音蘚如瘧狀，腰腹痛，四肢酸痛，女子下血，安胎，丈夫小腹痛，虚勞羸瘦，陰氣不足，脚酸不能久立，養肝氣。久服輕身益氣。一名㉕傅致膠。生東平郡，煮牛皮作之。出東阿。畏㉖大黄，得火良。

《圖經》曰：阿膠，出東平郡，煮牛皮作之。出東阿，故名阿膠。今鄆州皆能作之，以阿縣城北井水作煮爲真。造之，用阿井水煎烏驢皮，如常煎膠法。井官禁，真膠亦㉗難得，都下貨者甚多，恐非真。尋方書所説：所以勝諸膠者，大抵以驢皮得阿井水乃佳耳。





陶隱居云：出東阿，故曰阿膠也㉙。今東都下亦能作之，用皮亦有老少，膠則有清濁。凡三種：清薄者畫用；厚而清者名爲盆覆膠，作藥用之，皆火炙，丸散須極燥，入湯微炙爾；濁黑者可膠物，不入藥用，用一片鹿角即成膠，不爾不成也。

陳藏器云：阿井水煎成膠，人間用者多非真也。凡膠，俱療風止泄補虛，驢皮膠主風爲最。

禹錫云：按《藥性論》云：阿膠，君。主堅筋骨，益氣止痢。署預爲之使。

雷公云：凡使，先於猪脂㉚内浸一宿，至明出，於柳木火上炙，待炮子㉛，細碾用。

《聖惠方》：治妊娠尿血。用阿膠炒令黄燥爲散，每食前以粥飲調下二錢匕。

《梅師方》：治妊娠無故卒下血不止。取阿膠三兩炙搗末，酒一升半，煎令消，一服愈。又一方：以阿膠二兩搗末，生地黄半斤搗取汁，以清酒三升，絞汁，分三服。

《楊氏産乳》：療妊娠血痢。阿膠二兩，以酒一升半，煮取一升，頓服。

酥音蘇　微寒。補五臟，利大腸，主口瘡。

陶隱居云：文具牛黄條下。

《圖經》：酥出外國，亦從益州來。本是牛、羊乳所爲，作之自有法。佛經稱乳成酪，酪成酥，酥成醍醐。醍醐色黄白，作餅，甚甘肥。亦時至江南。

《唐本》注云：酥，掏㉜吐刀切酪作之，其性猶與酪異，聖通言功，是陶之未達。然酥有牛酥、羊酥，而牛酥勝羊酥。其牦牛復優於家牛也。

《食療》云：酥，堪合諸膏摩風腫，主消渴，治消渴。補肺腎氣，和小腸，亦故北人皆多肥健。

禹錫云：按《藥性論》云：羊乳，臣，味甘，無毒。主㉞心肺，治消渴。

《食療》云：補肺腎氣，和小腸，亦主消渴，治虚勞，益精氣，合用㉟作羹食，補腎虚，亦主女子與男子中風。蚰蜒入耳，以羊乳灌耳中即成水。又主小兒口中爛瘡，取牯羊生乳，含五六日差。

《經驗方》：治蜘蛛咬，一身生絲。羊乳一件飲之。

牛乳　微寒。補虚羸，止渴。

《唐本》注云：水牛乳，造石蜜須

之，言作酪濃厚，味勝犗牛。性平。生飲令人痢，熟飲令人口乾，似温也。

陳藏器云：黄牛乳，生服利人，下熱氣，冷補，潤膚，止渴。和酥煎三五沸食之，去冷氣痃癖，羸瘦。凡服乳，必煮一二沸，停冷啜之，熱食即壅。不欲頓服，欲得漸消。與酸物相反，令人腹中結癥。凡以乳及溺屎去病，黑牛勝黄牛。

《太平廣記》：貞觀中，太宗苦於氣痢，衆醫不效。詔問殿廷左右，有能治其疾者，當重賞之。有術士進以乳汁煎葦撥，服之立差。

酪　味甘、酸，寒，無毒。主止渴，解散發利，除胸中虚熱，身面上熱瘡，肌瘡。

《唐本》注云：按牛、羊、馬、水牛乳并爾言。驢乳尤冷，不堪作酪也。

《千金翼》：療丹癮疹方。酪和鹽熱煮以摩之，手下消。

《廣利方》：療蚰蜒入耳。以牛酪灌耳中，須臾蟲出。入腹中即飲酪二升，自消爲黄水。

醍醐　味甘，平，無毒。主風邪痹氣，通潤骨髓。可爲摩藥。性冷利，功優於酥。生酥中。

《唐本》注云：此酥之精液也。好酥一石，有三四升醍醐，熟拌煉貯器中待凝，穿中至底便津出得之。陶云黄白爲餅，此乃未達之言。唐本先附。

禹錫云：按：《蜀本》云：一説在酥中盛冬不凝，盛夏不融者是也。

《日華子》云：醍醐，止驚悸，心熱頭疼，明目，傅腦頂心。

《聖惠方》：治中風煩熱，皮膚瘙癢。用醍醐四兩，每服酒調下半匙。

《衍義》曰：醍醐，作酪時，上一重凝者爲酪麵；酪麵上，其色如油者爲醍醐。熬之即出，不可多得，極甘美，雖如此取之，用處亦少。惟潤養瘡痂最相宜。

馬乳　止渴利，止渴療熱。

《唐本》注云：馬乳作酪，彌應酷冷。

江南乏馬乳，今俱合是冷，委言之。驢乳療微熱黄，小兒中熱，驚熱，服之亦利。胡言馬酪性温，飲之消肉。當以物類，自相制伏，不拘冷熱也。

陳藏器云：味甘，治熱，性冷利。

孫真人云：合生魚食則作瘕。

乳腐　微寒。潤五臟，利大小便，益十二經脉。微動氣。細切如豆，麵拌，醋漿水煮二十餘沸，治赤白痢，小兒患，服之彌佳。

底野迦　味辛、苦，平，無毒。主百病中惡，客忤邪氣，心腹積聚。出西戎。

《唐本》注云：彼人云：用諸膽作之，狀似久壞丸藥，赤黑色。胡人時將至此，甚珍貴。試用有效。

烏氈　無毒。主火燒生瘡，令不著風水，止血，除賊風。燒爲灰，酒下

二錢匕，主産後血下不止，久卧吸人脂血，令人無顔色，上氣。

海獺　味鹹，無毒。主人食魚中毒，魚骨傷人，痛不可忍，及鯁不下者，取皮煮汁服之。海人亦食其肉，似獺，大如犬，脚下有皮，如人胼拇，毛著水不濡，海中魚獺、海牛、海馬、海驢等皮毛，在陸地皆候風潮，猶能毛起。《博物志》有此説也。

土撥鼠　味甘，平，無毒。主野鷄瘻瘡。肥美，煮食之宜人。生西蕃山澤。穴土爲窠，形如獺，夷人掘取食之。《魏略》曰：大秦國，出辟毒鼠。近似此也。

圖經衍義本草卷之二十七

---

❶石：晦明軒本『石』上有『北夢瑣言云』五字。
❷嘗：原作『常』，據晦明軒本改。
❸此：晦明軒本作『比』。
❹枕：原作『沉』，據晦明軒本改。
❸定：晦明軒本作『走』。
❻間：晦明軒本作『澗』。
❼捻：原作『稔』，據晦明軒本改。
❽絶：晦明軒本作『掩』。
❾垂：原作『睡』，據晦明軒本改。
❿小：晦明軒本作『心』。
⓫牛：原作『正』，據晦明軒本改。
⓬十：晦明軒本作『七』。
⓭主：原作『至』，據晦明軒本改。
⓮瘡：晦明軒本作『疥』。
⓯治五腫風：晦明軒本作『無毒治風』。
⓰中：晦明軒本『中』下有『收任用』三字。
⓱痔：原作『時』，據晦明軒本改。
⓲腊：原作『膳』，據晦明軒本改。
⓳晴：晦明軒本作『膽』。
⓴弗：原脱，據晦明軒本補。
㉑針：晦明軒本作『金』。
㉒爛：原作『亂』，據晦明軒本改。
㉓血：晦明軒本作『精』。
㉔膠：晦明軒本作『酥』。
㉕一名：原作『不得』，據晦明軒本改。
㉖畏：原作『黄』，據晦明軒本改。
㉗亦：晦明軒本作『極』。
㉘烊：原作『炷』，據晦明軒本改。
㉙也：原作『地』，據晦明軒本改。
㉚脂：原作『臘』，據晦明軒本改。
㉛炮子：晦明軒本作『泡了』。
㉜掏：原作『脂』，據晦明軒本改。
㉝豆：晦明軒本作『主』。
㉞主：晦明軒本作『潤』。
㉟用：晦明軒本作『脂』。
㉖制：原作『利』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之二十八

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

獸部中品

鹿





鹿茸　味甘、酸，温、微温，無毒。主漏下惡血，寒熱驚癇，益氣强志，主齒不老，療虚勞，洒洒如瘧，羸瘦，四肢酸疼，腰脊痛，小便利，泄精溺血，破留血在腹，散石淋癰腫，骨中熱疽。養骨，安胎下氣，殺鬼精物，不可近陰，令痿。久服耐老。四月、五月解角時取，陰乾。使時燥。麻勃爲之使。角，味鹹，無毒。主惡瘡癰腫，逐邪惡氣，留血在陰中，除小腹血急痛，腰脊痛，折傷惡血，益氣。七月採。杜仲爲之使。髓，味甘，温。主丈夫、女子傷中，絶脉，筋急痛，咳逆。以酒和服之，良。腎，平。主補腎氣。肉，温。補中，强五臟，益氣力。生者療口僻，割薄之。

《圖經》曰：鹿茸并角，《本經》不載所出州土，今有山林處皆有之。四月角欲生時取其茸，陰乾。以形如小紫茄子者爲上，或云：茄子茸太嫩，血氣猶未具，不若分歧如馬鞍形者有力。茸不可嗅，其氣能傷人鼻。七月採角。鹿年歲久者，其角堅好，煮以爲膠，入藥彌佳。今醫家多貴麋茸、麋角，力緊於鹿。《本經》自有麋脂角條在下品。

陶隱居云：野肉之中，獐鹿可食。生不膻腥。又非辰屬，八卦無主，而兼能温補，於人即生死無尤，故道家許聽爲脯，過其餘肉。雖牛、羊、鷄、犬補益，充肌膚，於亡魂皆爲愆責，并不足啖。

《唐本》注云：鹿茸，夏收，陰乾，百不收一，縱得一乾，臭不任用。破之火乾，大好。頭，主消渴。煎之可作膠，服之彌善。筋，主勞損續絶。骨，主虚勞。可爲酒，主風補虚。髓脂，主癰腫死肌，温中。

孟詵云：鹿茸，主益氣。不可以鼻嗅，其茸中有小白蟲，視之不見，入人鼻必爲蟲顙，藥不及也。角，錯爲屑，白蜜五升，淹之，微火熬令小變，暴乾❶，更搗篩服之，令人輕身益氣，强骨髓，補絶傷。又婦人夢與鬼交者，鹿角末三指一撮，和清酒服，即出鬼精。又，女子胞中餘血不盡欲死者，以清酒和鹿角灰，服方寸匕，日三夜一，甚效。鹿頭肉，主消渴，夜夢見物。又蹄肉，主脚膝疼痛。肉，主補中益氣。内又生肉，主中風，口偏不正，以生椒同搗傅之，專看正即速除之。九月以後，正月以前，堪食之也。

《日華子》云：鹿茸，補虚羸，壯筋骨，破瘀血，殺鬼精，安胎，下氣。酥炙，療患瘡癰腫熱毒等，醋摩

傅。脫精尿血，夜夢鬼交，并治之，水摩服。小兒重舌，鵝口瘡，炙熨之。髓，治筋骨弱，嘔吐。地黃汁煎作膏，填骨髓。蜜煮，壯陽，令有子。腎，補中，安五臟，壯陽氣。作酒及煮粥服。肉，無毒。補益氣，助五臟。風，左患右貼，右患左貼。生肉貼偏憊，多夢。蹄治脚膝痠。又血治肺痿吐血及崩中，帶下。和酒服之，良。

禹錫云：按《藥性論》云：鹿茸，君，味苦、辛。主補男子腰腎虛冷，脚膝無力，夜夢鬼交，精溢自出，女人崩中，漏血。炙末，空心温酒服方寸匕。又主赤白帶下，入散用。鹿骨，味甘，微熱，無毒。鹿角，温、微温。無毒。

雷公云：凡使，先以天靈蓋作末，然後鋸解鹿茸作片子，以好羊脂，拌天靈蓋末，塗之於鹿茸上，慢火炙之，令内外黄脆了，用鹿皮一片裹之，安室上一宿，其藥魂歸也。至明則以慢火焙之，令脆，方搗作末用之。每五兩鹿茸，用羊脂三兩，炙盡爲度。又❷制法：用黄精自然汁浸兩日夜了，漉出焙令乾，細搗用，免渴人也。鹿角，補陽勝如麋角。其角要黄色、緊重、尖好者。緣此鹿食靈草，所以異其衆鹿。其麋角頂根上有黄色毛若金綫，兼傍生小尖，色蒼白者上。注《乾寧記》云：鹿與遊龍相戲，生此異角。

《聖惠方》：治腎氣虛損，耳聾。用鹿腎一對，去脂膜，切，於豉汁中，入粳米二合和煮粥，入五味如法調和。空腹食之，作羹及酒并得。

《外臺秘要》：治消腎，小便數。鹿角一具，炙令隻焦，搗篩。酒服方寸匕，漸漸加至一匕半。

《百一方》：若男女喜夢與鬼交通，致恍惚者方。截鹿角屑三指撮，日二服，酒下。《食療》同。

《梅師方》：治卒腰痛，暫轉不得

此。雖草木至易生，亦無能及之，豈可與凡骨血爲比。麋茸利補陽，鹿茸利補陰。凡用茸，無須太嫩，惟長四五寸，茸端如馬瑙紅者佳。須佐他藥有功。

白馬莖　味鹹、甘，平，無毒。主傷中，脉絶陰不起，强志益氣，長肌肉肥健，生子，小兒驚癇。陰乾百日。當殺用之。眼，主驚癇，腹滿，瘧疾。懸蹄，主驚邪，癒瘕，乳難，辟惡氣，鬼毒，蠱疰，不祥，止衄血，内漏，齲齒。生雲中平澤。白馬蹄，療婦人瘦下白崩。赤馬蹄，療婦人赤崩。齒，主小兒驚癇。髻頭膏，主生髮。髻毛，主女子崩中赤白。心，主喜忘。肺，主寒熱，小兒莖痿。禹錫等今詳莖痿，非小兒之疾，二字必誤。肉，味辛、苦，冷。主熱下氣。長筋强腰脊，壯健，强志，輕身，不饑。脯，療寒熱痿痹。屎，名馬通，微温。主婦人崩中，止渴及吐、下血，鼻衄，金創止血。頭骨，主喜眠，令人不睡。溺，味辛，微寒。主消渴，破癥堅積聚，男子伏梁積疝，婦人瘕疾，銅器承飲之。

《圖經》曰：文具羖羊角條下。

陳藏器云：馬肉及血，有小毒。食之當飲美酒即解，婦人懷妊不得食馬，驢騾爲其十二月胎。騾又不産。馬頭骨於水上流浸之，則無水蜞，又埋死。取白馬糞五升，絞取汁，好器中安午地，令宜蠶。凡收白馬莖，當以遊牝時，力勢正强者，生取得爲良。馬牙燒作灰，唾和，緋帛貼於腫上根出。屎堪煮，餘食難消。不可多食，食後以酒投之。皆須好清水搦洗三五遍，即可煮食之。懷娠人及患痢人并不可食。忌蒼耳、生薑。又鬆燒灰，止血并傅惡瘡。頭骨，治多睡，作枕枕之。燒灰傅頭、耳瘡佳。尿，洗頭瘡白禿。按《蜀本》注云：諸筋肉，非十二月採者，并與倉米同食，必卒得惡，十有九死。與薑同食，生氣嗽。其肉多著浸洗，方煮得爛熟，兼去血盡，始可煮炙，肥者亦然，不爾，毒不出。患丁腫，中風疼痛者，炒驢馬糞，熨瘡滿五十遍，極效。男子患，未可及，新差後，合陰陽，垂至死。取白馬糞五升，絞取汁，好器中盛，停一宿。一服三合，日夜二服。按《日華子》云：馬齒水磨治驚癇。肉只

痛癢生瞤。爛研馬糞并齒傅上，不過三兩遍，良。武相在蜀，自腥有瘡，癢不可忍，得此方便差。

劉涓子：治被打，腹中瘀血。白馬蹄燒烟盡，取灰末，酒服方寸匕，日三夜一。亦治婦人血病。

牛角鰓　下閉血，瘀血疼痛，女人帶下血。燔之。味苦，無毒。水牛角，療時氣，寒熱頭痛。髓，補中，填骨髓，久服增年。髓味甘，温，無毒。主安五臟，平三焦，温骨髓，補中，續絶傷益氣，止泄痢，消渴。以酒服之。膽，可丸藥。膽味苦，大寒。除心腹熱渴，利口焦燥，益目精。心，主虚忘。肝，主明目。腎，主補腎氣，益精。齒，主小兒牛癎。肉，味甘，平，無毒。主消渴，止吐泄，安中益氣，養脾胃，自死者不良。屎，寒。主水腫，惡氣。用塗門户，著壁者。燔之，主鼠瘻，惡瘡。黄犍牛、烏牯牛溺，主水腫，腹脹脚滿，利小便。

《圖經》曰：文具前卷牛黄條下。

《藥性論》云：黄牛角鰓灰，臣，味苦、甘，無毒，性澀。能止婦人血崩不止，赤白帶下，止冷痢瀉血。水牛角，平。青牛膽，苦，無毒。主消渴，利大小腸。臘月牯牛膽，中盛黑豆一百粒，後一百日開取，食後、夜間吞二七枚，鎮肝明目。黑豆盛浸不計多少。

陶隱居云：此牛亦犗牛爲勝，青牛最良，水牛爲可充食爾。自死謂疫死，肉多毒。青牛腸不可共犬肉、犬血食之，令人成病也。

《日華子》云：水牛肉，冷，微毒。角，煎治熱毒風并壯熱。角鰓，燒焦治腸風瀉血痢，崩中帶下，水瀉。涎，止反胃嘔吐。治噎，要取即以水洗口後，鹽塗之，則便吐出。黄牛肉，温，微毒。益腰脚。大都食之發藥毒動病，不如水牛也。惟酥乳佳。骨髓，温，無毒。治吐血，鼻洪，崩中帶下，腸風瀉血并水瀉。燒灰用。

孟詵云：黑牛髓和地黄汁、白蜜等分作煎服，治瘦病。烏牛糞爲上。又小兒夜啼，取乾牛糞如手大，安卧席下，勿令母知，子、母俱吉。

《食療》云：肚，主消渴，風眩，補五臟，醋煮食之。肝，治痢。腎，主補腎。髓，安五臟，平三焦，温中，久服增年，以酒送之，和地黄汁、白蜜作煎，服之治瘦病。

孫真人云：主癰發數處。取牛糞燒作灰，以鷄子白和傅之，乾即易。

《外臺秘要》：大病後不足，病虚勞，補虚。取七歲已下，五歲已上黄牛乳一升，水四升，煎取一升，如人饑，稍稍飲，不得多，十日服不住，佳。

《肘後方》：風毒脚氣，若脛已滿，捻之没指。但勤飲烏牸牛溺二三升，使小便利，漸漸消，當以銅器取新者爲佳。純黄者亦可用。又方：治患癰腫未成膿。取牛耳中垢封之，愈。

《經驗方》：痔漏張用方❻。犍牛兒膽、猬膽各一個，用腻粉五十文，麝香二十文，將猬膽汁、腻粉、麝香和匀，帶下下血。燒以爲灰，暖酒服之。

入牛膽内，懸於檐前四十九日，熟。旋取爲丸如大麥，用急脚❼送入瘡内後，追出惡物是驗，瘡口漸合，生麵蓋瘡内一遍，出惡物。

《子母秘録》：治血氣逆，心煩悶滿，心痛。燒水牛角末，酒服方寸匕。

《産書》：主難産。牛糞中大豆一枚，擘作兩片，一片書子，却合，以少水吞之，立産。

《衍義》曰：牛角鰓，此則黄牛角鰓。用尖燒爲黑灰，微存性，治婦人血崩，大便血及冷痢。又白水牛鼻，乾、濕皆可用，治偏風口喎斜，以火炙熱，於不患處一邊熨之，漸正。

羖羊



羖羊角

味鹹、苦，温、微寒，無毒。主青盲，明目，殺疥蟲，止寒泄，辟惡鬼、虎狼，止驚悸，療百節中結氣，風頭痛及蠱毒，吐血，婦人産後餘痛。燒之殺鬼魅，辟虎狼。久服安心益氣輕身。生河西川谷。取無時，勿使中濕，濕即有毒。菟絲爲之使。羊髓，味甘，温，無毒。主男女傷中，陰氣不足，利血脉，益經氣。以酒服之。青羊膽，主青盲，明目。羊肺，補肺，主咳嗽。羊心，主憂恚，膈氣。羊腎，補腎氣，益精髓。羊齒，主小兒羊癇寒熱。三月三日取之。羊肉，味甘，大熱，無毒。主緩中，字乳餘疾，及頭腦大風汗出，虚勞寒冷，補中益氣，安心止驚。羊骨，熱。主虚勞，寒中，羸瘦。羊屎，燔之，主小兒泄痢，腸鳴，驚癇。

《圖經》曰：羖羊角，出河西川谷，今河東、陝西及近都州郡皆有之。此謂青羝羊也。餘羊則不堪，取無時。羊齒、骨及五臟皆温、平而主疾，惟肉性大熱，時疾初愈，百日内不可食，食之當復發及令人骨蒸也。羊屎，方書多用。近人取以内鯽魚腹中，瓦缶固濟燒灰，以塗髭髮，令易生而黑，甚效。乳，療蜘蛛咬，遍身生絲者，生飲之即愈。前條有白馬陰莖、眼、蹄、白馬懸蹄、赤馬蹄、齒、鬐鬣、毛、心、肺、肉脯、頭骨、屎、溺及牡狗陰莖、膽、心、腦、齒、四蹄、白狗血、肉、屎中骨，《本經》并有主治。惟白馬莖、眼、懸蹄用出雲中平澤者，餘無所出州土。今醫方多用馬通，即馬屎也，及狗膽，其餘亦稀使，故但附下。

陶隱居云：羖羊角，方藥不甚用，其餘皆入湯煎。羊有三四種，最以青色者爲勝；次則烏羊；其羬羯羊及虜中無角羊，正可啖食之。爲藥不及都下者。其乳、髓則肥好也。羊肝，不可合猪肉及梅子、小豆食之，傷人心、大病人。

《唐本》注云：羊角，以青羝爲佳，餘不入藥用也。羊膽，療疳❽，時行熱瘡，和醋服之良。羊肺療渴，止小便數。并小豆葉煮食之，良。羊腎合脂爲羹，療勞痢甚效。蒜齏食脂一升，療

癥瘕。羊肉，熱病差後食之，發熱殺人。

《日華子》云：牯羊角，退熱，治山瘴，溪毒，燒之去蛇。心有孔者殺人。腎，補虛，耳聾，陰弱，壯陽，益胃，止小便，治虛損盜汗。羊肉，治腦風并大風，開胃，肥健。頭，涼，治骨蒸，腦熱頭眩，明目，小兒驚癇。脂，治遊風并黑黯。牯羊糞，燒灰，治瞎耳并瘨刺。

禹錫云：按《藥性論》云：羖羊角，使。治產後惡血煩悶，燒灰酒服之。又主輕身，治小兒驚癇。青羊角，亦大寒。青羊肝，服之明目。膽點眼中，主赤障，白膜，風泪，主解蟲毒。

《外臺秘要》：崔氏療傷寒，手足疼欲脫。取羊屎煮汁以灌之，差止。亦療時疾，陰囊及莖熱腫。亦可煮黃檗等洗之，并除傷寒之疾。又方：治小兒疳。羊膽二個，和漿水灌下部。猪膽亦得。

《千金方》：療尿床方。羊肚盛水令滿，繫兩頭熟煮開，取水頓服之。即差。

《肘後方》：療面多皯黯如雀卵色。以羖羊膽一個，酒二升，合煮三沸，以塗拭之，日三度，差。

《聖惠方》：治風，心煩恍惚，腹中痛，或時悶絶而復蘇。用羖羊角屑微炒，揭羅爲末。不計時候，温酒調下一錢匕。又方：治硫黄忽發氣悶。用羊血服一合。

《梅師方》：治産後餘血攻心，或下血不止，心悶面青，身冷氣欲絶。新羊血一盞飲之，三兩服妙。

《食醫心鏡》：主風眩羸瘦，小兒驚癇，丈夫五勞，手足無力。羊頭一枚，炮洗如法，蒸熟，切，以五味調和，食之。又主腎勞損精竭。炮羊腎一雙，去脂細切，於豉汁中五味米揉如常法，作羹食，粥亦得。

《衍義》曰：羖羊角，出陝西、河東，謂之牯羝羊，尤狠健，毛最長而厚，如要食，不如無角白大羊。本草不言者，亦有所遺爾。又同、華之間，有卧沙細肋，其羊有角似羖羊，但低小供饌，在諸羊之上。張仲景治寒疝，用生薑羊肉湯，服之無不驗。又一婦人産當寒月，寒氣入産門，臍下脹滿，手不敢犯，此寒疝也。嘗教之曰，非以抵當湯，謂其有瘀血。醫將治之其治也；可服張仲景羊肉湯，少減水⑨，二服遂愈。

牡狗陰莖　味鹹，平，無毒。主傷中，陰痿不起，令强熱大，生子，除女子帶下十二疾。一名狗精。六月上伏取，陰乾百日。膽，主明目，痂瘍惡瘡。心，主憂恚氣，除邪。腦，主頭風痹，下部蟨瘡，鼻中息肉。齒，主癲癇寒熱，卒風痱，伏日取之。頭骨，主金瘡止血。四脚蹄，煮飲之，下乳汁。白狗血，味鹹，無毒。主癇疾發作。肉，味鹹、酸，温。主安五臟，補絶傷，輕身益氣。屎中骨，主寒熱，小兒驚癇。

《圖經》曰：文具羖羊角條下。

《日華子》云：犬陰，治絶陽及婦人陰痿。膽，主撲損瘀血，刀箭瘡。心，治狂犬咬，除邪氣，風痹，療鼻衄及

下部⑩。齒，理小兒客忤，燒入用。頭骨，燒灰用亦壯陽，黄者佳。血，補安五臟。犬黄者大補益，餘色微補。古言署預凉而能補，犬肉暖而不補，雖有此言，服終有益，然奈穢甚，不食者衆。

禹錫云：按通用藥云：狗膽，平。狗頭骨，平。狗四足，平。狗齒，平。狗頭骨，平。狗膽，平。白狗血，温。按《藥性論》云：狗膽，亦可單用。味苦，有小毒。主鼻齆，鼻中息肉。狗頭骨，使。燒灰爲末，治久痢，勞痢。和乾薑、莨菪焦炒見烟，爲丸。白飲空心下十丸，極效。

孟詵云：膽去腸中膿水。又白犬膽，和通草、桂爲丸服，令人隱形。青犬尤妙。犬肉，益陽事，補血脉，厚腸胃，實下焦，填精髓。不可炙食，恐成消渴，但和五味煮，空腹食之。不與蒜同食，必頓損人。若去血，則力少不益人。瘦者多是病，不堪食。

《聖惠方》：治女人赤白帶下久不止。用狗頭燒灰爲細散，每日空心及食前，温酒調下一錢匕。

《外臺秘要》：治馬鞍瘡。狗牙灰醋和傅之。又五月五日取牡狗糞燒灰傅之，良。

《楊氏産乳》：妊娠不得食狗肉，令兒無聲。

羚羊



羚羊角

味鹹、苦，寒、微寒，無毒。主明目，益氣，起陰，去惡血注下，辟蠱毒惡鬼不祥，安心氣，常不魘寐，療傷寒，時氣寒熱，熱在肌膚，温風注悸，煩悶，臥不安，心胸間惡氣毒，瘰癧。肉，主蛇咬，惡瘡。山羊、山驢、羚羊，三種相似，醫工所用，但信市人，遂以角挂樹不著地。但取角彎中深鋭緊小，猶有挂痕者即是真，慢無痕者非，作此分别，餘無他異。真角，耳邊聽之集集鳴者良。陶云一角者，繆也。

禹錫云：按《藥性論》云：羚羊角，臣，味甘。能治一切熱毒風攻注，中惡毒風，卒死昏亂不識人，散産後血

上心煩悶，燒末酒服之。主小兒驚癇，治山癉，能散惡血。燒灰治噎塞不通。

孟詵云：羚羊，北人多食，南人食之，免爲蛇蟲所傷。和五味子炒之，投酒中經宿，飲之治筋骨急强，中風。又治熱毒痢及血角，主中風筋攣，附骨疼痛，生磨和水塗腫上及惡瘡，良。又卒熱悶，屑作末[11]，研和少蜜服。亦治熱毒痢及血痢。

雷公云：凡所用亦有神羊角。其神羊角長有二十四節，内有天生木胎。此角有神力，可抵千牛之力也。凡修事之時，勿令單角，不復有驗，須要不拆元對，以繩縛之，將鐵錯子錯之，旋旋取用，勿令犯風，錯末盡[12]處，須三重紙裹之，恐力散也。錯得了即單搗，搗盡，背風頭，重篩過，然入藥中用之，若[13]更研萬匝了，用之更妙，免刮人腸也。

羚羊角若水羊角末，水服方寸匕。

《子母秘録》：治胸脅痛及腹痛熱滿。燒羚羊角末，水服方寸匕。

《衍義》曰：羚羊角，今皆取有挂痕者。陳藏器取耳邊聽之集集鳴者良。亦强出此説，未嘗遍試也。今將按郭璞《爾雅》注云：犀，三角，一在頂上，一在額上，一在鼻上。鼻上者即食角也，小而不橢。亦有一角者。《嶺表録異》曰：犀有二角，一在頂[15]上爲胡帽犀。牯犀亦有二犀，一在鼻上爲毛犀，而今人多傳一角之説。角，皆爲毛犀，而今人多傳一角之説。此數種俱有粟文，以文之粗細爲貴賤。角之貴者，有通天花文。犀有此角，必自惡其影，常飲濁水，不欲照見也。其文理絶好者，則有百物之形。或云犀之通天者是其病，理不可知也。又[16]有倒插者，有正插者，有腰鼓插者。其倒插者[17]，一半以下通；正插者，一半以上通；腰鼓插者，中斷不通。其類極多，足爲奇異。



犀角　味苦、酸、鹹，寒、微寒，無毒。主百毒蠱疰[14]，邪鬼瘴氣，殺鈎吻、鴆羽、蛇毒，除邪，不迷惑魘寐，療傷寒温疫，頭痛寒熱，諸毒氣。久服輕身，駿健。生永昌山谷及益州。松脂爲之

《藥性論》云：牯犀角，君，味甘，有小毒。能辟邪精鬼魅，中惡毒氣，鎮心神，解大熱，散風毒，能治發背癰疽瘡腫，化膿作水，主療時疾熱如火，煩

悶，毒入心中，狂言妄語。

陶隱居云：今出武陵、交州、寧州諸遠山。犀有二角，以額上者爲勝。又有通天犀，角上有一白縷，直上至端，此至神驗。或云是水犀角，出水中。《漢書》所云：駭鷄犀者，以置米中，鷄皆驚駭不敢啄；又置屋中，烏鳥不敢集屋上。又云：通天犀者，夜露不濡，以此知之。凡犀見成物，皆被蒸煮，不堪入藥，惟生者爲佳。雖是犀片亦是已經煮炙，況用屑乎？又有牸犀，其角甚長，文理亦似犀，不堪藥用。

陳藏器云：犀肉，主諸蠱、蛇、獸咬毒，功用劣於角。《本經》有通天犀，且犀無水陸二種，并以精粗言之。通天者，腦上角千歲者長且銳白星徹，端能出氣，通天則能通神，可破水、駭鷄，故曰通天。《抱朴子》曰：通天犀，有白理如綫者以盛米，鷄即駭矣。其真者，刻爲魚，銜入水，水開三尺。其鼻角，味甘、辛。治心煩，止驚，安五臟，補虛勞，退熱，消痰，解山瘴溪毒，鎮肝明目，治中風失音，熱毒風，時氣發狂。

禹錫云：按《陳藏器》云：《爾雅》云：兕似牛，一角。犀似豕，三角。復云多似象，復如豕三角。陶據《爾雅》而言，不知三角之誤也。又云：雌者是兕而形不同，未知的實。

雷公云：凡使，勿用奴犀、牸犀、淺水犀、無潤病水犀、孿子犀、下角犀、坼裂光潤者上。要使烏黑肌粗皺、坼裂犀。凡修治之時，錯其屑入臼中，搗令細，再入鉢中研萬匝，方入藥中用之。婦人有妊勿服，能消胎氣。角，大忌鹽也。

《食療》云：此只是山犀牛，未曾見人得水犀取其角。此兩種⑲者，功亦同矣。其生角，寒。可燒成灰，治赤痢。研爲末，和水服之。凡修治一⑱切除⑳客熱頭痛及五痔，諸血痢。若食過多，令人煩，即取麝香少許，和水服，即散也。

《聖惠方》：治雉肉作臛食之吐下。用生犀角末方寸匕，新汲水調下，即差。

《外臺秘要》：服藥過劑及中毒，煩悶欲死。燒犀角末，水服方寸匕。

《千金方》：有蠼螋蟲尿人影著處，便令人體病瘡，其狀如粟粒累累，如刺蟲所螫後細瘡瘤，作叢如茱萸子一聚滲痛，身中忽有處燥痛如芒刺，亦令人皮急，舉身惡寒壯熱，極者連起竟腰、脅、胸也。治之法：初得磨犀角，塗之止。

《抱朴子》：鄭君言，但習閉氣至千息，久久則能居水中一日許，得真通天犀角三寸以上者，刻爲魚，銜之入水，水常爲開，方三尺，可得氣息水中。又，通天犀赤㉑理如綖，自本徹末㉒，以角盛米著地，群鷄不敢啄而轉驚，故南人名爲駭鷄犀。是故有蟲毒之鄉，於

他家飲食，即以角攪之，白沫竦起，即爲有毒，無沫，即無毒也。

《衍義》曰：犀角，凡入藥須烏色，未經湯水浸煮者，故曰生犀。川犀及南犀，紋皆細；烏犀尚有顯紋者露；黃犀紋絶少，皆不及西番所出，紋高、兩脚顯也。物像黑、外黃者爲正透，物像黑、外黃者爲倒透。蓋以烏爲正，以形像肖物者爲貴。既曰通犀，又須紋頭顯，黃黑分明，透不脱，有兩脚滑潤者爲第一。鹿取茸，犀取尖，其精鋭之力盡在是矣。犀角尖，磨服爲佳，若在湯散，則屑之。西蕃者佳。

虎



虎骨　主除邪惡氣，殺鬼疰毒，止驚悸，主惡瘡鼠瘻。頭骨尤良。膏，主狗嚙瘡。爪，辟惡魅。肉，主惡心欲嘔，益氣㉓。

《圖經》曰：虎骨并睛、爪，《本經》不載所出州土，今有山林處皆有之。骨用頭及脛，色黃者佳。睛亦多僞，須自獲者乃真。爪并指骨毛存之，以繫小兒臂上辟惡鬼，兩脅間及尾端皆有兩脚滑潤威，如乙字，長一二寸許，此數物，皆用端亦有，不如脅者。膽，主小兒驚癇。肉及皮，主瘧。骨煮汁浴小兒，去瘡疥，鬼疰，驚癇。屎，主鬼氣。眼光，主驚邪，辟惡，鎮心。凡虎夜視，以一目放光，一目看物。獵人候而射之，弩箭纔及，目光隨墮地，得之者如白石是也。

《日華子》云：肉，味酸，平，無毒。治瘧。又睛，鎮心及小兒驚啼，疳氣，客忤。

雷公云：虎睛，凡使，須知採人，問其源，有雌有雄，有老有嫩，有殺得者，唯有中毒自死者勿使，却有傷人之患。夫用虎睛，先於生羊血中浸一宿，雜朱畫符療痢㉕。鬚療齒痛。爪以懸小兒臂辟惡鬼。

《唐本》注云：《別録》云：屎，主惡瘡。其眼睛主癲。其屎中骨爲屑，主火瘡。牙，主丈夫陰頭瘡及疽瘻。鼻，主癲疾，小兒驚癇。

陳藏器云：虎威，令人有威，帶之臨官佳，無官爲人所憎。威，言骨如乙字，長一寸，在脅兩傍，破肉取之。尾

漉出，微火上焙之，乾，搗成粉，候衆藥出，取合用之。

禹錫云：按鬼疰尸疰及惡瘡通用藥并《藥對》云：虎骨，平。《藥性論》云：虎骨，臣。殺犬咬毒。味辛，微熱，無毒。治筋骨毒風攣急，屈伸不得，走疰疼痛，主尸疰、腹痛，治温瘧，療傷寒温氣。按孟詵云：肉，食之入山，虎見有畏，辟三十六種精魅。又眼睛，主瘧病，辟惡，小兒熱，驚悸。膽，主小兒疳痢，驚，神不安，研水服之。骨，煮湯浴，去骨節風毒。膏，内下部，治五痔下血。

《聖惠方》：治癮[26]節風，百節疼痛不可忍。用虎頭骨一具，塗酥炙黄，捶碎，絹袋盛，用清酒二斗浸五宿，隨性多少暖飲之，妙。

《千金翼》：療燻疽，著手足肩背，累累如米起，色白，刮之汁出。虎尿[27]，以馬尿和之，暴乾，燒灰粉之。

《經驗後方》：白虎風，走注疼痛，兩膝熱腫[28]。虎脛骨塗酥炙，黑附子炮裂去皮臍，各一兩爲末。每服温酒調下二錢匕，日再服。

《勝金方》：治大腸痔漏并脱肛。以虎脛骨兩節，蜜二兩，炙令赤搗末，蒸餅，丸如桐子大。每服凌晨温酒下二十丸，隔夜先和大腸後，方服此藥。

張文仲：治痢久下，經時不愈者，此名休息。取大蟲骨，炙令黄焦，搗末。飲服方寸匕，日三，即愈。

《衍義》曰：虎骨，頭、脛與脊骨入藥，内[26]微熱。陳藏器所注乙骨之事，及射之目光墮地如白石之説，必得之於人，終不免其所誣也。人或問曰：風，木也；虎，金也。木風從虎何也？風從虎嘯則風生，自然之道也。所以治風攣急，屈伸不得，走疰，癲疾，驚癲，骨節風毒等，乃此義爾。

兔頭骨



平，無毒。主頭眩痛，癲疾。骨，主熱中消渴。腦，主凍瘡。肝，主目暗。肉，補中益氣。然性冷，多食損元氣，不可合鷄肉食之。髓及膏并主耳聾。毛煎湯洗豌豆瘡，毛燒灰[30]，主炙瘡。皮、毛及頭并燒灰，酒服，主難産衣不出。

《藥性論》云：兔骨，味甘。臘月肉作醬食，去小兒豌豆瘡。臘毛煎湯洗豌豆瘡及毛傅，良。

陶隱居云：兔肉爲羹，亦益人。今處處有之，爲食品之上味。兔竅乃有六七穴，子從口出，故妊娠者禁食之。頭骨，主頭眩痛，癲疾。腦，主凍瘡。肝，主目暗。肉，補中益氣。然性冷，不可合鷄肉食之。髓及膏并主耳聾。毛煎湯洗豌豆瘡，毛燒灰[30]，主炙瘡。皮、毛及頭并燒灰，酒服，主難産衣不出。

《藥性論》云：兔骨，味甘。臘月肉作醬食，去小兒豌豆瘡。臘毛煎湯洗豌豆瘡及毛傅，良。

陶隱居云：兔肉爲羹，亦益人。其肉不可合白鷄肉食之，面發黄。合獺肉食，令人病遁尸。

《唐本》注云：兔皮、毛，合燒爲灰

酒服，主産難後衣不出，及餘血搶心，脹欲死者，極驗。頭皮，主鬼疰，毒氣在皮中針刺者。又云：主鼠瘻。膏，主耳聾。肉治渴，健脾。生吃壓丹毒。

陳藏器云：兔，寒、平。主熱氣温脾[31]。毛，燒灰，主炙瘡不差。骨，主久疥，醋磨傅之。肉，久食弱陽，令人色痿。與薑同食，令人心痛。頭，主難産，燒灰末酒下。兔竅有五六穴，子從口出，令懷妊忌食其肉者，非爲缺唇，亦緣口出。

禹錫云：按《日華子》云：頭骨和毛、髓燒爲丸，催生落胞并産後餘血不下。兔骨，治瘡疥刺風，鬼疰。肝，明目，補勞，治頭旋眼疼。

孟詵云：肝，主明目，和決明子作丸服之。又，主丹石人上衝，眼暗不見物，可生食之，一如服羊子肝法。八月至[32]十一月可食，服丹石人相宜，大都損陽事，絶血脉。

《外臺秘要》：《必效》療婦人帶下。取兔皮燒令烟絶，揭爲末，酒服方寸匕，以差爲度。

《經驗方》：催生丹：兔頭二個，臘月内取頭中髓塗於浄紙上，令風吹乾，通明乳香二兩，碎入前乾兔髓同研。來日是臘，今日先研，俟夜星宿下安桌子上，將果、香、茶同一處排定，須是潔浄齋戒焚香，望北帝拜告天師道：弟子某，修合救世上産生婦人藥，願降威靈，祐助此藥，速令生産。壽吉[33]再拜，用紙貼同露之，次香燒至來日，日未出時，以猪肉和，丸如鷄頭大，用紙袋盛貯透風懸。每服一丸，醋湯下，良久未産，更用冷酒下一丸，即産。此神仙方，絶驗。

《博濟方》：治産前滑胎。臘月兔頭腦髓一個，攤於紙上令匀，候乾，剪作符子，於面上書生字一個，覺母陣痛時，用母釵子股上夾定，燈焰上燒灰盞盛，煎丁香酒調下。

《勝金方》：治發腦、發背及癰疽，熱癤，惡瘡等。臘月兔頭，細剉，入瓶内密封，久愈。注塗帛上厚封之，熱痛封之如冰[34]，頻換差。

《集驗方》：治痔疾，下血疼痛不止。以玩月砂不限多少，熳火熬令黄色爲末。每二錢入乳香半錢，空心温酒調下，日三四服，差。砂，即兔子糞是也。

《子母秘録》：療産後陰下脱，燒兔頭末傅之。

《抱朴子》：兔壽千歲，五百歲毛色變白。又云：兔血和女丹服之，有神女二人來侍，可役使之。

《衍義》曰：兔有白毛者，全得金之氣也，入藥尤功。凡兔至秋深時則用紙袋盛貯透風懸，至次日取四脚肘後毛爲遂食，飼雕鷹，至次日可食，金氣全也。纔至春夏，其味變，却吐出[35]，其意欲腹中逐盡脂肥，使饑急捕逐速爾。然作醬必使五味。既患豌豆瘡，又食此，則發毒太甚，恐斑爛尸疰、鬼疰，毒氣在皮中淫躍如針刺者，心腹痛，走無常處，及鼠瘻惡瘡。頭骨尤良。肉，療諸疰。陰莖，主月水不通，男子陰癩，燒之，以東流水服之。

猩猩骨　味甘，温，無毒。主風疰、

狸



《圖經》曰：狸骨及肉，《本經》不載所出州土，今處處有之。其類甚多，以虎斑紋者堪用，猫斑者不佳。皆當用頭骨。《華佗方》有狸骨散，治尸疰。肉主痔，可作羹臛食之。南方有一種香狸，人以作膾，生若北地狐，生法其氣甚香，微有麝氣。邕州以南又有一種風狸，似兔而短，多栖息高木，候風而吹過他木。其溺主風，然甚難取，人久養之始可得。

陶隱居云：狸類甚多，今此用虎狸，無用猫者，猫狸亦好。其骨至難別，自取乃可信。又有狸，色黄而臭，肉亦主鼠瘻，及狸肉作羹如常食法并佳。

《唐本》注云：狸屎灰，主寒熱鬼瘧，發無期度者，極驗。家狸亦好，一名猫也。

陳藏器云：風狸溺，主諸色風，人取養之，食果子以寵之。溺如乳，甚難得，似兔而短，在高樹候風而吹至彼樹，出邕州已南。

禹錫云：按《藥性論》云：狸骨，臣。亦可單用。頭骨炒末，治噎病，不通食飲。孟詵云：骨，主痔病，作羹臛食之，不與酒同食。其頭燒作灰，和酒服二錢匕，主痔。又食野鳥肉中毒，狸骨灰服之差。

《日華子》云：骨，治遊風惡瘡，頭骨最妙。糞燒灰，主寒熱瘧疾。肉，治遊風等病。又狸頭，燒灰酒服，治一切風。

按《蜀本》云：肉，療鼠瘻。

《外臺秘要》：治痔發疼痛。狸肉作羹食之良，作脯食之，不過三頓差，此肉甚妙。

《肘後方》：治鼠瘻腫核痛，若破有瘡口膿血出者。取狸一物，理作羹如食法，空心進之。

《子母秘録》：療小兒鬼舐方。狸屎燒灰，和臘月猪脂塗上。《千金方》同。

《聖惠方》：治瘰癧腫硬痛疼，年深時久不差。用狸頭、蹄骨等，并塗酥炙令黄，搗羅爲散。每日空心粥飲調下一錢匕。

《衍義》曰：狸骨形類猫，其紋有二：一如連錢者，一如虎紋者，此二色狸皆可入藥。其肉味與狐不相遠。江西一種牛尾狸，其尾如牛。人多啖食，未聞入藥。孟詵云：骨理痔病，作羹臛食之，然則骨如何作羹臛音郝，肉羹也？炙骨和麝香、雄黄爲丸服，治痔及瘻瘡，甚效。

獐



獐骨　微温，主虚損泄精。肉，温。補益五臟。髓，益氣力，悦澤人面。

《圖經》曰：獐骨及肉，《本經》不載所出州土，今陂澤淺草中多有之。亦呼爲麋。獐之類甚多，麋其總名也。有有牙者，有無牙者，用之皆同。然其牙不能噬嚙。崔豹《古今注》曰：獐有牙而不能噬，鹿有角而不能觸是也。其肉自八月已後至十一月已前，食之勝羊肉；十二月至七月食之動氣。道家以獐鹿肉羞爲白脯，言其無禁忌也。唐方有獐骨酒及獐髓煎并補下，其腦亦入面膏。

《日華子》云：獐骨，虚損，益精髓，悦顔色。臍下有香，治一切虚損。

禹錫云：按《藥性論》云：獐骨，味甘，無毒。主瘤病。獐、鹿二種肉，剖如厚脯，炙令熱，榻淹，可四炙四易，痛攪出膿便愈。不除更炙，新肉用之良。

豹



豹肉　味酸，平，無毒。主安五臟，補絶傷，輕身益氣。久服利人。

《圖經》曰：豹肉，《本經》不載所出州土，今河、洛、唐、鄧間或有之。頭骨，燒灰淋頭，去風屑。脂，可合生髮膏，朝塗暮生。謹按：豹有數種，有赤豹，黄羆。陸機疏云：赤豹，其形亦小。尾赤而文黑，謂之赤豹。有玄豹，幽都之山，有玄虎、玄豹。有白豹。

陶隱居云：豹至稀有，爲用亦鮮，惟尾可貴。

《唐本》注云：陰陽神豹尾及車駕鹵簿豹尾，名可尊重。真豹尾有何可貴，未審陶據奚理。

《日華子》云：肉，微毒。壯筋骨，强志氣，令人猛健。

禹錫云：按孟詵云：肉，食之令人志性粗，多時消即定。久食令人耐寒暑。脂，可合生髮膏，朝塗暮生。頭骨，燒灰淋汁，去白屑。

《食療》云：補益人。食之令人强筋骨，志性粗疏。食之即覺也，少時消即定。久食之，終令人意氣粗豪。唯令筋健，能耐寒暑。正月食之傷神。

《衍義》曰：豹肉，毛赤黄，其紋黑如錢而中空，比比相次。此獸猛捷過虎，故能安五臟，補絶傷，輕身。又有土豹，毛更無紋，色亦不赤，其形亦小。此各自有種，非能變爲虎也；聖人假喻而已。恐醫家未喻，故書之。

筆頭灰　年久者，主小便不通，小便數難，陰腫，中惡，脱肛，淋瀝。燒灰水服之。唐本先附。自草部今移。

《圖經》曰：文具兔頭骨條下。

禹錫云：按《藥性論》云：筆頭

灰，微寒。亦可單用，燒灰治男子交婚之夕莖痿。取灰酒服之良，其筆是使乏者。

《外臺秘要》：若小便不通，數而微腫方。取陳久筆頭一枚，燒爲灰，和水服之。

《勝金方》：催産，治難産，聖妙寸金散方。敗筆頭一枚，燒爲灰，細研爲末，研生藕汁一盞調下，立産。若産母虚弱及素有冷疾者，恐藕冷動氣，即於銀器内重湯暖過後服。

《范汪[36]方》：治喉中腫痛不得飲食。燒筆頭灰，漿飲下方寸匕。

犢子臍屎　主卒九竅中出血。燒末服之方寸匕。新生未食草者預取之，黄犢爲上。

《姚氏方》：人有九竅，四肢指歧間血出，乃暴驚所爲。取新生犢子未食草者臍屎，日乾燒末。水服方寸匕，日四五頓差。人云：口鼻出血亦良。

靈猫陰　味辛，温，無毒。主中惡鬼氣，飛尸，蠱毒，心腹卒痛，狂邪鬼神，如麝用之。功似麝，生南海山谷。

如狸，自爲牝牡，亦云蛉狸。《異物志》云：靈狸一體自爲陰陽，刳其水道，連囊以酒灑，陰乾。其氣如麝，若雜真香。罕有别者，用之亦如麝焉。

震肉　無毒。主小兒夜驚，大人因驚失心。亦作脯與食之。此畜爲天雷所霹靂者是。

圖經衍義本草卷之二十八

---

❶乾：原作『飲』，據晦明軒本改。
❷又：原作『有』，據晦明軒本改。
❸許：原作『牛』，據晦明軒本改。
❹合：原作『令』，據晦明軒本改。
❺茯苓：晦明軒本作『蓯蓉』。
❻方：原作『九』，據晦明軒本改。
❼急脚：晦明軒本作『紙拈』。
❽疳：晦明軒本『疳』下有『濕』字。
❾水：原作『才』，據晦明軒本改。
❿部：晦明軒本『部』下有『瘡』字。
⓫末：原作『木』，據晦明軒本改。
⓬盡：原作『患』，據晦明軒本改。
⓭若：原作『老』，據晦明軒本改。
⓮疳：晦明軒本作『疰』。
⓯頂：晦明軒本作『額』。
⓰又：晦明軒本作『文』。
⓱其倒插者：此四字原脱，據晦明軒本補。
⓲一：原脱，據晦明軒本補。
⓳種：原作『利』，據晦明軒本改。
⓴除：原脱，據晦明軒本補。
㉑赤：原作『亦』，據晦明軒本改。
㉒末：原作『木』，據晦明軒本改。
㉓氣：晦明軒本『氣』下有『利』字。
㉔血：晦明軒本作『肉』。
㉕痢：晦明軒本作『邪』
㉖癰：晦明軒本作『歷』。
㉗尿：晦明軒本作『屎白者』。
㉘腫：原作『用』，據晦明軒本改。
㉙内：晦明軒本作『肉』。
㉚灰：原作『火』，據晦明軒本改。
㉛温脾：晦明軒本作『温痹』。
㉜至：原作『止』，據晦明軒本改。
㉝壽吉：晦明軒本作『禱告』。
㉞冰：原作『水』，據晦明軒本改。
㉟吐出：原作『在』，據晦明軒本改。
㊱汪：原作『注』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之二十九

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

獸部下品

豚卵



豚卵　味甘、温，無毒。主驚癇癲癲疾，鬼疰蠱毒，除寒熱，貲豚五癃，邪氣攣縮。一名豚顛。陰乾藏之，勿令敗。懸蹄，主五痔，伏熱在腸，腸癰内蝕。猪四足，小寒。主傷撻諸敗瘡，下乳汁。心，主驚邪，憂恚。腎冷。和理腎氣，通利膀胱。膽，主傷寒熱渴。肚，主補中益氣，止渴利。齒，主小兒驚癇。五月五日取。鬐膏，生髮。肪膏，主煎諸膏藥，解斑猫、芫青毒。豶猪肉，味酸，冷。療狂病。凡猪肉，味苦。主閉血脉，弱筋骨，虚人肌。不可久食，病人、金瘡者尤甚。猪屎，主寒熱，黄疸，濕痹。

《圖經》曰：豚卵，《本經》不著所出州土，云一名豚顛，陰乾藏之，勿令敗。謹按楊雄《方言》云：猪，燕、朝鮮之間謂之貑，關東、西謂之彘，或謂之豕，南楚謂之豨音喜，其子謂之豯音奚，吴揚之間謂之猪子，其實一種也。今云豚卵，當是猪子也。猪之屬，爲用最多，惟肉不多。惟肉不宜食，食之多暴肥，蓋風虚所致也。

陶隱居云：猪，爲用最多，惟肉不宜食，人有多食，皆能暴肥，此蓋虚肥故也。其脂能悦皮膚，作手膏，不皴裂。肪膏煎藥，無不用之。勿令中水。

《肘後方》：治卒腫痢❷，身面皆洪大。生猪肝一具，細切，頓食之，勿與鹽，乃可用苦酒，妙。

《經驗後方》：定喘化涎。猪蹄甲四十九個，洗淨控乾，每個指甲内半夏、白礬各一字，入罐子内封閉，勿令其肉飲酒，不可卧床稻穰中。又白猪，白蹄雜青者，不可食之。猪膏又忌烏梅。

禹錫云：按孟詵云：腎，主人腎虚，不可久食。肚，主暴痢虚弱。按《日華子》云：腎，補水臟，暖腰膝，補膀胱，治耳聾。雖補腎，又令人少子。肚，補虚損，殺勞蟲，止痢。釀黄糯米蒸搗爲末，甚治膀❶氣并小兒疳蛔黄瘦病。

《外臺秘要方》：療毒熱病攻手足腫，疼痛欲脱方。猪膏和羊屎，塗之亦佳。

《千金翼方》：治手足皴裂，血出疼痛，若冬月冒涉凍凌，面目手足瘃壞，及熱疼痛皆治。取猪腦髓著熱酒中以洗之，差。

烟出，火煅通赤，去火細研，入麝香一錢匕。人有上喘咳嗽，用糯米飲下，小兒半錢，至妙。

《梅師方》：治産後虚勞，骨節疼痛，汗出不止。取猪腎造晞臛，以葱、豉、米，如法食之。

《傷寒類要方》：療男子、女人黄疸病，醫不愈，耳目悉黄，食飲不消，胃中脹熱，生黄衣，在胃中有乾屎使病爾。用煎猪脂一小升，温熱頓服之，日三，燥屎下去乃愈。

《千金髓方》：治胎孕九個月，將産，陰癢，小兒陰頹卵腫。五臟及腸，味苦，微寒，有毒。主蠱毒寒熱，小兒驚癇。雄狐屎，燒之辟惡。在木、石上者是。



狐

《圖經》曰：狐，舊不著所出州郡。陶隱居注云：江東無狐，皆出北方及益州。今江南亦時有，京、洛尤多。形似狸而黄，亦善能爲魅。

《唐本》注云：狐肉及腸，作臛食之，主疥瘡久不差者。腸主牛疫。燒灰和水灌之乃勝獺。鼻尖似小狗，惟大尾，全不似狸。

《日華子》云：狐，暖，無毒。補虚勞，治惡瘡疥，隨臟而補。頭、尾灰治牛疫，以水飲之。心、肝生服治妖魅。雄狐尾燒辟惡。

孟詵云：狐補虚，煮炙食之。又主五臟邪氣，患蠱毒寒熱，宜多服之。

《食醫心鏡》云：治驚癇，神精恍惚，語言錯謬，歌笑無度，兼五臟積冷，蠱毒寒熱。狐肉一片及五臟，治如食法，豉汁中煮，五味和作羹，或作粥，炙食并得。京中以羊骨汁、鯽魚替豉汁。

《千金方》：惡刺。取狐屎灰，臘月膏和封孔上。又方：治一切惡瘻中冷瘕肉。用正月狐屎，不限多少，乾末，食前新汲水下一錢匕。

《衍義》曰：狐，今用肝治風，皮兼毛用爲裘者是也。此獸多疑，極審聽，移時即無及矣。

效。

狐陰莖　味甘，有毒。主女子絶

人智出之，以多疑審聽而捕取，捕者多用胸。

獺



獺肝　味甘，有毒。主鬼疰蠱毒，却魚鯁，止久嗽，燒服之。肉，療疫氣温病及牛、馬時行病。煮屎灌之亦良。

《圖經》曰：獺，舊不著所出州土，今江湖間多有之。北土人亦馴養以爲玩。《廣雅》一名水狗。然有獱音賓，獱或作猵音頻。獺，形大，頭如馬，身似蝙蝠。《淮南子》云：養池魚者，不畜獱，獺類也。入藥當以取魚祭天者，其肉性寒。主骨蒸勞，血脉不行，營衛虛滿，及女子經絡不通，血熱，大小腸秘澀。然消陽氣，不益男子，宜少食。五臟及肉皆性寒，惟肝温。主傳尸勞極，四肢寒瘧，虛汗客熱，亦主産勞。諸畜肝皆葉數定。惟此肝一月一葉，十二葉，其間又有退葉。用之須見形力，不爾多僞。

陶隱居云：獺有兩種：有獱獺，形大，頭如馬，身似蝙蝠，不入藥用；此當取以魚祭天者。其骨亦療食魚骨鯁，有牛、馬家，可與取屎收之。多出溪岸邊，其肉不可與❸兔肉雜食。

《別録》云：獺四足，主手足皮皴裂。

陳藏器云：獺主魚骨鯁不可出者，取足於項下爬之，亦煮汁食。皮毛，主❹水癊病者，作褥及履屨著之并煮汁服。屎主魚膖瘡，研傅之。亦主驢馬蟲顙，細研灌鼻中。

禹錫云：按《藥性論》云：獺肝，君，味鹹，微熱，無毒。能治上氣咳嗽，勞損疾，尸疰，瘦病。其骨治嘔噦不止。孟詵云：獺肝，主疰病。相染一門悉患者，以肝一具火炙末，以水和方寸匕服之，日再服。謹按，服之下水脹，但熱毒風虛脹，服之即差。若是冷氣虛脹，食益虛腫甚也。只治熱不治冷，不可一概爾。按《日華子》云：獺肉，平，無毒。治水氣脹滿，熱毒風。獺肝，治虛勞并傳尸勞疾。

《肘後方》：尸疰鬼疰病者，葛云是五尸之一疰，又挾諸鬼邪爲害。其病變動，乃有三十六種至九十九種。大略使人寒熱淋瀝，沉沉默默然，不的知其所苦，而無處不惡。累年積月，漸就頓滯，以致於死。死後傳以傍人，乃至滅門。覺如此候者，便宜急治。獺肝一具，陰乾杵末，水服方寸匕，日三，未差再作。姚云神效。又方：治腸痔，大便常有血。燒獺肝，服一錢匕。

《衍義》曰：獺，四足俱短，頭與身、尾皆扁，毛色若故紫帛。大者，身與尾長三尺餘，食魚，居水中，出水中亦不死；亦能休於大木上，世謂之水獺。嘗縻置大水瓮中，於其間旋轉如風，水謂之成旋，壠起，四面高，中心凹

下，觀者駭目。皮，西戎將以飾毳服領、袖。問之，云：垢不著，如風霾翳目，即就袖口飾目中，即出。又毛端果不著塵，亦一異也。又《本草·叙例》言：獺膽分杯，嘗試之，不驗；惟塗於盞唇，但使酒稍高於盞面。分杯之事，亦古今傳誤言也，不可不正之。肝，用之有驗。

鼷鼠



鼷鼠鼷，音傴　味鹹，無毒。主癰疽，諸瘻蝕惡瘡，陰蜜爛瘡。在土中行。五月取令乾，燔之。

陶隱居云：俗中一名隱鼠，一名鼢扶粉切鼠。形如鼠大而無尾，黑色，長鼻甚强，常穿鑿地中行，討掘即得。今諸山林中，有獸大如水牛，形似猪，灰赤色，下脚似象，胸前、尾上皆白，有力而純，亦名鼷鼠。人長取食之，肉亦似牛肉，肉多以作脯。其膏亦云主瘻，乃云此是鼠王，其精溺一滴落地，輒成一鼠，穀有鼠灾年則多出。恐非虚爾。

陳藏器云：鼷鼠肉主風，久食主瘡疥痔瘻。膏堪摩諸惡瘡。《本經》所説即是小於鼠在地中行者。陶亦云形如鼠，尾黑，常穿於地中，討掘即得。如《經》所言，乃是今之鼢鼠小口尖者，其鼷鼠是獸，非鼠之儔。大如牛，前脚短，皮入鞦轡用。

《衍義》曰：鼷鼠，鼢鼠也。其毛色如鼠，今京畿田中甚多。脚絶短，但能行，尾長寸許，目極小，項尤短。兼易掘取，或安竹弓射之，用以飼鷹。陶不合更引：今諸山林中，大如水牛，形似猪，灰赤色者也。設使是鼠，則孰能見其溺精成鼠也。陶如此輕信，但真醇之士，不以無稽之言爲妄矣。今《經》云：在土中行。則鼢鼠無疑。

鼺鼠



鼺鼠鼺音羸　主墮胎，令産易。生山都平谷。

陶隱居云：鼺是鼯鼠。一名飛生。狀如蝙蝠，大如鴟鳶，毛紫色暗，夜行飛生。人取其皮毛以與産婦持之，令兒易生。又有水馬，生海中，是魚蝦類，狀如馬形，亦主易産。

陳藏器云：陶云有水馬，生海中。主産。按水馬，婦人臨産帶之，不爾，臨時燒末❺飲服，亦可手持之。出南海，形如馬，長五六寸，蝦類也。《南州異物志》云：婦人難産割裂而出者，手握此蟲，如羊之産也。生物中羊産最

易。

禹錫云：按難産通用藥云：鼺鼠，微温。

《衍義》曰：鼺鼠，《經》中不言性味，惟是於難産通用藥中云：鼺鼠，微温。毛赤黑色，長尾，人捕得，取皮爲暖帽。但向下飛則可，亦不能致遠。今關西山中甚有，毛極密，人謂之飛生者是也。《注》中又引水馬，首如馬，身如蝦，背傴僂，身有竹節紋，長二三寸。今謂之海馬。

腽肭臍



腽肭臍 味鹹，無毒。主鬼氣尸疰，夢與鬼交，鬼魅，狐魅，心腹痛，中惡邪氣，宿血結塊，痃癖羸瘦等。骨訥獸，似狐而大，長尾。生西戎。

《圖經》曰：腽肭臍，出西戎，今東海傍亦有之，云是新羅國海狗腎。舊説是骨訥獸，似狐而大，長尾，其皮坐❻自有肉黄毛，三莖共一穴。今滄州所圖，乃是魚類，而豕首兩足。其臍紅紫色，上❼有紫斑點，全不相類，醫家亦兼用此，云欲驗其真，取置睡犬傍，其犬忽驚跳若犴❽者爲佳。

《日華子》云：腽肭獸，熱。補中益氣，腎暖腰膝，助陽氣，破癥結，療驚狂癇疾及心腹疼，破宿血。

禹錫云：按《藥性論》云：腽肭臍，君，大熱。此是新羅國海内狗外腎也。連而取之。主治男子宿癥氣塊，積冷勞氣，羸瘦，腎精衰損，多色成腎勞，瘦悴。

雷公云：凡使，先須細認，其僞者多。其海中有獸號曰水鳥龍，海人採得殺之，取腎將入諸處，在藥中修合，恐有誤，其物自殊。有一對，其有兩重薄皮裹丸氣肉核，皮上白❾有肉黄毛，三莖共一穴。年年瘮濕，常如新。若用，須酒浸一日後，以紙裹，微微於火上炙令香，細剉單搗用也。

《衍義》曰：腽肭臍，今出登、萊州。《藥性論》以謂是海内狗外腎。《日華子》又謂之獸。今觀其狀，非狗非獸，亦非魚也。但前即似獸，尾即魚，其身有短密淡青白毛，腹脅下全白，仍相間於淡青。白毛上有深青黑點，久則色復淡，皮厚且韌，如牛皮，邊將多取以飾鞍韉。其臍治臍腹積冷，精衰，脾腎勞極有功，不待别試也。似狐長尾之説，蓋今人多不識。

麂音紀 味甘，平，無毒。主五痔病。炸出以薑、醋進之，大有效。又云：多食能動人痼疾。頭骨，爲灰飲下，主飛尸。生東南山谷。

《圖經》曰：麂，出東南山谷，今有山林處皆有，而均、房、湘、漢間尤多，實獐類也。謹按《爾雅》：麕與麂同，大麕，旄毛狗足。釋曰：麕亦獐也。旄

麂



毛，獐音猙長毛也。大獐，毛長狗足者名麞。南人往往食其肉，然堅韌，不及獐味美。多食之，則動痼疾。其皮作履舄，勝於衆皮。頭亦入藥用。

禹錫云：按《日華子》云：麂，凉，有毒。能墮胎及發瘡癰疥。

《衍義》曰：麂，獐之屬，又小於獐，但口兩邊有長牙，好鬥，則用其牙。皮爲第一，無出其右者，然多牙傷痕。四方皆⑩有，山深處則頗多，其聲如擊破鈸。

野猪黄　味辛、甘，平，無毒。主中蠱毒。水研如棗核，日二服，效。

禹錫云：按孟詵云：野猪，主補肌膚，令人虚肥，膽中有黄。研如水服之，治疰病。其肉尚勝諸猪，雌者肉美。其冬月在林中食橡子，肉色赤，補五臟風氣。其膏，煉令精細，以一⑪匙和一盞酒服，日三服，令婦人多乳。服十日，可供三四孩子。齒，作灰服，主蛇毒。膽，治惡熱氣。

《日華子》云：野猪，主腸風瀉血，炙食，不過十頓。疾及惡毒風，小兒疳氣，客忤，天吊。脂⑫，悦色，并除風腫毒瘡疥癬。臘月陳者佳。外腎和皮，燒作灰，不用絶過爲末，飲下，治崩中帶下，并腸風瀉血及血痢。

《食醫心鏡方》：主久痔，野鷄下血不止，肛邊痛。猪肉二斤，切，著五味炙，空心食。作羹亦得。

《衍義》曰：野猪黄在膽中，治小兒諸癇疾。京西界野猪甚多，形如家猪，但腹小脚長，毛色褐，作群行，獵人惟敢射最後者，射中前奔者，則群猪散走傷人。肉色赤如馬肉，其味甘，肉復軟，微動風。黄不常有，間得之，世亦少用，食之尚勝家猪。

敗鼓皮　平。主中蠱毒。

《圖經》曰：敗鼓皮，主蠱毒，古方亦單用，燒灰服之。用之者稀，故但附於其末。

陶隱居云：此用穿敗者，燒作屑，水和服之。病人即喚蠱主姓名，仍往令其呼取蠱，仍差。白蘘荷亦然。自草部今移。

《外臺秘要方》：治蠱。取敗鼓皮廣五寸，長一尺，薔薇根五寸，如足拇指大本元云葭菪根，剉，以水一升，酒三升，煮取一升，服之。當下蠱蟲，即愈。

《梅師方》：治卒中蠱毒，下血如鵝肝，晝夜不絶，臟腑壞敗待死。知蠱姓名方，破鼓皮燒灰服，自呼名治之乃去。又欲知蠱毒主姓名，取敗鼓皮少許，作⑬末飲服，病人須臾自當呼蠱主姓名。

《衍義》曰：敗鼓皮，黃牛皮爲勝。今不言是何皮，蓋亦以驢、馬皮爲之者。唐·韓退之所謂牛溲、馬勃、敗鼓之皮，俱收并蓄，待用無遺者。今用處亦少，尤好煎膠。專用牛皮，始可入藥。

麋脂　味辛，温，無毒。主癰腫、惡瘡、死肌，寒風濕痹，四肢拘緩不收，風頭腫氣，通腠理，柔皮膚。不可近陰，令痿。一名宫脂。畏大黄。角，味甘，無毒。主痹，止血，益氣力。生南山山谷及淮海邊。十月取。

陶隱居云：今海陵間最多，千百爲群，多牝少牡。人言一牡輒交十餘牝，交畢即死。其脂墮土中，經年，人得之方好，名曰遁脂，洒服至良。尋麋性乃爾淫快，不應痿人陰。一方言不可近陰，令陰不痿，此乃有理。麋肉不可合蝦及生菜、梅、李、果實食之，皆病人。其角刮取屑熬香，酒服之大益人事。出《彭祖傳》中。

禹錫云：按孟詵云：麋肉益氣，補中，治腰脚，不與雉肉同食。謹按：肉多無功用，所食亦微補五臟不足氣，多食令人弱房，發脚氣。骨除虚勞至良。可煮骨作汁釀酒飲之，令人肥白美顏色。又云：其角補虚勞填髓。理角法：可五寸截之，中破，炙令黄香後末，和酒空腹服三錢匕。若卒心痛，一服立差。常服之，令人赤白如花，益陽道。不知何因？與肉功不同爾。亦可煎作膠，與鹿角膠同功。茸，甚勝鹿茸，仙方甚重。又丈夫冷氣及風，筋骨疼痛，作粉長服。又於漿水中研爲泥，塗面令不皺，光華可愛。又常俗人以皮作靴，熏脚氣。

《經驗方》：治老人骨髓虚竭，補益麋茸煎：麋茸五兩，去毛，塗酥炙微黄爲末，以清酒二升，於銀鍋中慢火熬成膏，盛瓷器中。每服半匙，温酒⑭調下，空心食前服。

沈存中《筆談》：麋茸利補陽，鹿茸利補陰，壯骨血，堅陽道，强骨髓。茄⑮茸太嫩長數寸，破之如朽木。端如馬腦紅玉者最善。

驢屎　熬之，主熨風腫癢瘡。屎汁，主心腹卒痛，諸疰忤。尿，主癥癖，胃反吐不止，牙齒痛，水毒。

牝驢尿：主燥水。駃驢尿主濕水，一服五合良。燥水者畫體成字，濕水者不成字。乳，主小兒熱，急黄等。多服使痢。尾下軸垢，主瘧。水洗取汁，和麵如彈丸二枚，作燒餅。瘧未發前食一枚，至發時食一枚，療瘧無久新，發無期者。

禹錫云：按《蜀本》云：味甘，性冷利。療消渴。驢色類多，以烏者爲勝。蕭炳云：驢乳主熱黄，小兒熱，驚邪，赤痢。《日華子》云：乳治小兒癇，客忤，天吊風。

孟詵云：肉主風狂，憂愁不樂，能安心氣。又，頭煑去毛，煮汁以漬麵醞酒，去大風。又，生脂和生椒熟搗，綿裹塞耳，治積年耳聾。狂癲不能語、不識人者，和酒服三升良。皮，覆患瘧人良。又，和毛煎，令作膠，治一切風毒，骨節痛呻吟不止者，消和酒服良。又，骨煮作湯，浴漬身，治歷節風。又，煮

頭汁，令服三二升，治多年消渴，無不差者。又，脂和烏梅爲丸，治多年瘧，未發時服三十丸。又，頭中一切風，以毛一斤炒令黃，投一斗酒中，漬三日。空心細細飲，使醉，衣覆卧取汗。明日更依前服。忌陳倉米、麥麵。

《外臺秘要方》：治反胃。昔幼年經患此疾，每服食餅及羹粥等，須臾吐出。貞觀中，許奉御兄弟及柴、蔣等家，時稱名醫，奉敕令治罄竭所患，竟不能療，漸羸憊，候絶朝夕。忽有一術士云：服驢小便極驗。日服二合，後食唯吐一半，晡時又服二合，人定時食粥，吐即便定。迄至今日午時奏知之。大内中五六人患反胃同服，一時俱差。此藥稍有毒，服時不可過多。盛取尿及熱服二合。病深，七日以來服之，良。後來療人并差。

《衍義》曰：驢肉，食之動風，脂肥尤甚，屢試屢驗。《日華子》以謂止風狂，治一切風，未可憑也。煎膠用皮者，取其發散皮膚之外也，仍須烏者。用烏之意，如用烏鷄子、烏蛇、烏鴉之類。其物雖治風，然更取其水色，蓋以制其熱則生風之義。

獐肉、胞、膏　味甘，平，無毒。主上氣乏氣，咳逆。酒和三合服之，日二。又主馬肺病，蟲顙等病。肉，主久水脹不差、垂死者，作羹臛食之，下水大效。胞，乾之，湯摩如鷄卵許，空腹服，吐諸蠱毒。

陳藏器云：獐脂，主傳尸鬼氣疰忤。銷於酒中服之。亦殺馬漏脊蟲也。唐本先附。

禹錫云：按孟詵云：獐，主服丹石，勞熱，患赤白痢多時不差者，可煮肉，經宿露中，明日空腹和醬食之，一頓即差。又，瘦人可和五味煮食，令人長脂肉肥白。曾服丹石，可時時服之，丹石惡發熱。

《圖經》曰：獐，肥矮，毛微灰色，今惟西北蕃界有之。此中盡人家畜養生息者，入藥不及野駝耳。其脂在兩峰間。其性温。治風下氣，壯力，潤食之極美。貉形如小狐，毛黄褐色，野獸中獐肉最甘美，仍益瘦人。

豺皮　性熱。主冷痹，脚氣，熟之以纏病上，即瘥。唐本先附。

禹錫云：按孟詵云：主疳痢，腹中諸瘡，煮汁飲之，或燒灰和酒服之。其灰傅蜜齒瘡。肉，酸，不可食，消人脂肉，損人神情。《日華子》云：有毒。炙裹軟脚骨，食之能瘦人。

《聖惠方》：治噎病。用狼喉結曝乾杵末，入半錢於飯内，食之妙。

《外臺秘要方》：治瘰癧，狼屎灰傅上。

野駝脂　無毒。主頑痹風瘙，惡瘡瘡毒腫死肌，筋皮攣縮，捥損筋骨。火炙摩之，取熱氣入内，又和米粉作煎餅食之，療痔。勿令病人知。脂在兩峰内。生塞北、河西。家駝爲用亦可。今附。

《圖經》曰：野駝，出塞北、河西，今惟西北蕃界有之。此中盡人家畜養生息者，入藥不及野駝耳。其脂在兩峰間。其性温。治風下氣，壯力，潤食之極美。貉形如小狐，毛黄褐色，野獸中獐肉最甘美，仍益瘦人。又六畜毛蹄甲，皮膚。人亦鮮食之。

主鬼蠱毒，寒熱，驚癇，癲痓狂走。駱駝毛尤良。陶隱居云：六畜，謂馬、牛、羊、猪、狗、鷄也。騾、驢亦其類，毛蹄各出其身之品類中，所主療不必⑯盡同此矣。蘇恭云：駱駝毛蹄甲，主婦人赤白下最善。

《衍義》曰：野駝，生西北界等處，家生者峰、蹄最精，人多煮熟糟啖。糞爲乾末，搐鼻中，治鼻衄。此西番多用，嘗進築於彼，屢見之。

獼猴 味酸，平，無毒。肉，主諸風勞，釀酒彌佳。頭角，主瘴瘧。作湯，治小兒則辟驚，鬼魅寒熱。手，主小兒驚癇口噤。屎，主蜘蛛咬。肉爲脯，主久瘧。皮，主馬疫氣。此物數種者都名寓⑰屬。取色黃、尾長、面赤者是。人家養者，肉及屎并不主病，爲其食息雜，違其本真也。唐慎微續添。

《聖惠方》：治鬼瘧，進退不定。用猢猻頭骨一枚，燒灰末。空心温酒調一錢匕，臨發再服。

六畜毛蹄甲 味鹹，平，有毒。主鬼疰蠱毒，寒熱驚癇，癲痓狂走。駱駝毛尤良。

《圖經》曰：文具野駝脂條下。

陶隱居云：六畜，謂馬、牛、羊、猪、狗、鷄也。騾、驢亦其類，駱駝，方家并少用。且馬、牛、羊、鷄、猪、狗毛蹄，亦以各出其身之品類中，所主療不必同此矣。

《唐本》注云：駱駝毛蹄甲，主婦人赤白帶下最善。

諸血 味甘，平。主補人身血不足。或因患血枯，皮上膚起，面無顏色者，皆不足也。并生飲之。又解諸藥毒、菌毒，止渴，除丹毒，去煩熱，食筋令人多力。

果然肉 味鹹，無毒。主瘧瘴，寒熱，煮食之，亦坐其皮爲褥。似猴，人面，毛如蒼鴨，肋邊堪作褥。《南州異物志》云：交州有果然獸，其名自呼，如猿，白質黑文，尾長過其頭，鼻孔向天，雨以尾塞鼻孔，毛温而細。《爾雅》：蜼，仰鼻而長尾。郭注與此相似也。

諸肉有毒 獸歧尾，殺人，鹿豹文，殺人。羊心有孔，殺人。馬蹄夜目，五月已後食之，殺人。犬懸蹄肉，有毒，殺人，不可食。米瓮中肉，殺⑱人。漏沾脯，殺人。肉中有星如米，殺人。羊脯三月已後，有蟲如馬尾，有毒，殺人。脯曝不燥，火燒不動，入腹不消，久置黍米瓮中，令人氣閉。白馬鞍下肉，食之損人五臟。馬及鹿膳白不可食。乳酪及大酢和食，令人爲血痢。驢、馬、兔肉，妊娠不可食。乳酪煎魚鱠爪和食，立患霍亂。猪、牛肉和食，令人患寸白蟲。諸肉煮熟不飲⑲水，食之成瘕。食兔肉食乾薑，令人霍亂。市得野中脯，多有射罔毒，食諸肉過度，還飲肉汁即消，食腦立銷。

圖經衍義本草卷之二十九

❶膀：晦明軒本作『勞』。
❷痢：晦明軒本作『病』。
❸與：原脱，據晦明軒本補。
❹主：原作『上』，據晦明軒本改。
❺末：原作『米』，據晦明軒本改。
❻坐：晦明軒本作『上』。
❼上：原作『坐』，據晦明軒本改。
❽犴：晦明軒本作『狂』。
❾白：晦明軒本作『自』。
❿皆：原作『背』，據晦明軒本改。
⓫一：晦明軒本作『二』。
⓬脂：原作『指』，據晦明軒本改。
⓭作：晦明軒本作『燒』。
⓮酒：晦明軒本作『水』。
⓯茄：晦明軒本作『茹』。
⓰必：原作『及』，據晦明軒本改。
⓱寓：晦明軒本作『禺』。
⓲殺：原脱，據晦明軒本補。
⓳飲：晦明軒本作『斂』。

圖經衍義本草卷之三十

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

禽部上品

諸雞



丹雄鷄　味甘，微温、微寒，無毒。主女人崩中漏下赤白沃❶，補虚，温中止血，久傷乏瘡，通神，殺毒，辟不祥。頭主殺鬼。東門上者尤良。

白雄鷄：肉，味酸，微温。主下氣，療狂邪，安五臟，傷中消渴。

烏雄鷄：肉，微温。主補中止痛。膽，微寒。主療目不明，肌瘡。心，主五邪。血，主蹉折骨痛及痿痹。肪，主耳聾。腸，主遺溺，小便數不禁。肝及左翅毛，主起陰。冠血，主乳難。胜胵裏黄皮，微寒。主泄利，小便利，遺溺，除熱止渴。屎白，微寒。主消渴，傷寒，寒熱，破石淋及轉筋，利小便，止遺溺，滅瘢痕。

黑雌鷄：主風寒濕痹，五緩六急，安胎血無毒。主中惡腹痛及蹉折骨痛，乳難。翮羽，主下血閉。

黄雌鷄：味酸、甘，平。主傷中消渴，小便數不禁，腸澼泄利，補益五臟絶❷傷，療勞益氣。肋骨，主小兒羸瘦，食不生肌。

鷄子：主除熱火瘡，癇痙。可作虎魄神物。卵白，微寒。療目熱赤痛，除心下伏熱，止煩滿咳逆，小兒下泄，婦人産難，胞衣不出，醯漬之一宿，療黄疸，破大煩熱。卵中白皮，主久咳結氣，得麻黄、紫菀和服之，立已。鷄白蠹肥脂生朝鮮平澤。

禹錫云：按《日華子》云：朱雄鷄

冠血，療白癜風。糞，治白虎風并傅風痛。白雄鷄，調中，除邪，利小便，去丹毒。烏雄鷄，温，無毒。止肚痛，除風濕麻痹，補虚羸，安胎，治折傷并癰疽。主署竹木刺不出者。諸鷄肫胵，平，無毒。止泄精并溺血，崩中，帶下，腸風，瀉痢，此即是肫肉黄皮。無毒。安心定志，除邪辟惡氣，治血邪，破心中宿血及治癰疽，排膿補新血，補産後虚羸，益色助氣。膽，治疣目、耳瘡瘡，日三傅。腸，治遺尿并小便多。糞，治中風失音，疾❸逆，消渴，破石淋，利小腸，餘瀝，傅瘡瘍，滅瘢痕。炒❹服，治小兒客忤，蠱毒。翼，治小兒夜啼，安席下，勿令母知。窠中草，治頭瘡白禿，和白頭翁草燒灰，猪脂傅。黄雌鷄，止勞劣，添髓補精，助陽氣，暖小腸，止泄精，補水氣。按《藥性論》云：黑雌鷄，味甘。安胎。

孟詵云：産後血不止，以鷄子三枚，醋半升，好酒二升，煎取一升，分爲四服，如人行三二里，微暖進之。又，新産婦，可取一隻，理如食法，和五味炒熟香，即投二升酒中，封口經宿，取飲之，令人肥白。又，和烏油麻二升，熬令黄香，末之入酒，酒盡極效。黄雌鷄，主腹中水癖水腫。以一隻理如食法，和赤小豆一升同煮，俟豆爛，即出食之。其汁，日二夜一❺，每服四合。補丈夫陽氣，治冷氣。瘦著床者，鷄子❻食之，良。

《經驗方》：治小兒疳痢，肚脹方。用鷄子一個，打破眼子如豆大，納巴豆一粒去皮，膩粉一錢，用五十重紙裹，於飯甑中蒸三度，放冷打破，用鷄子肉同巴粉一時研，入少麝，添日❽糊丸如米粒大。食後、夜卧温湯下二丸、三丸。又方❾：婦人産後口乾舌縮不止。打鷄子一個，煎水一盞衝之，揉❿蓋少緩解之，慎勿割繩斷，抱取，心下猶温者，刺鷄冠血滴口中，即活，男雌女雄。又方：以鷄屎白如棗大，酒半盞，和灌之及鼻中，尤佳。

《子母秘録》：小兒急丹毒不止，以卵殼研，和猪脂傅之。

《譚氏方》：小兒急丹毒不止，以鷄子白和赤小豆末傅之。

《衍義》曰：丹雄鷄，今言赤鷄者

是也，蓋以毛色言之。巽爲鷄爲風，鷄鳴於五更者，日將至巽位，感動其氣而鳴也。體有風，人故不可食。《經》所著其用甚備。産後血暈、身痙直、帶眼、口角與目外眵、向上牽、急不知人。取子一枚，去殼，分清，以荆芥末二錢調服，遂安。仍依次調治。若無他疾，則不須。治甚敏捷，烏鷄子尤善。《經》、《注》皆不言鷄發風。今體有風，人食之無不發作。爲鷄爲巽，信可驗矣。食者當審。

白鵝膏　主耳卒聾。以灌之。毛主射工水毒。肉平，利五臟。

陶隱居云：東川多溪毒，養鵝以辟之，毛羽亦佳，中射工毒者飲血，又以塗身，鵝未必食射工，蓋以威相制爾。乃言鵝不食生蟲，今鵝子亦啖蚯蚓輩。

《唐本》注云：鵝毛，主小兒驚癇及[11]者。又燒灰主噎氣逆上。

《日華子》云：蒼鵝，冷，有毒。發瘡膿。糞可傅蛇蟲咬毒。舍中養能辟蟲、蛇。白鵝，凉，無毒。解五臟熱，止渴。脂潤皮膚。尾罌治聤耳及聾，内之，亦療手足皴。子，補中益氣，不可多食。尾燒灰，酒服下，治目[12]。

孟詵云：脂，可合面脂。肉性冷，不可多食，令人易霍亂，與服丹石人相宜，亦發痼疾。

《肘後方》：誤吞環若指彄，燒鵝羽數枚，末，飲服之。

《子母秘録》：小兒鵝口不乳者，白鵝矢汁灌口中。

鶩肪鶩音牧　味甘，無毒。主風虚寒熱。白鴨屎名通。主殺石藥毒，解結縛，散蓄熱。肉補虚，除熱，和臟腑，利水道。

陶隱居云：鶩即是鴨，鴨有家、有野。又《本經》云：雁肪一名鶩肪，其療小異，此説則專是家鴨爾。黄雌鴨爲補最勝。鴨卵不可合鱉魚食之。凡鳥自死，口不閉者，皆不可食，食之殺人。

《唐本》注云：《别録》云：鴨肪主水腫。血主解諸毒。肉主小兒驚癇。頭主水腫，通利小便。古方療水用鴨頭丸。

孟詵云：白鴨肉，補虚，消毒熱，利水道，及小兒熱驚癇。頭生瘡腫，又和葱、豉作汁飲之，去卒煩熱。又，糞主熱毒痢。又取和鷄子白，封熱腫毒上消。又黑鴨，消中發冷痢，下脚氣。不可多食。子微寒，少食之，亦發氣，令背膊悶。

《食醫心鏡》：治十種水病不差，垂死。青頭鴨一隻，治如食法，細切和米并五味，煮令及[13]熟作粥，空腹食之。又云：主水氣脹滿浮腫，小便澀少。白鴨一隻，去毛、腸，湯洗，饋飯半升，以飯、薑、椒釀鴨腹[14]中，縫定如法蒸，候熟食之。

《衍義》曰：鶩肪，陶隱居云：鶩即是鴨，然有家鴨，有野鴨。陳藏器本草曰：《尸子》云：野鴨爲鳧，家鴨爲鶩。《蜀本》注云：《爾雅》云：野鳧，鶩。注云：鴨也。如此，則鳧、鶩皆是鴨也。又云：《本經》用鶩肪，即家鴨

也。如此所説各不同，其義不定。又按唐·王勃《滕王閣記》云：落霞與孤鶩齊飛。則明知鶩爲野鴨也。勃，唐人亦呼爲越雉，又謂之隨陽之鳥。《南越志》云：鷓鴣雖東西徊翔，然開翅之始，必先南翥。崔豹《古今注》云：其鳴自呼，此不然也。其鳴，若云鈎輈格磔者是矣。亦有一種鳥酷相類，但不作此鳴，不可食。

鷓鴣



鷓鴣　味甘，温，無毒。主嶺南野葛、菌毒、生金毒，及温瘴久，欲死不可差者，合毛熬酒漬服之。生搗取汁服，最良。生江南。形似母鷄，鳴云鈎輈格磔者是。

《圖經》曰：鷓鴣，出江南，今江西、閩、廣、蜀、夔州郡皆有之。形似母鷄，臆前有白丸點，背間有紫色毛，彼人亦呼爲越雉，又謂之隨陽之鳥。《南越志》云：鷓鴣雖東西徊翔，然開翅之始，必先南翥。崔豹《古今注》云：其鳴自呼，此不然也。其鳴，若云鈎輈格磔者是矣。亦有一種鳥酷相類，但不作此鳴，不可食。

《日華子》云：微毒。療蠱氣瘴疾欲死者，酒服之。

禹錫云：按孟詵云：鷓鴣，能補五臟，益心力，聰明。此鳥出南方。不可與竹笋同食，令人小腹脹，自死者不可食。一言此鳥大地之神。每月取一隻饗至尊，所以自死者不可食也。

《衍義》曰：鷓鴣，鄭谷所謂相呼相應湘江闊者，南方專充庖。然治瘴及菌毒，甚效。餘悉如《經》。

禽部中品

雀卵　味酸，温，無毒。主下氣，男子陰痿不起，强之令熱，多精有子。腦主耳聾。頭血主雀盲。雄雀屎，療目痛，決癰癤，女子帶下，溺不利，除疝瘕。五月取之良。



《圖經》曰：雀，舊不著所出州土，今處處有之。其肉大温，食之益陽，冬月者良。卵及腦、頭血，皆入藥。雄雀屎，冬月收之。俗呼爲青丹，頭尖者爲雄屎。

陳藏器云：雀肉起陽道，食之令人有子。冬月者良。臘月收雀屎，俗呼爲青丹。主痃癖諸塊，伏梁。和乾

薑、桂心、艾等爲丸，入腹能爛痃癖。

患癰苦不漬⑯，以一枚傅之，立效。

《日華子》云：雀，暖，無毒。壯陽，益氣，暖腰膝，縮小便，治血崩，帶下。糞，頭尖及成挺者雄。

禹錫云：按耳聾通用藥云：雀腦，平。齒痛通用藥云：雄雀屎，温。

孟詵云：其肉七⑰月以後、正月以前食之。續五臟不足氣，助陰道，益精髓，不可停息。糞和天雄、乾薑爲丸，令陰強。腦，塗凍瘡。

《食療》云：卵白，和天雄末、菟絲子末爲丸，空心酒下五丸。主男子陰痿不起，女子帶下，便溺不利。除疝瘕，決癰腫，續五臟氣。

《外臺秘要》：療齒齲痛有蟲。取雄雀糞，以綿裹塞齒孔内，日一二易之，良。

《肘後方》：療目熱生膚赤白膜。取雀屎細直⑱者，以人乳和傅目，上⑲消爛盡。

《梅師方》：治諸癰不消，已成膿，懼針不得破，令速決。取雀屎塗頭上，即易之。雄屎佳。堅者爲雄。

《簡要濟衆》：婦人吹奶獨勝散：白丁香半兩，搗羅爲散。每服半錢匕，温酒調下，無時服。

《廣利方》：妊娠食雀肉，飲酒，令子心淫亂。又云：妊娠食雀肉及豆醬，令子面多黑皯。

《衍義》曰：雀肉，十月已後、正月已前食之。此蓋取其陰陽静定，未決飲之義。卵亦取第一番者。



伏翼

伏翼　味鹹，平，無毒。主目瞑音冥瘡痛，療淋利水道，明目，夜視有精光。久服令人喜樂，媚好無憂。一名蝙蝠。生泰山川谷及人家屋間。立夏後採，陰乾用。天鼠屎，即伏翼屎也。出合浦山谷。十月、十一月取。蘇恭引《方言》：伏翼，一名仙鼠，故知一物。又云：仙鼠在山孔中，食諸乳石精汁，皆千歲，頭上有冠，淳白，大如鶉、鵲。其大如鶉未白者，皆已百歲，而并倒懸其石乳中。此《仙經》所謂肉芝者也。其屎皆白，如大鼠屎。入藥當用也。

陶隱居云：伏翼目及膽，術家用爲洞視法，自非白色倒懸者，不可服。

陳藏器云：伏翼，主蚊子。五月五日取倒懸者曬乾，和桂、薰陸香爲末，燒之，蚊子去。取其血滴目，令人不睡，夜中見物。

雷公云：凡使，要重一斤者方採之。每修事，先拭去肉上毛，去爪、腸，即留翅并肉、脚及嘴。然後用酒浸一宿，漉出，取黄精自然汁塗之，炙令乾方用。每修事，重一斤一個，用黄精自然汁五兩爲度。

《李氏本草》云：即天鼠。又云：

西平山中別一有天鼠，十一月、十二月取。主⑳女人生子餘疾，帶下病，無子。

《方言》：一名仙鼠，在山孔中食諸乳石精汁，皆千歲。頭上有冠，淳白，大如鶉、鵲。食之令人肥健，長年。其大如鶉，未白者皆已百歲，而并倒懸，其石孔中屎皆白，如大鼠屎，下條天鼠屎，當用此也。其屎灰，酒服方寸匕，主子死腹中。其腦，主女子面皰，服之令人不忘也。

《聖惠方》：治小兒生十餘月後，母㉑又有妊，令兒精神不爽，身體萎瘁，名爲魅病。用伏翼燒爲灰，細研。以粥飲調下半錢，日四五服，效。若炙令香，熟嚼之哺兒，亦效。

《百一方》：治久咳嗽上氣十年、二十年，諸藥治不差方。蝙蝠除翅、足，燒令焦末，飲服之。

《鬼遺方》：治金瘡出血，肉㉒癭。蝙蝠二枚，燒烟盡末，以水調服方寸匕㉓，令一日服盡，當下如水，血消。

《抱朴子》：千歲蝙蝠色白如雪，集則倒懸，蓋腦重也。得而陰乾末服，令人壽千歲也。

《衍義》曰：伏翼屎，合疳藥。白日亦能視，但畏鷙鳥不敢出。此物善服氣，故能壽。冬月不食，亦可驗矣。



雉肉

雉肉　味酸，微寒，無毒。主補中益氣力，止泄痢，除蟻瘻。

《圖經》曰：雉，《本經》不載所出州土，今南北皆有之。多取其充庖厨。

《周禮㉔·庖人》共六禽，雉是其一，亦食品之貴，然有小毒，不宜常食。九月以後至十一月以前食之，即有補，他月則發五痔及諸瘡疥。

陶隱居云：雉雖非辰屬，而正是離禽，午日不可食者，明主於火也。

《唐本》注云：雉，温。主諸瘻瘡。

禹錫云：按孟詵云：山鷄，主五臟氣，喘不得息者，食之發五痔。和蕎麥麵食之生肥蟲。卵不與葱同食，生寸白蟲。又野鷄，久食令人瘦。又九月至十一月食之，稍有補。他月即發五痔及諸瘡疥。不與胡桃同食，菌子、木耳同食發五痔，立下血。

《日華子》云：雉鷄，平，微毒。有痼疾人不宜食。秋冬益，春夏毒。

《食療》：不與胡桃同食，即令人發頭風，如在船車内，兼發心痛。亦不與豉同食。自死者，食之殺人。

《食醫心鏡》：主消渴，飲水無度，小便多，口乾渴。雉一隻，細切，和鹽、豉作羹食。又云：主脾胃氣虚下痢，日夜不止，腸滑不下食。野鷄一隻，如食法，細研，著橘皮、椒、葱、鹽、醬，調和作餛飩熟煮。空心食之。又云：治消渴，舌焦口乾，小便數。野鷄一隻，以五味煮令極熟，取二升半已來，去肉取汁，渴飲之，肉亦可食。又云：治產

後下痢，腰腹痛。野鷄一隻，作餛飩食之。

《衍義》曰：雉，其飛若矢，一往而墮，故今人取其尾置船車上，意欲如此快速也。漢·吕太后名雉，高祖字之曰野鷄，其實即鷄屬也。食之，所損多，所益少。

禽部下品

孔雀屎　微寒。主女子帶下，小便不利。

禹錫云：按陳藏器云：孔雀，味鹹，無毒。

《日華子》云：孔雀，凉，微毒。解藥毒、蠱毒。血，治毒藥等，生飲良。糞，治崩中帶下及可傅惡瘡。

《衍義》曰：孔雀[25]不可入目，昏翳人眼。

白鶴　味鹹，平，無毒。血，主益氣力，補勞乏，去風益肺。肫中砂石子，摩服治蠱毒邪。今鶴有玄有黄，有白有蒼。取其白者爲良，他者次之。

《穆天子傳》云：天子至，巨蒐二氏獻白鶴之血，以飲天子。注云：血益人氣力。



烏鴉

烏鴉　平，無毒。臘月者瓦缶泥煨，燒爲灰，飲下。治小兒身疼[26]鬼魅。目睛注目中，蒸勞。臘月者瓦缶泥煨，燒爲灰，飲下。治小兒身疼[26]鬼魅。目睛注目中，通治目也。

《圖經》曰：烏鴉今人多用，而《本經》不著，古方有用其翅羽者。葛洪《肘後》療從高墮下，瘀血脹心，面青短氣者，以烏翅羽七枚，得左翅最良。燒末酒調服之，當吐血便愈。近世方家多用烏鴉之全者，以治急風。其法：臘月捕取，翅羽、嘴、足全者，泥缶固濟，大火燒煅入藥，烏犀丸中用之。

《聖惠方》：治土蜂癆。以鴉頭燒灰，細研，傅之。



雄鵲

雄鵲肉　味甘，寒，無毒。主石淋，消結熱。可燒作灰，以石投中散解者，是雄也。

《圖經》曰：雄鵲，舊不著所出州土，今在處有之。肉，主風，大小腸澼，四肢煩熱，胸膈痰結，婦人不可食。是雄也。

《經》云：燒作灰，以石投中散[27]解者，

陶隱居云：五月五日鵲腦，入術家用。一名飛駁烏。烏之雌雄難別，

舊云其翼左覆右是雄，右覆左是雌。又燒毛作屑納水中，沉者是雄，浮者是雌。今云投石，恐止是鵲，餘鳥未必爾。

陳藏器云：雄鵲子，下石淋，燒作灰，淋取汁飲之，石即下。

禹錫云：按《日華子》云：雄鵲，涼。主消渴疾。巢，多年者，療癲狂鬼魅及蠱毒等，燒之，仍呼祟物名號。亦傅瘻瘡，良。



鸛鵒

《圖經》曰：鸛鵒屎，《本經》不載所出州土，今水鄉皆有之。此鳥胎生，從口中吐子，如兔子類。故杜臺卿《淮賦》云：此鳥吐子於八九，鵂鶹銜翼而低昂。是也。產婦臨蓐令執之，則易生。其屎多在小㉘石上，紫色如花，就石上刮取用之。南人用治小兒疳，既乾碾爲末，炙猪肉點與啖，有奇功。

陶隱居云：溪谷間甚多見之，當自取其屎，擇用白處。市賣不可信。骨亦主魚鯁。此鳥不卵生，口吐其子，獨爲一異。

《日華子》云：冷，微毒。療面瘢疵及湯火瘡痕。和猪脂調傅丁瘡。

杜臺卿㉙《淮賦》云：鸛鵒吐子於八九，鵂鶹銜翼而低昂。

《聖惠方》：治鼻面酒皶疱。用鸛㉜鵒糞二合研，以臘月猪脂和，每夜傅之。

《孫真人方》：治噎欲發時，銜此鳥嘴，遂下。《外臺秘要》同。

《衍義》曰：鸛鵒，陶隱居云：此鳥不卵生，口吐其子。今人謂之水老鴉，巢於大木，群集㉙，宿處有常，久則木枯，以其糞毒也。懷妊者不敢食，爲其口吐其子。陳藏器復云：使易產，臨時令產婦執之，與陶相戾。嘗官於澧州，公宇後有大木一株，其上有三四十巢。日夕觀之，既能交合，兼有卵殼布地，其色碧。豈得子吐口中？是全未考尋，可見當日聽人之誤言也。

啄木鳥　平，無毒。主痔瘻，及牙齒疳蟲蚘牙。燒爲末，納牙齒孔中，不過三數。此鳥有大有小，有褐有斑，褐者是雌，斑者是雄，穿木食蠹。《爾雅》云：鴷，斫木。《荊楚歲時記》云：野人以五月五日得啄木貨之。主齒痛。《古今異傳》云：本雷公採藥吏，化爲此鳥。《淮南子》云：斫木愈齲信哉。又有青黑者，黑者頭上有紅毛，生山中，土人呼爲山啄木，大如鵲。

姚大夫：治瘻有頭，出膿水不止。以啄木一隻燒灰，酒下二錢匕，立差。

《深師方》：治蛀牙有孔竅處，以啄木鳥舌尖綿裹，於痛處咬之。

慈鴉　味酸、鹹，平，無毒。補勞治瘦，助氣止咳嗽。骨蒸羸弱者，和五味淹炙食之，良。慈鴉似烏而小，多群飛作鴉鴉聲者是。北土極多，不作膻臭也。今謂之寒鵲[34]。

《食療》云：主瘦病，咳嗽，骨蒸者，可和五味淹炙食之，良。其大鴉不中食，肉澀，只能治病，不宜常食也。以目睛汁滴眼中，則夜見鬼神。又神通目法中亦要用此物。又《北帝攝鬼籙》中，亦用慈鴉卵。

雁肪　味甘，平，無毒。主風攣拘急偏枯，氣不通利。久服長毛髮鬚眉，益氣不肌[35]，輕身耐老。一名鶩肪。生江南池澤。取無時。

《唐本》注云：雁喉下白毛，療小兒癇有效。夫雁爲陽鳥，冬則南翔，夏則北徂，時當春夏，則尋[36]育於北，豈謂北人不食之乎？然雁與燕相反，燕來則雁往，燕往則雁來，故《禮》云：秋鴻雁來，春玄鳥至。

《衍義》曰：雁，人之不食者，謂其知陰陽之升降，分長少之行序。世或謂之天厭，亦道家之三[37]說爾，食之則治諸疾[38]。《唐本》注曰：雁爲陽鳥，其義未盡。茲蓋得中和之氣，熱則即北，寒則即南，以就和氣。所以爲社[39]幣者，一以取其信，二取其和也。

燕屎　味辛，平，有毒。主蠱毒鬼疰，逐不祥邪氣，破五癃，利小便。生高山平谷。

陶隱居云：燕有兩種，有胡、有越。紫胸輕小是越燕，不入藥用[40]；胸斑黑，聲大是胡燕。俗呼胡燕爲夏候，其作窠喜長，人言有窠[41]一疋絹者，令家富。窠亦入藥用，與屎同，多以作湯浴，療小兒驚邪。

《唐本》注云：《別録》云，胡燕卵[42]，主水浮腫。肉，出痔蟲。越燕屎亦療痔，殺蟲，去目翳。

天鼠屎　味辛，寒，無毒。主面癰腫，皮膚洗洗時痛，腹中血氣，破寒熱積聚，除驚悸，去面黑皯。一名鼠法，一名石肝。生合浦山谷。十月、十二月收。惡白蘞、白薇。

《唐本》注云：《李氏本草》云：即伏翼屎也。伏翼條中不用屎，是此明矣。《方言》名仙鼠，伏翼條已論也。今按一名夜明砂。

鷹屎白　主傷撻滅瘢。

《藥性論》云：鷹屎，臣，微寒，有小毒。主中惡。又，頭燒灰，和米飲服之。

《衍義》曰：鷹屎白兼他藥用之，作潰虛積藥。治小兒奶癖黄。

鴟頭　味鹹，平，無毒。主頭風眩顛倒，癇疾。鴟，尺脂切。

陶隱居云：即俗人呼爲老鴉者。一名鳶。又有雕、鴞，并相似而大。雖不限雌雄，恐雄者當勝。今鴟頭酒用，當微炙，不用蠹蟲者。

鸂鶒　味甘，平，無毒。治驚邪。食之，主短狐。可養，亦辟之。今短狐

處多有鸂鶒，五色，尾有毛如船舵，小如鴨。《臨海異物志》曰：鸂鶒，水鳥，食短狐。在山澤中無復毒氣也。又杜臺卿《淮賦》云：鸂鶒尋邪而逐害。是也。新補。

斑鶴　味甘，平，無毒。主明目。多食其肉，益氣，助陰陽。一名斑鳩。范方有斑鳩圓。是處有之。春分則化爲黃褐候[43]，秋分則化爲斑鶴。又有青鶴，平，無毒。安五臟，助氣虛損，排膿，治血，并一切瘡癰癱瘻。又名黃褐侯[44]。新補。

《衍義》曰：斑鶴，斑鳩也。嘗養之數年，并不見春秋分化。有有斑者，有無斑者，有灰色者，有小者，有大者。有此數色，久病虛損，人食之補氣。雖有其用即一也。

練鵲　味甘，温、平，無毒。益氣，治風疾。冬春間取，細剉，炒令香，袋盛於酒中浸。每朝取酒温服之。似鸛鶴小，黑褐色，食槐子者佳。

鴝鵒肉　味甘，平，無毒。主五痔，止血。炙食，或爲散飲服之。

《唐本》注云：鳥似雕而有幘者是也。

禹錫云：按《日華子》云：治嗽及吃噫下氣，炙食之，作妖可通靈。眼睛和乳點眼，甚明也。

鸛骨　味甘，無毒。主鬼蠱，諸疰毒，五尸，心腹疾。

陶隱居云：鸛亦有兩種：似鵠而巢樹者爲白鸛；黑色曲頸[45]者爲烏鸛。今宜用白者佳。

《衍義》曰：鸛，頭無丹，項無烏帶，身如鶴者是。兼不善唳，但以喙相擊而鳴，作池養魚、蛇以哺子之事，豈可垂後世？此禽多在樓殿吻[46]土作窠，日夕人觀之，故知其未審耳。磐石條中亦著。

白鴿　味鹹，平，無毒。肉，主解諸藥毒，及人、馬久患疥。屎，主馬疥一云犬疥。鳩類也。鴿、鳩類翔集屋間，人

百勞　平，有毒。毛，主小兒繼病。繼病，母有娠乳兒，有[48]病如瘧痢，他日亦相繼腹大，或差或發。他人相近，亦能相繼。北人未識此病。懷妊者取毛帶之。又取其蹋枝鞭小兒，令速語。鄭禮注云：鵙，博勞也。

《楚詞》云：左見兮鳴鵙，言其鳴惡也。

《白澤圖》云：屋間鬥，不祥。

鶉　補五臟，益中續氣，實筋骨，耐寒温，消結熱。小豆和生薑煮食之，止泄痢。酥煎，偏令人下焦肥。與猪肉同食，令人生小黑子。又不可和菌子食之，令人發痔。四月已前未堪食，是蝦蟆化爲也。新補。

《衍義》曰：鶉有雌雄，從卵生。何言化也，其説甚容易。嘗於田野屢得其卵。初生謂之羅鶉，至初秋謂之早秋，中秋已後謂之白唐。然此物四名，當悉書之。小兒患疳及下痢五色，旦旦食之，有效。

鶉鵝嘴　味鹹，平，無毒。主赤白久痢成疳者，燒爲黑末，服一方寸匕。煮取汁飲亦佳。今之翠鳥是也，有大小，小者名魚狗，大者名翠，取其尾爲飾。亦有白者，俱能水上取魚，鳥大如蒼鵝。頤下有皮袋，容一二升物，展縮由袋，中盛水以養魚。一名逃河。身是水沫，惟胸前有兩塊肉，如拳。云昔爲人竊肉入河，化爲此鳥。今猶有肉，因名逃河。《詩》云：維鵜在梁，不濡其咮[49]。鄭云：鵜鶘咮，喙也。言愛其嘴。新補。

鴛鴦　味鹹，平，小毒。肉，主諸瘻疥癬病，以酒浸，炙令熱，傅瘡上，冷更易。食其肉，令人患大風。

《食療》云：其肉，主瘻瘡，以清酒炙食之。則令美麗。又，主夫婦不和，作羹臛，私與食，即立相憐愛。

陽烏鸛　注：陶云：陽烏是鸛。按二物殊不似，陽烏身黑，頸長白，殊小鸛嘴。主惡蟲咬作瘡者，燒爲末，酒下。亦名陽鴉。出建州。

魚狗　味鹹，平，無毒。主鯁及魚骨入肉，不可出，痛甚者，燒令黑爲末，頓服之。煮取汁飲亦佳。今之翠鳥是也，有大小，小者名魚狗，大者名翠，取其尾爲飾。亦有白者，俱能水上取魚，故曰魚狗。《爾雅》云：竭，天狗。注云：小鳥青似翠，食魚，江東呼爲魚狗。穴土爲窠。

百舌鳥　主蟲咬，炙食之。亦主小兒久不語。又取其窠及糞，塗蟲咬處。今之鶯，一名反舌也。

布穀脚、腦、骨　令人夫妻相愛。五月五日收帶之各一，男左女右。云置水中，自能相隨，未試。江東呼爲郭公，北人云撥穀，一名獲穀，似鷂，長尾。《爾雅》云：鳴，鳩。注云：今之布穀也，牝牡飛鳴，以翼相拂。《禮記》云：鳴鳩拂其羽。鄭注云：飛且羽相擊。

杜鵑　初鳴先[50]聞者，主離別。學其聲，令人吐血。於厠溷上聞者不祥。

厭之法，當爲狗聲以應之，俗作此説。按《荆楚歲時記》亦云有此言，乃復古今相會。鳥小似鷂，鳴呼不已。《蜀王本紀》云：杜宇爲望帝。《異苑》云：杜鵑先鳴者，則人不敢學其聲，有妻，乃亡去，蜀人謂之望帝。《楚辭》云：鶗鴂鳴而草木芳，人云人山行，見一群，聊學之，嘔血便殞。口出血，聲始止，故有嘔血之事也。

圖經衍義本草卷之三十

❶沃：原作『治』，據晦明軒本改。
❷絶：晦明軒本『絶』上有『續』字。
❸疾：晦明軒本作『痰』。
❹炒：原作『妙』，據晦明軒本改。
❺日二夜一：原作『日一療一』，據晦明軒本改。
❻鷄子：晦明軒本作『漸漸』。
❼動：原作『治』，據晦明軒本改。
❽日：晦明軒本作『麵』。
❾又方：晦明軒本作『經驗后方』。
❿揉：晦明軒本作『碟』。
⓫及：晦明軒本作『極』。
⓬目：晦明軒本作『唾』。
⓭及：晦明軒本作『極』。
⓮腹：原作『置』，據晦明軒本改。
⓯大：晦明軒本作『亦』。
⓰漬：原作『須』，據晦明軒本改。
⓱七：晦明軒本作『十』。
⓲直：原作『真』，據晦明軒本改。
⓳上：晦明軒本作『自』。
⓴主：原作『生』，據晦明軒本改。
㉑母：原作『用』，據晦明軒本改。
㉒肉：晦明軒本作『内』。
㉓匕：原脱，據晦明軒本補。
㉔禮：原作『初』，據晦明軒本改。
㉕雀：晦明軒本『雀』下有『尾』字。
㉖身疼：晦明軒本作『癇及』。
㉗散：原作『教』，據晦明軒本改。
㉘主：原作『土』，據晦明軒本改。
㉙小：晦明軒本作『山』。
㉚既：晦明軒本作『蛔』，屬上讀。
㉛卿：原作『即』，據晦明軒本改。
㉜鷓：原脱，據晦明軒本補。
㉝集：原作『葉』，據晦明軒本改。
㉞鵲：晦明軒本作『鴉』。
㉟肌：晦明軒本作『饑』。
㊱尋：晦明軒本作『孳』。
㊲三：晦明軒本作『一』。
㊳疾：晦明軒本作『風』。
㊴社：晦明軒本作『禮』。
㊵用：原作『紫』，據晦明軒本改。
㊶窠：晦明軒本作『容』。
㊷卵：原作『非』，據晦明軒本改。
㊸候：晦明軒本作『侯』。
㊹侯：晦明軒本『侯』下有『鳥』字。
㊺頸：原作『頭』，據晦明軒本改。
㊻吻：晦明軒本作『吻』，按疑當作『叨』。
㊼懸：晦明軒本作『延』。
㊽有：晦明軒本『有』上有『兒』字。
㊾味：原作『味』，據晦明軒本改。
㊿先：原作『北』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之三十一

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

蟲魚部上品

石蜜



石蜜　味甘，平，微温，無毒。主心腹邪氣，諸驚癇痙，安五臟諸不足，益氣補中，止痛解毒，除衆病，和百藥，養脾氣，除心煩，食飲不下，止腸澼，肌中疼痛，口瘡，明耳目。久服强志輕身，不饑不老，延年神仙。一名石飴❶。生武都山谷及諸山石中。色白如膏者良。

《圖經》曰：蜜，《本經》作石蜜，蘇恭云當去石字，生武都山谷、河源山谷及諸山中，今蜀❷、江南、嶺南皆有之。而宣、歙、唐、鄧、伊、洛間尤多。石蜜即崖蜜也。其蜂黑色，似虹，作房於巖崖高峻處，或石窟中，人不可到。但以長竿刺令蜜出，以物承之，多者至三四石，味醎，色緑，入藥勝於他蜜。

《藥性論》云：白蜜，君。治卒心痛及赤白痢，水作蜜漿，頓服一碗止；又生薑汁、蜜各一合，水和頓服之。又長服之，面如花色，仙方常服，面如花紅，神仙方中甚貴。治口瘡，浸大青葉含之。

陶隱居云：石蜜即崖蜜也，高山巖石間作之，色青赤，味❸小醎，食之心煩，其蜂黑色似虹。又木蜜，呼爲食蜜，懸樹枝作之，色青白。樹空及人家養作之者亦白，而豐❹厚味美。凡蜂作蜜，皆須人小便以釀諸花，乃得和熟，狀似作飴須蘗也。

陳藏器云：蜜，主牙齒疳蟨，唇口瘡，目膚赤障，殺蟲。

雷公云：凡煉蜜一斤，只得十二兩半，或一分是數。若火少、火過，并用不得。

《食療》云：微温。主心腹邪氣，諸驚癇，補五臟不足氣。益中止痛，解毒。能除衆病，和百藥，養脾氣，除心煩悶，不能飲食。治心肚痛，血刺腹痛及赤白痢，則生搗地黄汁，和蜜一大匙服，即下。又，長服之，面如花色，仙方中甚貴此物。若覺熱，四肢不和，即服蜜漿一碗，甚良。又能止腸澼，除口瘡，明耳目，久服不饑。又，點目中熱膜，家養白蜜爲上，木蜜次之，崖蜜更次。

《孫真人食忌》云：七月勿食生蜜，若食則暴下，發霍亂。

《産書》云：治産後渴。蜜不計多少煉過，熟水温調服，即止。

《外臺秘要方》：比歲有病天行發斑❺瘡，頭面及身，須臾周匝，狀如火瘡，皆戴白漿，隨決隨生。不即療，數

日必死。差後瘡瘢黯，一歲方滅，此惡毒之氣。世人云：建武中，南陽擊虜，仍呼爲虜瘡。諸醫參詳療之方，取好蜜通抹瘡上，以蜜煎升麻，數數拭之。

《傷寒類要方》：陽明病，自汗者，若小便自利，此爲津液内竭，雖爾，不可攻之，當須自欲大便，宜蜜煎導以通之。取蜜七合，於銅器中微火煎可丸，捻作一挺，如指許大，得冷以納穀道中，須臾必通矣。

《葛氏方》：食諸魚骨鯁、雜物鯁。以好蜜匕抄，稍稍服之，令下。

《梅師方》：治年少髮白。拔去白髮，以白蜜塗毛孔中，即生黑者。髮不生，取梧桐子搗汁塗上，必生黑者。又方，肛門主肺，肺熱即肛塞腫縮生瘡。白蜜一升，猪膽一枚相和，微火煎令可丸，丸長三寸作挺。塗油内下部，卧令後重。須臾通泄。

《肘後方》：凡有惡毒之瘡，五色無常。蜜和乾薑末傅之。

《衍義》曰：石蜜，《嘉祐本草》石蜜收蟲魚部中，又見果部。新書取蘇恭説，直將石字不用。石蜜既自有本條，煎煉亦自有法，今人謂之乳糖，則蟲部石蜜自是差誤，不當更言石蜜也。《本經》以謂白如膏者良。由是知石蜜字，乃白蜜字無疑。去古既遠，亦文字傳寫之誤，故今人尚言白沙蜜。蓋經久則陳白而沙，新收者惟稀而黄。次條蜜蠟故須别立目，蓋是蜜之房，攻治亦别。至如白蠟，又附於蜜蠟之下，此又誤矣。本是續上文叙蜜蠟之用，及注所出州土，不當更分之爲二。何者？白蠟本條中蓋不言性味，止是言其色白爾。既有黄白二色，今止言白蠟，是取蠟之精英者，在黄蠟直置而不言。黄則蠟陳，白則蠟新，亦是。蜜取

蜂子

味甘，平、微寒，無毒。主風頭，除蠱毒，補虚羸，傷中，心腹痛，大人、小兒腹中五蟲曰吐出者，面目黄。久服令人光澤好顏色，不老，輕身，益氣。大黄蜂子主心腹脹滿痛，乾嘔，輕身益氣。土蜂子主癰腫，嗌音益，喉也痛。一名蜚零。生武都山谷。畏黄芩、芍藥、牡蠣。

陶隱居云：前直云蜂子，即應是蜜蜂子也。取其未成頭足時炒食之。又酒浸以傅面，令面悦白。黄蜂則人家屋上者及侯甕蜂也。

陳藏器《本草》云：蜂子，主丹毒，風疹，腹内留熱，大小便澀，去浮血，婦



蜂子

人帶下，下乳汁，此即蜜房中白如蛹者。其穴居者名土蜂，最大，螫人至死，其子亦大、白，功用同蜜蜂子也。

《日華子》云：樹蜂、土蜂、蜜蜂，凉，有毒。利大小便，治婦人帶下等病。又有食之者，須以冬瓜及苦賈、生薑、紫蘇，以制其毒也。

禹錫云：按陳藏器云：土蜂赤黑色，燒末油和傅蜘蛛咬瘡。此物能食蜘蛛，亦取其相伏也。

蜜蠟　味甘，微温，無毒。主下痢膿血，補中，續絶傷，金瘡，益氣，不饑，耐老。白蠟療久泄澼後重見白膿，補絶傷，利小兒。久服輕身不饑。生武都山谷，生於蜜房、木石間。齊蛤。

《圖經》曰：文具石蜜條下。

陶隱居云：此即蜜蠟爾，生於蜜中，故謂蜜蠟。蜂皆先以此爲蜜蹠音隻，煎蜜亦得之，初時極香軟。人更煮煉，或加少醋、酒，使黄赤，以作燭色爲好。今藥家皆應用白蠟，但取削之，於夏月暴百日許，自然白。卒用之，亦可烊，納水中十餘過，亦白。俗方惟以合療下丸，而《仙經》斷穀最爲要用，今人但嚼食方寸者，亦一日不饑也。

禹錫云：按《藥性論》云：白蠟，使，味甘，平，無毒。主孕婦人胎動，漏下血不絶，欲死。以蠟如鷄子大，煎消三五沸，美酒半斤投之，服之差。主白髮，鑷去，消蠟點孔中，即生黑者。和松脂、杏人、棗肉、茯苓等分合成，食後服五十丸，便不饑，功用甚多。又云：主下痢膿血。

《衍義》曰：文具石蜜條下。





牡蠣　味鹹，平、微寒，無毒。主治女子崩中，止盜汗，除風熱，止痛，治温瘧。又和杜仲服止盜汗。末，蜜丸，服三十丸，令人面光白，永不值時氣。主傷寒寒熱，温瘧洒洒，驚恚怒氣，除拘緩鼠瘻，女子帶下赤白，除留熱在關節榮衛，虚熱去來不定，煩滿，止汗，心痛氣結，止渴，除老血，澼大小腸，止大小便，療泄精，喉痹咳嗽，心脅下痞熱。久服强骨節，延年。一名蠣蛤，一名牡蛤。生東海池澤。採無時。貝母爲之使，得甘草、牛膝、遠志、蛇床良，惡麻黄、吴茱萸、辛夷。

《圖經》曰：牡蠣，生東海池澤，今海傍皆有之，而南海、閩中及通泰間尤多。此物附石而生，磈礧相連如房，故名蠣房讀如阿房之房。一名蠔山。晋安人呼爲蠔莆。初生海邊，才如拳石，四面漸長，有一二丈者，嶄岩如山者。一房内有蠔肉一塊，肉之大小隨房所生，大房如馬蹄，小者如人指面。每潮來，則諸房皆開，有小蟲入，則合之以充腹。海人取之，皆鑿房以烈火逼開之，挑取其肉，而其殼左顧者爲雄，右顧者則牝❻蠣耳。

《藥性論》云：牡蠣，君。主治女子崩中，止盜汗，除風熱，止痛，治温瘧。又和杜仲服止盜汗。末，蜜丸，服三十丸，令人面光白，永不值時氣。主

鬼交精出，病人虛而多熱，加用之，并地黃、小草。

陶隱居云：是百歲雕所化。以十一月採爲好。去肉，二百日成。今出東海、永嘉、晋安皆好。道家方以左顧者是雄，故名牡蠣，右顧則牝蠣爾。生著石，皆以口在上，舉以腹向南視之，口斜向東則是，或云以尖頭爲右顧者，未詳孰是，例以大者爲好。

孟詵云：牡蠣火上炙令沸，去殼食之甚美，令人細肌膚，美顏色。又藥家比來取左顧者，若食之即不揀左右也，可長服之，海族之中惟此物最貴，北人不識，不能表其味爾。

段成式《酉陽雜俎》云：牡蠣言牡，非謂雄也。

《肘後方》：大病差後小勞便鼻衄。牡蠣十分，石膏五分，搗末。酒服方寸七，日三四，亦可蜜丸如梧桐子大，服之。

《經驗方》：治一切渴。大牡蠣不計多少，於臘日、端午日，黃泥裹煅通赤，放冷取出，爲末。用活鯽魚煎湯調下一錢匕，小兒服半錢匕，只兩服差。

《海藥》云：按《廣州記》云：出南海水中。主男子遺精，虛勞乏損，補腎正氣，止盜汗，去煩熱，治傷熱疾，能補養安神，治孩兒驚癇。久服輕身。用之，炙令微黃色，熟後研令極細，入丸散中用。

《勝金方》：治甲疽，弩肉裹甲，膿血疼痛不差。牡蠣頭厚處，生研爲末。每服二錢，研靛花酒調下。如癰盛已潰者，以末傅之，乃更服藥，并一日三服。

《初虞世方》：治癰，一切腫未成膿，未破甚效如神。牡蠣四兩，甘草二兩，爲末。每服一大錢，食後臘茶同點，日三。

《集驗方》：治瘰癧發頸項，破、拔毒。牡蠣白者爲細末，水調塗，乾更塗。

《衍義》曰：牡蠣須燒爲粉用，兼以麻黃根等分同搗，研爲極細末，粉盜汗及陰汗。本方使生者，則自從本方。

左顧，《經》中本不言，止從陶隱居説。其《酉陽雜俎》已言：牡蠣言牡，非爲雄也。且如牡丹，豈可更有牝丹也？今則合於地，人面向午位，以牡蠣頂向子，視之口，口在左者爲左顧。此物本無目，如此焉得更有顧眄也。

龜甲　味鹹、甘，平，有毒。主漏下赤白，破癥瘕痕痃、五痔陰蝕，濕痹四肢重弱，小兒囟不合，頭瘡難燥，女子陰瘡，及驚恚氣心腹痛，不可久立，骨中寒熱，傷寒勞復，或肌體寒熱欲死，以作湯，良。久服輕身不饑。益氣資智，亦使人能食。一名神屋。生南海池澤及湖水中。採無時。勿令中濕，中濕即有毒。惡沙參、蜚蠊。

《圖經》曰：文具秦龜條下。

《藥性論》云：畏狗膽，無毒。燒灰治小兒頭瘡不燥。骨帶入山令人不迷。血治脱肛。灰治脱紅。

陶隱居云：此用水中神龜，長一尺二寸者爲善。厭可以供卜，殼可以充藥，亦入仙方。用之當炙。生龜溺甚療久嗽，亦斷瘧。肉作羹臛，大補而

多神靈，不可輕殺。書家載之甚多，此不具説也。

蕭炳云：殼主風脚弱，多灸之，末，酒服。

《日華子》云：卜龜小者，腹下可灸之，末，酒服。主温瘴十❼，鑽遍者，名敗龜。治血麻痹。入藥酥炙用，又名敗將。

《食療》云：温，味酸。主除温瘴氣，風痹，身腫，踒折。又，骨帶入山林中，令人不迷路。其食之法，一如鱉法也。其中黑色者，常啖蛇，不中食之，其殼亦不堪用。

《經驗方》：治産後産前痢。敗龜一枚，用米醋炙，搗爲末，米飲調下。

《抱朴子》云：千歲靈龜五色具焉，以羊血浴之，乃剔取其甲，炙搗，服三❽寸匕，日三盡一具。

《衍義》曰：文具秦龜條下。

秦龜　味苦，無毒。主除濕痹氣，身重，四肢關節不可動摇。生山之陰土中。二月、八月取。



秦龜

《圖經》曰：秦龜，山中龜，不入水者是也，生山之陰土中。或云秦以地山陰也。今稱，云生山之陰者是，秦地處處有之。龜甲，水中神龜也，生南海池澤及湖水中，今江湖間皆有之。山中龜，其形大小無定，大者有如碑趺，食草根、竹筍，冬月藏土中，至春而出，遊山谷中。今市肆間人或畜養爲玩，至冬而埋土穴中。然藥中稀用，卜人亦取以占山澤，揭取其甲，亦堪飾器物。《爾雅》所謂山龜者，豈是此歟。

《抱朴子》云：蠃龜啖蛇，南人皆帶蠃龜之尾以辟蛇。蛇中人，刮此物以傅之，其瘡亦便愈。

《衍義》曰：秦龜，即生於秦者。形大小無定，方藥不堪用。龜類雖多，入藥止有兩種爾。又有龗龜，小狹尾長，乃言療蛇毒，以其食蛇故也。用以卜則吉凶正反，帶秦龜前臑乃到切骨，令人入山不迷。廣州有蠃蠵，其血甚療俚人毒箭傷。

陳士良云：龗龜腹下横折，秦人呼爲蠃蠵，山龜是也。肉寒，有毒。主筋脉。凡撲損，便取血作酒食。肉生研厚塗，立效。

《日華子》云：蠃蠵，平，微毒。治中刀箭悶絶，刺血飲便差。皮甲名鼈皮，治血疾，若無生血，煎汁代之，亦可。寶裝飾物。

《海藥》云：謹按《正經》云：生在廣州山谷。其殼，味帶苦，治婦人赤白漏下，破積癥，頑風冷痹，關節鬲氣壅，或經卜者更妙。凡用炙令黄，然後入諸藥中用。

秦地山中多老龜，極大而壽。龜甲即非止秦地有，四方皆有之，但取秦地所出，大者爲勝。今河北獨流釣臺甚多。取龜筒治療，亦入衆藥。止此二種，各逐本條，以其靈於物，方家故用以補心，然甚有驗。

真珠





真珠　寒，無毒。主手足皮膚逆淡，此不可測也。土人採小蚌肉作脯食之，往往得細珠如米者。乃知此池之蚌，隨大小皆有珠矣。而今之取珠多用。河北塘濼中，亦有圍及寸者，色多微紅，珠母與廉州珠母不相類。但牡，云得於海傍，不必是珠池中也。

禹錫云：按《藥性論》云：真珠，君。治眼中翳障白膜，七寶散用磨翳障，亦能墜痰。

《日華子》云：真珠子，安心，明目，注⑩顏色也。

《海藥》云：謹按《正經》云：生南海，石決明産出也。主明目，除面黑，止⑪泄，合知母療煩熱，消渴。以左纏根，治兒子麩豆瘡入眼。蜀中西路女爪⑫亦出真珠，是蚌蛤産，光白甚好，不及舶上彩耀。欲穿須得金剛鑽也。爲藥須久研如粉麵，方堪服餌。研之不細，傷人腑臟。

《外臺秘要方》：療子死腹中方。真珠二兩，爲末，酒調服盡，立出。

《圖經》曰：真珠徑寸已上可服，服之可以長久。酪漿浸之，皆化如水銀，亦可以浮石、水蜂窠、鱉化包彤、蛇黄合之，可以引長三四尺，丸服之，絶穀得長生。

《衍義》曰：真珠，小兒驚熱藥中多用。河北塘濼中，亦有圍及寸者，色多微紅，珠母與廉州珠母不相類。但清水急流處，其色光白；水濁及不流處，其色暗。餘如《經》。

玳瑁



玳瑁　寒，無毒。主解嶺南百藥毒。俚人刺其血飲，以解諸藥毒。大如帽，似龜，甲中有文。生嶺南海畔山水間。

《圖經》曰：玳瑁，生嶺南山水間，今亦出廣南。蓋龜類也。惟腹、背甲皆有紅點斑文，其大者有如盤。入藥須生者乃靈，帶之可以辟蠱毒。凡遇

飲食有毒，則必自摇動，死者則不能，神矣。

禹錫云：按陳士良云：玳瑁，身似龜，首觜如鸚鵡。肉，平。主諸風毒，行氣血，胸膈中風痰，鎮心脾，逐邪熱，利大小腸，通婦人經脉。甲殼亦似肉，同療心風邪，解煩熱。

《日華子》云：破癥結，消癰毒，止驚癇等疾。

陳藏器云：大如扇，似龜，甲有文，餘并同。

《楊氏産乳方》：産乳療中蠱毒。生玳瑁以水磨如濃飲，服一盞日解。

《衍義》曰：玳瑁，治心經風熱，生者入藥，蓋性味全也。既入湯火中，即不堪用，爲器物者是矣，與生熟犀其義同。

桑螵蛸　味鹹、甘，平，無毒。主傷中，疝瘕，陰痿，益精生子，女子血閉腰痛，通五淋，利小便水道。又療男子虚損，五臟氣微，夢寐失精，遺溺。久服益氣養神。一名蝕肬音尤，生桑枝上，螳蜋子也。二月、三月採蒸之，當火炙。不爾令人泄。得龍骨，療泄精。畏旋復花。


桑螵蛸

《圖經》曰：桑螵蛸，治底耳方。用桑螵蛸一個，慢火炙，及八分熟存性細研，入麝香一字爲末。摻在耳内，每用半書⑬字，神效。如有膿，先用綿包子拈去，次後摻藥末入在耳内。

《産書》云：治妊娠小便數不禁。桑螵蛸十二枚，搗爲末，分作兩服，米飲下。《楊氏産乳》同。又方：療小便不通及胞轉。桑螵蛸搗末，米飲服方寸匕，日三。

《衍義》曰：桑螵蛸，自採者真，市中所售者，恐不得盡皆桑中⑭者。《蜀

冷者能止之，止小便利。火炮令熱，空心食之。虚而小便利，加而用之。

陶隱居云：俗呼螳螂爲蚵音石螂，逢樹便産，以桑上者爲好，是兼得桑皮之津氣。市人恐非真，皆令合枝斷取之爾，僞者亦以膠著桑枝之上也。

雷公云：凡使，勿用諸雜樹上生者，螵螵不入藥中用。凡採覓者須桑樹東畔枝上者，採得去核子，用沸漿水浸淘七遍，令水遍沸，於瓷鍋中熬令乾用。勿亂别修事，却無效也。

《經驗方》：治底耳方。用桑螵蛸一個，慢火炙，及八分熟存性細研，入麝香一字爲末。摻在耳内，每用半書⑬字，神效。如有膿，先用綿包子拈去，次後摻藥末入在耳内。

《産書》云：治妊娠小便數不禁。桑螵蛸十二枚，搗爲末，分作兩服，米飲下。《楊氏産乳》同。又方：療小便不通及胞轉。桑螵蛸搗末，米飲服方寸匕，日三。

《衍義》曰：桑螵蛸，自採者真，市中所售者，恐不得盡皆桑中⑭者。《蜀

本圖經》浸泡之法，不若略蒸過爲佳。鄰家有一男子，小便日數十次，如稠米泔色，亦白，心神恍惚，瘦瘁食減，以女勞得之。令服此桑螵蛸散，未終一劑而愈。安神魂，定心志，治健忘，小便數，補心氣。桑螵蛸、遠志、菖蒲、龍骨、人參、茯神、當歸、龜甲醋炙，已上各一兩，爲末。夜卧，人參湯調下二錢，如無桑上者，即用餘者，仍須以炙桑白皮佐之，量多少，可也。行水，意以接螵蛸就腎經。之意如此。然治男女虛損，益精，陰痿，夢失精，遺溺，疝瘕，小便白濁，腎衰不可闕也。

石決明

味鹹，平，無毒。主目障翳痛，青盲。久服益精輕身。生南海。

《圖經》曰：石決明，生南海，今嶺南州郡及萊州皆有之。舊説或以爲紫貝，或以爲鰒魚甲。按紫貝即今人研螺，古人用以爲貨幣者，殊非此類。鰒魚，王莽所食者，一邊著石，光明可愛，自是一種，與決明相近耳。決明殼大如手，小者三兩指，海人亦啖其肉，亦取其殼，清水洗眼，七孔、九孔者良，十孔者不佳。採無時。





石決明

陶隱居云：俗云是紫貝，定小異，如手，明耀五色，内亦含珠。今人皆水漬紫貝，以熨眼，頗能明。此一種，本亦附見在決明條中，既是異類，今爲副品。

《日華子》云：石決明，凉，明目。殼磨障翳。亦名九孔螺也。

《海藥》云：主青盲、内障，肝肺風熱，骨蒸勞極，并良。凡用先以⑮麵裹煨，然後磨去其外黑處并粗皮了⑯，爛搗之，細羅，於乳鉢中再研如麵，方堪用也。

《勝金方》：治小腸五淋。石決明去粗皮甲，研細，如有軟硬物淋，即添朽木細末，熟水調下二錢匕。

《衍義》曰：石決明，《經》云味鹹，即是肉也。人採肉以供饌，及乾致都下，北人遂爲珍味。肉與殼兩可用，方家宜審用之，然皆治目。殼研，水飛，點磨外障翳。登、萊州甚多。

海蛤



味苦、鹹，平，無毒。主咳逆上氣，喘息煩滿，背⑰痛寒熱，療陰痿。一名魁蛤。生東海。蜀漆爲之

使，畏狗膽、甘遂、芫花。

《圖經》曰：海蛤、文蛤，并生東海，今登、萊、滄州皆有之。陶隱居以細如巨勝，潤澤光淨者爲海蛤。云經器以爲海蛤是海中爛殼，久爲風波濤洗，自然圓淨，此有小而久遠者爲佳，不必雁腹中出也。

《藥性論》云：海蚆亦曰海蛤，臣。亦名紫薇。味平⑱，有小毒。能治水氣浮腫，下小便，治嗽逆上氣。瘤癭。

《唐本》注云：此物以細如巨勝，潤澤光淨者好，有粗如半杏人者，不入藥用。亦謂爲豚耳蛤，粗惡不堪也。

蕭炳云：止消渴，潤五臟，治服丹石人有瘡。

《日華子》云：治嘔逆，陰痿，胸脅脹急，腰痛，五痔，婦人崩中帶下病。此即鮮蛤子。雁食後糞中出，有文彩者爲文蛤，無文彩者爲海蛤。鄉人又多將海岸邊爛蛤殼，被風濤打磨瑩滑者，僞作之。

《衍義》曰：海蛤、文蛤，陳藏器所說是。今海中無雁，豈有食蛤糞出者？若蛤殼中有肉時，尚可食，肉既無，焉得更有糞中過數多者？必爲其皆無廉棱，乃有是說。殊不知風浪日夕淘汰，故如是。治傷寒汗不溜，搐却手脚，海蛤、川烏頭各二⑲兩，川山甲二兩，爲末，酒糊和丸，大一寸許，捏扁，置所患足心下。擘葱白蓋藥，以綿⑳纏定。於暖室中，取熱水浸脚至膝上，久則水温，又添熱水，候遍身汗出爲度。凡一二日一次浸脚，以知爲度。

文蛤　味鹹，平，無毒。主惡瘡，蝕五痔，咳逆胸痹，腰痛脅急，鼠瘻大孔出血，崩中漏下。生東海。表有文，取無時。

《圖經》曰：文具海蛤條下。

陶隱居云：海蛤至滑澤，云從雁屎内得之，二三十過方爲良。今人多取相摝，令磨蕩似之爾。文蛤小大而有紫斑，此既異類而同條，若別之，則數多，今以爲附見，而在副品限也。凡有四物如此。

陳藏器云：海蛤，主水癊。取二兩先研二日，漢防己、棗肉、杏仁二兩，葶藶子六兩，熬研成脂爲丸，一服十丸，利下水。

《千金翼方》：治急疳蝕口鼻數日盡，欲死。燒文蛤灰，臘月脂和，塗之。

《衍義》曰：文具海蛤條下。

蠽魚



蠽魚　蠽音禮　味甘，寒，無毒。主濕痹，面目浮腫，下大水，療五痔，有瘡者不可食，令人瘢白。一名鮦魚。生九江池澤。取無時。

《圖經》曰：蠽通作鱧字魚，生九江

池澤，今處處有之。陶隱居云爲公蠣蛇所變，至難死，猶有蛇性。謹按《爾雅》：鱧，鮦。郭璞注云：鱧，鮦也。《詩·小雅》云：魚麗於罶，魴鱧。《毛傳》云：鱧，鮦也。陸機謂《正義》云：諸本或作鱧，鰱。鮦即鮑魚也，似鱧，狹而厚，今京東出呼鱧魚，其實二類也。㉑

陶隱居云：今皆作鱧字，舊言是公蠣蛇所變，然亦有相生者。猶有蛇性。合小豆白煮以療腫滿，甚效。

《唐本》注云：《別録》云，腸及肝，主久敗瘡中蟲。諸魚灰，并主哽噎。至難死，《日華子》云：鯉魚腸，以五味炙貼痔瘻及蛇骭，良久蟲出，即去之。諸魚中，惟此膽甘，可食。

《外臺秘要方》：療患腸痔，每大便常有血。鯉魚鱠，薑齏食之，佳。任性多少，差。忌冷毒物。

《食醫心鏡》云：治十種水氣病不差垂死。鱧魚一頭，重一斤已上，又熟取汁，和冬瓜、葱白作羹食之。又方：治野鷄病，下血不止，腸疼痛。鱧魚一頭，如食法作鱠，蒜齏食之。

《靈苑方》：治急喉閉，逡巡不救者。蠶魚膽，臘月收，陰乾爲末，每服少許，點患處，藥至即差，病深則水調灌之。

《衍義》曰：蠶魚，今人謂之黑鯉魚。道家以謂頭有星爲厭，世有知之者，往往不敢食。又發故疾，亦須忌。

鯚魚



鯚魚 鯚音夷，又音題　味甘，無毒。主百病。

《圖經》曰：鯚魚，舊不著所出州土，今江浙多有之。大首方口，背青黑，無鱗，多涎。其類有三。陶隱居云：即鯷魚也，即鮎魚也。又有鱴魚，相似而大。鮠魚亦相似，色黄而美。三種形性皆相類，而小不同。

陶隱居云：此即鯷音題也，今人皆呼慈音，即是鮎魚，作臛食之，云補。又有鱴魚相似而大；又有鮠五回切魚亦相似，黄而美，益人，其合鹿肉及赤目、赤鬚、無鰓者，食之并殺人；又有人魚，似鯷而有四足，聲如小兒，食之療瘕疾，其膏燃之不消耗，始皇驪山冢中用之，謂之人膏也。荆州、臨沮、青溪至多此魚。

《食療》云：鮎與㉒鱴，大約相似。主諸補益。

《千金翼方》：治刺傷中毒，水燒魚目灰塗之。

《衍義》曰：鯚魚，形少類獺，有四足，腹重墜如囊，身微紫色。嘗剖之，中有三小蟹，又有四五小石塊，如指面許小魚五七枚，然無鱗，與鮎、鮠相類，今未見用者。



鱔魚

鱔魚音善　味甘，大温，無毒。主濕痹氣，補損，補中，益血，療瘨音審脣。五月五日取頭骨燒之，止痢。

陶隱居云：鱔是荇芩根化作之。又云是人髮所化，今其腹中自有子，不必盡是變化也。性熱，作臛食之亦補。而時行病起，食之多復，又善令人霍亂。凡此水族魚蝦之類甚多，其有名者，已注在前條，雖皆可食，而甚損人，故不入藥用。又有食之反能致病者，今條注如後説，凡魚頭有白色如連珠至脊上者、腹中無膽者、頭中無鰓者，并殺人。魚汁不可合鸐鵴肉食之。鯽音秋鱔不可魚不可合猴、雉肉食之。鯉魚子不可合猪肝食合白犬血食之。鯽魚亦爾。青魚鮓不可合生胡荽及生葵并麥醬食之。

陳藏器云：鱔魚主濕痹氣，補損，婦人産後淋瀝，血氣不調，羸瘦，止血，除腹中冷氣腸鳴。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：似鰻鱺魚而細長，亦似蛇而無鱗，有青黄二色，生水岸泥窟中。

孟詵云：鱔魚，補五臟，逐十二風邪。患氣㉓人，常作臛，空腹飽食，便以衣蓋卧少頃，當汗出如白膠，汗從腰脚中出，候汗盡，暖五木湯浴，須忌風一日，更三五日一服。并治濕風。

《聖惠方》：治婦人乳結硬痛。用鱔魚皮燒灰末，空心暖酒調二錢匕。

《衍義》曰：鱔魚，腹下黄，世謂之黄鱔。此尤動風氣，多食令人霍亂，屢見之。向在京師，鄰舍一郎官，因食黄鱔，遂致霍亂吐利，幾至委頓。又有白鱔，稍粗大，色白，二者皆亡鱗。大者長尺餘，其形類蛇，但不能陸行，然皆動風。江陵府西有湖曰西湖，每歲夏秋沮河水漲，即湖水滿溢，冬即復涸。土人於乾土下撅得之，每及二三尺，則有往來之路，中有泥水，水涸又下，水至復出。



鯽魚

鯽魚　主諸瘡，燒以醬汁和塗之，或取猪脂煎用，又主腸癰。頭灰，禹錫等按：《藥對》云：頭，温。主小兒頭瘡，口瘡，重舌，目翳。一名鮒音父魚，合莼作羹，主久赤白痢。

《圖經》曰：鯽魚，《本經》不載所出州土，今所在池澤皆有之。似鯉魚，色黑而體促，肚大而脊隆。亦有大者至重二三斤。性温，無毒。鱗甲中最可食。或云稷米所化，故其腹尚有米色。又有一種背高腹狹小者，名鰿魚，功用亦與鯽魚同，但力差劣耳。又黔

州有一種重唇石鯽魚，亦其類也。

《日華子》云：鯽魚，平，無毒。温中下氣，補不足。作鱠，療腸澼，水穀不調及赤白痢。燒灰以傅惡瘡良。又釀白礬燒灰，治腸風血痢。頭燒灰療嗽。又云：子不宜與猪肉同食。

禹錫等按：《蜀本》云：鯽魚，味甘，温。止下痢，多食亦不宜人。又注云：形亦似鯉，色黑而體促，肚大而脊隆，所在池澤皆有之。

孟詵云：鯽魚，平胃氣，調中，益五臟，和菹作羹食，良。又鯽魚與鱒，其狀頗同，味則有殊。穬米化之，其魚腹尚有米色。寬大者是鯽，背高腹狹小者是鱒，其功不及鯽。子調中，益肝氣。

《食療》云：食之平胃氣，調中，益五臟，和菹作羹食。作鱠食之，斷暴下痢。和蒜食之，有少熱；和薑、醬食之，有少冷。又夏月熱痢可食之，多益。冬月則不治也。骨燒爲灰，傅蜜瘡，蟲三五度差。謹按：其子調中，益肝氣。

《聖惠方》：治小兒腦疳鼻瘡，毛髮作穗，面黄羸瘦，益腦。用鯽魚膽滴於鼻中，連三五日，甚良效。

《外臺秘要方》：治患腸痔，大便常有血。食鯽魚羹及隨意任作飽食。取無時。

《圖經》曰：鯽魚，生九江池澤，今處處有之。即赤鯽魚也。其脊中鱗一道，每鱗上皆有黑小點，從頭數至尾，能下食，虚弱無力，鶻突羹：鯽魚半斤細切，起作鱠，沸豉汁熱投之，著胡椒、乾薑、蒔蘿、橘皮等末，空腹食之。

《衍義》曰：鯽魚，開其腹，内藥燒之，治齒。



鯉魚

鯉魚膽　味苦，寒，無毒。主目熱赤痛，青盲，明目。久服强悍，益志氣。

肉，味甘，主咳逆上氣，黄疸，止渴。生者，主水腫脚滿，下氣。骨，主女子帶下赤白。齒，主石淋。生九江池澤。

出。血，主小兒丹腫及瘡。皮，主癮疹。腦，主諸癇。腸，主小兒肌瘡。

《日華子》云：鯉魚，凉，有毒。肉治咳嗽，療脚氣，破冷氣，痃癖㉔。懷妊人治胎不安，絹裹鱗和魚煮羹，熟後去鱗，食之驗。脂治小兒癇疾驚忤。膽治障翳等。腦髓治暴聾，煮粥服之良。諸溪澗中者，頭内有毒。不計大小，并三十六鱗也。

禹錫云：按大腹水腫通用藥云：鯉魚，寒。《群㉕藥對》云：平。陳士良云：無毒。《藥性論》云：鯉魚膽亦可單用，味大苦。點眼治赤腫翳痛。小兒熱腫塗之。蜀漆爲使。魚燒爲末，治咳嗽，糯米煮粥。

孟詵云：鯉魚白煮食之，療水腫脚滿，下氣，腹有宿癖不可食。又修理，可去脊上兩筋及黑血，毒故也。又天行病後不可食，再發即㉖死。其在沙石中者，毒多在腦中，不得食頭。

《食療》云：膽，主除目中赤及熱毒痛，點之良。肉，白煮食之，療水腫脚滿，下氣。腹中有宿癖不可食，害人。久服天門冬人，亦不可食。刺在肉中，中風水腫痛者，燒鯉魚眼睛作灰，納癖中，汁出即可。謹按：魚血，主小兒丹毒，塗之即差。魚鱗，燒，烟絶，研，酒下方寸匕，破産婦滯血。脂，主諸癇，食之良。

《聖惠方》：治水氣，利小便，除浮腫。用鯉魚一個，重一斤者，治如食法，修事食之。

《外臺秘要方》：《古今録驗㉕》：療魚鯁骨横喉中，六七日不出。取鯉魚鱗、皮合燒作屑，以水服之，則出，未出再服。又方：療水病腫。鯉魚一頭極大者，去頭尾及骨，唯取肉，以水二斗，赤小豆一大升，和魚肉煮，可取二升已上汁，生布絞去滓，頓服盡，如不盡，分爲三服，後服温令暖，服訖當下利，利盡即差。又方：凡腫已潰、未潰者。燒鯉魚作灰，酢和塗之一切腫上，以差爲度。

《千金方》：治暴痢。小鯉魚二枚，燒爲末，米飲服之。大人、小兒俱服得。

《食醫心鏡方》：主肺咳嗽，氣喘促。鯉魚一頭重四兩，去鱗，紙裹火炮，去刺研，煮粥，空腹吃。

《衍義》曰：鯉魚，至陰之物也，其鱗故三十六。陰極則陽復，所以《素問》曰：魚熱中。王叔和曰：熱即生風，食之所以多發風熱，諸家所解并不言。《日華子》云：鯉魚，凉，今不取，直取《素問》爲正。萬一風家更使食魚，則是貽禍無窮矣。

魁蛤

味甘，平，無毒。主痿痹，泄痢便膿血。一名魁陸，一名活東。生東海。正圓兩頭空，表有文，取無時。

陶隱居云：形似紡軠音狂，小狹長，外有縱横文理，云是老蝙蝠化爲，用之至少。而《本經》海蛤，一名魁蛤，與此爲異也。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：形圓長，似大腹檳榔，頭有孔，今出萊州。

鮑魚

味辛、臭，温，無毒。主墜

墮，骲吐猥切蹶，踠折，瘀血、血痹在四肢不散者，女子崩中，血不止。勿令中鹹。

陶隱居云：所謂鮑魚之肆，言其臭也，俗人呼爲鯇魚，字似鮑，又言鹽鯇之以成故也。作藥當用少鹽臭者，不知正何種魚爾？乃言穿貫者亦入藥，方家自少用之。今此鮑魚乃是鯆魚，長尺許，合完淡乾之，而都無臭氣，要自療漏血，不知何者是真？

禹錫云：按《蜀本圖經》云：十月後，取魚去腸，繩穿淡乾之，凡魚皆堪食，不的取一色也。據陶注，作藥當用少鹽，不知正何種魚爾？又據《本經》云勿令中鹹，是知入藥，當少以鹽鯇成之，有鹽則中鹹而不臭，鹽少則味辛而臭矣！古人云：與不善人居，如入鮑魚之肆。謂惡人之行，如鮑魚之臭也。考其實，則今荊楚淡魚，頗臭而微辛，方家亦少用。舊云沔州、復州作之，餘皆不出。審《陶注》及《圖經》與《本經》，即所在皆可作之也。又據鯠魚有口小，背黃，腹白者爲鮑魚，而療治與鯠魚同。補益，主百病。今《圖經》既不的取一色，可淡乾，此之爲是也。補虛勞，稍發疳痼。

時魚　平。

黃魚　平，有毒。發諸氣病，不可多食。亦發瘡疥，動風。不宜和蕎麥同食，令人失音也。

海豚魚　味鹹，無毒。肉主飛尸、蠱毒、瘴癘，作脯食之。一如水牛肉，味小腥耳。

鮫魚　調胃氣，利五臟。和芥子醬食之，助肺氣，去胃家風。消穀不化者，作鱠食，助脾氣，令人能食。患疳痢痢者，不得食。作羹臛食，宜人。其功與鯽魚同。

鱘魚　味甘，平，無毒。主益氣補虛，令人肥健。生江中，背如龍，長一二丈，鼻上肉作脯名鹿頭。一名鹿肉。以鹽炙食。郭注《爾雅》云：鱘魚長二三丈。《顏氏家訓》曰：鱘魚純灰色，無文。古書云：有多用鱘魚字爲鱣，既長二三丈，則非鱣魚明矣。《本經》云：有毒。主血淋。可煮汁飲之。其味雖美，而發諸藥毒。鮓，世人雖重，尤不益人，服丹石人不可食，令人少氣。發一切瘡疥，動風氣。不與乾笋同食，發癰緩風。小兒不與食，結癥瘕及嗽。大人久食，令人卒心痛，并使人卒患腰痛。

鱣魚肝　無毒。主惡瘡疥癬。勿

又以鱔爲鼉，此誤深矣。今明鱔魚，體有三行甲，上龍門化爲龍也。

水龜　無毒。主難産。婦産婦戴之，亦可臨時燒末酒下。出南海，如龜，長二三尺，兩目在側傍。

圖經衍義本草卷之三十一

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

蟲魚部中品

蝟



蝟皮　味苦，平，無毒。主五痔，陰蝕，下血赤白五色，血汁不止，陰腫痛引腰背，酒煮殺之。又療腹痛疝積，亦燒灰爲末，酒服之。生楚山川谷田野。取無時，勿使中濕。得酒良，畏桔

❶飴：原作『胎』，據晦明軒本改。
❷蜀：晦明軒本『蜀』上有『川』字。
❸味：原作『朱』，據晦明軒本改。
❹豐：晦明軒本作『濃』。
❺發斑：原作『瘢發』，據晦明軒本改。
❻牝：原作『牡』，據晦明軒本改。
❼十：晦明軒本作『卜』。
❽三：晦明軒本作『方』。
❾地：晦明軒本作『池』。
❿注：晦明軒本作『駐』。
⓫止：原作『上』，據晦明軒本改。
⓬爪：晦明軒本作『瓜』。
⓭書：晦明軒本無『書』字。
⓮中：晦明軒本作『上』。
⓯以：原作『次』，據晦明軒本改。
⓰了：原作『子』，據晦明軒本改。
⓱背：晦明軒本作『胸』。
⓲平：晦明軒本作『鹹』。
⓳二：晦明軒本作『一』。
⓴綿：晦明軒本作『帛』。
㉑出：晦明軒本作『人猶』二字。
㉒與：原作『魚』，據晦明軒本改。
㉓氣：晦明軒本『氣』上有『惡』字。
㉔瘕：晦明軒本作『癖』。
㉕群：晦明軒本無『群』字。
㉖即：原作『却』，據晦明軒本改。
㉗驗：原脱，據晦明軒本補。

梗、麥門冬。

《圖經》曰：猬皮，生楚山川谷田野，今在處山林中皆有之。狀類猫、豚，脚短多刺，尾長寸餘，人觸近便藏頭足，外皆刺不可嚮爾。惟見鵲則反腹受啄，或云惡鵲聲，故欲掩取之，猶蚌蠙也。此類亦多，惟蒼白色，脚似猪蹄者佳，鼠脚者次。

《藥性論》云：猬皮，臣，味甘，有小毒。主腸風瀉血，痔病有頭，多年不差者，炙末，白飲下方寸匕。燒末，吹，主鼻衄。甚解一切藥力。

陶隱居云：田野中時有此獸，人犯近，便藏頭足，毛刺人，不可得捉，能跳入虎耳中。而見鵲便自仰腹受啄，物有相制，不可思議爾。其脂烊鐵注中，内少水銀，則柔如鉛錫矣。

《日華子》云：開胃氣，止血、汗，肚脹痛，疝氣。脂治腸風瀉血。作猪蹄者妙，鼠脚者次。

孟詵云：猬，食之肥下焦，理胃氣。其脂可主❶五金八石，皮燒灰酒服治胃逆。又煮汁服止反胃。又可五味淹、炙食之。不得食骨，令人瘦小。

《食療》云：平，其肉可食。以五味汁淹、炙食之，良。不得食其骨也。食其骨能瘦人，使人縮小也。謹按：主下焦弱，理胃氣。令人能食。其皮可燒灰，和酒服。及炙令黄，煮汁飲之，主胃逆。細剉，炒令黑，入丸中，治腸風，鼠奶痔，效。主腸風，痔瘦。可煮五金八石。與桔梗、麥門冬反惡。

《外臺秘要方》：治五痔。猬皮方三指大，切，熏黄如棗大，熟艾。右三味，穿地作坑，調和取便熏之，取口中熏黄烟氣出爲佳。火氣稍盡即停，三日將息，更熏之，三度永差。勿犯風冷，羹臛將補，謹❷忌鷄、猪、魚、生冷，二十日後補之。

《千金翼方》：治蠱毒下血。猬皮燒末，水服方寸匕，當吐蠱毒。

《肘後方》：治腸痔大便血，燒猬皮傅之。

《聖惠方》：治鼻衄塞鼻散。用猬皮一大枚，燒末，研。用半錢，綿裹塞鼻。

《衍義》曰：猬皮，取乾皮兼刺用，刺作刷，治紕帛絶佳。此物兼治胃逆，開胃氣有功，從蟲、從胃有理焉。膽治鷹食病。世有養者，去而復來，久亦不去。當縮身藏足之時，人溺之，即開。合穿山甲等分，燒存性，治痔，入肉豆蔻一半，末之，空肚熱米飲調二錢服。隱居所説，跳入虎耳及仰腹受啄之事，《唐本》注見擯，亦當然。



露蜂房　味苦，鹹，平，有毒。主驚癇癒瘛，寒熱邪氣，癲疾，鬼精蠱毒，腸痔，火熬之良。又療蜂毒腫。一名蜂勑音窠。生牂牁山谷。七月七日採，陰乾。惡乾薑、丹參、黄芩、芍藥、牡蠣。

《圖經》曰：露蜂房，生羬羝山谷，今處處山林中皆有之。此木上大黄蜂窠也。大者如甕，小者如桶，其蜂黑色，長寸許，螫牛、馬及人乃至欲死者，用此尤效。人家屋間亦往往有之，但小而力慢，不堪用，不若山林中得風露氣者佳。古今方書治牙齒湯多用之，七月七日採。又云十一月、十二月採者佳，亦解蠱毒，又主乳石發動，頭痛，煩熱口乾，便旋赤少者，取二❸分炙，以水二升，煮取八合，分温再服，當利小便，諸惡毒隨便出。

陶隱居云：此蜂房多在樹腹中及地中，今此曰露蜂，當用人家屋間及樹枝間苞裹者。乃遠舉羬羝洞，未解所以。

《藥性論》云：土蜂房，微毒。治頭痛，煩熱口乾，小不入服食，能治臃腫不消，用醋、水調塗，乾即更易。

《日華子》云：露蜂房，微毒。治牙齒疼，痢疾，乳癰，蜂叮，惡瘡，即煎洗入藥并炙用。

《千金方》：蜂螫人，用蜂房末，猪膏和傅之。《楊氏産乳》：蜂房煎湯洗亦得。

《肘後方》：治若❹鼻中外查瘤，膿水血出。蜂房燒末，酒服方寸匕，日七❺。

《經驗方》：解藥毒上攻，如聖散：蜂房、甘草等分，用麩炒令黄色，去麩爲末。水二碗，煎至八分，一碗令温，臨卧頓服。明日取一❻惡物。

《簡要濟衆方》：治婦人乳癰汁不出，内結成膿腫，名妬❼乳，方：蜂房燒灰，末，每服二錢，水一中盞❽，煎至六分，去滓温服。

《勝金方》：治小兒咳嗽。蜂房二兩净洗，去蜂糞及泥土，以快火燒爲灰。每服一字，飯飲調下。

《廣利方》：治頭痛，煩熱口乾，小便赤少。蜂房十二分炙，水二升，煎取八合，分爲二服。當利小便，諸惡石毒隨小便出之。又方：治熱病後，毒氣衝目痛。蜂房半兩，水二升，煮取一升，重濾洗目，日三四度。治赤白翳。

《集驗方》：治風氣客於皮膚，瘙癢不已。蜂房煎湯洗過，蟬蜕等分，爲末。酒調一錢匕，日三二服。

《子母秘録方》：小兒大小便不通。蜂房燒末，酒服二錢，日二服。

《衍義》曰：露蜂房有兩種，一種小而其色淡黄，窠長六七寸至一尺者，闊二三寸，如蜜脾下垂，一邊是房，多在叢木鬱翳之中，世謂之牛舌蜂。又一種或在高木上，或屋之下，外作固，如三四斗許，小者一二斗，中有窠，如瓠之狀，由此得名。蜂色赤黄，其形大於諸蜂，世謂之玄瓠蜂。《蜀本圖經》言十一月、十二月採者，應避生息之時也。今人用露蜂房，兼用此兩種。

鱉甲　味鹹，平，無毒。主心腹癥瘕堅積，寒熱，去痞，息肉，陰蝕，痔，惡肉，療温瘧，血瘕，腰痛，小兒脊下堅。生丹陽池澤，今處處有之。以嶽州、沅江其甲有九肋者爲勝。取無時，仍生取甲，剔去肉爲好，不用煮脱者，但看有連厭及乾巖便

鱉甲



真，若上兩邊骨出，是已被煮也。古今治癥癖虛勞方中用之最多。婦人漏下五色羸瘦者，燒甲令黃色，篩末，酒服方寸匕，日二。又合訶梨勒皮、乾薑，三物等分爲丸，空腹服三十丸，治癖最良。又醋炙令黃搗末，以牛乳一合，調一匙，朝日服之，主痃氣。其肉食之亦益人，補虛，去血熱。但不可久食，則損人，以其性冷耳。

《藥性論》云：鱉甲，使，惡理石。能主宿食，癥塊痃癖氣，冷痕勞瘦，下氣，除骨熱，骨節間勞熱，結實擁塞。治婦人漏下五色爲末，清酒服之方寸匕，日二服。

陶隱居云：生取甲，剔去肉爲好，不用煮脫者。今看有連厭及乾巖便好，若上有甲，兩邊骨出，已被煮也，用之當炙。夏月剉鱉，以赤莧包置濕地，則變化生鱉。人有裹鱉甲屑，經五月，皆能變成鱉子。其肉亦不足食，多作癥痕。其目陷者，及合鷄子食之，殺人。不可合莧菜食之。其肉⑨下有如王字形者，亦不可食。

《千金翼方》：治丈夫陰頭癰，師帶下，治血痕腰痛。鱉甲，去血氣，破癥結惡血，墮胎，消瘡腫，并撲損瘀血，瘧疾，腸癰。頭燒灰療脫肛。

《日華子》云：鱉，主婦人漏下，羸瘦。

孟詵云：鱉，益氣調中，婦人中春食之美，夏月有腥氣。岳州昌江者爲上。赤足不可食，殺人。

雷公云：凡使，要綠色、九肋、多裙、重七兩者爲上。治氣破塊，消癥，定心，藥中用之。每個寸⑩甲，以六一泥固濟瓶子外⑪了，乾，於大火以物撝於中，與頭醋下火煮之，盡三升醋爲度，仍去裙并肋骨了，方炙乾，然後入藥中用。

《聖惠方》：治久患勞瘧瘴等方，用鱉甲三兩，塗酥炙令黃，去裙爲末。臨發時溫酒調下二錢匕。又方：治小兒尸疰勞瘦，或時寒熱方。用鱉頭一枚，燒灰杵末，新汲水下半錢匕。

《千金方》：治脫肛歷年不愈。死鱉頭一枚，燒令烟絶，杵末。以傅肛上，手按挼之。

《千金翼方》：治久患勞瘧瘴等方，用鱉甲三兩，塗酥炙令黃，去裙爲末。臨發時溫酒調下二錢匕。又方：治小兒尸疰勞瘦，或時寒熱方。用鱉頭一枚，燒灰杵末，新汲水下半錢匕。

《肘後方》：治篤病新起，早勞食飲，多致復欲死。燒鱉甲，服方寸匕。

《楊氏産乳方》：療上氣急滿，坐卧不得方：鱉甲一大兩炙令黃，細搗爲散。取燈心一握，熱水二升，煎取五合。食前服錢匕，食後蜜水服一錢匕。

《衍義》曰：鱉甲，九肋者佳，煮熟者不如生得者，仍以醶醋炙黃色用，《經》中不言治勞，惟蜀本《藥性論》云：治勞瘦，除骨熱，後人遂用之。然

甚有據，亦不可過劑。頭血塗脫肛，又燒頭灰，亦治之。

蟹



蟹　味鹹，寒，有毒。主胸中邪氣熱結痛，喎僻，面腫，敗漆燒之致鼠，解結散血，愈漆瘡，養筋氣。爪，主破胞，墮胎。生伊、洛池澤諸水中。取無時。殺莨菪毒。

《圖經》曰：蟹，生伊、洛池澤諸水中，今淮海、京東、河北陂澤中多有之，伊、洛乃反難得也。八足二螯，大者箱角兩出，足節屈曲，行則旁橫。今人以爲食品之佳味，獨螯獨目及兩目相向者，皆有大毒，不可食。其黃能化漆爲水，故塗漆瘡用之。黃并肉熬末，以內金瘡中，筋斷亦可續。黃并螯燒烟，可以集鼠於庭。爪入藥最多。胡洽療孕婦僵仆，胎轉上搶心困篤，有蟹爪湯之類是也。

陶隱居云：蟹類甚多，蝤音遒蜞音謀音謀、擁劍、彭螖音越皆是，并不入藥。惟蟹最多有用，仙方以化漆爲水，服之長生。以黑犬血灌之二⑫日，燒之，諸鼠畢至。未被霜甚有毒，云食水莨音建所爲，人中之，不即療多死。目相向者亦殺人，服冬瓜汁、紫蘇汁及大黃丸皆得差。海邊又有彭蜞、擁劍，似彭螖而大，似蟹而小，不可食。蔡謨初渡江，不識而啖之，幾死，嘆曰：讀《爾雅》不熟，幾爲勸學所誤。

《日華子》云：螃蟹，涼，微毒。治產後肚痛，血不下，并酒服。筋骨折損傷，生搗，炒署，良。脚爪，破宿血，止產後血閉、肚痛，酒及醋湯煎服，良。又云：蝤蛑，冷，無毒。解熱氣，治小兒痞氣。

孟詵云：蟹，主散諸熱。治胃氣，理經脉，消食。八月輸芒後食好，未輸時爲長未成。就醋食之，利肢節，去五臟中煩悶氣。其物雖形狀惡，食甚宜人。

《百一方》：金瘡方。續筋多取蟹黃及腦并足中肉熬末，納瘡中。

《簡要濟衆方》：小兒解顱不合。生蟹足骨半兩，焙乾，白斂半兩，爲末。用乳汁和，貼骨縫上，以差爲度。

《楊氏產乳方》：妊娠人不得食螃蟹，令兒橫生也。

《衍義》曰：蟹，伊、洛絶少，今多自京師來，京師亦自河北置之。今河北沿邊滄、瀛州等處所出甚多，徐州亦有，但不及河北者。小兒解顱，以螯并白及爛搗，塗顖上，顱合。此物極動風，體有風疾人，不可食，屢見其事。

泊⑬北人取之，當八九月蟹浪之時，直於塘濼岸上，伺其出水而拾之。又夜則以燈火照捕，始得之。時黃與白滿殼，凡收藏十數日，不死亦不食。此物每至夏末秋初，則如蟬蛻解。當日名蟹之意，必取此義。



蚱蟬 蚱音笮，又音側　味鹹、甘，寒，無毒。主小兒驚癇，夜啼，癲病，寒熱，驚悸，婦人乳難，胞衣不出，又墮胎。生楊柳上。五月採，蒸乾之，勿令蠹。

《圖經》曰：蚱蟬，《本經》不載所出州土，但云生楊柳上，今在處有之。陶隱居以爲啞蟬。蘇恭以爲鳴蟬。二說不同。按字書解蚱字云：蟬聲也。《月令》：仲夏之月，蟬始鳴，言五月始有此蟬鳴也。而《本經》亦云五月採，正與《月令》所記始鳴者同時。如此蘇說得之矣。蟬類甚多，《爾雅》云：蜩中最大者爲蟬⑭，馬蜩。郭璞注云：蜩中最大者爲馬蟬。今夏中所鳴者，比衆蟬最大。陶又引《詩》鳴蜩嘒嘒，云是形大而黑，昔人所啖者。又禮冠之飾⑮附蟬者，亦黑而大，皆此類也。

《藥性論》云：蚱蟬，使，味酸。主治小兒驚哭不止，殺疳蟲，去壯熱，治腸中幽幽作聲。又云：蟬蛻，使，主治小兒渾身壯熱，驚癇，兼能止渴。

《唐本》注云：《別録》云，殼名枯蟬，一名伏蜻音育。主小兒癇，女人生子不出。灰服之，主久痢。又云：蚱者，鳴蟬也，主小兒癇，絶不能言。今云啞蟬，啞者則雌蟬也，極乖體用，按諸蟲獸，雄者爲良。

雷公云：味鹹，無毒。

《聖惠方》：治風頭旋。用蟬殼二兩，微炒爲末。非時温酒下一錢匕。

《集驗方》：治風氣客皮膚，瘙癢不已。蟬蛻、薄荷葉等分，爲末。酒調一錢匕，日三服。

《御藥院方》：治頭風目眩。蟬蛻末，飲湯下。

《衍義》曰：蚱蟬，夏月身與聲皆出土中，升高處，背殼拆蟬出。所以皆夜出者，一以畏人，二畏日炙，乾其殼而不能蛻也。至時寒則墜地，小兒蓄之，雖數日亦不須食。古人以謂飲風露，信有之，蓋不糞而溺，亦可見矣。



蟬花　味甘，寒，無毒。主小兒天吊，驚癇癡癎，夜啼心悸。所在皆有，七月採。生苦竹林者良，花出土上。

《圖經》曰：文具蚱蟬條下。

雷公云：凡使，要白花全者，收得後，於屋下東角懸乾，去甲土後，用漿

水煮一日，至夜焙乾，碾細用之。

《衍義》曰：文具蚱蟬條下。



蟌蠐

蟌蠐　味鹹，微温、微寒，有毒。

主惡血，血瘀痹氣，破折血在脅下堅滿痛，月閉，目中淫膚，青翳白膜，療吐血在胸腹不去及破骨踒折，血結，金瘡内塞，産後中寒，下乳汁。一名蟦扶文切蟌，一名肥音肥齊，一名教齊。生河内平澤及人家積糞草中。取無時，反行者良。蜚蠊爲之使，惡附子。

《圖經》曰：蟌蠐，生河内平澤及人家積糞草中，今處處有之。大者有如足大指，以背行，反馱於脚，採無時。

郭璞云：在糞土中者是也。而諸朽木中蠹蟲，形相似，但潔白於糞土中者，即《爾雅》所云：蝤蠐，蝎。又云：蝎，桑蟲。郭云：在木蛄蝑。又云：蝎，近方用之，治眼得效。

中雖通名蝎，所在異者是此也。蘇恭以謂入藥當用木中者，乃與《本經》云生積糞草中相戾矣。

《藥性論》云：蟌蠐，臣。汁，主滴目中，去翳障。主血止痛。

陶隱居云：大者如足大指，以背行，反馱於脚，雜猪蹄作羹，與乳母不出，蟌蠐碎之傅刺上，立出。

《衍義》曰：蟌蠐，此蟲諸腐木根下有之。構木津甘，故根下多有此蟲，其木身未有完者。亦有生於糞土中者，雖肥大，但腹中黑，不若木中者，雖瘦而稍白。生研，水絞汁，濾清飲下之，其芒出著布上，良也。

《百一方》：諸竹木刺得在肉中不浸淫，名火丹，方：取蟌蠐末傅之。

《千金方》：治稻、麥芒入眼。取蟌蠐，以新布覆目上，持蟌蠐從布上摩之，其芒出，著布上。

《外臺秘要方》：《删繁》丹走皮中蠹蟲，俗通謂之蝎，莫知其主療，惟柳⑰樹中者，近方用之，治眼得效。

《本經》亦云：一名蟦蟌。又云：生積糞草中。則此外恐非也，今諸朽樹中蠹蟲，形相似，但潔白於糞土中者，即《爾雅》所云：蝤蠐，蝎。又云：蝎，桑蟲。郭云：在木蛄蝑。又云：蝎，近方用之，治眼得效。

中雖通名蝎，所在異者是此也。蘇恭以謂入藥當用木中者，乃與《本經》云生積糞草中相戾矣。

《藥性論》云：蟌蠐，臣。汁，主滴目中，去翳障。主血止痛。

陶隱居云：大者如足大指，以背行，反馱於脚，雜猪蹄作羹，與乳母不出，蟌蠐碎之傅刺上，立出。

《衍義》曰：蟌蠐，此蟲諸腐木根下有之。構木津甘，故根下多有此蟲，其木身未有完者。亦有生於糞土中者，雖肥大，但腹中黑，不若木中者，雖瘦而稍白。生研，水絞汁，濾清飲下之，其芒出著布上，良也。

《百一方》：諸竹木刺得在肉中不浸淫，名火丹，方：取蟌蠐末傅之。

《千金方》：治稻、麥芒入眼。取蟌蠐，以新布覆目上，持蟌蠐從布上摩之，其芒出，著布上，良也。

《外臺秘要方》：《删繁》丹走皮中蠹蟲，俗通謂之蝎，莫知其主療，惟柳⑰樹中者，近方用之，治眼得效。

《本經》亦云：一名蟦蟌。又云：生積糞草中。則此外恐非也，今諸朽樹中蠹蟲，形相似，但潔白於糞土中者，即《爾雅》所云：蝤蠐，蝎。又云：蝎，桑蟲。郭云：在木蛄蝑。又云：蝎，近方用之，治眼得效。

中雖通名蝎，所在異者是此也。蘇恭以謂入藥當用木中者，乃與《本經》云生積糞草中相戾矣。

《藥性論》云：蟌蠐，臣。汁，主滴目中，去翳障。主血止痛。

陶隱居云：大者如足大指，以背行，反馱於脚，雜猪蹄作羹，與乳母不出，蟌蠐碎之傅刺上，立出。

《衍義》曰：蟌蠐，此蟲諸腐木根下有之。構木津甘，故根下多有此蟲，其木身未有完者。亦有生於糞土中者，雖肥大，但腹中黑，不若木中者，雖瘦而稍白。生研，水絞汁，濾清飲下之⑯，名以蟌字在下，恐此云蟌蠐蟲倒爾。

《唐本》注云：此蟲有在糞聚，或在腐柳樹中者，内外潔白；土糞中者，皮黄内黑黯。形色既異，土木又殊，當以木中者爲勝。採雖無時，亦宜取冬月爲佳。按《爾雅》一名蝎音曷，一名蛣蜣，一名蝤蠐。今按陳藏器《本草》云：蟌蠐，主赤白遊瘴。以物發瘴破碎，蟌蠐汁塗之。

禹錫云：按《蜀本》注云：今據《爾雅》：蟦，蟌蠐。注云：在糞土中。

烏賊魚骨　味鹹，微温，無毒。主

女子漏下赤白經汁，血閉，陰蝕腫痛，寒熱，癥瘕痕，無子，驚氣入腹，腹痛環臍，陰中寒腫，令人有子。又止瘡多膿汁不燥。肉，味酸，平，主益氣强志。

烏賊魚



生東海池澤。取無時。惡白斂、白及、附子。

《圖經》曰：烏賊魚，出東海池澤，今近海州郡皆有之。云：是顯烏所化，今其口脚猶存，頗相似，故名烏鰂，能吸波噀墨以溷水，所以自衛，使水匿不能爲人所害。又云：性嗜烏，每暴水上，有飛烏過，謂其已死，便啄其腹，則卷取而食之，以此得名，言爲烏之賊害也。形若革囊，口在腹下，八足聚生口傍。只一骨，厚三四分，似小舟輕虛而白。又有兩鬚如帶，可以自纜，故別名纜魚。《南越志》云：烏賊有碇，遇風便虬前一鬚下碇而往[19]碇，亦纜之義也。腹中血及膽，正如墨，中以書也，世謂烏賊懷墨而知禮。

《藥性論》云：烏賊魚骨，使，有小毒。止婦人漏血，主耳聾。

陶隱居云：此是顯音剥烏所化作，今其口脚具存，尤相似爾。用其骨亦炙之。其魚腹中有墨，今作好墨用之。

《唐本》注云：此魚骨，療牛、馬目中障翳，亦療人目中翳，用之良也。

陳藏器云：烏賊魚骨，主小兒痢下，細研爲末，飲下之。亦主婦人血瘕，殺小蟲并水中蟲，投骨於井中，蟲死。腹中墨，主血刺心痛，醋摩服之。海人云：昔秦王東游，棄算袋於海，化爲此魚。其形一如算袋，兩帶極長，墨尤在腹也。

孟詵云：烏賊骨，主目中一切翳。細研，和蜜點之。又，骨末治眼中熱淚。

《日華子》云：烏賊魚，通月經。骨療血門[20]，殺蟲。心痛甚者，炒其墨，醋調服也。又名纜魚，鬚脚悉在眼前，風波稍急，即以鬚粘石爲纜。

《食療》云：骨，主小兒、大人下痢，炙令黄，去皮細研成粉，粥中調服之良。其骨能銷一切目中浮翳。細研和蜜點之，妙。又，點馬眼熱泪甚良。久食之，主絶嗣無子，益精。其魚腹中有墨一片，堪用書字。

《聖惠方》：治傷寒熱毒氣攻眼，生赤白翳。用烏賊魚骨一兩，不用夫[21]皮，杵末，入龍腦少許更研令細，日三四度，取少許點之。

《外臺秘要方》：治癧瘍風。取[22]三年醋磨烏賊魚骨，先布磨肉赤[23]，即傅之。

《千金方》：治婦人水户痛[24]。烏賊魚骨燒末，酒下方寸匕，日二[25]服。

《子母秘録方》：治小兒重舌。燒烏賊魚骨和鷄子黄，傅喉及舌上。

《衍義》曰：烏賊魚，乾置。四方人炙食之。又取骨鏤爲鈿。研細，水飛，沉下，比去水，日乾之，熟蜜[26]和得所，點目中翳，緩取效。

鰻鱺魚鰻音曼，鱺音黎　味甘，有毒。主五痔，瘡瘻，殺諸蟲。

鰻鱺魚



《圖經》曰：鰻鱺魚，《本經》不載所出州土，今在處有之。似鱔而腹大，青黃色。云是蛟蜃之類，善攻碕岸，使輒頹弛，近江河居人酷畏之。此魚雖有毒，而能補五臟虛損，久病罷瘵，人可和五味，以米煮食之。患諸瘡痔漏及有風者長食。歙州出一種，背有五色紋，其功最勝。出海中者名海鰻，相類而大，功用亦同。海人又名慈鰻，又名猾狗魚。

陶隱居云：能援樹食藤花，形似鱔，取作臛食之。炙以熏諸木竹，辟蛀蟲。膏，療諸瘻瘡。又有鰍音秋，亦相似而短也。

《日華子》云：海鰻，平，有毒。治皮膚惡瘡疥，疳蟲，痔瘻。又名慈鰻、猾狗魚。又云：鰻魚，平，微毒。治勞補不足，殺傳尸疰氣，殺蟲毒，惡瘡，暖腰膝，起陽，療女人産尸㉗瘡蟲癢。

《聖惠方》：治諸蟲心痛，多吐，四肢不和，冷氣上攻，心腹滿悶。用鰻鱺魚淡炙令熟，令患人三五度食之。又方：治骨蒸勞及腸風下蟲。以魚二斤，治如食法，切作段子入鐺内，以酒三盞煮鹽、醋食。

《經驗方》：治惡瘡。用鮀魚骨作末，入諸色膏藥中相和合，傅上，紙花、甘遂。

《圖經》曰：鮀甲生南海池澤，今江湖中多，即鼉也，形似守宮、陵鯉輩，而長一二丈，背、尾俱有鱗甲，善攻碕岸，夜則出邊岸，人甚畏之。南人食其肉，云色白如鷄，但發冷氣痼疾。其皮亦中冒鼓。其頭骨燒灰，研末，米飲服，主腸風痔疾，甚者入紅鷄冠花末，白礬爲末，和之，空腹服，便差。今醫者少有用黿、鮀甲者。

陳藏器云：主惡瘡，腹内癥瘕。遂爲漁人妻。

《衍義》曰：鰻鱺魚，生剖曬乾，取少許，火上微炙，俟油出，塗白剥風，以指擦之，即時色轉。凡如此五七次用，即愈，仍先於白處微微擦動。

鮀魚甲鮀音駝　味辛，微温，有毒。主心腹癥瘕，伏堅積聚，寒熱，女子崩中，下血五色，小腹陰中相引痛，瘡疥死肌，五邪涕泣時驚，腰中重痛，小兒氣癰疵潰。肉，主少氣吸吸，足不立地。生南海池澤。取無時。蜀漆爲之使，畏狗膽、芫花、甘遂。

甲更佳，炙，酒浸服之，口內涎有毒也。

《藥性論》云：鼈甲，臣，味甘，平，有小毒。主百邪鬼魅，婦人帶下，除腹內血積聚伏堅相引結痛。

孟詵云：鼈，療驚恐及小腹氣疼。

《日華子》云：鼈甲，臣，平，無毒。主五臟邪氣，殺百蟲毒，消百藥毒，續人筋骨。又脂塗鐵燒之便明。淮南王方術內用之。

白殭蠶



白殭蠶　味鹹、辛，平，無毒。主小兒驚癇夜啼，去三蟲，滅黑黯，令人而㉘色好，男子陰瘍病，女子崩中赤白，產後餘痛，滅諸瘡瘢痕。生潁川平澤。四月取自死者，勿令中濕，濕有毒，不可用也。

《圖經》曰：白殭蠶，生潁川平澤，今所在養蠶處皆有之。用自殭死白色而條直者爲佳。四月取，勿令中濕，濕則有毒，不可用。用時仍去綿絲及子，炒過。今醫家用治中風急喉痹欲死者，搗篩爲末，生薑自然汁調灌之，下咽立愈。又合衣魚、鷹屎白等分爲末，用蜜和面膏和塗瘡瘢瘕疵，便滅㉙。

《藥性論》云：白殭蠶，惡桑螵蛸、桔梗、茯苓、茯神、菟薾，有小毒。治口噤發汗，主婦人崩中，下血不止。與衣中白魚、鷹屎白等分，治瘡滅瘢。

陶隱居云：人家養蠶時，有合箔皆殭者，即暴燥都不壞。今見小白色，似有鹽度者爲好。末以塗馬齒，即不能食草，以桑葉拭去乃還食，此明蠶即馬類也。

《日華子》云：殭蠶，治中風失音，并一切風疾，小兒客忤，男子陰癢痛，女子帶下。入藥除綿絲并子盡，勻炒用。又云：蠶蛹子，食，治風及勞瘦。又研，傅蠶瘡、惡瘡等。

《聖惠方》：治風遍身癮瘕，疼痛成瘡。用白殭蠶少許，焙令黃色，細研爲末。用酒服之，立差。又方：主偏、正頭疼并夾腦風，連兩太陽穴疼痛。以白殭蠶細研爲末，溫茶調服方寸匕。

《小兒宮氣方》：主小兒口瘡通白者，及風疳瘡蝕透者。以白殭蠶炒令黃色，拭去蠶上黃肉、毛，爲末，用蜜和傅之，立效。

《斗門方》：治中風急喉痹欲死者。用白殭蠶以火焙乾令黃色，搗篩爲末。用生薑自然汁調灌。

《千金方》：主婦人崩中，下血不止。以衣中白魚、殭蠶等分，爲末。以井花水服之，日三服，即差。

《衍義》曰：白殭蠶，然蠶有兩三番，惟頭番殭蠶最佳，大而無蛆。治小兒驚風，白殭蠶、蝎梢等分，天雄尖、附子尖共一錢，微炮過，爲細末。每服一字或半錢，以生薑溫水調，灌之。其蠶蛾，則第二番者，以其敏於生育。







原蠶蛾　雄者，有小毒。主益精氣，强陰道，交接不倦，亦止精。屎，温，無毒。主腸鳴，熱中消渴，風痹癮瘾。

陶隱居云：原蠶是熏養者，俗呼爲魏蠶。道家用其蛾止精，其瓮繭入術用。屎，名蠶沙，多入諸方用，不但熨風而已也。

《圖經》曰：原蠶蛾，《本經》不載所出州土，今東南州郡多養此蠶，處處皆有之。此是重養者，俗呼爲晚蠶。北人不甚再養，蓋惡其損桑。而《周禮》禁原蠶者，鄭康成注云：爲其傷馬，傷馬亦是其一事耳。《淮南子》曰：原蠶一歲再登，非不利也。然王法禁之者，爲其殘桑是也。人既稀養，市中貨者亦多早蛾，不可用也。至於用蠶沙、蠶退，亦須用晚出者，惟白殭蠶不看早晚，但用白而條直者。

陳藏器云：原蠶屎㉚，一名蠶沙，净收㉛，取曬乾，炒令黄，袋盛浸消，去風，護㉜諸節不隨，皮膚頑痹，腹内宿冷，冷血瘀血，腰脚疼冷。炒令熱，袋盛熱熨之，主偏風，筋骨癱緩，手足不隨及腰脚軟，皮膚頑痹。

禹錫云：按《日華子》云：晚蠶蛾，壯陽事，止泄精，尿血，暖水臟。又，蠶蛾，平。治暴風，金瘡，凍瘡，湯火瘡并滅瘡瘢，入藥炒用。又云：蠶布紙，平。治吐血，鼻洪，腸風瀉血，崩中帶下，赤白痢，傅丁腫瘡。入藥燒用。又云：蠶沙，治風痹頑疾不仁，腸鳴。

《聖惠方》：治風瘙癮瘕遍身癢成瘡。用蠶沙一升，水二斗，煮取一斗二升，去滓，温熱洗。宜避風。

《勝金方》：治刀斧傷，止血生肌，天蛾散：晚蠶蛾爲末，摻匀絹裹，隨手瘡合血止。一切金瘡亦治。

《簡要濟衆方》：小兒撮口及發噤方。晚蠶蛾二枚，炙令黄，爲末，蜜和，傅兒口唇内。

《衍義》曰：原蠶蛾，有原復敏速之義，此則第二番蛾也。白殭蠶條中已具。屎，飼牛代穀。又以三升醇酒，拌蠶屎五斗，用甑蒸熱，於暖室中鋪於油單上，令患風冷氣閉及近感癱風人，就所患一邊卧，看温熱，厚蓋覆，汗出爲度。若虚人須常在左右，防大熱昏冒。仍令頭面不得壅覆。未全愈，間，再作。

蠶退　主血風病，益婦人。一名馬鳴退。近世醫家多用蠶退紙，而東方諸醫用蠶欲老眠起所蜕皮，雖二者之用各殊，然東人所用者爲正。用之當微炒，和諸藥可作丸、散服。

《集驗方》：治纏喉風及喉痹，牙癰，口瘡并小兒走馬疳。蠶蛾退紙不計多少，燒成灰存性，又煉蜜和丸，如鷄頭大。含化咽津。牙宣，牙癰，揩齦上。口瘡，乾傅患處。小兒走馬疳，入麝香少許，貼患處佳。

《衍義》曰：蠶退，治婦人血風，此

則眠起時所蛻皮也。其蠶退紙，謂之蠶連，亦燒灰用之，治婦人血露。



蛞蝓

蛞蝓上音闊，下音俞　味鹹，寒，無毒。主賊風喎口乖切僻，軼音益筋及脫肛，驚癇攣縮。一名陵蠡，一名土蝸，一名附蝸。生泰山池澤及陰地沙石垣下。八月收。

陶隱居云：今蛞蝓無殼，不應有蝸名，其附蝸者，復名蝸牛。生池澤沙石，則應是今山蝸，或當言其頭，形類猶似蝸牛蟲者，作瓜字，則蝸字亦音瓜。《莊子》所云戰於蝸角也。蛞蝓入三十六禽限，又是四種角蟲之例。營[33]室星之精矣，方家殆無復用乎。

禹錫云：按《爾雅》云：附蠃蝓。注云：蝸牛也。而《玉篇》蝓字下注亦云：蠃蝓，蝸牛也。此則一物明矣。形似小螺，白色，生池澤草樹間，頭有四角，行則出，驚之則縮，首尾俱能藏入殼中。而蘇注云無殼蝸牛，非也。

《衍義》曰：蛞蝓、蝸牛，二物矣。蛞蝓，其身肉止一段。蝸牛，背上別有肉，以負殼行，顯然異矣。其爲一物，《經》中焉得分爲二條也。《玉篇》同小異，故知別類。又謂蛞蝓是蝸牛之老者，甚無謂。蛞蝓有二角，蝸牛四角，兼背有皮殼肉，豈得爲一物也。

蝸牛

蝸牛　味鹹，寒。主賊風喎僻，踠跌，大腸下脫肛，筋急及驚癇。

陶隱居云：蝸牛，字是力戈切，而俗呼爲瓜牛。生山中及人家，頭形如蛞蝓，但背負殼爾。前以注說之。海邊又一種，正相似，火炙殼便走出，食之益顏色，名爲寄居。方家既不復用，人無取者。

禹錫云：按《藥性論》云：蝸牛角[34]亦可單用，又名蠡牛，有小毒，能治大腸脫肛，生研取服，止消渴。

《日華子》云：冷，有毒。治驚癇等，入藥炒用。此即負殼蚹蛐也。

《聖惠方》：治齒蠹并有蟲。用蝸牛殼三[35]十枚，燒灰細研，每用揩齒，良。又方：治蜈蚣咬方。用蝸牛挼取汁，滴入咬處。又方：治大腸久積則虛冷，因大便脫肛收不得。蝸牛一兩燒灰，猪脂和傅之。

《集驗方》：治發背。以蝸牛一百枚，活者，以一升淨瓶入蝸牛，用新汲水一盞，浸瓶中封繫，自晚至明，取蝸牛放之，其水如涎，將真蛤粉不以多少，調，以鷄翎刷瘡上。日可十餘度，其熱痛止，瘡便愈。

《衍義》曰：文具蛞蝓條下。

石龍子

石龍子　味鹹，寒，有小毒。主五癰邪結氣，破石淋下血，利小便水道。

一名蜥蜴上音錫，下音亦，一名山龍子，一名守宮，一名石蜴。生平陽川谷及荊

石龍子



山山石間。五月取，著石上令乾。惡硫黄、斑猫、蕪荑。

陶隱居云：其類有四種：一大形，純黄色，爲蛇醫母，亦名蛇舅母，不入藥；次似蛇醫，小形長尾，見人不動，名龍子；次有小形而五色，尾青碧可愛，名蜥蜴，并不螫人；一種喜緣籬壁，名蝘蜓，形小而黑，乃言螫人必死，而未嘗聞中人。按東方朔云：是非守宫，則蜥蜴，如此蝘蜓名守宫矣。以朱飼之，滿三斤，殺，乾末。以塗女子身，有交接事便脱，不爾如赤誌，故謂守宫。今此一名守宫，猶如野葛、鬼臼之義也，殊難分別。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：長者一尺，今出山南襄州、安州、申州。以三、四、八、九月採，去腹中物，火乾。

《衍義》曰：石龍子，蜥蜴也，今人但呼爲蜴蜥，大者長七八寸，身有金碧色。孝仁廟朝，有一蜥蜴在右掖門西濬溝廟中，此真是蜥蜴也。鄭狀元有詩。有樵者於澗下行，見一蜥蜴自石罅中出，飲水訖而入。良久，凡百十次，尚不已。樵者疑，不免翻石視之，有冰雹一二升。樵人訝而去，行方三五里，大雨至，良久風雹暴作。今之州縣依法，用此祈雨。《經》云：治五癃，破石淋，利水道，亦此義乎。

檮雞



檮雞 檮丑如切

主心腹邪氣，陰痿，益精强志，生子好色，補中輕身。又療腰痛，下氣，强陰多精，不可近目。生河内川谷檮樹上。七月採，暴乾。

陶隱居云：形似寒蜨而小，今出梁州，方用至稀，惟合大麝香丸用之。檮樹似漆而臭，今以此樹上爲好，亦如芫菁、亭長，必以芫、葛上爲良矣。

《唐本》注云：此物有二種，以五色具者爲雄，良；青黑質白斑者是雌，不入藥用。今出岐州，河内無此物。

《衍義》曰：檮雞，東、西京界尤多。形類蠶蛾，但頭、足微黑，翅兩重，外一重灰色，下一重深紅，五色皆具。腹大，此即檮雞也。今人又用之，行瘀血、月閉。

木蝨



木蝨 音萌

味苦，平，有毒。主目

赤痛，眦傷淚出，瘀血，血閉，寒熱酸慚音酉，無子。一名魂常。生漢中川澤，五月取。

《圖經》曰：木蝨，生漢中川澤。蜚生江夏川谷，今并處處有之，而襄、漢近地尤多。蝨有數種，皆能啖牛馬血，木[36]蝨最大而緑色，幾若蜩蟬。蜚蝨狀如蜜蜂，黄色。醫方所用蝨蟲，即此也。又有一種小蝨，名鹿蝨，大如蠅，咂牛馬亦猛。三種大抵同體，俱能治血，而方家相承，只用蜚蝨，他不復用，并五月採，腹有血者良。人伺其啖齧牛馬時腹紅者，掩取乾之用，入藥須去翅足也。

陶隱居云：此蝨不啖血，狀似蝨而小，近道中不見，市人亦常[37]有賣者，方家所用，惟蜚蝨也。

《淮南子》：散積血，斫，此以類推之者也。然今本草不著斫木之治病，亦漏脱耳。

《肘後方》：葛氏云：蛇螫人九竅皆血出方。取蝨蟲初食牛馬血腹滿者二[38]七枚，燒服之。

《衍義》曰：木蝨，大小有三種。蜚蝨，今人多用之，大如蜜蜂，腹凹偏[39]，微黄緑色，雄、霸州、順安軍、沿塘濼界河甚多。以其惟食牛馬等血，故治瘀血，血閉。



廬蟲 廬音柘　味鹹，寒，有毒。主心腹寒熱洗洗，血積癥瘕，破堅，下血閉，生子大良。一名地鱉，一名土鱉。生河東川澤及沙中、人家墻壁下土中濕處。十月暴乾。畏皂角、菖蒲。









《圖經》曰：廬蟲，今人謂之簸箕蟲，爲其像形也。乳脉不行，研一枚，水半合，濾清，服，勿使服藥人知也。

禹錫云：按《藥性論》云：廬蟲，使，畏屋游，味苦、鹹。治月水不通，破留血積聚。

《張仲景治雜病方》：主久瘕積結，有大黄廬蟲丸。又大鱉甲丸中，并治婦人藥，并用。

《衍義》曰：廬蟲，今人謂之簸箕蟲，爲其像形也。

鮫魚皮 主蠱氣，蠱疰方用之。即裝刀靶音霸　鞘音鵲魚皮也。

《圖經》曰：鮫魚皮，舊不著所出州土。蘇恭云出南海。形似鱉無脚而有尾。《山海經》云：鮫，沙魚，其皮可以飾劍是也。今南人但謂之沙魚。然有二種：其最大而長喙如鋸者，謂之胡沙，性善而肉美；小而皮粗者曰白沙，肉强而有小毒。二種彼人皆鹽爲脩脯，其皮刮治去沙，剪爲膾，皆食品之美者，食之益人。然皆不類鱉，蓋其種類之別耳。





沙魚

《唐本》注云：出南海，形似鱉，無脚而有尾。

陳藏器云：一名沙魚，一名鰋㊵魚。皮主食魚中毒，燒末服之。唐本先附。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：圓廣尺餘，尾長尺許，惟無足，背皮粗錯。

《日華子》云：鮫魚，平，微毒。

胡洽云：治五尸鬼疰，百毒惡氣等，鮫魚皮散主之。鮫魚皮炙、朱砂、雄黄、金牙、椒、天雄、細辛、鬼臼、麝香、乾薑、鷄舌香、桂心、莽草各一兩，貝母半兩，蜈蚣炙、蜴蜥炙，各二枚，凡十六物，治下篩，温清酒服半錢匕，日三，漸增至五分匕，亦作㊶帶之。中用蜈蚣、蜴蜥，皆此品類中，故并載方。

《食療》云：平。補五臟。作鱔㊷食之并同。

又，有大患喉閉，取膽汁和白礬灰，丸之如豆顆，綿裹内喉中，良久吐惡涎沫，即喉嚨開。臘月取之。

《海藥》云：謹按《名醫别録》云：生廣州南海。味甘、鹹，無毒。主心氣鬼疰，蠱毒，吐血，皮上有真珠斑。

《衍義》曰：鮫魚、沙魚皮一等，形稍異，令人取皮飾鞍、劍。餘如《經》。

青魚



味甘，平，無毒。肉，主脚氣濕痹。作鮓與服石人相反。眼睛，主能夜視。頭中枕，蒸取乾，代琥珀，用之摩服，主心腹痛。膽，主目暗，滴汁目中，并塗惡瘡。生江湖間。

禹錫云：按蕭炳云：療卒氣。研服，止腹痛。可白煮吃，治脚氣脚弱。

《日華子》云：作鯖字，平，微毒。治脚軟，煩滿，益氣力。枕用醋摩，治水氣，血氣心痛。不可同葵、蒜食之。服术人亦勿啖也。

紫貝　明目，去熱毒。

《圖經》曰：紫貝，《本經》不載所

紫貝



出州土。蘇恭注云：出東海及南海上，今南海多有之，即砑磟[43]也。形似貝而圓，大二三寸，儋振夷黎採以爲貨市，北人惟畫家用砑物。又車螯之紫者，海人亦謂之紫貝。車螯，近世治癰疽方中多用，其殼燒煅爲灰，傅瘡瘡。南海、北海皆有之，採無時。人亦食其肉，云味鹹，平，無毒。似蛤蜊，而肉堅硬不及。亦可解酒毒。不中者殼粗，不堪用。

《唐本》注云：形似貝，圓，大二三寸。生東海及南海上，紫斑而骨白。唐本先附。

《衍義》曰：紫貝，大二三寸，背上深紫有點，俱[44]黑。《本經》以此燒存性，入瞭[43]眼藥。

緣桑螺　主人患脫肛。燒末，和猪膏傅之，脫肛立縮。此螺全似蝸牛黃，小雨後好緣桑葉。

《范汪方》：脫肛。緣桑樹螺燒之，以猪脂和，傅之立縮，亦可末傅之。

蜚蠊　味苦，微寒，有毒。主逐瘀血，破下血積，堅痞癥瘕，寒熱，通利血脉及九竅，女子月水不通，積聚，除賊血在胸腹五臟者，及喉痹結塞。生江夏川谷。五月取，腹有血者良。

陶隱居云：此即今啖牛馬血者，伺其腹滿掩取用之，方家皆呼爲蝘蜓蟲矣。

《唐本》注云：三蝘俱食牛馬，非獨此也，但得即堪用，何假血充然始掩取。如以義求，應如養鷹，饑則爲用，若伺其飽，何能除疾爾。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：金州、房州等山人啖之，謂之石薑，多在林樹間百十爲聚。《爾雅》云：蜚，蠦蜚。注云：蜚即負盤臭蟲。

使，一名蜚蝘，惡麻黃。

《日華子》云：破癥結，消積膿，墮胎。入丸散，除去翅足，炒用之。

蜚蠊　味鹹，寒，有毒。主血瘀癥堅，寒熱，破積聚，喉咽痺內寒[46]，無子，通利血脉。生晉陽川澤及人家屋間，立秋採。

《圖經》曰：文具木蝘條下。

白魚　味甘，平，無毒。主胃氣，開胃下食，去水氣，令人肥健。大者六七尺，色白頭昂，生江湖中。

禹錫云：按孟詵云：白魚，主脾[47]家不足氣，不堪多食，泥人心。雖不發病，終養蠹所食。新者好，久食令人心腹諸病。可煮炙，於葱、醋中一兩沸食。猶少調五臟氣，理經脉。

《日華子》云：助血脉，補肝明目。患瘡癰人不可食，甚發膿，炙瘡不發，作鱠食之良。

鱖魚　味甘，平，無毒。主腹内惡血，益氣力，令人肥健，去腹内小蟲。背有黑點，味尤重。昔仙人劉憑，常食桂魚。今此魚猶有桂名，恐是此也。生江溪間。

禹錫云：按《日華子》云：微毒。又名鱖豚、水豚。

河豚　味甘，温，無毒。主補虚，去濕氣，理腰脚，去痔疾，殺蟲。江、河、淮皆有。

陳藏器云：如鯰魚，口尖，一名鮑魚也。

禹錫云：按《日華子》云：河豚，有毒。又云：胡夷魚，涼，有毒。煮和禿菜食，良。毒以蘆根及橄欖等解之。

嘉魚　味甘，温，無毒。食之令人肥健悦澤。此乳穴中小魚，常食乳水，所以益人，能久食之，力强於乳，有似英鷄，功用同乳。

陳藏器云：《吴都賦》云：嘉魚出於丙穴。李善注云：丙日出穴，今人[49]不然。丙者，向陽穴也。陽穴多生此魚，魚復何能擇丙日耶？此注誤矣。新注云：治腎虚消渴及勞損羸瘦，皆煮食之。又《抱朴子》云：鳩知夜半，燕知戊己。豈魚不知丙日也。

《食療》云：微温。常於崖石下孔中吃乳石沫，甚補益。微有毒。其味甚珍美也。

鯽魚　味甘，平，無毒。主開胃，通利五臟。久食令人肥健。此魚食泥，與百藥無忌。似鯉身圓，頭扁骨軟。生江海淺水中。

鱸魚　平。補五臟，益筋骨，和腸胃，治水氣。多食宜人，作鮓猶良。又暴乾，甚香美。雖有小毒，不至發病。一云：多食發痃癖及瘡腫，不可與乳酪同食。

《食療》云：平。主安胎，補中。作鱠尤佳。

《衍義》曰：鱸魚，益肝腎，補五臟，和腸胃，食之宜人。不甚發病，宜然張翰思之也。

鱟　平，微毒。治痔，殺蟲，多食發嗽并瘡癬。殼入香，發衆香，尾灰斷產燒焦，治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢。脂，燒，集鼠。

陳藏器云：味辛，無毒。主治野鷄病，殺蟲，發嗽，殼發衆香，尾灰斷產後痢，膏燒集鼠未試。生南海，大者如扇，牡、牝相隨，牝無目，得牡始行，牡去牝死。以骨及尾，尾長二尺，燒爲黑灰末，酒下，大主產後痢。先服生地黄、蜜等煎訖，然後服尾，無不斷也。

黿鱉魚　陶云：黿肉，補。此老者，能變化爲魅。按黿甲，功用同鱉甲。炙浸酒，主瘰癧，殺蟲，逐風惡瘡瘻，風頑疥瘙。肉，主濕氣，諸邪氣蠱，消百藥毒。張鼎云：膏塗鐵[50]摩之便明未試。膏摩風及惡瘡。子如鷄卵，正圓，煮之白不凝。今世人謂藏卵爲黿子，似此非爲木石机也。至難死，剔其肉盡，頭猶咬物，可以張鳶鳥。

《食療》云：微温。主五臟邪氣，殺百蟲蠱毒，消百藥毒，續人筋。又，膏塗鐵，摩之便明。淮南術方中有用處。

海馬　謹按《異志》云：生西海，大小如守宫蟲，形若馬形，其色黄褐。性温，平，無毒。主婦人難産，帶之於身，神驗。此外別無諸要用，今無。

蚱蜢　石蟹注陶云：石蟹如蚱蜢，形長小，兩股如石蟹，在草頭能飛，蟲螽之類，無別功。與蚯蚓交，在土中得之，堪爲媚藥。入《拾遺記》。

齊蛤　遠志注陶云：遠志畏齊蛤。蘇云：《藥録》下卷有蛤，而不言功狀。注又云：蠟畏齊蛤。按齊蛤如蛤，兩頭尖小，生海水中。無別功用，海人食之。

❶主：晦明軒本作『煮』。
❷謹：晦明軒本作『慎』。
❸二：晦明軒本作『十二』。
❹若：晦明軒本作『苦』。
❺七：晦明軒本作『三』。
❻一：晦明軒本作『下』。
❼妬：原作『垢』，據晦明軒本改。
❽盞：原脱，據晦明軒本補。
❾肉：晦明軒本作『厭』。
❿寸：晦明軒本作『驚』。
⓫外：晦明軒本作『底』。
⓬二：晦明軒本作『三』。
⓭洎：晦明軒本作『河』。
⓮蛹：原作『蛔』，據晦明軒本改。
⓯飾：原作『餘』，據晦明軒本改。
⓰之：原作『乏』，據晦明軒本改。
⓱柳：晦明軒本作『桑』。

⑱妙：晦明軒本作『奶』。
⑲往：晦明軒本作『住』。
㉙門：晦明軒本作『崩』。
㉛夫：晦明軒本作『大』。
㉒取：原作『及』，據《外臺》卷十五改。
㉜赤：原作『亦』，據晦明軒本改。
㉞水户痛：晦明軒本作『小户嫁痛』。
㉕二：晦明軒本作『三』。
㊱蜜：原作『米』，據晦明軒本改。
㉗尸：晦明軒本作『户』。
㉘而：晦明軒本作『面』。
㉙滅：原作『出』，據晦明軒本改。
㉙屎：原脱，據晦明軒本補。
㉛收：原作『去』，據晦明軒本改。
㉜護：晦明軒本作『緩』。
㉝營：晦明軒本作『炙』。
㉞角：晦明軒本無『角』字。
㉟三：晦明軒本作『二』。
㊱木：原作『咊』，據晦明軒本改。
㊲常：晦明軒本作『少』。
㊳二：晦明軒本作『三』。
㊴偏：晦明軒本作『褊』。
㊵馥：原作『鮫』，據晦明軒本改。
㊶作：晦明軒本作『可』。
㊷鱨：晦明軒本作『鱠』。
㊸磥：晦明軒本作『螺』。
㊹俱：晦明軒本作『但』。
㊺瞭：晦明軒本作『點』。
㊻寒：疑當作『塞』。
㊼脾：晦明軒本作『肝』。

㊷謹：晦明軒本作『慎』。
㊵人：晦明軒本作『則』。
㊴鐵：原脱，據晦明軒本補。

圖經衍義本草卷之三十三

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

蟲魚部下品

蝦蟆



味辛，寒，有毒。主邪氣，破癥堅血，癰腫，陰瘡，服之不患熱病，療陰蝕疽瘍音賴惡瘡，猘犬傷瘡，能合玉石。一名蟾蜍，一名蟾音秋，一名去甫，一名苦蠪音龍。生江湖池澤。五月五日取，陰乾，東行者良。

《圖經》曰：蝦蟆，生江湖，今處處有之。腹大形小，皮上多黑斑點，能跳接百蟲食之，時作呷呷聲，在陂澤間，舉動極急，五月五日取，陰乾，東行者良。《本經》一名蟾蜍，以爲一物，似非的也。謹按《爾雅》黽黽，蟾蜍。郭璞注云：似蝦蟆，居陸地。又科斗注云：蝦蟆子也。是非一物明矣。且蟾蜍形大，背上多疣磊，行極遲緩，不能跳躍，亦不解鳴，多在人家下濕處。其腹下有丹書八字者，真蟾蜍也。

《藥性論》云：蝦蟆，亦可單用。主辟百邪鬼魅，塗癰腫及治熱結腫。又云：蟾蜍，臣。能殺疳蟲，治鼠漏惡瘡。端午日取眉脂，以朱砂、麝香爲丸，如麻子大，小兒子疳瘦者，空心一丸。如腦疳，以奶汁調鼻中。燒灰，傅一切有蟲惡瘡滋胤瘡。

陶隱居云：此是腹大、皮上多疣罪切磊者，其皮汁甚有毒。犬嚙之，口皆腫。人得温病斑出困者，生食一兩枚，無不差者。五月五日取東行者五枚，反縛著密室中閉之，明日視自解者，取爲術用，能使人縛亦自解。燒灰杵末，猪脂和傅之。

《梅師方》：治疳蝕無問去處，皆傅瘡立驗。其肪塗玉則刻之如蠟，故云能合金石，但肪不可多得。取肥者，以蝦蟆燒灰，好醋和傅，日三五度，傅之差。

《子母秘録方》：小兒洞泄下痢。燒蝦蟆爲末，飲調方寸匕服。

《衍義》曰：蝦蟆，多在人家渠壍及蝦蟆肪所刻也。

蕭炳云：腹下有丹書八字者，以足畫地，真蟾蜍也。

《日華子》云：蝦蟆，冷，無毒。治犬咬及熱狂，貼惡瘡，解煩熱，色斑者是。又云：蟾，凉，微毒。破癥結，治瘧，入藥并炙用。

《聖惠方》：治風邪。蝦蟆燒灰、珠砂等分。每服一錢，水調下，日三四服。

《外臺秘要方》：治卒狂言鬼語。燒蝦蟆杵末，酒服方寸匕，日三。又方：治小兒初得月蝕瘡。五月蝦蟆燒灰杵末，猪脂和傅之。

《梅師方》：治疳蝕無問去處，皆傅瘡立驗。其肪塗玉則刻之如蠟，故云能合金石，但肪不可多得。取肥者，以蝦蟆燒灰，好醋和傅，日三五度，傅之差。

《子母秘録方》：小兒洞泄下痢。燒蝦蟆爲末，飲調方寸匕服。

《衍義》曰：蝦蟆，多在人家渠壍及蝦蟆肪所刻也。

蕭炳云：腹下有丹書八字者，以足畫地，真蟾蜍也。

《日華子》云：蝦蟆，冷，無毒。治犬咬及熱狂，貼惡瘡，解煩熱，色斑者是。又云：蟾，凉，微毒。破癥結，治瘧，入藥并炙用。

牡鼠　微温，無毒。療蹉折，續筋骨，搗傅之，三日一易。四足及尾，主婦人墮胎，易出。肉，熱，無毒。主小兒哺露大腹，炙食之。糞，微寒，無毒。主小兒癇疾，大腹，時行勞復。

《圖經》曰：文具附鼷鼠條下。

陶隱居云：牡鼠，父鼠也。其屎兩頭尖，專療勞復。鼠目，主明目，夜

見書，術家用之。臘月鼠，燒之辟惡氣。膏，煎之，亦療諸瘡。膽，主目暗，但纔死膽便消，故不可得之。

陳藏器序云：雄鼠脊骨，未長齒多年不生者效。

禹錫云：按孟詵曰：牡鼠，主小兒癇疾。腹大貪食者，可以黄泥裹燒之，細揀去骨，取肉和五味汁作羹，與甚瘦人。又，取食之。勿令食著其骨，甚為大升，煎之使臘月新死者一枚，油一大爛，絞去滓，重煎成膏。塗凍瘡及折破瘡。

《日華子》云：鼠，涼，無毒。治小兒驚癇疾，以油煎令消，入蠟傅湯火瘡。生搗署折傷筋骨。雄鼠糞，頭尖硬者是。治癇疾，明目。葱、豉煎服，治勞復。足，燒食，催生。

馬刀







馬刀　味辛，微寒，有毒。主漏下赤白，寒熱，破石淋，殺禽獸賊鼠，除五臟間熱，肌中鼠鼸蒲剥切，止煩滿，補中，去厥痹，利機關。用之當煉，得水爛人腸。又云：得水良。一名馬蛤。生江湖池澤及東海。取無時。

陶隱居云：李云生江漢中，長六七寸，漢間人名爲單音善姥音母，亦食其肉，肉似蚌。今人多不識之，大都似今蚌蛤乃蚌。

陳藏器云：據陶云：大蛤乃蚌。按蚌，寒，煮之，主婦人勞損，下血，明目，除濕，止消渴。老蚌含珠，殼堪爲粉，爛殼爲粉，飲下，主反胃，心胸間痰飲。生江溪渠瀆間。陶云大蛤，誤耳。

《食療》云：蚌，大寒。主大熱，解酒毒，止渴，去眼赤。動冷熱氣。

《丹房鏡源》云：蚌粉制硫黄。



蚌



蚌　冷，無毒。明目，止消渴，除煩，解熱毒，補婦人虚勞，下血并痔漏，血崩帶下，壓丹石藥毒。以黄連末納之，取汁，點赤眼并暗，良。爛殼粉，飲下，治反胃，痰飲。此即是寶裝大者。又云：蚌粉，冷，無毒。治疳，止痢并嘔逆。癰腫，醋調傅，兼能制石亭脂。



蛸蛇膽

蚺蛇膽蚺音髯　味甘、苦，寒，有小毒。主心腹蜇痛，下部蜇瘡，目腫痛。膏，平，有小毒。主皮膚風毒，婦人産後腹痛餘疾。

《圖經》曰：蚺蛇膽，《本經》不載所出州土，陶隱居云出晉安，大者三桂、廣以南，高、賀等州，今嶺南州郡皆有之。此蛇極大，彼土人多食其肉，取其膽及膏爲藥。

陶隱居云：此蛇出晉安，大者三圍。在地行住不舉頭者，是真；舉頭者，非真。形多相似，彼土人以此別之。膏、膽又相亂也。真膏纍纍如梨豆子相著，他蛇膏皆大如梅、李子。真膽狹長通黑，皮膜極薄，舐之甜苦，摩以注水即沉而不散；其僞者并不爾。此物最難得真，真膏多所入藥用，亦云：能療伯牛疾。

《藥性論》云：蚺蛇膽，臣。渡嶺南，食此膾，瘴毒不侵，世人皆知之。膽，主下部蟲，殺小兒五疳。

《食療》云：膽，主蜇瘡瘦，目腫痛，疳蜇。肉，主温疫氣。可作膾食之。如無此疾及四月勿食之。膏，主皮膚間毒氣。小兒疳痢，以膽灌鼻中及下部。

《聖惠方》：治小兒急疳瘡。用蚺蛇膽細研，水調傅之。

《楊氏産乳方》：療温痢久不斷，體瘦，昏多睡，坐則閉目，食不下。蚺蛇膽大如豆二枚，煮通草汁研膽，以意多少飲之，并塗五心并下部。

《朝野僉載》云：泉州盧元欽患大風，唯鼻未倒。五月五日取蚺蛇膽，欲進，或云肉可治風，遂一截蛇肉食之，三五日頓覺漸可，百日平復。

蛇蜕音税　味鹹，甘，平，無毒。主小兒百二十種驚癇，癒尺曳切瘛子用切，癲疾，寒熱，腸痔，蟲毒，蛇癇，弄舌搖頭，大人五邪，言語僻越，惡瘡，嘔咳，一名龍子衣，一名龍子單衣，一名龍子皮，一名弓皮。生荆州川谷及田野。五月五日、十五日取之，良。畏磁石及酒。

陶隱居云：草中不甚見虺、蝮蜕，惟有長者，多是赤蠕、黄領輩，其皮不可復識，今往往得耳，皆須完全。石上者亦❹佳，燒之甚療諸惡瘡也。

禹錫云：按《藥性論》云：蛇蜕皮，臣，有毒。能主百鬼魅，兼治癇瘧❺。

陳藏器云：按《本草》蛇蜕，主瘧，取正發日，以蜕皮塞人兩耳，臨發又以手持少許，并服一合鹽、醋汁，令吐也。

《日華子》云：治蠱毒，辟惡，止嘔逆，治小兒驚悸，客忤，催生。癮瘡，白癜風，煎汁傅。入藥并炙用。

《食療》云：蛇蜕皮，主去邪，明目。治小兒一百二十種驚癇，寒熱，腸痔，蠱毒，諸❻蟨惡瘡，安胎。熬用之。

《聖惠方》：治小兒重腭，重齦腫痛。燒末傅之，效。

《千金方》：治諸腫失治，有膿。燒蛇蜕皮，水和，封腫上，即蟲出。又方：治惡瘡十年不差似癩者。燒全者一條爲末，猪脂和傅上，良。

《十全博救方》：治横生難産方。蛇皮一條，瓶子内鹽泥固濟，存性燒爲

黑灰。每服二錢，用榆白皮湯調服，立效。

《必效方》：五痔肛脫。以死蛇一枚指大者温用。掘地作坑燒蛇，取有孔板覆坑坐上，蟲盡出。

《杜壬方》：治纏喉風，咽中如束，氣不通。蛇蜕炙黄，以當歸等分，爲末，温酒調一錢匕，得吐即愈。

《産書》云：治産不順，手足先見者。蛇蜕皮，燒作灰，研。面東酒服一錢匕，更以藥末傅手足，即順。

《衍義》曰：蛇蜕，從口翻退出，眼睛亦退，今合眼藥多用，取此義也。入藥洗净。



白頸蚯蚓

主蛇瘕，去三蟲，伏尸，鬼疰，蠱毒，殺長蟲，仍自化作水。療傷寒伏熱，狂謬，大腹，黄疸。一名土龍。生平土，三月取。陰乾。

《圖經》曰：白頸蚯蚓，生平土，今處處平澤皋壤地中皆有之。白頸是老者耳。三月採，陰乾，一云：須破去土鹽之，日乾。方家謂之地龍。治脚風藥，必須此物爲使，然亦有毒。曾有人因脚病藥中用此，果得其❼效，病既愈，服之不止，至二十餘日，而覺煩躁憒亂，但欲飲水不已，遂至委頓。凡攻病用藥毒已愈，當便罷服也。其屎呼爲蚓螻，并鹽傅瘡，可去熱毒也。

《藥性論》云：蚯蚓，亦可單用，有小毒。乾者熬末用之，主蛇傷毒。一名地龍子。

《唐本》注云：《别録》云，鹽霑爲汁，療耳聾。鹽消蛔，功同蚯蚓。其屎，封狂犬傷毒。出犬毛，神效。

陳藏器云：蚯蚓糞土，療赤白久熱痢，取無沙者，末一升，炒令烟盡，水沃，取半大升，濾去滓，空肚服之。

《日華子》云：蚯蚓，治中風并癇疾，去三蟲，治傳屍，天行熱疾，喉痹，蛇蟲傷。一名千人踏，即路行人踏殺者。入藥燒用。其屎，治蛇、犬咬并熱瘡，并鹽研傅。小兒陰囊忽虚熱腫痛，以甘草汁調，輕輕塗之。

禹錫云：按《蜀本》注又云：解射罔毒。

《聖惠方》：治風赤眼。以地龍十條，炙乾爲末，夜卧以冷茶調下二錢匕。

《千金方》：治齒齦宣露。蚯蚓屎水和爲泥，火燒令極赤，研之如粉。臘月猪脂和傅上，日三，永差。

《斗門方》：小便不通。用蚯蚓杵，以冷水濾過，濃服半碗，立通。兼大解熱疾不知人事，欲死者，服之立效。

《勝金方》：治耳聾立效。以乾地龍入鹽，貯在葱尾内，爲水點之。

《百一方》：治交接勞復，陰卵腫或縮入腹，腹絞痛，或便絶。蚯蚓數

條，絞取汁服之，良。又方：治中蠱毒或吐下血若爛肝。取蚯蚓十四條，以苦酒三升漬之，蚓死，但服其汁。已死者皆可活。

《衍義》曰：白頸蚯蚓，自死者良，然亦應候而鳴。此物有毒。昔有病腹大，夜聞蚯蚓鳴於身，有人教用鹽水浸之而愈。崇寧末年，平❽州兵士暑月中在倅廳前，跣立廳下，爲蚯蚓所中，遂不救。後數日，又有人被其毒，博識者教以先飲鹽湯一杯，次以鹽湯浸足，乃愈。今入藥，當去土了微炙。若治腎臟風下疰病，不可闕也，仍須鹽湯送。王荊公所謂藁壤太牢俱有味，可能蚯蚓獨清廉者也。

蜘蛛

微寒。主大人、小兒癇。七月七日取其網，療喜音戲忘。

陶隱居云：蜘蛛類數十種，《爾雅》止載七八種爾，今此用懸網狀如魚罾者，亦名蚰蜒。蜂及蜈蚣螫人，取置肉上，則能吸毒。又以斷瘧及乾嘔霍亂。術家取其網著衣領中辟惡。有赤斑者，俗名絡新婦，亦入方術用。餘雜用白礬、葱、椒煎湯洗浴，拭乾後，將藥末摻在軟處，帛上將手掌按托入收之，妙。



《孫真人方》：蜈蚣咬。取蜘蛛一大腹丁奚，三年不能行者，又主蛇毒、温瘧、霍亂，止嘔逆。劍南、山東爲此蟲嚙，瘡中出絲，屢有死者。其網纏瘡疣，七日消爛，有驗矣。

《唐本》注云：《別録》云：治小兒正謂此也。

《聖惠方》：治瘰癧。無問有頭無頭。用大蜘蛛五枚，日乾，細研，酥調如麵脂，日兩度貼之。

《千金方》：治鼠瘻腫核痛，若已有瘡口出膿水者。燒蜘蛛二七枚傅，良。

《乘閑方》：治瀉多時，脱肛疼痛，黑聖散：大蜘蛛一枚，瓠葉重裹綿繫定，合子内燒令黑色存性，取出細研，入黄丹少許，同研。凡有上件疾，即先用白礬、葱、椒煎湯洗浴，拭乾後，將藥末摻在軟處，帛上將手掌按托入收之，妙。

《孫真人方》：蜈蚣咬。取蜘蛛一枚，咬處安，當自飲毒，蜘蛛死，痛未止，更易生者。

《廣利方》：治蝎螫人。研蜘蛛汁傅之，差。

《産寶方》：治産後咳逆，經三五日不止，欲死方。煎壁鏡窠三五個呷，差。

《衍義》曰：蜘蛛，品亦多，皆有毒，《經》不言用是何種。今人多用人

家檐角、籬頭、陋巷之間，空中作圓網，大腹、深灰色者。遺尿著人作瘡癬。



蠐螬

蠐螬上音噎，下烏紅切　味辛，平，無毒。主久聾，咳逆，毒氣，出汗，療鼻窒陟栗切。其土房主癰腫，風頭。一名土蜂。生熊耳川谷及牂牁，或人屋間。

陶隱居云：此類甚多，雖名土蜂，不就土中爲窟，謂揵土作房爾。今一種黑色，腰甚細，銜泥於人壁及器物邊作房，如并竹管者是也。其生子如粟米大置中，乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中，仍塞口，以擬其子大爲糧也。其一種入蘆竹管中者，亦取草上青蟲，一名蜾蠃。《詩》云：蜎蜎有子，蜾蠃負之。教誨爾子式穀似之，言細腰物無雌，皆取青蟲，教祝音咒便變成己子，斯爲謬矣。造詩者乃可不詳，未審夫子何爲因其僻邪。聖人有闕，多皆類此。

《日華子》云：此中有毒。治嘔逆，生研，署竹木刺。入藥炒用。

李含光《音義》云：咒變成子，近亦數有見者，非虛言也。

《聖惠方》：治小兒霍亂吐瀉方。用此蟲窠，微炙爲末，以乳汁調下一字，止。

《衍義》曰：蠐螬，諸家所論備矣，然終不敢捨詩之意。嘗折窠而視之，果有子，如半粟米大，其色白而微黃，所負蟲亦在其中，乃青菜蟲，却在子下，不與蟲相著。又非葉蟲及草上青蟲，應是諸蟲皆可也。陶隱居所説近之矣。人取此房，研細，醋調，塗蜂蠆。

葛上亭長

味辛，微温，有毒。主蠱毒，鬼疰，破淋結，積聚，墮胎。七月取，暴乾。一名斑猫。

《圖經》曰：文具芫青條下。

陶隱居云：葛花時取之，身黑而頭赤，喻如人著玄衣赤幘，故名亭長。此一蟲五變，爲療皆相似，二月、三月在芫花上，即呼芫青；四月、五月在王不留行上，即呼爲王不留行蟲；六月、七月在葛花上，即呼爲葛上亭長；八月在豆花上，即呼爲斑猫；九月、十月欲還地蟄，即呼爲地膽。此是僞地膽耳，爲療猶同其類。亭長，腹中有卵，白如米粒，主療諸淋結也。

《唐本》注云：今檢本草及古今諸方，未見用王不留行蟲者，若爾，則四蟲專在一處。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：五月、六月葛葉上採取之，形似芫青而蒼黑色。凡用斑猫、芫青、亭長之類，當以糯米同炒，看米色黃黑，即出，去頭、足及翅脚，以亂髮裹，懸屋棟上一宿，然後入藥用。

蛤蚧

味鹹，平，有小毒。主久肺勞傳尸，殺鬼物邪氣，療咳嗽，下淋瀝，通水道。生嶺南山谷及城墻或大樹間。身長四五寸，尾與身等。形如大守宮，一雄一雌，常自呼其名，曰蛤蚧。

蛤蚧



最護惜其尾，或見人欲取之，多自嚙斷其尾，人即不取之。凡採之者，須存其尾，則用之力全故也。《方言》曰：桂林之中，守宮能鳴者，謂蛤蚧，蓋相似也。

《圖經》曰：蛤蚧，生嶺南山谷及城墻或大木間，今嶺外亦有之。首若蝦蟆，背有細鱗如蠶子，色黃如土，長四五寸，尾與身等，蓋守宮、蜴蜥之類也。故揚雄《方言》云：桂林之中，守宮能鳴者，俗謂之蛤蚧，言其自呼其名也。藥力全在尾，人捕之，則自嚙斷其尾，因得釋去。巢穴多依榕木，亦有在古屋城樓間者，人欲得其首尾完者，乃以長柄兩股鐵叉，如粘竊竿狀，伺於榕木間，以叉刺之，皆一股中腦，一股著尾，故不能嚙也。行常一雄一雌相隨，入藥亦須兩用之。或云陽人用雌，陰人用雄。

《日華子》云：無毒。治肺氣，止嗽，并通月經，下石淋及治血。又名蛤蟹，合藥去頭、足，洗去鱗鬣內不淨，以酥炙用，良。

《衍義》曰：蛤蚧，補肺虛勞嗽有功，治久嗽不愈。肺間積虛熱，久則成瘡，故嗽出膿血，曉夕不出❾。喉中氣塞，胸膈噎痛，蛤蚧、阿膠、生犀角、鹿角膠、羚羊角各一兩；除膠外，皆爲屑，次入膠，分四服。每服用河水三升，於銀石器中慢火煮去❿半升，濾去滓，臨卧微温細細呷，其滓候服盡再服。若病人久虛不喜水，當遞減水。張刑部子皋病極，顧⓫樞密況送此方，遂愈。

蜈蚣



味辛，温，有毒。主鬼疰，蠱毒，啖諸蛇、蟲、魚毒，殺鬼物老精温瘧，去三圓⓬，療心腹寒熱結聚，墮胎，去惡血。生大吴川谷、江南。赤頭、足者良。

《圖經》曰：蜈蚣，生吴中川谷及江南，今江浙、山南、唐、鄧間皆有之。多在土石人家屋壁間，以頭、足赤者爲勝。七八月取之，黄足者最多。人以火炙令赤當之，不堪用。其性能制蛇，忽見大蛇，便緣而啖其腦。陶隱居及蘇恭皆以爲《莊子》稱蛫蛆，甘帶。《淮南子》云：騰蛇殆於蛫蛆，并言蛫蛆是此蜈蚣也。

陶隱居云：今赤足者多出京口，長山、高麗山、茅山亦甚有，於腐爛積草處得之，勿令傷，暴乾之。黄足者甚多，而不堪用，人多火炙令赤以當之，非真也。一名蛫蛆。莊周云：蛫蛆，甘帶。《淮南子》云：騰蛇游霧，而殆

於蝍蛆。其性能制蛇，忽見大蛇，便緣而啖其腦。蜈蚣亦嚙人，以桑汁、白鹽塗之即愈。

《日華子》云：蜈蚣，治癥癖，邪魅，蛇毒，入藥炙用。

《子母秘録方》治小兒撮口病，但看舌上有瘡如粟米大是也。以蜈蚣汁，刮破指甲，研，傅兩頭肉，差。如無生者，乾者亦得。

《衍義》曰：蜈蚣，背光黑緑色，足赤，腹下黄。有中其毒者，以烏鷄屎水調稠，塗咬處，效。大蒜塗之，亦效。復能治丹毒瘤。蜈蚣一條乾者，白礬皂子大，雷丸一個，百部⑬二錢，秤，同爲末，醋調塗之。又畏蛞蝓，不敢過所行之路，觸其身則蜈蚣死，人故取以治蜈蚣毒。桑汁、白鹽亦效。

水蛭 音質

味鹹、苦，平、微寒，有毒。主逐惡血，瘀血，月閉，破血瘕，積聚，無子，利水道，又墮胎。一名蚑，一名至掌。生雷澤池澤。五月、六月採，暴乾。



水蛭

《圖經》曰：水蛭，生雷澤池澤，今近處河池中多有之。一名蜞。此有數種：生水中者名水蛭，一名馬黄⑭；生山中者名石蛭；生草中名草蛭；生泥中名泥蛭。并能著人及牛、馬股脛間，嚙咂其血，甚者入肉中，産育爲害亦大。水蛭有長尺者，用之當以小者爲佳。六月採，暴乾。一云採得當以簞盛之，待乾，又用米泔浸經宿，然竹筒盛之，待乾，又冬月猪脂煎令黄，乃後出之，暴已。又《初虞世方》：治從高墜下及打擊内傷，神效。麝香、水蛭各一兩，剉碎，炒令烟出，一件研爲末。酒調一錢，當下畜血。未止再服，其效如神。

《衍義》曰：水蛭，陳藏器、《日華

子》所説備矣。大者京師又謂之馬鰲，腹黄者謂之馬蟥，畏鹽，然治傷折有功。《經》與《注》皆不言修制，宜子細不可忽也。今人用者皆炒。


斑猫

斑猫　味辛，寒，有毒。主寒熱，鬼疰，蠱毒，鼠瘻，疥癬，惡瘡，疽蝕，死肌，破石癃，血積，傷人肌，墮胎。一名龍尾。生河東川谷。八月取，陰乾。馬刀爲之使，畏巴豆、丹參、空青，惡膚青。

《圖經》曰：斑猫，生河東川谷，今處處有之。七月、八月大豆盛時，此蟲多在葉上，長五六分，甲⑯上黄黑斑文，烏腹尖喙，如巴豆大，就葉上採之，陰乾。古方書多有用此，其字或作斑蝥，亦作斑蚕，入藥不可令生，生即吐瀉人。

《藥性論》云：斑猫，一名龍苗，有大毒。能治瘰癧，通利水道。

陶隱居云：豆花時取之，身上黄黑斑色如巴豆大者是也。

《日華子》云：惡豆花。療淋疾，傅惡瘡，瘻爛。生即吐瀉人。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：七月、八月，大豆葉上甲蟲，長五六分，黄斑文烏腹者，今所在皆有之。

吴氏云：斑猫，一名斑菌，一名胜髮，一名盤蛩，一名晏青。神農：辛。岐伯：鹹。桐君：有毒。扁鵲：甘，有大毒。生河内川谷或生水石。

《外臺秘要方》：治乾癬積年生痂，搔之黄水出，每逢陰雨即癢。用斑猫半兩，微炒爲末，蜜調傅之。

《經驗方》：大治大人、小兒瘰癧内消方：斑猫一兩，去翅、足，用粟米一升，同斑猫炒，令米焦黄，去米不用，細研，入乾薄荷末四兩同研，令匀，以鷄子清丸如緑豆大。空心臘茶下一丸，加至五丸，却每日減一丸，減至一丸後，每日服五丸。

《衍義》曰：斑猫，須糯米中炒米黄爲度，妊娠人不可服。爲能潰人肉，治淋藥中⑰用，極苦，人尤宜斟酌。下條芫青，其用與此不相遠，故附於此。

蛤蜊　冷，無毒。潤五臟，止消渴，開胃，解酒毒，主老癖，能爲寒熱者及婦人血塊，煮食之。此物性雖冷，乃與丹石相反，服丹石人食之，令腹結痛。

初虞世云：療湯火傷神妙。蛤蜊殼灰火燒研爲末，油調塗之。

蜆音顯　冷，無毒。治時氣，開胃，壓丹石藥及丁瘡，下濕氣，下乳，糟煮服，良。生浸取汁，洗丁瘡。多食發嗽并冷氣，消腎。

陳殼，治陰瘡，止痢。蜆肉，寒，去暴熱，明目，利小便，下熱氣，脚氣，濕毒，解酒毒，目黄。浸取汁服，主消渴，爛殼，温，燒爲白灰飲下，

主反胃吐食，除心胸痰水。殼，燒以米醋三度淬後，埋令壞，醋膏丸，治一切血氣，胃反及失精。

陳藏器云：小於蛤，黑色，生水泥中，候風雨，能以殼爲翅飛也。

蜬蜷　殼燒作末服之，主痔病。

陳藏器云：蜬蜷，一名生進。有毛似蛤，長扁，殼燒作末服之，主野鷄病。人食其肉，無功用也。

車螯　冷，無毒。治酒毒，消渴，酒渴并癰腫。殼，治瘡癰腫毒。此⑱二度，各以醋煅，搗爲末。又甘草等分，酒服，以醋調傅腫上，妙。車螯是大蛤，一名蜌。能吐氣爲樓臺，海中春夏間依約島溆，常有此氣。

《食療》云：車螯，蝤蛑類也，并不可多食之。

蚶　温，主心腹冷氣，腰脊冷風，利五臟，健胃，令人能食，每食了，以飯壓之，不爾令人口乾。又云：温中，消食，起陽，味最重，出海中。殼如瓦屋。又云：無毒，益血色。殼，燒以米醋三度淬後，埋令壞，醋膏丸，治一切血氣，冷氣，癥癖。

蠣　味甘，温，無毒。補虚，主冷利。煮食之，主婦人産後虚損。生海泥中，長二三寸，大如指，兩頭開。主胸中邪熱，煩悶氣。與服丹石人相宜。天行病後不可食，切忌之。

淡菜　温。補五臟，理腰脚氣，益陽事，能消食，除腹中冷氣，消痃癖氣。亦可燒，令汁沸出食之。多食令煩悶目暗，可微利即止。北人多不識，雖形狀不典，而甚益人。又云：温，無毒。補虚勞損，産後血結，腹内冷痛，治癥瘕，腰痛，潤毛髮，崩中帶下。燒一頓令飽，大效。又名殼菜，常時頻燒食即苦，不宜人。與少米先煮熟後，除肉内兩邊鎖及毛了，再入蘿蔔，或紫蘇、或冬瓜皮同煮，即更妙。

陳藏器云：東海夫人，味甘，温，無毒。主虚羸勞損，因産瘦瘠，血氣結積，腹冷，腸鳴，下痢，腰疼，帶下，疝瘕。久服令人髮脱。取肉作臛宜人，發石令腸結。生南海，似珠母，一頭尖，中銜少毛，海人亦名淡菜。新注云：此名殼菜，大甘美，南人好食，治勞虚傷憊，精血少者及吐血，婦人帶下漏下，丈夫久痢，并煮食之，任意。出江湖。

蝦　無鬚及煮色白者，不可食。

謹按：小者生水田及溝渠中，有小毒。小兒患赤白遊腫，搗碎傅之。煮熟色正赤，甚有毒爾。

陳藏器云：食主五野鷄病，小兒目暗，可微利即止。北人多不識，雖形狀不典，而甚益人。又云：温，無毒。補虚勞損，産後血結，腹内冷痛，治癥瘕，腰痛，潤毛髮，崩中帶下。燒一頓令飽，大效。又名殼菜，常時頻燒食即苦，不宜人。與少米先煮熟後，除肉内有大者。已出《拾遺》條中。

《食療》云：平。動風，發瘡疥。

蝮蛇膽　味苦，微寒，有毒。主蠱

瘡。肉，釀作酒，療癩疾，諸瘻，心腹痛，下結氣，除蠱毒。其腹中吞鼠，有小毒，療鼠瘻。

陶隱居云：蝮蛇，黃黑色，黃頷尖口，毒最烈，虺形短而扁，毒不異於蚖，中人不即療，多死。蛇類甚衆，惟此二種及青蝰爲猛，療之并別有方。蛇皆有足，五月五日取，燒地令熱，以酒沃之，置中，足出。術家所用赤連、黃頷，多在人家屋間，吞鼠子、雀雛，見腹中大者，破取，乾之。

《唐本》注云：蛇屎，療痔瘻，器中養取之。皮灰，療疔腫，惡瘡，骨疽。蛻皮，主身癢、瘑、疥、癬等。蝮蛇作地色，鼻反，口叉長，身短，頭尾相似，大毒，一名蚖蛇，無二種也。山南漢沔間多有之。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：形粗短，黃黑如土色，白斑，鼻反者，山南金州、房州、均州皆有之。

圖經衍義本草卷之三十三

---

❶止：晦明軒本作『正』。
❷蛹：晦明軒本作『烟』。
❸不：晦明軒本作『多』。
❹亦：晦明軒本作『彌』。
❺癩瘡：晦明軒本作『喉痹』。
❻諸：原作『者』，據晦明軒本改。
❼其：晦明軒本作『奇』。
❽平：晦明軒本作『隴』。
❾出：晦明軒本作『止』。
❿去：晦明軒本作『至』。
⓫顧：晦明軒本作『田』。
⓬圓：晦明軒本作『蟲』。
⓭部：原作『步』，據晦明軒本改。
⓮黃：晦明軒本作『蟥』。
⓯效：原作『較』，據晦明軒本改。
⓰甲：原作『黑』，據晦明軒本改。
⓱中：晦明軒本作『多』。
⓲此：晦明軒本作『燒』。

圖經衍義本草卷之三十四

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

蟲魚部下品

田中螺汁　大寒。主目熱赤痛，止渴。

《藥性論》云：田螺汁，亦可單用。主治肝熱，目赤腫痛。取大者七枚，洗淨，新汲水養去穢泥，重換水一升浸洗，仍旋取於乾淨器中，著少鹽花於口上，承取自出者，用點目。逐個如此用了，却放之。

陶隱居云：生水田中及湖瀆岸側，形圓大如梨、橘者，人亦煮食之。煮汁，亦療熱，醒酒，止渴。患眼痛，取真珠并黃連納其中，良久汁出，取以注目中，多差。

《唐本》注云：《別録》云：殼，療尸疰，心腹痛；又主失精。水漬飲汁，止渴❶。

今按：陳藏器《本草》云：田中螺，煮食之，利大小便，去腹中結熱，目下黃，脚氣衝上，小腹急硬，小便赤澀，脚手浮腫。生浸取汁飲之，止消渴，碎其肉，傅熱瘡。爛殼燒爲灰末服，主反胃。

陳藏器云：在水田中，圓大者是。小小泥有棱名螭螺，亦止渴，不能下水。食之當先米泔浸去泥，此物至難死，有誤泥在壁中，三十年猶活，能伏氣飲露，唯生穿散而出即死。爛殼燒爲灰末服，主反胃，胃冷，去卒心痛。

日華子云：田螺，冷，無毒。治手足腫及熱瘡，生研汁傅之。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：生水田中，大如桃、李，狀類蝸牛而尖長，青黃色，夏月採之。

《食療》云：大寒。汁飲療熱、醒酒、壓丹石。不可常食。

《聖惠方》：治連月飲酒咽喉爛，舌上生瘡。水中螺、蚌肉、葱、豉、椒、薑煮，飲汁三兩盞，差。

《食醫心鏡方》：主消渴，飲水日夜不止，口乾，小便數。田中螺五升，水一斗，浸經宿，渴即飲之。每日一度易水換生螺爲妙。又方：以水三升，煮取汁，冷即飲之，螺即任吃。



貝子

味鹹，平，有毒。主目翳，鬼疰，蠱毒，腹痛下血，五癃，利水道，除寒熱温疰，解肌，散結熱。燒用之良。一名貝齒。生東海池澤。

《圖經》曰：貝子，生東海池澤，今南海亦有之。貝類之最小者，又若蝸狀。《交州記》曰：大貝出日南，如酒杯；小貝，貝齒。善治毒，俱有紫色是也。潔白如魚齒，故一名貝齒。古人以飾軍容服物，今亦稀用，但穿與小兒戲鬚頭，家以飾鑒帶，畫家亦或使研物。採無時。珂亦似此而大，黃黑色，骨白，可以飾馬。

《藥性論》云：貝子，使。能破五淋，利小便，治傷寒狂熱。

陶隱居云：此是今小小貝子，人以飾軍容服物者，乃出南海。燒作細屑末，以吹眼中，療翳食❷。又真馬珂搗末，亦療盲翳。

《日華子》云：貝齒，良❸。治翳障并鬼毒，蠱氣，下血。又名白貝。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：蝸類也，形若魚，齒潔者良。

《海藥》云：雲南極多，用爲錢貨易。主水氣浮腫及孩子疳蝕，吐乳。并燒過入藥中用。

《聖惠方》：治射罔在諸肉中有毒及漏脯毒。用貝子末，水調半錢服，效。或食麵臛毒，亦同用。

《孫真人方》：點小兒黑花眼翳，澀子一枚，含，自吐。

《千金方》：卒痛。用貝齒一兩燒作灰，研如麵，入少

龍腦，點之妙。又方：去目翳。貝子十枚，燒灰細篩，取一胡豆大，著翳上，卧如炊一石米久乃滅。瘜肉者加真珠與貝子等分。

《衍義》曰：貝子，今謂之貝齒，亦如紫貝，但長寸餘，故曰貝子。色微白，有深紫黑者，治目中翳，燒用。北人用之氈帽上爲飾及綴衣，或作蹀躞下垂。

石蠶



石蠶 味鹹，寒，有毒。主五癃，破石淋，墮胎。肉，解結氣，利水道，除熱。一名沙虱。生江漢池澤。

《圖經》曰：石蠶，生江漢池澤，舊注或以爲草根，生石上，似蠶者。或以爲生氣物，猶如海中蠣蛤輩。又《本經》云：一名沙虱。沙虱自是水中細蟲，都無定論。《蜀本草》注云：此蟲所在水石間有之，人取以爲鈎餌。馬胡❹石間出此最多。彼人亦好啖之，云味鹹、小辛。今此類川、廣中多有之。草根之似蠶者，亦名石蠶，出福州及信州山石上，四時常有，其苗青，亦有節，三月採根，焙乾。主走疰風，散血，止痛。其節亦堪單用，搗篩取末，酒温服。

《唐本》注云：石蠶，形似蠶，細小有角節，青黑色。生江漢側石穴中，坡隴間亦有，北人不多用，採者遂絶爾。今隴州采送之。

《衍義》曰：石蠶，謂之爲草則繆矣。《經》言肉解結氣，《注》中更辨不定此物在處。有附生水中石上，作絲繭如釵股，長寸許，以蔽其身，色如泥，蠶在其中，此所以謂之石蠶也。今方家用者絶稀，此亦水中蟲耳，山河中多。

雀瓮 味甘，平，無毒。主小兒驚癇，寒熱，結氣，蠱毒，鬼疰。一名躁舍。生漢中，採蒸之，生樹枝間，蛅音髯蟖音斯房也。八月取。



雀瓮

《圖經》曰：雀瓮，蛅蟖房也。生漢中木枝上，今處處有之。蛅蟖，蚝蟲也，亦曰蛓。毛蟲，好在石榴木上，似蠶而短，背上有五色斑，刺螫人有毒，欲老者口吐白汁，凝聚漸堅硬，正如雀卵，故名之。一名雀癰，癰、瓮聲近耳，其子在瓮中作蛹，如蠶之在繭也。久而作蛾出，枝間葉上放子如蠶子，復扁❺蟲。舊注以瓮爲蟲卵，非也。

陶隱居云：蛅蟖，蚝蟲也。此蟲多在石榴樹上，俗爲蚝蟲，其背毛亦螫人。生卵形如雀子，大如巴豆，今方家

亦不用此。蛇，一作蝮七吏切。

禹錫云：按《蜀本》注云：雀好食之，俗謂之雀兒飯瓮。

《日華子》云：蝮，毛蟲窠，有毒。

《衍義》曰：雀瓮，多在棘枝上，故又名棘剛子。研其間蟲汁，灌小兒，治驚癇。



白花蛇　味甘、鹹，温，有毒。主中風，濕痹不仁，筋脉拘急，口面喎斜，半身不遂，骨節疼痛，大風疥癩及暴風瘙癢，脚弱不能久立。一名蓑鼻蛇，白花者良。生南地及蜀郡諸山中。九月、十月採捕之，火乾。

《圖經》曰：白花蛇，生南地及蜀郡諸山中，今黔中及蘄州、鄧州皆有之。其文作方勝白花，喜螫人足，黔人有被螫者，立斷之。補養既愈，或作木脚續之，亦不妨行。九月、十月採捕之，火乾。治風速於諸蛇。然有大毒，頭、尾各一尺甚，不可用，只用中斷。乾者以酒浸，去皮骨，炙過收之，不復不可不防也。



烏蛇

《衍義》曰：白花蛇，諸蛇鼻向下，獨此蛇鼻向上，背有方勝花文，以此得名。用之去頭、尾，換酒浸三日，棄酒不用，火炙，仍盡去皮、骨。此物毒甚，



烏蛇　無毒。主諸風瘙癮瘕，疥癬，皮膚不仁，頑痹諸風。用之炙，入丸散，浸酒、合膏。性善，不噬物。江東有黑梢蛇，能漆。背有三棱，色黑如纏物至死，亦是其類。生商洛山。

《圖經》曰：烏蛇，生商洛山左❽，蘄州、黄州山中有之。背有三棱，色黑如漆。性至善，不噬物。多在蘆叢中

嗅其花氣，亦乘南風而及❾。最難採捕，多於蘆枝上得之。至枯死而眼不陷，稱之重三分至一兩者爲上，粗大者轉重，力彌減也。又頭有逆毛，二寸一路，可長半分以來，頭尾相對，用之入神，此極難得也。作僞者，用它蛇生熏之至黑，亦能亂真，但眼不光爲異耳。

禹錫云：按《藥性論》云：烏蛇，君，味甘，平，有小毒。能治熱毒風，皮肌生瘡，眉髭脱落，瘋癘疥等。

《朝野僉載》曰：商州有人患大風，家人惡之，山中爲起茅屋。有烏蛇墜酒罌中，病人不知，飲酒漸差。罌底尚有蛇骨，方知其由也。

《聖惠方》：治面上瘡及黑，以綿裹蛇膏方：用烏蛇二兩，燒灰末，以臘月猪脂調傅之。

《千金方》：治耳聾。塞耳中，神效。

《衍義》曰：烏蛇，尾細長，能穿小銅錢一百文者，佳。有身長一丈餘者，蛇類中此蛇入藥最多。嘗於順安軍塘樂❿堤上，見一烏蛇，長一丈餘，有鼠狼嚙蛇頭，曳之而去，是亦相畏伏爾。市者多僞以它蛇熏黑色貨之，不可不察也。烏蛇脊高，世謂之劍脊烏稍。



蜣螂

蜣螂　味鹹，寒，有毒。主小兒驚癇，癒癡，腹脹，寒熱，大人癲疾狂易音羊。手足端寒，肢滿賁豚。一名蛄音詰蜣音羌。火熬之良。生長沙池澤。五月五日取，蒸，藏之，臨用當炙，勿置水中，令人吐。畏羊角、石膏。

《圖經》曰：蜣螂，生長沙池澤，今處處有之。其類又⓫多，取其大者。又鼻高目深者，名胡蜣蜣，用之最佳。五月五日取，蒸而藏之，臨用當炙，勿置水中，令人吐。小兒疳蟲方多用之。

《本經》不著。唐·劉禹錫纂《柳州救三死方》云：元和十一年得丁瘡，凡十四日，日益篤，善藥傅之皆莫能知，長樂賈方伯教用蜣蜣心，一夕而百苦皆已。明年正月食羊肉又大作，再用亦如神驗。

《藥性論》云：蜣螂，使，主治小兒疳蟲蝕。

陶隱居云：《莊子》云：蛄蜣之智，在於轉丸。其喜入人糞中，取屎丸而却推之，俗名爲推丸。當取大者，其類有三四種，以鼻頭扁者爲真。

《唐本》注云：《別録》云：搗爲丸，塞下部，引痔蟲出盡，永差。

《日華子》云：能墮胎，治疰忤，和乾薑傅惡瘡，出箭頭，其糞窒痔瘻出蟲。入藥去足炒用。

葛洪《肘後方》：主箭鏃入骨不可拔者，微熬巴豆與蜣蜣并研匀，塗所傷處，斯須痛定，是必微癢，且忍之，待及癢不可忍，便撼動箭鏃拔之立出。

《聖惠方》：治一切惡瘡及沙虱弓⓬弩，惡疽，并治之。將蜣螂十枚，端午日收乾者佳。杵末油調傅之。

《外臺秘要方》：治癮瘕風。取塗中死蜣螂杵爛之，當揩令熱，封之，一宿差。

《子母秘録方》：小兒大腸頭得惡瘡癰熱識者⑬。取蜣螂用，絞取汁，傅其上。又方：治小兒重舌。燒蜣螂末，和唾傅舌上。

《劉涓子方》：治鼠瘻。死蜣螂燒作灰爲末，苦酒和傅之，數過即愈，先以鹽湯洗。

《衍義》曰：蜣螂，大小二種：一種大者爲胡蜣螂，身黑光，腹翼下有小黄，子附母而飛行，晝不出，夜方飛出，至人家庭户中，見燈光則來。一種小者，身黑暗，晝方飛出，夜不出。今當用胡蜣螂，其小者研三十枚，以水灌牛馬，治脹結，絶佳。狐遇而必盡食之。

五靈脂

味甘，温，無毒。主療心腹冷氣，小兒五疳，辟疫，治腸風，通利氣脉，女子月閉。出北地，此是寒號蟲糞也。

《圖經》曰：五靈脂，出北地，今惟河東州郡有之。云是寒號蟲糞，色黑如鐵，採無時。然多夾沙石，絶難修治。若用之，先以酒研飛煉，令去沙石，乃佳。治傷冷積聚及小兒、女子方中多用之。今醫治産婦血暈昏迷，上衝悶絶，不知人事者。五靈脂二兩，一半炒熟，一半生用，搗爲細末，每服一錢，温熟水調下。如口噤者，以物斡⑭開口灌之，入喉即愈，謂之獨勝散。又治血崩不止。五靈脂十兩，搗爲細末，以水五大盞，煎至三盞，去滓澄清，再煎爲膏，入神麴末二兩，合和，丸如梧桐子大。每服二十丸，温酒下，空心服便止。諸方用之及⑮多。



五靈脂

禹錫云：今據號⑯蟲四足，有肉翅不能遠飛，所以不入禽部。

《經驗方》：治丈夫、婦人吐逆，連日不止，粥食湯藥不能下者，可以應用此候⑰效。麝香半兩，乳香半兩，川烏頭一兩，没藥一兩，同爲末，滴水丸如彈子大，精好者，不計多少，搗爲細末，研狗膽汁和爲丸，如鷄頭大。每服一丸，煎熱生薑、酒，摩令及⑱細，更以少生薑、酒摩丸，五靈脂不夾土石，揀化以湯，湯藥令極熱，須是先做下粥，温熱得所，左手與患人藥吃，不得漱口，右手急將粥與患人吃，不令太多。

《經效方》：治婦人心痛，血氣刺不可忍，失笑散：五靈脂净好者，蒲黄等分，爲末。每服二錢，用好醋一杓熬成膏，再入水一盞同煎至七分，熱服，立效。又方：治婦人經血不止。五靈脂末，炒令過熟，出盡烟氣。每服大兩錢，用當歸兩片，酒一中盞，與藥末同煎至六分，去滓熱服。連三五服效。

《衍義》曰：五靈脂，行經血有功，不能生血。常有人病眼中翳，往來不定，如此乃是血所病也。蓋心生血，肝藏血，肝受血則能視，目病不治血爲背理。此物入肝最速。一法，五靈脂二兩，没藥一兩，乳香半兩，川烏頭一兩半，炮去皮，同爲末，滴水丸如彈子大，

每用一丸，生薑温酒磨服，治風冷氣血閉，手足身體疼痛，冷麻。又有人被毒蛇所傷，良久之間已昏困，有老僧以酒調藥二錢灌之，遂蘇。及以藥滓塗咬處，良久，復灌二錢，其毒皆去。問之，乃五靈脂一兩，雄黄半兩，同爲末，止此耳。後有中毒者用之，無不驗。此藥雖不⑲甚貴，然亦多有僞者。

蠍



蠍　味甘、辛，有毒。療諸風癮疹及中風，半身不遂，口眼喎斜，語澀，手足抽掣。形緊小者良。出青州者良。舊不著所出州土，注云出青州者良，今京東㉑西及河、陝㉒州郡皆有之。採無時。用之欲緊小者。今人捕得，皆火逼乾死收之。方書謂之蜥蜴。陶隱居《集驗方》云：蠍有雌雄，雄者螫人痛止在一處，雌者痛牽諸處。若是雄者，用井泥傅之，温則易。雌者當用瓦屋溝下泥傅之。治中風抽掣手足，及小兒驚搐方，多用蠍。《簏中方》治小兒風癇，取蠍五枚，以一大石榴割頭，去子，作瓮子樣，内蠍其中，以頭蓋之，紙根⑳和黄泥封裹，以微火炙乾，漸加火燒令通赤，良久去火，待冷去泥，取中焦黑者細研。乳汁調半錢匕，灌之便㉔定。兒⑳稍大，則以防風湯調服之。

禹錫云：按《蜀本》云：蠍，緊小者名蜥蜴。段成式《酉陽雜俎》云：鼠負蟲巨者，多化爲蠍。蠍子多負於背，嘗見一蠍負十餘子，子色猶白，才如稻粒。陳州古倉有蠍，形如錢，螫人必死。江南舊無蠍，開元初嘗有主簿，竹筒盛過江，至今江南往往有之，俗呼爲主簿蟲。蠍常爲蝸所食，先以迹規之不復去。蠍前謂之螫，後謂之蠆。

《經驗方》：治小兒驚風。用蠍一個，不失頭尾，薄荷四葉裹合，火上炙令薄荷焦，同碾爲末，作四服，湯下。大人風涎只一服。

《杜壬方》：治耳聾。因腎虚所致，十年内一服愈。蠍，至小者四十九枚，生薑如蠍大四十九片，二物銅器内，炒至生㉖薑乾爲度，爲末。并作一服，初夜温酒下，至三更盡，盡量飲酒至醉，不妨。次日即效。

《衍義》曰：蠍，大人、小兒通用，治小兒驚風，不可闕也。有用全者，有只用稍者，稍力尤功。今青州山中石下捕得，慢火逼，或烈日中煦，蠍渴熱時，乃與青泥食之，既滿腹，以火逼殺之，故其色多赤，欲其體重而售之故也。醫家用之，皆悉去土。



螻蛄上音婁，下音姑　味鹹，寒，無毒。主産難，出肉中刺，潰癰腫，下哽噎，解毒，除惡瘡。一名蟪蛄，一名天螻，一名螜音斛。生東城平澤，夜出者良，夏至取，暴乾。

《圖經》曰：螻蛄，生東城平澤，今處處有之。穴地糞壤中而生，夜則出求食，人夜行忽見出，多打殺之，言其爲鬼所使也。夏至後取，暴乾，以夜出者良。其自腰以前甚澀，主止大小便，或云止小便。自腰以後甚利，主下大小便。若出拔刺，多用其腦，此一名螜。《爾雅》云：螜，天螻。《夏小正》篇云：三月螜則鳴是也。《廣雅》云：一名碩鼠，《易》晋如碩鼠。孔穎達《正義》云：有五能而不能成技之蟲也。又引蔡邕《勸學篇》云：碩鼠五能不成一技術。注云：能飛不能過屋；能緣不能窮木；能游不能度谷；能穴不能掩身；能走不能免人。《荀子》云：梧鼠五技而窮。并爲此螻蛄也。今方家治石淋導水，用螻蛄一㉗枚，鹽二兩，同於新瓦上鋪蓋焙乾，研末。温酒調一錢匕，服之即愈。

陶隱居云：以自出者，其自腰以前甚澀，主止大小便。從腰以後甚利，主下大小便。若出拔刺，多用其腦。此物頗叶神鬼，昔人獄中得其蟪力者。今人夜忽見出，多打殺之，言爲鬼所使也。

禹錫云：按《蜀本》注云：《爾雅》曰：螜，天螻是也。《圖經》云：夏至取，今所在有。

《日華子》云：冷，有毒。治惡瘡水腫，頭面腫，入藥炒用之。

雷公云：味鹹，無毒。

《聖惠方》：十種水病，腫滿喘促不得卧。螻蛄五枚，乾爲末。食前湯調半錢匕至一錢，小便通，效。

《外臺秘要方》：治鯁。螻蛄腦一物吞，亦治刺不出，傅之，刺即出。

孫真人：治箭鏃在咽喉，胸膈及針刺不出。以螻蛄搗取汁滴上，三五度箭頭自出。

《衍義》曰：螻蛄，此蟲當立夏後，至夜則鳴，《月令》謂之螻蟈鳴者是矣。其聲如蚯蚓，此乃是五技而無一長者。



鯪鯉甲　微寒。主五邪，驚啼悲傷，燒之作灰，以酒或水和方寸匕，療蟻瘻。

《圖經》曰：鯪鯉甲，舊不著所出州土，今湖嶺及金、商、均、房間深山大谷中皆有之。似鼉而短小，色黑，又似鯉魚而有四足，能陸能水。日中出岸，開鱗如死，令蟻入中，蟻滿便閉而入水，蟻皆浮出，因接而食之，故主蟻瘻爲最。亦主惡瘡疥癩，燒其甲，末，傅之。楊炎《南行方》主山瘴瘧，有鯪鯉甲湯。今人謂之穿山甲，近醫亦用燒灰，與少肉豆蔻末，飲調下，療腸痔疾。

又治人奶疼痛不可忍，用穿山甲炙黃，木通各一兩，自然銅半兩，主用三味搗爲細末。每服三錢，温酒調下，不計時候。

《藥性論》云：鯪鯉甲，使，有大毒。治山瘴瘧，惡瘡，燒傅之。

陶隱居云：其形似鼉而短小，又似鯉魚，有四足，能陸能水。出岸開鱗甲，伏如死，令蟻入中，忽閉而入水，開甲，蟻皆浮出，於是食之。故主蟻瘻，方用亦稀，惟療瘡癩及諸疰疾爾。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：生深山大谷中，金、房、均等州皆有之。

《日華子》云：凉，有毒。治小兒驚邪，婦人鬼魅悲泣及痔漏，惡瘡，疥癬。

《千金翼方》：治蟻漏。取鯪鯉甲二七枚，末，猪膏和傅之。

《簡要濟衆方》：治産後血氣上衝心成血暈。穿山甲一兩，童子小便浸一宿，取出慢火炙令黄，爲末。每服一錢，狗膽少許，熱酒調下，非時服之。

《外臺秘要方》：《肘後》治蟻入耳。燒鱗鯉甲末，以水調灌之，即出。

《衍義》曰：鯪鯉甲，穴山而居，亦能水。燒一兩存性，肉豆蔻仁三個，同爲末，米飲調二錢，服，治氣痔，膿血；甚者加猬皮一兩，燒入，中病即已，不必盡劑。



芫青

味辛，微温，有毒。主蠱毒，風疰，鬼疰，墮胎。三月取，暴乾。

《圖經》曰：芫青，《本經》不載出州土，今處處有之。其形頗與斑猫相類，但純青緑色，背上一道黄文，尖喙。三四月芫花發時乃生，多就花上採之，暴乾。凡用斑猫、芫青、亭長之類，當以糯米同炒，看米色黄黑，即爲熟，便出之。去頭、足及翅翼，更以亂髮裹之，挂屋東榮一宿，然後用之，則去毒矣。

陶隱居云：芫花時取之，青黑色，亦療鼠瘻。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：形大小如斑猫，純青緑色，今出寧州。

雷公云：芫青、斑猫、亭長、赤頭等四件，其㉘樣各不同，所居、所食、所效各不同。其芫青觜尖，背上有一畫黄。斑猫背上一畫黄，一畫黑，觜尖處小點赤，在豆葉上居，食豆葉汁。亭長形黑黄，在蔓葉上居，食蔓膠汁。赤頭，額上有大紅一點，身黑。用各有㉙處。凡修事芫青、斑猫、亭長、赤頭并用糯米、小麻子相拌同炒，待米黄黑出，去麻子等，去兩翅、足并頭，用血餘裹，懸於東墻角上一夜，至明取用。

黿 音蛙

味甘，寒，無毒。主小兒赤氣，肌瘡，臍傷，止痛，氣不足。一名長股。生水中，取無時。

黿





《圖經》曰：黿，《本經》不載所出州土，云生水中，今處處有之。似蝦蟆而背青緑色，俗謂之青黿。外有背作黄文者，人謂之金綫黿。陶隱居云：凡蜂、蟻、黿、蟬，其類最多，大腹而脊青者，俗名土鴨，其鳴甚壯，即《爾雅》所謂在水曰黿[30]者是也。黑色者，南人呼爲蛤子，食之至美，即今所謂之蛤，亦名水鷄是也。閩、蜀、浙東人以爲珍饌。彼人云食之補虚損，尤宜産婦，即此也。

陶隱居云：凡蜂、蟻、黿、蟬，其類最多。大而青脊者，俗名土鴨，其鳴甚壯。又一種黑色，南人名爲蛉[31]子，食之至美。又一種小[32]形善鳴喚，名黿子，此則是也。

禹錫云：按《蜀本》注云：蝦蟆屬也，居陸地，青脊善鳴，聲作黿者是。

《日華子》云：青黿，性冷，治小兒熱[33]，背有黄路者，名諸乘，俗呼胡蝌，道家蟲，去勞劣，解熱毒，身青緑者是也。

《千金方》：主小兒赤氣。

禹錫云：此有五六種，今用青色大眼者，一名諸乘，俗呼胡蝌，道家用以止精。眼可化爲青珠。其餘黄細及黑者，不入藥用，一名蜻蜓。

《衍義》曰：黿，其色青，腹細嘴尖，後肱長，故善躍。大其聲則曰蛙，小其聲則曰蛤，《月令》所謂雀入大水化爲蛤者也。唐·韓退之詩一夜青蛙啼到曉者是。此食之性平，解勞熱。

蜻蛉



蜻蛉 上音青，下音零　微寒。强陰，止[34]精。

《圖經》曰：蜻蛉，舊不載所出州郡，今所在水際多有之。此有數種，當用青色大眼者爲良。其餘紅[35]赤及黑色者不入用。俗間正名蜻蜓，而不甚須也。道家則多用之。

陶隱居云：此有五六種，今用青色大眼者，一名諸乘，俗呼胡蝌，道家用以止精。眼可化爲青珠。其餘黄細及黑者，不入藥用，一名蜻蜓。

禹錫云：按《蜀本》注云：蜻蜓六足四翼，好飛溪渠側。

《日華子》云：蜻蛉，其中一種最大，陽，暖水臟。入藥去翼足，炒用良。

《衍義》曰：蜻蛉，其中一種最大，京師名爲馬大頭者是，身緑色，雌者腰間一遭碧色。用則當用雄者，陶隱居以謂青色大眼。一類之中，元無青者，眼一類皆大。此物生化於水中，故多飛水上。唐·杜甫云：點水蜻蜓款款

鼠婦

味酸，温、微寒，無毒。主氣癰，不得小便，婦人月閉，血瘕，癇瘕，寒熱，利水道。一名負燔[36]音煩，一

鼠婦



名蚐音伊蝛音威，一名蜲蟓。生魏郡平谷及人家地上，五月五日取。

《圖經》曰：鼠婦，生魏郡平谷及人家地上，今處處有之。多在下濕處瓮器底及土坎中，常惹著鼠背，故名鼠負。今作婦字，謬耳。《爾雅》云：蟠鼠，鼠負。郭璞云：瓮器底蟲[37]。又云：蚐蝛，委黍。《詩·東山》云：蚐蝛在室。鄭箋云：此物家無人則生。然《本經》亦有此名，是今人所謂濕生蟲者也。五月五日取。古方有用者，張仲景主久瘧，大鱉甲丸中使之，以其主寒熱也。

陶隱居云：一名鼠負，言鼠多在坎中，背則負之，今作婦字，如似乖理。又一名鼠姑。

《日華子》云：鼠婦蟲，有毒。通[38]小便，能墮胎。

《千金方》：治産後小便不利。鼠婦七枚，一味熬爲屑，作一服，酒調下。

《衍義》曰：鼠婦，此濕生蟲也，多足，其色如蚓，背有横紋蹙起，大者長三四分，在處有之，磚甃及下濕處多，用處絶少。

衣魚



衣魚　味鹹，温，無毒。主婦人疝瘕，小便不利，小兒中風項强上聲也背起，摩之。又療淋，墮胎，塗瘡滅瘢。一名白魚，一名蟫音談。生咸陽平澤。

《圖經》曰：衣魚，生咸陽平澤，今處處有之。衣中乃少，而多在書卷中。《爾雅》所謂蟫潭，尋兩音，白魚。郭璞云：衣、書中蟲，一名蛃魚是也。段成式云：補闕張周[39]見壁上瓜子化爲白魚，因知《列子》朽瓜爲魚之言不虚也。古方主小兒淋閉，取以摩臍及小腹，溺即通。又合鷹屎、殭蠶同傅瘡瘢即滅。今人謂之壁魚，俗傳壁魚入道經函中，因蠹食神仙字，則身有五色，人能得而吞之，可致神仙。唐·張湯之少子，惑其説，乃多書神仙字，碎剪置瓶中，取壁魚投之，冀其蠹食而不能得，遂致心疾。蛃音丙。

禹錫云：按《藥性論》云：衣中白魚，以[40]有毒，利小便。

《千金方》：治沙石草落目中，眯，不出。白魚以乳汁和，注目中。

《外臺秘要方》：主眼翳。白魚末，注少許於翳中。

《孫真人方》：卒患偏風，口喎語澀。取白魚摩耳下。喎向左摩右，向右摩左，正即止。

《子母秘録方》：治婦人無故遺血溺。衣中白魚三十個，納陰中。

《衍義》曰：衣魚，多在故書中，久

不動，帛中或有之，不若故紙中也。身有厚粉，手搔之則落，亦噛毳衣，用處亦少。其形稍似魚，其尾又分二歧，世用以滅瘢痕。

甲香



甲香　味鹹，平，無毒。主心腹滿痛，氣急，止痢，下淋。生南海。

《圖經》曰：甲香，生南海，今嶺外、閩中近海州郡及明州皆有之。海蟲之掩也。《南州異物志》曰：甲香，大者如甌面，前一邊直攙長數寸，圍殼疽蛞有刺。其掩雜衆香燒之使益芳，獨燒則臭。一名流螺。諸螺之中，流最厚味是也。其蟲大如小拳，青黄色，長四五寸。人亦啖其肉。今醫方稀用。蟲音螺。

《唐本》注云：蟲大如小拳，青黄色，長四五寸，取鱉燒灰用之。南人亦煮其肉啖，亦無損益也。

《海藥》云：和氣清神，主腹㊶風癃痔。陳氏云：主蜂螫，疥癬，頭瘡，嚫瘡。甲煎，口脂用也。《廣州記》云：南人常食，若龜鱉鱉之類。又有小甲香，若螺子狀。取其蒂而修成也。

《衍義》曰：甲香，善能管香烟，與沉、檀、龍、麝用之，甚佳。

金蛇　無毒。解生金毒。人中金毒。人中金藥毒者，取蛇四寸，炙令黄，煮汁飲，頻服之，以差爲度。大如中指，長尺許，常登木飲露，體作金色，照日有光。亦有銀蛇，解銀藥毒。人中金毒，候之有銀蛇，解銀藥毒。大如細筆管，長三四寸，斑色，一如蚰蜒，襄陽人名爲馬蚿，亦呼馬軸，亦名刀環蟲，以其死側卧，狀如刀環也。有人自毒，服一枚便死也。

《唐本》注云：金蛇，出賓州。大如小拳，青黄色，長四五寸，取鱉燒灰用之。南人亦煮其肉啖，亦無損益也。

《海藥》云：主腹㊶風癃痔。陳氏云：主蜂螫，疥癬，頭瘡，嚫瘡。甲煎，口脂用也。《廣州記》云：南人常食，若龜鱉鱉之類。又有小甲香，若螺子狀。取其蒂而修成也。

《衍義》曰：甲香，善能管香烟，與沉、檀、龍、麝用之，甚佳。

馬陸　味辛，温，有毒。主腹中大堅癥，破積聚，息肉，惡瘡，白禿，療寒熱痞結，脅下滿。一名百足，一名馬軸。生玄菟川谷。

陶隱居云：李云此蟲形長五六寸，狀如大蚓，夏月登樹鳴，冬則蟄，今人呼爲飛蚿蟲也，恐不必是馬陸爾。今有一細黄蟲，狀如蜈蚣而甚長，俗名土蟲，鷄食之醉悶亦至死。書云：百足之蟲，至死不僵。此蟲足甚多，寸寸斷便寸行，或欲相似，方家既不復用，市人亦無取者，未詳何者的是。

《唐本》注云：此蟲大如細筆管，長三四寸，斑色，一如蚰蜒，襄陽人名爲馬蚿，亦呼馬軸，亦名刀環蟲，以其死側卧，狀如刀環也。有人自毒，服一枚便死也。

《衍義》曰：馬陸，即今百節蟲也，

身如槎節，節有細蹙紋，起紫黑色，光潤，百足。死則側卧狀如刀環也，長二三寸，尤者粗如小指。西京上陽宮及內城磚墻中甚多，入藥至鮮。

地膽　味辛，寒，有毒。主鬼疰，寒熱，鼠瘻，惡瘡，死肌，破癥瘕，墮胎，蝕瘡中惡肉，鼻中息肉，散結氣石淋，去子，服一刀圭即下。一名阮青，一名蛙❸烏媧切。生汶山川谷，八月取。惡甘草。

《藥性論》云：地膽，能宣出瘰癧根，從小便出，上亦吐之。治鼻塞。

陶隱居云：真者出梁州，狀如大馬蟻，有翼，僞者即斑猫所化，狀如大豆，大都療體略同，必不能得真爾，此亦可用，故有蚖青之名。蚖字乃異，恐是相承誤矣。

《唐本》注云：形如大馬蟻者，今見出邠州者是也。狀如大豆者，未見也。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：二月、三月、八月、九月，草菜上取之，形倍黑色，芫青所化也。

珂　味鹹，平，無毒。主目中翳，斷血，生肌。貝類也，大如鰒，皮黄黑而骨白，以爲馬飾。生南海，取無時。

《海藥》云：謹按《名醫別録》云：生南海，白如蚌。主消翳膜及筋弩肉，并刮點之。此外無諸要用也。

雷公云：要冬採得色白膩❹者，并有白旋水紋。勿令見火，立無用處。夫用，以銅刀刮作末子，細研，用重絹羅篩過後，研千餘下用。此物不入婦人藥中用。

螢火　味辛，微温，無毒。主明目，小兒火瘡，傷熱氣，蠱毒，鬼疰，通神精。一名夜光，一名放光，一名熠燿上以入切，下以灼切，一名即炤音照。生階地池澤。七月七日取，陰乾。

陶隱居云：此是腐草及爛竹根所化，初猶未如蟲，腹下已有光，數日便變而能飛。方術家捕取納酒中令死，乃乾之，俗藥用之亦稀。

海螺　《百一》云：治目痛累年，或三四十年方。取生螺一枚，洗之，内燥抹螺口開，以黄連一枚，納螺口中，令其螺飲黄連汁，以綿注取汁，著眦中。

孫真人：合菜食，治心痛。

海月　味辛，平，無毒。主消渴，下氣，令人能食，利五臟。

獨脚蜂　所用同前。似小蜂，黑色，一足。連樹根不得去，不能動摇，五月採取，出嶺南。又有獨脚蟻，功用同蜂。亦連樹根，不❺能動摇，出嶺南。

飛生蟲　無毒。令人易産，取角，臨時執之。亦得可燒末服少許，蟲如嚙髮，頭上有角。

兩頭蛇　見之令人不吉。大如指，一頭無目無口，二頭俱能行。出會稽，人云是越王弩弦。昔孫叔敖埋之，恐後人見之，將必死也。人見蛇足，亦

云不佳。蛇以桑薪燒之，則足出見，無可怪也。

圖經衍義本草卷之三十四

❶渴：原作『濕』，據晦明軒本改。
❷食：晦明軒本作『良』。
❸良：晦明軒本作『凉』。
❹胡：晦明軒本作『湖』。
❺扁：晦明軒本作『爲』。
❻神：晦明軒本作『藥』。
❼後：晦明軒本作『彼』。
❽左：晦明軒本作『今』，屬下讀。
❾及：晦明軒本作『吸』。
❿樂：晦明軒本作『澡』。
⓫又：晦明軒本作『極』。
⓬弓：晦明軒本作『水』。
⓭小兒大腸頭得惡瘡癰熱識者：晦明軒本作『小兒大人忽得惡瘡未辨識者』。
⓮斡：原作『乾』，據晦明軒本改。
⓯及：晦明軒本作『極』。
⓰號：晦明軒本『號』上有『寒』字。
⓱候：晦明軒本作『得』。
⓲及：晦明軒本作『極』。
⓳不：原脱，據晦明軒本補。
⓴按舊：晦明軒本無此二字。
㉑東：原作『木』，據晦明軒本改。
㉜陜：原作『夾』，據晦明軒本改。
⓴根：晦明軒本作『筋』。
㉞便：原作『更』，據晦明軒本改。
㉕兒：原作『與』，據晦明軒本改。
㉖生：原作『柱』，據晦明軒本改。
㉗一：晦明軒本作『七』。
㉘其：原作『一』，據晦明軒本改。
⓴有：晦明軒本『有』下有『長』字。
⓴轟：原作『蛙』，據晦明軒本改。
㉛蛉：晦明軒本作『蛤』。
㉜小：原作『下』，據晦明軒本改。
⓴熱：晦明軒本『熱』下有『瘡』字。
㉞止：原作『上』，據晦明軒本改。
㉗紅：晦明軒本作『黄』。
㉖燔：晦明軒本作『蟠』。
㉗蟲：原作『二』，據晦明軒本改。
㊳通：原脱，據晦明軒本補。
⓴周：晦明軒本『周』下有『封』字。
㊸以：晦明軒本作『使』，獨字爲句。
㊶腹：晦明軒本作『腸』。
㊸主：原作『至』，據晦明軒本改。
㊸蛙：晦明軒本『蛙』上有『青』字。
㊹膩：原作『二』，據晦明軒本改。
㊺不：晦明軒本作『下』，屬上讀。

圖經衍義本草卷之三十五

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

果部上品

豆蔻





豆蔻　味辛，温，無毒。主温中，心腹痛，嘔吐，去口臭氣。生南海。

《圖經》曰：豆蔻，即草豆蔻也。生南海，今嶺南皆有之。苗似蘆，葉似山薑、杜若輩，根似高良薑。花作穗，初如芙蓉，穗頭深紅色，葉漸展，花漸出，而色漸淡，亦有黄白色者，南人多採以當果實，尤貴。暴

乾者，煎湯服之，極能除冷氣，止霍亂，消酒食毒，甚佳。

《藥性論》云：草豆蔻，可單用，能主一切冷氣。

陶隱居云：味辛烈者爲好，甚香，可常含之。其五和糝中物皆宜人。廉薑，最温中下氣；益智，熱；枸櫞，温；甘蕉、鹿目并小冷爾。糝，素感切。枸，音矩。櫞，音沿。鹿，音几。

《唐本》注云：豆蔻，苗似山薑，花黄白；苗、根及子赤似杜若。枸櫞，性冷，陶云温，誤爾。

今注：此草豆蔻也，下氣止霍亂。

《日華子》云：豆蔻花，熱，無毒。下氣，止嘔逆，除霍亂，調中補胃氣。消酒毒。又云：山薑花，暖，無毒。調中下氣，消食，殺酒毒。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：苗似杜若。春花在❶穗端，如❷芙蓉，四房，生於莖下，白色，花開即黄。根似高良薑。實若龍眼，而無鱗甲，中如石榴子。莖、葉、子皆味辛而香。今苑中亦種之。十月收。

《海藥》云：豆蔻，生交趾，其根似益智，皮殼小厚，核如石榴，辛且香。葫草，樹也，葉如芄蘭而小。三月採其葉，細破陰乾之。味近苦而有甘。

《千金方》：治心腹脹滿，短氣。以草豆蔻一兩，去皮爲末，以木瓜生薑湯下半錢。

《衍義》曰：豆蔻，生交趾，草豆蔻也，味極辛，微香。此是對肉豆蔻而名之。若作果，則味不和。不知前人之意，編入果部，有何意義？性温而調，散冷氣，力甚速。花性熱，淹置京師，然味不甚美，微苦。必爲能消酒毒，故爲果。花乾則色淡紫。

藕實莖　味甘，平、寒，無毒。主補中養神，益氣力，除百疾。久服輕身耐老，不饑延年。一名水芝丹，一名蓮。生汝南池澤。八月採。

《圖經》曰：藕實莖，生汝南池澤，今處處有之。生水中，其葉名荷。謹按：《爾雅》及陸機疏謂：荷爲芙蕖，江東呼荷。其莖茄；其葉蕸加遐二音或作葭；其本蔤，莖下白蒻在泥中者；其華未發爲菡萏，已發爲芙蓉；其實蓮，蓮上謂房也；其根藕。凡此數物，今人皆以中藥。藕，生食其莖，主霍亂後虚渴煩悶，不能食及解酒食毒。花，鎮心，益顏色，入香尤佳。荷葉，止渴，殺蕈毒。今婦人藥多用荷葉者。葉中蒂，謂之荷鼻。主安胎，去惡血，留好血。實，主益氣。其的至秋表皮黑而沉水者，謂之石蓮。陸機云：可磨爲飯，如粟飯，輕身益氣，令人强健。醫人炒末以止痢，治腰痛。又治噦逆，以實人六枚，炒赤黄色，研末，冷熱水半盞，和服，便止。惟苦薏不可食，能令


藕實

人霍亂。大抵功用主血多效。蒴音若。

《藥性論》云：藕汁亦單用，味甘，能消瘀血不散。即❸搗汁，主吐血不止，口鼻并皆治之。

陶隱居云：此即今蓮子，八月、九月取堅黑者，乾搗破之。花及根并入神仙用。今云莖，恐即是根，不爾不應言甘也。宋帝時，大官作血衄，庖人削藕皮誤落血中，遂皆散不凝，醫用藕療血多效。

《唐本》注云：《別録》云：藕，主熱渴，散血，生肌。久服令人心喜。

陳藏器云：荷鼻，味苦，平，無毒。主安胎，去惡血，留好血，血痢，煮服之。即荷葉蒂。又葉及房，主血脹腹痛，産後胎衣不下，酒煮服。又主食野菌毒，水煮服。鄭玄云：芙蕖莖曰荷。的中薏，食之令人霍亂。

陳士良云：蓮子心，生取爲末，以米飲調下三錢，療血、渴疾。産後渴疾，服之立愈。

《日華子》云：藕，温。止霍亂，開胃消食，除煩止悶，口乾渴疾。止怒，令人喜。産後血悶，生研服亦不妨，可及金瘡并傷却❹，止暴痛。蒸煮食，大開胃。節，冷。解熱毒，消瘀血。産後血悶，合地黄生研汁，熱酒并小便服，并得。又云：蓮子，温，并石蓮。益氣止渴，助心，止痢。治腰痛，治泄精，安心，多食令人喜，又名蓮的。蓮子心，苖，蓮葉也。的，蓮實也。薏，中心也。止霍亂。又云：荷葉，止渴，落胞，殺曹毒，并産後口乾，心肺燥，煩悶，入藥炙用之。又云：蓮花，暖，無毒。鎮心，輕身，益色，駐顔。入香甚妙。忌地黄、蒜。

孟詵云：藕，生食之，主霍亂後虚渴、煩悶、不能食。其産後忌生冷物，惟藕不同生冷，爲能破血故也。又蒸食甚補五臟，實下焦。與蜜同食，令人腹臟肥，不生諸蟲。亦可休糧。仙家有貯石蓮子及乾藕經千年者，食之至精矣。又云：蓮子，性寒，主五臟不足，傷中氣絶，利益十二經脉血氣。生食微動氣，蒸食之良。又熟去心，爲末，蠟蜜和丸。日服三十丸，令人不饑。此方仙家用爾。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：此生水中。葉名荷，圓徑尺餘。《爾雅》云：荷，芙蕖。其莖茄，其葉蕸，其本蔤，其華菡萏，其實蓮，其根藕，其中的，的中薏是也。《爾雅》釋曰：芙蕖，其實蓮，其根藕，其中的，蓮實也。薏，中心也。郭云：蔤，下❺白蒻在泥中者。今江東人呼荷葉❻爲芙蓉，北方人便以藕爲荷，亦以蓮爲荷。蜀人以藕爲茄，或用其母爲華名，或用根子爲母葉號。此❼皆名相錯，習俗傳誤，失其正體也。陸機疏云：蓮，青皮裏白，子爲的，的中有青爲薏，味甚苦，故俚語云苦如薏，是也。

孫真人云：蓮子不去心食，成霍亂。

《食醫心鏡》云：藕實，味甘，平，無毒。主補中養神，益氣力，除百病。久服令人歡心，止渴去熱，輕身耐老，不饑延年。其根止熱渴，破留血，生肌。久服令人悦澤矣。

《聖惠方》：治時氣煩渴。用生藕

汁一半❽盞，入生蜜一合，令勻，分爲二服。又方：治撲打墜損，惡血攻心，悶亂疼痛。以火乾荷葉五斤，燒令烟盡，細研。食前以童子熱小便一小盞，調三錢匕，日三服。

《千金方》：治墜馬，積血心腹，唾血無數。乾花❾根爲末，酒服方寸匕，日三服。

《經驗後方》：主吐血咯血。以荷葉焙乾爲末，米湯下二錢匕。

《梅師方》：治産後餘血不盡，奔上衝心，煩悶腹痛。以生藕汁一❿升飲之。

《救急方》：治産後血不盡，疼悶心痛。荷葉熬令香，爲末，煎水下方寸匕。

《集驗方》：治漆瘡。取蓮葉乾者一斤，水一斗，煮取二⓫升，洗瘡上，日再，即差。

《衍義》曰：藕實，就蓬中乾，擦去浮石蓮子，取其肉，於砂盆中乾者爲上赤色，留青心爲末，少入龍腦爲湯點，寧心志，清神。然亦有粉紅千葉、白千葉者，皆不實。如此是有四等也。其根惟白蓮爲佳。今禁中又生碧蓮，亦一瑞也。

橘柚





柚

橘柚　味辛，温，無毒。主胸中瘕熱逆氣，利水穀，下氣，止嘔咳，除膀胱留熱，停水，五淋，利小便，主脾不能消穀，氣衝胸中，吐逆，霍亂，止泄，去寸白。久服去臭，下氣通神，輕身長年。一名橘皮。生南山川谷，生江南。十月採。

《圖經》曰：橘、柚，生南山川谷及江南，及江浙、荆襄、湖嶺皆有之。木高一二丈，葉與枳無辨，刺出於莖間。夏初生白花，六月、七月而成實，至冬而黄熟，乃可啖。舊説小者爲橘，大者爲柚。又云：柚似橙而實酢，大於橘。孔安國注《尚書》：厥包橘柚。郭璞注《爾雅》柚條皆如此⓬説。又閩中、嶺外、江南皆有柚，比橘黄白色而大；襄、唐間柚，色青黄而實小。皆味酸，皮厚，不堪入藥。

陶隱居云：此是説其皮功爾。以東橘爲好，西江亦有而不如。其皮小冷，療氣，乃言勝橘。北人亦用之，并以陳者爲良。其肉，味甘、酸，食之多痰，恐非益也。今此雖用皮，既是果類，所以猶宜相從。柚子皮乃可服，而不復入藥。用此應亦下氣。

《唐本》注云：柚皮厚，味甘，不如橘皮味辛而苦。其肉亦如橘，有甘有酸，酸者名胡甘。今俗人或謂橙爲柚，非也。按《吕氏春秋》云：果之美者，有雲夢之柚。郭璞云：柚似橙，而大於橙。孔安國云：大曰柚，小曰橘，皆爲甘酸。

今注：自木部今移入此。

陳藏器云：橘、柚本功外，中實冷。酸者聚痰，甜者潤肺。皮堪入藥，子非宜人。其類有朱柑、乳柑、黄柑、石柑、沙柑。橘類有朱橘、乳橘、塌橘、山橘、黄淡子。此輩皮皆去氣調中，實總堪食。就中以乳柑爲上。《本經》合入果部，宜加實字，入木部非也。嶺南有柚，大如冬瓜。

《日華子》云：橘，味甘、酸。止消渴，開胃，除胸中膈氣。又云：皮，暖，消痰止嗽，破癥瘕痃癖。又云：核，治腰痛，膀胱氣，腎疼[13]，炒去殼，酒服，良。橘囊上筋膜，治渴及吐酒。炒，煎湯飲，甚驗也。又云：柚子，無毒。治妊孕人吃食少并口淡，去胃中惡氣，消食，去腸胃氣。解酒毒，治飲酒人口氣。

禹錫云：按《藥性論》云：橘皮，臣，味苦、辛。能治胸膈間氣，開胃，主氣痢，消痰涎，治上氣咳嗽。

孟詵云：橘，止泄痢。食之下食，開胸膈痰實結氣。下氣不如皮。穰不可多食，止氣。性雖温，止渴。又，乾皮一斤，搗爲末，蜜爲丸。每食前酒下三十丸，治下焦冷氣。又，取陳皮一斤，和杏仁五兩，去皮、尖，熬加少蜜爲丸。每日食前飲下三十丸，下腹臟間虚冷氣。脚氣衝心，心下結硬[14]，悉主之。

《食醫心鏡》云：主胸中伏熱，下氣消痰，化食。橘皮半兩，微熬作末，如茶法，煎呷之。

《肘後方》：治卒失聲，聲咽不出。橘皮五兩，水三升，煮取一升，去滓頓服。

《經驗後方》：治膈下冷氣及酒食飽滿。常服青橘皮四兩，鹽一兩，分作四分，一分無用，湯浸青橘皮一宿，漉出去穰，又用鹽三分，一處拌和匀，候良久，銚子内炒微焦，爲末。每服一錢半，茶末半錢，水一盞，煎至七分，放温常服，不用入茶，煎沸湯點亦妙。

《孫尚藥方》：治諸吃噫。橘皮二兩，湯浸去瓤，剉，以水一升，煎之五合，通熱頓服。更加枳殼一兩，去瓤炒，同煎之服，效。

《集驗方》：治腰痛不可忍。橘子仁炒研爲末。每服一錢，酒一盞，煎至七分，和滓空心服。

《衍義》曰：橘、柚，自是兩種，故曰一名橘皮，是元無柚字也。豈有兩等之物，而治療無一字别者，即知柚一字爲誤。後人不深求其意，謂柚字所惑，妄生分别，亦以過矣。且青橘與黄橘，治療尚别，矧柚爲别種也。郭璞云：柚似橙而大於橘，此即是識橘、柚者也。今若不如此言之，恐後世亦以柚皮爲橘皮，是貽無窮之患矣。去古既遠，後之賢者亦不[15]以意逆之耳。橘惟用皮與核。皮，天下甚所須也，仍湯浸去穰，餘如《經》與《注》。核、皮二者須自收爲佳。有人患氣嗽將期，或教以橘皮、生薑焙乾，神麯等分爲末，丸如桐子大，食後、夜卧，米飲服三五十丸。兼舊患膀胱，緣服此皆愈。然亦取其陳皮入藥，此六陳中一陳也。腎疰、腰痛、膀胱氣痛，微炒核，去殼爲末，酒調服，愈。



大棗　味甘，平，無毒。主心腹邪氣，安中養脾，助十二經，平胃氣，通九竅，補少氣，少津液，身中不足，大驚，四肢重，和百藥，補中益氣，强力，除煩悶，療心下懸，腸澼。久服輕身長年，不饑神仙。一名乾棗，一名美棗，一名良棗。八月採，暴乾。三歲陳核中人燔之，味苦。主腹痛，邪氣。生棗，味甘、辛。多食令人多寒熱，羸瘦者不可食。葉，覆麻黃，能令出汗。生河東平澤。殺烏頭毒。燔音煩。

《圖經》曰：大棗，乾棗也。生棗，味甘、辛。多食令人多寒熱，羸瘦者不可食。葉，覆麻黃，能令出汗。生河東平澤。殺烏頭毒。燔音煩。

陶隱居云：舊云河東猗氏縣棗特異，今青州者，形大，核細，多膏，甚甜。并生河東，今近北州郡皆有，而青、晉、鄴州互市亦得之，而鄴州者亦好，小不及爾。江東臨沂金城棗，形大而虛，少脂，好者亦可用。南棗大惡，殆不堪啖。道家方藥以棗爲佳餌。其皮利，久即嘔吐。揩熱痱瘡肉補虛，所以合湯皆擘之也。

《唐本》注云：《別録》云：棗葉散，服使人瘦，久服香身，并衣亦香。軟棗，壺棗。云：今江東呼棗大而鋭上者爲壺，壺猶瓠也。邊，腰棗。云：子細腰，今謂之鹿盧棗。櫅，白棗。云：即今棗子，白乃熟。檟，酸棗。云：木小實酢者。遵，羊棗。云：實小而圓，紫黑色，今俗呼之爲羊矢棗。洗，尖⑯棗，壺棗。云：今河東猗氏縣出大棗，子如雞卵。蹶泄，苦哲，無實棗。云：不著子者。還味，稔棗。云：還味，短味也。而酸棗自見別條，其餘種類非一，今園圃皆種蒔之，亦不能盡別其名。又其極美者，則有水菱棗、御棗之類，皆不堪入藥。櫅，子分切。稔，五審切。

陶隱居云：舊云河東猗氏縣棗特異，今青州者，形大，核細，多膏，甚甜。并生河東，今近北州郡皆有，而青、晉、鄴州互市亦得之，而鄴州者亦好，小不及爾。江東臨沂金城棗，形大而虛，少脂，好者亦可用。南棗大惡，殆不堪啖。道家方藥以棗爲佳餌。其皮利，久即嘔吐。揩熱痱瘡肉補虛，所以合湯皆擘之也。

《食療》云：棗和桂心、白瓜人、松樹皮爲丸，久服香身，并衣亦香。軟棗，壺棗。云：今江東呼棗大而鋭上者爲壺，壺猶瓠也。邊，腰棗。云：子細腰，今謂之鹿盧棗。櫅，白棗。云：即今棗子，白乃熟。檟，酸棗。云：木小實酢者。遵，羊棗。云：實小而圓，紫黑色，今俗呼之爲羊矢棗。洗，尖⑯棗，壺棗。云：今河東猗氏縣出大棗，子如雞卵。蹶泄，苦哲，無實棗。云：不著子者。還味，稔棗。云：還味，短味也。而酸棗自見別條，其餘種類非一，今園圃皆種蒔之，亦不能盡別其名。又其極美者，則有水菱棗、御棗之類，皆不堪入藥。櫅，子分切。稔，五審切。

陶隱居云：舊云河東猗氏縣棗特異，今青州者，形大，核細，多膏，甚甜。并生河東，今近北州郡皆有，而青、晉、鄴州互市亦得之，而鄴州者亦好，小不及爾。江東臨沂金城棗，形大而虛，少脂，好者亦可用。南棗大惡，殆不堪啖。道家方藥以棗爲佳餌。其皮利，久即嘔吐。揩熱痱瘡肉補虛，所以合湯擘之也。

《唐本》注云：《別録》云：棗葉散，服使人瘦，久服香身，并衣亦香。軟棗，壺棗。云：今江東呼棗大而鋭上者爲壺，壺猶瓠也。邊，腰棗。云：子細腰，今謂之鹿盧棗。櫅，白棗。云：即今棗子，白乃熟。檟，酸棗。云：木小實酢者。遵，羊棗。云：實小而圓，紫黑色，今俗呼之爲羊矢棗。洗，尖⑯棗，壺棗。云：今河東猗氏縣出大棗，子如雞卵。蹶泄，苦哲，無實棗。云：不著子者。還味，稔棗。云：還味，短味也。而酸棗自見別條，其餘種類非一，今園圃皆種蒔之，亦不能盡別其名。又其極美者，則有水菱棗、御棗之類，皆不堪入藥。櫅，子分切。稔，五審切。

陶隱居云：舊云河東猗氏縣棗特異，今青州者，形大，核細，多膏，甚甜。并生河東，今近北州郡皆有，而青、晉、鄴州互市亦得之，而鄴州者亦好，小不及爾。江東臨沂金城棗，形大而虛，少脂，好者亦可用。南棗大惡，殆不堪啖。道家方藥以棗爲佳餌。其皮利，久即嘔吐。揩熱痱瘡肉補虛，所以合湯皆

棗，温。多食動風，發冷風咳嗽。

《聖惠方》：令髮易長。東行棗根三尺，横安甑上蒸之，兩頭汗出，收之傅髮，即長。

《外臺秘要方》：痔發疼痛。肥大棗一枚剥去皮，取水銀掌中，以唾研令極熟，傅棗瓤上，内下部，差。

《梅師方》：治妊娠四五月，忽腹絞痛。以棗十四枚，燒令焦，爲末，以小便服。

《衍義》曰：大棗，今先青州，次蒲州，此二等可曬曝入藥，益脾胃，爲佳，餘止可充食用。又御棗甘美輕脆，後衆棗熟。以其甘，故多生蟲。今人所謂撲落酥者是。又有牙棗，先亦甘美，但微酸，尖長。此二等，止堪啖，不堪收曝。今人將乾棗去核，於鐺鍋内微火緩逼，乾爲末，量多少，入生薑末爲湯，點服，調和胃氣。又將煮棗肉，和治脾胃丸藥尤佳。又青州棗去皮核，焙乾爲棗圈，達都下，爲奇果。

栗



味鹹，温，無毒。主益氣，厚腸胃，補腎氣，令人耐饑。生山陰，九月採。

《圖經》曰：栗，舊不著所出州土，但云生山陰，今處處有之，而兗州、宣州者最勝。木極類櫟，花青黄色，似胡桃花。實有房，匯若拳，中子三五，小者若桃杏，中子惟一二，將熟則罅拆子出。凡栗之種類亦多，《詩》云：樹之榛栗。陸機疏云：栗，五方皆有之，周、秦、冀⑰、揚宣⑰饒，吴越彼⑱城表裏皆栗，惟濮陽及范陽栗，甜美味長，他方者悉不及也。果中，栗最有益。治腰脚宜生食之，仍略曝乾，去其木氣。惟患風水氣不宜食，以其味鹹故也。

殼煮汁飲，止反胃及消渴。木皮主瘡毒，醫家多用。莘音榛。

陶隱居云：今會稽最豐，諸暨栗形大，皮厚不美。剡及始豐，皮薄而甜。相傳有人患脚弱，往栗樹下食數升，便能起行，此是補腎之義，然應生啖之。若餌服，故宜蒸曝之。暨音既。剡，時冉切。

《唐本》注云：栗作粉，勝於菱芡。嚼生者塗瘡上，療筋骨斷碎，疼痛腫瘀血，有效。其皮名扶，搗爲散，蜜和塗肉，令急縮。毛殼，療火丹，療毒腫。實飼孩兒，令齒不生。樹白皮水煮汁，主溪毒。斷音段。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：樹高二三丈，葉似櫟，花青黄色，似胡桃花。實大者如拳，小如桃李。又有板栗、佳栗，二樹皆大。又有茅栗，似栗而細，其樹雖小，然葉與諸栗不殊，惟春生、夏花、秋實、冬枯。今所在皆有之。

孟詵云：栗子，生食治腰脚。蒸炒食之，令氣擁，患風水氣，不宜食。又，樹皮，主癰瘡毒。謹按：宜日中曝

乾，食即下氣補益。不爾猶有木氣，不補益。就中吴栗大，無味，不如北栗也。其上薄皮，研，和蜜塗面，展皺。又，殼，煮汁飲之，止反胃，消渴。今所食生栗，可於熱灰火中煨令汗出，食之良。不得通熱，熱則擁氣。生即發氣。故又㉑煨殺其木氣耳。

《肘後方》：丹者，惡毒之瘡，五色無常。治之，煮栗皮有刺者，洗之佳。

《經驗後方》：治腎虚，腰脚無力。生栗袋盛，懸乾。每日平明吃十餘顆，次吃猪腎粥。

《衍義》曰：栗，欲乾莫如曝，欲生莫如潤，沙中藏至春末夏初，尚如初收摘。小兒不可多食，生者難化，熟即滯氣，隔食，生蟲，往往致小兒病疳亦不知。所謂補腎氣者，以其味鹹，又滯其氣爾。湖北路有一種栗，頂圓末尖，謂之旋栗。《圖經》引《詩》言莘栗者，謂其象形也。

葡萄

味甘，平，無毒。主筋骨濕痹，益氣倍力，强志，令人肥健，耐饑，忍風寒。久食輕身不老延年。可作酒。逐水，利小便。生隴西五原、敦煌山谷。



葡萄

《圖經》曰：葡萄，生隴西五原，敦煌山谷，今河東及近京州郡皆有之。苗作藤蔓而極長大，盛者，一二本綿被山谷。開花極細而黄白色。其實有紫、白二色，而形之圓鋭亦二種。又有無核者。皆七月、八月熟。取其汁，可以釀酒。謹按《史記》云：大宛以葡萄爲酒，富人藏酒至萬餘石，久者十數歲不敗。張騫使西域，得其種而還，種之，中國始有。蓋北果之最珍者。

《藥性論》云：葡萄，君，味甘、酸。除腸間水氣，調中，治淋，通小便。陶隱居云：魏國使人多賫來，狀如五味子而甘美，可作酒，云用其藤汁酒。逐水，利小便。生隴西五原、敦煌山谷。

《圖經》曰：葡萄，生隴西五原，敦煌山谷，今河東及近京州郡皆有之。苗作藤蔓而極長大，盛者，一二本綿被山谷。開花極細而黄白色。其實有紫、白二色，而形之圓鋭亦二種。又有無核者。皆七月、八月熟。取其汁，可以釀酒。謹按《史記》云：大宛以葡萄爲酒，富人藏酒至萬餘石，久者十數歲不敗。張騫使西域，得其種而還，種之，中國始有。蓋北果之最珍者。

《藥性論》云：葡萄，君，味甘、酸。除腸間水氣，調中，治淋，通小便。陶隱居云：魏國使人多賫來，狀如五味子而甘美，可作酒，云用其藤汁酒。逐水，利小便。生隴西五原、敦煌山谷。

《圖經》曰：葡萄，生隴西五原，敦煌山谷，今河東及近京州郡皆有之。苗作藤蔓而極長大，盛者，一二本綿被山谷。開花極細而黄白色。其實有紫、白二色，而形之圓鋭亦二種。又有無核者。皆七月、八月熟。取其汁，可以釀酒。謹按《史記》云：大宛以葡萄爲酒，富人藏酒至萬餘石，久者十數歲不敗。張騫使西域，得其種而還，種之，中國始有。蓋北果之最珍者。

《藥性論》云：葡萄，君，味甘、酸。除腸間水氣，調中，治淋，通小便。陶隱居云：魏國使人多賫來，狀如五味子而甘美，可作酒，云用其藤汁酒。逐水，利小便。生隴西五原、敦煌山谷。

《圖經》曰：葡萄，生隴西五原，敦煌山谷，今河東及近京州郡皆有之。苗作藤蔓而極長大，盛者，一二本綿被山谷。開花極細而黄白色。其實有紫、白二色，而形之圓鋭亦二種。又有無核者。皆七月、八月熟。取其汁，可以釀酒。謹按《史記》云：大宛以葡萄爲酒，富人藏酒至萬餘石，久者十數歲不敗。張騫使西域，得其種而還，種之，中國始有。蓋北果之最珍者。

《藥性論》云：葡萄，君，味甘、酸。除腸間水氣，調中，治淋，通小便。

雞頭實

味甘，平，無毒。主濕痹，腰脊膝痛，補中除暴疾，益精氣，强志，令耳目聰明。久服輕身，不饑，耐老神仙。一名雁喙實，一名芡。生雷澤池澤。八月採。芡音儉。

雞頭實



《圖經》曰：雞頭實，生雷澤，今處處有之，生水澤中。葉大如荷，皺而有刺，俗謂之雞頭盤。花下結實，其形類雞頭，故以名之。其莖菱之嫩者，名蔦菱，人採以爲菜茹，八月採實。服餌家取其實并中子，搗爛暴乾，并搗下篩，熬金櫻子煎和丸服之。云補下益人，謂之水陸丹。經傳謂其子爲芡。

陶隱居云：此即今蔦子形上花似雞冠，故名雞頭。仙方取此并蓮實合餌，能令小兒不長，正爾。食之亦當益人。蔦音鞏。

《唐本》注云：此實去皮作粉，與菱粉相似，益人勝菱。菱音陵。

《日華子》云：雞頭，開胃助氣。根可作蔬菜食。

《淮南子》云：雞頭已癭頸疾，幽人謂之雁頭。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：此生水中，葉大如荷，皺而有刺，花、子若拳大，形似雞頭，實若石榴，皮青黑，肉白，如菱米也。

孟詵云：雞頭作粉食之，甚妙。是長生之藥，與小兒食，不能長大，故駐年耳。生食動風冷氣，蒸之，於烈日曬之，其皮即開。亦可舂作粉。

陳士良云：此種雖生於水，而有軟根名莅菜。主小腹結氣痛，宜食。

《經驗後方》：治益精氣，强志意，聰利耳目。以雞頭實三合，煮令熟，去殼，研如膏，入粳米一合煮粥，空心食之。

《衍義》曰：雞頭實，今天下皆有之，河北沿塘濼居人採得，舂去皮，搗人爲粉，蒸潠作餅，可以代糧，食多不益脾胃氣，兼難消化。

蓬藁

味酸，鹹，平，無毒。主安五臟，益精氣，長陰令堅，强志倍力，有子。又療暴中風，身熱大驚。久服輕身不老。一名覆盆，一名陵藁，一名陰藁。生荆山平澤及冤句。



《圖經》曰：蓬藁，覆盆苗莖也。生荆山平澤及冤句。覆盆子，舊不著所出州土，今并處處有之，而秦、吴地尤多。苗短不過尺，莖、葉皆有刺。花白，子赤黄，如半彈丸大，而下有莖承如柿蒂狀。小兒多食其實。五月採其苗，葉採無時。江南人謂之莓，然其地十月而實成。功用則同，古方多用。笮其子取汁，合膏塗髮不白。挼葉絞

汁滴目中，去膚赤，有蟲出如絲綫即效。

陶隱居云：李云即是人所食莓爾。今注是覆盆苗莖也。陶言蓬藁是根名，乃昌容所服以易顏者。蓋根、苗相近爾。李云莓也。按《切韻》莓是覆盆草也。又藁者，藤也。今據蓬藁之名，明其藤蔓也。《唐本》注云：蓬藁、覆盆，一物異名，本謂實，而非根。此亦誤矣。亦如蜀漆與常山異條，芎藭與蘼蕪各用。今此附入果部者，蓋其子是覆盆子也。莓，音茂。

陳藏器云：變白，不老，佛説云蘇蜜那花點燈，正言此花也。乍取汁，合成膏，塗髮不白。食其子，令人好顏色，葉授絞取汁，汁滴目中，去膚赤，有蟲出如絲綫。其類有三種，四月熟，甘美如覆盆子者是也，餘不堪入藥，今人取茅莓當覆盆，誤矣。

禹錫云：按陳士良云：諸家本草皆説是覆盆子根，今觀採取之家，按草木類所説自有蓬藁，似蠶莓子，紅色。其葉似野薔薇，有刺，食之酸、甘。恐諸家不識，誤説是覆盆也。

《衍義》曰：蓬藁，非覆盆，別是一種，雖枯敗而枝梗不散。今人不見用，此即賈山策中所言是也。

覆盆子　味甘，平，無毒。主益氣輕身，令髮不白。五月採之。

《圖經》曰：文具蓬藁條下。

《藥性論》云：覆盆子，臣，微熱，味甘、辛。能主男子腎精虛竭，女子食不用，乃昌容所服以易顏者也。覆盆是實名，李云是莓，今莓子乃似覆盆之形。而以津汁爲味，其核微細。藥中用覆盆子小異。此未詳孰是？

《唐本》注云：覆盆，蓬藁，一物異名，本謂實，非根也。李云莓子，近之矣。其根不入藥用。然生處不同，沃地則子大而甘，瘠地則子細而酸。此乃子有甘、酸，根無酸味。陶景以根酸、子甘，將根入果，重出子條，殊爲孟浪。

今注：蓬藁，是覆盆之苗也，覆盆，乃蓬藁之子也。陶注、唐注非爾。今用覆盆子補虛續絶，强陰㉒陽，悦澤肌膚，安和臟腑，温中益力，療勞損風虛，補肝明目。

《日華子》云：覆盆子，臣，微熱，安五臟，益顔色，養精氣，長髮，强志，療中風身熱及驚。又有樹莓，即覆盆子。

孟詵云：覆盆子，味酸，五月於麥田中得之良。採得及烈日曬乾，免爛不堪。江東亦有，名懸鈎子。大小形異，氣味、功力同。北土即無懸鈎，南地無覆盆，是土地有前後生，非兩種物耳。

《衍義》曰：覆盆子，長條，四五月紅熟，秦州甚多，永興華州亦有。及時，山中人採來賣。其味酸甘，外如荔枝，櫻桃許大，軟紅可愛，失採則就枝生蛆。益腎臟，縮小便，服之，當覆其地則子大而甘，瘠地則子細而酸。此溺蓋，如此取名。食之多熱，出㉓時五六分熟便可採。烈日曝，仍須薄綿蒙之。今人取汁作煎爲果，仍少加蜜，或熬爲稀湯，點服，治肺虛寒。採時著水

則不堪煎。



櫻桃

櫻桃　味甘。主調中，益脾氣，令人好顏色，美志。

陶隱居云：此即今朱櫻，味甘、酸，可食，而所主又與前櫻桃相似。恐醫家濫載之，未必是今者爾。又，胡頹子凌冬不凋，子亦應益人。或云：寒熱病不可食。

《唐本》注云：葉搗傅蛇毒。絞葉汁服，防蛇毒内攻。

《日華子》云：櫻桃，微毒，多食令人吐。

禹錫云：按孟詵云：櫻桃，熱。益氣，多食無損。又云：此名櫻，非桃也。不可多食，令人發暗風。東[24]根，療寸白、蛔蟲。

《衍義》曰：櫻桃類。然非桃類，蓋以其形肖桃，故曰櫻桃，又何疑焉？謂如木猴梨、胡桃之類，亦取其形相似爾。古謂之含桃，可薦宗廟，《禮》云先薦寢廟者是此。唐·王維詩云：纔是寢園春薦後，非干御苑鳥銜殘。小兒食之，纔過多無不作熱。



芰實

芰實　味甘，平，無毒。主安中，補五臟，不饑輕身。一名菱。芰音伎。

《圖經》曰：芰，菱實也。舊不著所出州土，今處處有之。葉浮水上，花黄白色，花落而實生，漸向水中乃熟。實有二種，一種四角，一種兩角。兩角中又有嫩皮而紫色者，謂之浮菱，食之尤美。江淮及山東人曝其實人，以爲米，可以當糧。

陶隱居云：廬江間最多，皆取火燔以爲米充糧。今多蒸曝，蜜和餌之，斷穀長生。水族中又有菰首，性冷，恐非上品。被霜後食之，令陰不强。又不可雜白蜜食，令生蟲也。菰音孤。

《唐本》注云：芰作粉，極白潤，宜人。

孟詵云：菱實，仙家蒸作粉，蜜和食之，可休糧。水族之中，此物最不能治病。又云：令人臟冷，損陽氣，痿莖。可少食。多食令人腹脹滿者，可暖酒和薑飲一兩盞，即消矣。

《食療》云：神仙家用，發冷氣。人含吴茱萸，咽其津液，消其腹脹矣。

《衍義》曰：芰，今世俗謂之菱角，所在有。煮熟取人食之，代糧，不益脾。又有水菱，亦芰也，但大而脆，可生食。和合治療，未聞其用。有食生

芰多則利及難化，是亦性冷。

橙子皮　味苦、辛，温。作醬醋香美。散腸胃惡氣，消食，去胃中浮風氣。其瓤，味酸，去惡心，不可多食，傷肝氣。又，以瓤洗去酸汁，細切，和鹽、蜜煎成煎，食之去胃中浮風。其樹亦似橘樹而葉大，其形圓，大於橘而香，皮厚而皺。八月熟。

《圖經》曰：文具附橘柚條下。

禹錫云：按陳士良云：橙子，暖，無毒。行風氣，發虛熱，療瘿氣，發瘰癧，殺魚蟲毒。不與檳榔肉同食，發頭旋、惡心。

《食鏡㉕》云：温。去惡心，胃風。取其皮和鹽貯之。又，瓤，去惡氣。和鹽、蜜細細嚼之。

雷公云：味苦、辛，無毒。

《衍義》曰：橙子皮，今人止以爲果，或取皮合湯待賓，不見入藥。宿酒未醒，食之速醒。

果部中品



梅實　味酸，平，無毒。主下氣，除熱煩滿，安心，肢體痛，偏枯不仁，死肌，去青黑痣，惡疾，止下痢，好唾，口乾。生漢中川谷。五月採，火乾。

《圖經》曰：梅實，生漢中川谷，今襄漢、川蜀、江湖、淮嶺皆有之。其生實酢而損齒，傷骨，發虛熱，不宜多食之，服黄精人尤不相宜。其葉煮濃汁服之，已休息痢。根，主風痹。出土者殺人。梅實，利筋脉，當去核，微熬之。傷寒煩熱，水漬飲汁。生梅子及白梅亦應相似，今人多用白梅和藥，以點痣，蝕惡肉也。服黄精人，云禁食梅實。

陶隱居云：此亦是今烏梅也，用療風痹，出土者殺人。

《唐本》注云：《別録》云：梅根，腸上熱。烏梅去痰，主瘧瘴，止渴調中，除冷熱痢，止吐逆。梅葉搗碎湯洗，衣易脱也。嵩陽子云：清水揉梅葉，洗蕉葛衣不脆。余試之驗。

《日華子》云：梅子，暖。止渴。多痰㉖傷骨，蝕脾胃，令人發熱。根、葉煎濃湯，治休息痢并霍亂。又云：白梅，暖，無毒。治刀箭，止血，研傅之。

禹錫云：按《藥性論》云：梅核人亦可單用，味酸，無毒。能除煩熱。蕭炳云：今人多用烟熏爲烏梅。

孟詵云：烏梅，多食損齒。又，刺在肉中，嚼白梅封之，刺即出。又，大便不通，氣奔欲死。以烏梅十顆置湯

中，須臾挼去核，杵爲丸如棗大，内下部，少時即通。謹按：擘破水漬，以少蜜相和，止渴，霍亂心内不安及痢赤，治瘧方多用之。

《聖惠方》：主傷寒，下部生蟨瘡。用烏梅肉三兩，炒令燥，杵爲末，煉蜜丸如梧子大。以石榴根皮煎湯，食前下十丸。又方：治痰厥頭痛。以十個取肉，鹽二錢，酒半盞，合煎至七分，去滓，非時温服，吐即佳。又方：治痢下積久不差，腸垢已出。以二十個，水一盞，煎取六分，去滓，食前分爲二服。

《肘後方》同。

《外臺秘要方》：治下部蟲嚙。杵梅、桃葉一斛，蒸之，令極熱，内小器中，大布上坐，蟲死。

《肘後方》：治心腹俱脹痛，短氣欲死或已絶。烏梅二十七枚，水五升，煮一沸，内大錢二七枚，煮取二升半，强人可頓服，羸人可分之再服。又方：治手指忽腫痛，名爲代指。以烏梅人杵[27]，苦酒和，以指漬之，須臾差。

《葛氏方》：治赤白痢，下部疼重。以二十枚打碎，水二升，煮取一升，頓服。

《經驗方》：治馬汗入肉。用烏梅和核，爛杵爲末，以頭醋和爲膏。先將瘡口以針刺破，但出紫血，有紅血出，用帛拭乾，以膏傅上，以帛縛定。

《梅師方》：治傷寒四五日，頭痛壯熱，胸中煩痛。烏梅十四個，鹽五合，水一升，煎取一半服，吐之。

《簡要濟衆方》：治消渴，止煩悶。以烏梅肉二兩，微炒爲末。每服二錢，水二盞，煎取一盞，去滓，入豉二百粒，煎至半盞，去滓，臨卧時服之。

《鬼遺方》：治一切瘡肉出。以烏梅燒爲灰，杵末傅上，惡肉立盡，極妙。

《衍義》曰：梅實，食梅則津液泄，故傷齒。腎屬水，外爲齒，故也。王叔和曰：膀胱、腎合爲津液[28]，此語雖鄙，然理存焉。熏之爲烏梅，曝乾藏蜜器中，名白梅。

木瓜實

味酸，温，無毒。主濕痹邪氣，霍亂大吐下，轉筋不止。其枝亦可煮用。

《圖經》曰：木瓜，舊不著所出州土。陶隱居云：山陰蘭亭尤多，今處處有之，而宣城者爲佳。其木狀若柰，花生於春末而深紅色。其實大者如瓜，小者如拳。《爾雅》謂之楙。郭璞云：實如小瓜，酢，可食，不可多，亦不益人。宣州人種蒔尤謹，遍滿山谷。始實成，則鏃紙花薄其上，夜露日曝，漸而變紅，花文如生。本州以充土[29]貢



木瓜

澀，斷痢。《禮》云：梨曰攢之。鄭公不識樝，乃云是梨之不臧者。古亦以柤爲果，不㉝則不入例爾。樸音冥，樝音查。

陳藏器云：木瓜本功外，下冷氣，强筋骨，消食，止水痢後渴不止，作飲服之。又，脚氣衝心，取一顆去子，煎服之，嫩者更佳。又止嘔逆，心膈痰唾。

《日華子》云：木瓜，止吐瀉，賁豚及脚氣，水腫，冷熱痢，心腹痛，療渴，嘔逆，痰唾等。根，治脚氣。

孟詵云：木瓜，謹按：枝葉煮飲之，亦治霍亂。不可多食，損齒及骨。又，臍下絞痛。木瓜一兩片，桑葉七片，大棗三枚，碎之，以水二升，煮取半升，頓服之，差。又云：樝子，平。損齒及筋，不可食。亦主霍亂轉筋，煮汁食之，與木瓜功稍等，餘無有益人處。江外常爲果食。

禹錫云：按《蜀本》注：其樹枝狀如柰，花作房生，子形似栝樓㉛，火乾甚香。《爾雅》云：楸㉜，木瓜。注云：實㉝如小瓜，酢可食，然多食亦不益人。又《爾雅》注：樝似梨而酢澀。

雷公云：凡使，勿誤用和圓子、蔓子、土伏子，其色樣外形真似木瓜，只子味效并向裏子各不同。若木瓜，皮薄，微赤黄，香，甘、酸，不澀。調榮衛，助穀氣。向裏子頭尖一面，方是真木瓜。若和圓子，微黄，蒂粗，子小圓，味澀、微鹹，傷人氣。

《食療》云：主嘔吷風氣。又吐後轉筋，煮汁飲之甚良。脚膝筋急痛，煮木瓜令爛，研作漿粥樣，用裹痛處。冷即易，一宿三五度，熱裹便差。煮木瓜時，入一半酒同煮之。

《衍義》曰：木瓜，得木之正，故入筋。以鉛霜塗之，則失醋味，受金之制，故如是。今人多取西京大木瓜爲佳，其味和美，至熟止，青白色，入藥，煏者亦好，日乾者性冷。粗心柿尤不可多食，令人腹痛。生柿彌冷。又有椑，色青，惟堪生啖，性冷復甚於柿，散故益筋與血病，腰腎脚膝無力，此物不可闕。

柿　味甘，寒，無毒。主通鼻耳



《圖經》曰：柿，舊不著所出州土，今南北皆有之。柿之種亦多，黄柿生近京州郡；紅柿南北通有；朱柿出華山，似紅柿而皮薄，更甘珍；椑柿出宣、歙、荆、襄、閩、廣諸州，但可生啖，不堪乾。諸柿食之皆善㉞而益人，椑柿更壓丹石毒耳。其乾柿火乾者，謂之烏柿，出宣州、越州。性甚温，人服藥時，入一半酒同煮之。

陶隱居云：柿有數種，云今烏柿，火熏者，性熱，斷下，又療狗嚙瘡。火煏者亦好，日乾者性冷。粗心柿尤不可多食，令人腹痛。生柿彌冷。又有椑，色青，惟堪生啖，性冷復甚於柿，散故益筋與血病，腰腎脚膝無力，此物不可闕。

煏，皮逼切。椑音卑。

《唐本》注云：《別録》云：火柿主殺毒，療金瘡、火瘡，生肉止痛。軟熟氣，腸癖不足。

柿解酒熱，止口乾，壓胃間熱。

陳藏器云：柿本功外，日乾温補，多食去面皯，除腹中宿血。炙縣火乾者，名烏柿。人服藥口苦及欲吐逆，食少許立止。蒂煮服之，止噦氣。黄柿和米粉作糗，蒸與小兒食之，止下痢。飲酒食紅柿，令人心痛直至死。亦令易醉。陶云解酒毒，失矣。

《日華子》云：柿，冷。潤心肺，止渴，澁腸。療肺痿心熱嗽，消痰，開胃。亦治吐血。又云：柿，平。潤聲喉，殺蟲。火柿，性暖，功用同前。

禹錫云：柿寒。主補虚勞不足。謹按：乾柿厚腸胃，澁中，健脾胃氣，消宿血。又，紅柿補氣，續經脉氣。又，酸柿澁下焦，健脾胃氣，消宿血。作餅及糕與小兒食，治秋痢。又，研柿，先煮粥，欲熟即下柿，更三兩沸，與小兒飽食，并奶母吃亦良。

《聖惠方》：治耳聾鼻塞。以乾柿三枚細切，粳米三合，豉少許煮粥，空心服。

《産寶方》：治産後患咳逆氣亂心煩。乾柿一個，碎之，以水十分，煮熱服。

《衍義》曰：柿，有著蓋柿，於蒂下別生一重。又牛心柿，如牛之心；蒸餅柿，如今之市買蒸餅。華州有一等朱柿，比諸品中最小，深紅色。又一種塔柿，亦大於諸柿，性皆凉，不至大寒，食之引痰，極甘，故如是。去皮，挂大木株上，使風日中自乾，食之多動風火。乾者味不佳，生則澁，以温水養之，需澁去可食，逮至自然紅爛，澁亦自去，乾則性平。

烏芋



味苦，甘，微寒，無毒。主消渴，痹熱，温中益氣。一名藉姑，一名水萍。二月生葉如芋，三月三日採根，暴乾。

《圖經》曰：烏芋，今荔茨也。舊不著所出州土。苗似龍鬚而細，正青色，根黑，如指大，皮厚有毛。又有一種，皮薄無毛者亦同。田中人并食之，亦以作粉，食之厚人腸胃，不饑。服丹石人尤宜，蓋其能解毒爾。又《爾雅》謂之芍。

陶隱居云：今藉姑生水田中，葉有椏，狀如澤瀉，不正似芋。其根黄似芋子而小，煮之亦可饌。疑其有烏者，根極相似，細而美，葉乖異，狀如莧草，呼爲荔茨，恐是此也。椏，烏牙切。

《唐本》注云：此草一名槎牙，一名茨菰。主百毒。産後血悶攻心欲死，産後㉟難，衣不出，搗汁服一升。生水中，葉似錍箭鏃，澤瀉之類也。《千金方》云下石淋。菰音孤。錍，普兮切。

禹錫云：按孟詵云：茨菰不可多食。吴人常食之，令人患脚。又，發脚氣，癱瘓風。損齒，令人失顔色，皮肉乾燥。卒食之，令人嘔水。又云：荔茨，冷。下丹石，消風毒，除胸中實熱

氣。可作粉食。明耳目，止渴，消疸黃。若先有冷氣，不可食，令人腹脹氣滿。小兒秋食，臍下當痛。

《日華子》云：蒴茨，無毒。消風毒，除胸胃熱，治黃疸，開胃下食。服金石藥人食之，良。又云：蒴菰，冷，有毒。葉研傅蛇蟲咬[35]。多食發虛熱及腸風痔漏，崩中帶下，瘡癰。煮以生薑御之佳。懷孕人不可食。又名燕尾草及烏芋。

《衍義》曰：烏芋，今人謂之茏臍。皮厚，色黑，肉硬白者，謂之猪茏臍；皮薄澤，色淡紫，肉軟者，謂之羊茏臍。正[37]、二月人採食之。此二等，藥罕用。荒歲，人多採以充糧。

枇杷葉

味苦，平，無毒。主卒嘔不止，下氣。

《圖經》曰：枇杷葉，舊不著所出州郡，今襄、漢、吳、蜀、閩嶺皆有之。木高丈餘，葉作驢耳形，皆有毛。其木陰密婆娑可愛，四時不凋。盛冬開白花，至三四月而成實。故謝眺[38]《枇杷賦》云：稟金秋之青條，抱東陽之和氣，肇寒葩之結霜，成炎果乎纖露。是也。



枇杷

《藥性論》云：枇杷[39]，使，味甘。能主胃氣冷，嘔噦不止。

陶隱居云：其葉不暇煮，但嚼食亦差。人以作飲，則小冷。

《食療》云：卒嘔噦不止，不欲食。又，煮汁飲之，止渴。偏理肺及肺風發痰熱。

《日華子》云：枇杷子，平，無毒。治肺氣，潤五臟，下氣，止吐逆并渴疾。又云：葉療婦人產後口乾。

雷公云：凡使，採得後秤，濕者一葉重一兩，乾者三葉重一兩者是，氣足堪用。使粗布拭上毛令盡，用甘草湯洗一遍，却用綿再拭，令乾。每一兩以酥一分炙之，酥盡爲度。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：樹高丈餘，葉大如驢耳，皆有黃毛。子樣生如小李，黃色，味甘、酸。核大如小栗，皮肉薄。冬花春實，四月五月熟，凌冬不凋[40]。生江南、山南，今處處有之。

孟詵云：枇杷，温。利五臟，久食亦發熱黃。子，食之潤肺，熱上焦。若和熱炙肉及熱麵食之，令人患熱毒黃病。

《衍義》曰：枇杷葉，江東、西，湖南、北，二川皆有之。以其形如琵琶，故名之。治肺熱嗽有功。花白，最先春也。子大如彈丸，四五月熟，色若黃杏，微有毛，肉薄，性亦平，與葉不同。

有婦人患肺熱，久嗽，身如炙，肌瘦將成肺勞。以枇杷葉、木通、款冬花、紫菀、杏仁、桑白皮各等分，大黄減半，各如常製。治訖，同爲末，蜜丸如櫻桃大。食後、夜卧，各含化一丸，未終一劑而愈也。

荔枝



荔枝子　味甘，平，無毒。止渴，益人顏色。生嶺南及巴中。其樹高一二丈，葉青陰，凌冬不凋。形如松子大，殼朱若紅羅紋，肉青白若水精，甘美如蜜。四五月熟，百鳥食之，皆肥矣。

《圖經》曰：荔枝子，生嶺南及巴中，今泉、福、漳、嘉、蜀、渝、涪州、興化軍及二廣州郡皆有之。其品閩中第一，蜀川次之，嶺南爲下。《扶南記》云：此木以荔枝爲名者，以其結實時形似橘而圓大，皮色生青、熟黄赤。未經霜時尤酸，霜後甚甜，故名柑子。生嶺南及江南。

《圖經》曰：乳柑性冷，多食亦不宜人。今人但取其核作塗面藥，餘亦稀用，故不悉載。

禹錫云：按蕭炳云：出西戎者佳。

《日華子》云：冷，無毒。皮炙作湯，可解酒毒及酒渴，多食發陰汗。

《食療》云：寒。堪食之。其皮不尤可愛。先[42]朝蔡君謨《荔枝譜》，其説甚詳。唐·杜牧詩云：一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。此是蜀川荔枝，亦可生置之長安。以核熳火中，燒存性，爲末，新酒調一枚末服，治心痛及小腸氣。

乳柑子　味甘，大寒。主利腸胃中熱毒，解丹石，止暴渴，利小便。多食令人脾冷，發痼癖、大腸泄。又有沙柑、山柑，體性相類，惟山柑皮療咽喉痛效，餘者皆不堪用。其樹若橘樹，其形似橘而圓大，皮色生青、熟黄赤。未經霜時尤酸，霜後甚甜，故名柑子。生嶺南及江南。

《圖經》曰：乳柑子，今人多作橘皮，售於人，不可不擇也。柑皮不甚苦，橘皮極苦，至熟亦苦。若以皮緊慢，分別橘與柑，又緣方宜各不同，亦互有緊慢者。脾胃冷人食其肉，多致臟寒或泄痢。

石蜜乳糖　味甘，寒，無毒。主心腹熱脹，口乾渴，性冷利。出益州及西戎。煎煉沙糖爲之，可作餅塊，黃白色。

《圖經》曰：煉沙糖和牛乳爲石蜜。即乳糖也。

《唐本》注云：用水牛乳、米粉和煎，乃得成塊。西戎來者佳。江左亦有，殆勝蜀者。云用牛乳汁和沙糖煎之，并作餅，堅重。

今注：此石蜜，其實乳糖。前卷已有石蜜之名，故注此條爲乳糖。唐本先附。

禹錫云：按孟詵云：石蜜，治目中熱膜，明目。蜀中、波斯者良。東吳亦有，并不如兩處者。此皆煎甘蔗汁及牛乳汁，則易細白耳。和棗肉及巨勝末丸，每食後含一兩丸，潤肺氣，助五臟津。

《衍義》曰：石蜜，川、浙最佳，其味厚，其他次之。煎煉成，以鉶象物，達京都。至夏月及久陰雨，多自消化。土人先以竹葉及紙裹，外用石灰埋之，仍不得見風，遂免。今人謂乳糖，其作餅黃白色者，今人又謂之捻糖，易消化，入藥至少。

仲思棗　味甘，温，無毒。主補虛益氣，潤五臟，去痰嗽，冷氣。久服令人肥健，好顏色，神仙不饑。形如大棗，長一二寸，正紫色，細文，小核。味甘重。北齊時有仙人仲思得此棗，因以爲名。隋大業中，信都郡[43]獻數顆。又有千年棗，生波斯國，亦稍温補[44]，非此之儔也。

禹錫云：按《爾雅》云：棗，壺棗；邊，腰棗；檳，白棗；榛，酸棗；楊徹，齊棗；遵，羊棗[45]；洗，大棗；煮，填棗；蹶泄，苦棗；皆，無實棗；還味，稔棗。釋曰：壺棗者，棗形似壺也。郭云：今江東呼棗大而銳上者爲壺。壺猶瓠也。邊大而腰細者，名邊棗。郭云：子細腰，今謂之鹿盧棗。實小而味酢者名榛棗子白熟者名檳。實小而味厚，其他次之。煎煉成，以鉶象物，達京都。郭云：實小而圓，紫黑色，今俗呼之爲羊矢棗。洗，最大之棗名也。郭云：今河東猗氏縣出大棗，子如鷄卵。蹶泄者，味苦之棗名也。皆者，無實之棗名也。還味[46]者，短味也。徹、煮，并未詳。

陳士良云：苦棗，大寒，無毒。棗中苦者是也。人多不食，主傷寒熱伏在臟時[47]，狂瘍[48]煩滿，大小便秘澀[46]，取肉煮研爲蜜丸藥佳。今處處有之。

芋　味辛，平，有毒。主寬腸胃，充肌膚，滑中。一名土芝。

《唐本》注云：芋有六種：有青芋、紫芋、真芋、白芋、連禪芋、野芋。其青芋細長，毒多，初煮要須灰汁，易水煮熟，乃堪食爾。白芋、真芋、連禪芋毒少并正爾。蒸煮啖之。又宜冷啖，療熱止渴。其真、白、連禪三芋，兼肉作羹，大佳。蹲鴟[50]之饒，蓋謂此也。野芋大毒，不堪啖也。

《日華子》云：芋葉，冷，無毒。除煩止瀉，療妊孕心煩迷悶、胎動不安。又鹽研傅蛇蟲咬，并療腫毒，及署傅毒箭。

圖經衍義本草卷之三十五

❶在：原作『作』，據晦明軒本改。
❷如：原作『乃』，據晦明軒本改。
❸即：晦明軒本作『節』。
❹却：晦明軒本作『折』。
❺下：晦明軒本『下』上有『莖』字。
❻葉：晦明軒本作『華』。
❼此：原作『母』，據晦明軒本改。
❽半：晦明軒本作『中』。
❾花：晦明軒本作『藕』。
❿一：晦明軒本作『二』。
⓫二：晦明軒本作『五』。
⓬此：原脱，據晦明軒本補。
⓭疼：晦明軒本作『冷』。
⓮硬：原作『哽』，據晦明軒本改。
⓯不：晦明軒本作『可』。
⓰尖：晦明軒本作『大』。
⓱冀：晦明軒本作『吴』。
⓲宣：晦明軒本作『特』。
⓳彼：晦明軒本作『被』。
㉓又：晦明軒本作『火』。
㉑大：原脱，據晦明軒本補。
㉒陰：晦明軒本『陰』下有『健』字。
㉓出：晦明軒本作『收』。
㉔東：晦明軒本『東』下有『行』字。
㉕鏡：晦明軒本作『療』。
㊴痰：晦明軒本作『啖』。
㉓杵：原作『拌』，據晦明軒本改。
㊴液：晦明軒本作『府』。
㊴土：晦明軒本作『上』。
㊴不：晦明軒本作『今』。
㉛栝樓：原作『枯髏』，據晦明軒本改。
㉒楸：原作『懋』，據晦明軒本改。
㊴實：原作『子』，據晦明軒本改。
㉔善：晦明軒本作『美』。
㊴後：晦明軒本無『後』字。
㊴咬：原作『交』，據晦明軒本改。
㊴正：原作『止』，據晦明軒本改。
㊳眺：晦明軒本作『瞻』。
㊴枇杷：晦明軒本『杷』下有『葉』字。
㊴凋：原作『用』，據晦明軒本改。
㊼元：原脱，據晦明軒本補。
㊷先：晦明軒本作『本』。
㊴郡：原脱，據晦明軒本補。
㊹補：原脱，據晦明軒本補。
㊼羊棗：原作『王』，據晦明軒本改。
㊾味：原作『寧』，據晦明軒本改。
㊼時：晦明軒本作『腑』。
㊽瘍：晦明軒本作『蕩』。
㊾澀：原作『嗇』，據晦明軒本改。
㊿鴟：晦明軒本作『鴟』。

圖經衍義本草卷之三十六

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

果部中品

甘蔗



甘蔗　味甘，平，無毒。主下氣和中，助脾氣，利大腸。

《圖經》曰：甘蔗，舊不著所出州土。陶隱居云：今江東者爲勝，廬陵亦有好者。廣州一種，數年生，皆如大竹，長丈餘。今江、浙、閩、廣、蜀、川所生，大者高丈許。

陶隱居云：今出江東爲勝，廬陵亦有好者。廣州一種，數年生，皆如大竹，長丈餘，取汁以爲沙糖，甚益人。又有荻蔗，節疏而細，亦可啖也。

《唐本》❶注云：蔗有兩種，赤色名崑崙蔗，白色名荻蔗。出蜀及嶺南爲勝，并煎爲沙糖。今江東甚多，而劣於蜀者，亦甚甘美，時用煎爲稀沙糖也。今會稽作乳糖，殆勝於蜀。去煩，止渴，解酒毒。

《日華子》云：冷。利❷小腸，下氣痢，補脾，消痰，止渴，除心煩熱。作沙糖，潤心肺，殺蟲，解酒毒。臘月窖糞坑中，患天行熱狂人，絞汁服，甚良也。

《食醫心鏡》云：理正氣，止煩渴，和中補脾，利大腸，解酒毒。削甘蔗去皮，食後吃之。

《外臺秘要方》：主發熱口乾，小便澀。取甘蔗去皮盡，令吃之咽汁。若口痛，搗取汁服之。

《肘後方》：主卒乾嘔不息。甘蔗汁温令熱，服半升，日三。又以生薑汁一升服，并差。

《梅師方》：主胃反，朝食暮吐，暮食朝吐，旋旋吐者。以甘蔗汁七升，生薑汁一升，二味相和，分爲三服之。

《衍義》曰：甘蔗，今川、廣、湖南、北、二浙、江東、西皆有，自八九月已堪食，收至三四月方酸壞。石蜜、沙糖、糖霜，皆自此出，惟川、浙者爲勝。

沙糖　味甘，寒，無毒。主壓石藥發熱，利水，解酒熱。久食令人寒中，去胃中熱。生江淮南。似柿而青黑。

《閑居賦》云梁侯烏椑之柿是也。椑音卑。

《圖經》曰：文具附柿條下。

禹錫云：按孟詵云：沙糖，多食令人心痛。不與鯽魚同食，成疳❸蟲。又，不與葵同食，生流癖。又，不與筍同食，使笋不消，成癥，身重不能行履耳。

《食療》云：主心熱，口乾。多食生長蟲，消肌肉，損齒，發疳蟨。不可長食之。

《衍義》曰：沙糖，又次石蜜，蔗汁清，故費煎煉，致紫黑色，治心肺大腸熱，兼啖駝馬。今醫家治暴熱，多以此物爲先導，小兒多食則損齒，土制水也，及生蟯蟲。裸蟲屬土，故因甘遂生。

椑柿　味甘，寒，無毒。主壓石藥發熱，利水，解酒熱。久食令人寒中，去胃中熱。生江淮南。似柿而青黑。

《閑居賦》云梁侯烏椑之柿是也。椑音卑。

《圖經》曰：文具附柿條下。

禹錫云：按孟詵云：椑柿，止渴，潤心肺，除腹臟冷熱，作漆甚妙。不宜與蟹同食，令人腹疼并大瀉。

果部下品

桃核人



桃核人　味苦、甘，平，無毒。主瘀血，血閉瘕，邪氣，殺小蟲，止咳逆上氣，消心下堅，除卒暴擊血，破癥瘕，通月水，止痛。七月採取人，陰乾。今都下市賈花，殺疰惡鬼，令人好顏色。味苦，平，無毒。主除水氣，破石淋，利大小便，下三蟲，悦澤人面。三月三日採，陰乾。桃梟，味苦，微温。主殺百鬼精物，療中惡腹痛，殺精魅，五毒不祥。一名桃奴，一名梟景。是實著樹不落，實中者，正月採之。桃毛，主下血瘕，寒熱，積聚，無子，帶下諸疾，破堅閉，刮取毛用之。禹錫等按：《本經》月閉通用藥云：桃毛，平。桃蠹，殺鬼辟邪惡不祥。食桃樹蟲也。桃莖白皮，味苦、辛，無毒。除邪鬼中惡腹痛，去胃中熱。桃葉，味苦、辛，平，無毒。主除尸蟲，出瘡中蟲。膠，煉之，主保中不饑，忍風寒。桃實，味酸，多食令人有熱。生太山川谷。

《圖經》曰：桃核人并花、實等，生太山，今處處有之。京東、陝西出者尤大而美。大都佳果多是圃人以他木接根上栽之，遂至肥美，殊失本性。此等藥中不可用之，當以一生者爲佳。七月採核，破之取人，陰乾。今都下市賈多取炒貨之，云食之亦益人。然亦多雜接實之核，爲不堪也。《千金方》桃人煎，療婦人産後百病，諸氣。取桃人一千二百枚，去雙人、尖、皮，熬搗令極細，以清酒一斗半，研如麥粥法，以極細爲佳。内小項瓷瓶中，蜜以麵封之，内湯中煮一伏時，藥成。温酒和服一匙。花三月三日採，陰乾。《太清卉木方》云：酒漬桃花飲之，除百病疾，益顔色。崔元亮《海上方》治面上瘡，黄水出，并眼瘡，三月三日收取桃花，不計多少，細末之，食後以水半盞，調服方寸匕，日三，甚良。其實已乾著木上，經冬不落者，名桃梟。正月採之，以中實者良。女子崩中。食桃木蟲名桃蠹，食之悦人顔色。莖白皮，中惡方用之。葉多用作湯導藥，標嫩者名桃心，尤勝。張文仲治天行，有支太醫桃葉湯熏身法：水一石，煮桃葉，取七斗，以爲鋪席，自圍衣被蓋上，安桃湯於床簀下，乘熱自熏，停少時，當雨汗，汗遍去湯，待歇，速粉之，并灸大椎，則愈。陳廩丘《蒸法經》云：連發汗，汗不出者死，可蒸之，如中風法。以問張苗，苗曾有疲極汗出，臥單簟，中冷，但苦寒倦。四日凡八過發汗，汗不出。燒地桃葉蒸之，則得大汗，被中傅粉極燥，便差。《必效方》主蠱毒，用大戟、桃白皮東引者，以大火烘之，斑猫去足翅熬，三物等分，搗篩爲散。以冷水服半方寸匕，不出更一服，蠱并出。此其毒即出。李饒州法，云奇效。若以酒中得，則以酒服；以食中得，以飲服之。桃膠，入服食藥，仙方著其法：取膠二十斤，絹袋盛，櫟木灰汁一石中，煮三五沸，并袋出，挂高處，候乾再煮。如此三度止，暴乾篩末，蜜和，空腹酒下梧桐子大二十丸。久服當仙去。又主石淋，《古今録驗》著其方云：取桃木膠如棗大，夏以冷水三合，冬以湯三合，和爲一服，日三，當下石，石盡即止。其實

亦不可多食，喜令人發熱。

陶隱居云：今處處有，京口者亦好，當取解核種之爲佳。又有山桃，其人不堪用。桃人作酪，乃言冷。桃膠又桃味酸，無毒，多食令人有熱。又入仙家用。三月三日採花，亦供丹方所須。《方言》：服三樹桃花盡，則面色如桃花。人亦無試之者。服术人服半升。冬用桃樹皮。

云：禁食桃也。

《唐本》注云：桃膠，味苦，平，無毒。主下石淋，破血，中惡疰忤。花，主下惡氣，消腫滿，利大小腸。

禹錫云：按《藥性論》云：桃人，使。桃符，主中惡。

《日華子》云：桃，熱，微毒。益氣，小兒寒熱客忤。桃毛，療崩中，破癖氣。桃蠹，食之肥，悅人顏色也。

《抱朴子》云：桃膠以桑灰漬之服，百病愈。又服之身輕，有光明在晦夜之地，如❹月斷穀。

《荆楚歲時記》：謝道通登羅浮山，見數童子以朱書桃板貼户上，道通還，以紙寫之貼户上，鬼見畏之。

孫真人云：桃，味辛，肺病宜食。

《聖惠方》：補心虚，治健忘，令耳目聰明。用戊子日，取東引桃枝三寸枕之。《千金翼》同。

《外臺秘要方》：治伏梁氣在心下，結聚不散。用桃奴三兩爲末，空心温酒調二錢匕。

《千金翼方》：延年去風，令光潤。桃人五合去皮，用粳米飯漿研令細，以漿水杵取汁，令桃人盡即止，微温，用洗面，極妙。又方：五月五日取東向桃枝，日未出時，作三寸木人，著衣帶中，令人不忘。

《肘後方》：尸注鬼疰病者，葛云即是五尸之一注，又挾諸鬼邪爲祟，其病變動及有三十六種至九十九種。大略使人寒淋瀝，沉沉默默，不的知其所苦，而無處不惡。累年積月，漸就頓滯，以至於死，死後復傳傍人，乃至滅門。覺如此候者，宜便急治。桃人五十枚碎研，以水煮，取四升，一服盡當吐。吐病不盡，三兩日不吐，再服也。

又方：卒心痛。東引桃枝一把切，以酒一升，煎取半升，頓服，大效。

《葛氏方》：卒中瘑瘡，瘑瘡常對在兩脚。杵桃葉，以苦酒和傅。皮亦得。又方：治小兒卵癩，杵桃人傅之。亦治婦人陰腫燥❻癢。又方：治胎下

血不止⑦。取桃樹上乾不落桃子燒作灰，和水服，差。又産後陰腫痛，燒桃人傅之。

《梅師方》：諸蟲入耳。取桃葉熟搥塞兩耳，出。又方：狂狗咬人。取桃白皮一握，水三升，煎一升服。

《食醫心鏡方》：主上氣咳嗽，胸膈防⑧滿，氣喘。桃人二兩去皮、尖，以水一升研取汁，和粳米二合，煮粥食之。又方：凡風勞毒，腫疼攣痛或牽引小腹及腰痛。桃人一升去皮、尖兩人，熬令黑烟出，熱研搗如脂膏，以酒三升，絞令相和，一服取汗。不過再服取汗。不過再差。

《傷寒類要方》：治黃疸。身眼皆如金色，不可使婦人、鷄、犬見，取東引桃根，切細如箸，若釵股以下者一握，以水一大升，煎取一小升，適温，空腹頓服。後三五日，其黃離離如薄雲散，惟服最後差，百日方平復。身黃散後，可時時飲一盞清酒，則眼中易散，不飲則散遲。忌食熱麵、猪、魚等肉。此是徐之才家秘方。又方：凡天時疫癘者。常以東行桃枝細剉煮，浴，佳。

《子母秘録》：治陰腫，桃人搗傅。又方：小兒瘡初起，燻漿似火瘡，一名爛瘡，杵桃人面脂傅上。

《崔氏方》：主鬼疰，心腹痛不可忍。取東引桃枝，削去蒼皮，取白皮一握，水二升，煮取半升，服令盡，差。如有瘀血，用桃人三十個，湯去皮、尖，麩炒赤色，別研，蝕蟲三十枚，去翅，水蛭二十枚，各炒，川大黄一兩，同爲末，再與桃人同搗，令勻，煉蜜丸如小豆大，每服二十丸，桃人湯下，利下瘀血惡物，便愈，未利，再服。

《治癮方》：以桃人百個去皮、尖小大⑨，於乳鉢中細研成膏，不得犯生水，候成膏入黄丹三錢，丸如梧桐子大。每服三丸，當發日面北用温酒下，不飲酒，井花水亦得。五月五日午時合，忌鷄、犬、婦人見。

《典術》曰：桃者，五木之精也。今之作桃符著門上，厭邪氣，此仙木也。



杏核人　味甘、苦，温、冷利，有毒。主咳逆上氣，雷鳴，喉痹，下氣，産乳，金瘡，寒心，賁豚，驚癇，心下煩熱，

風氣去來，時行頭痛，解肌，消心下急，殺狗毒。五月採之。其兩人者殺人，可以毒狗。杏花，味苦，無毒。主補不足，女子傷中，寒熱痹，厥逆。杏實，味酸，不可多食，傷筋骨。生晉川山谷，得火良，惡黃芩、黃耆、葛根，解錫毒，畏蘘草。

《圖經》曰：杏核人，生晉川山谷，今處處有之，其實亦數種，黃而圓者名金杏。相傳云：種出濟南郡之分流山，彼人謂之漢帝杏，今近都多傅⑪之，不及金杏。杏子入藥，今以東來者爲勝，仍用家園種者，山杏不堪入藥。劉禹錫《傳信方》治嗽補肺丸，杏人三⑫大升，山杏不中，揀却雙人及陳鼠，以童子小便一升⑬浸之，春夏七日、秋冬二七日，并皮、尖，於砂盆子中，研細濾取汁，煮令魚目沸，候軟如麵糊即成。仍時以柳篦攪，勿令著底，後即以馬尾羅或粗布下之。日暴通丸即丸，服之時食前後總須服三十丸、五十丸。任意茶、酒下。忌白水粥，只是爲米泔耳。自初浸至成，當以紙蓋之，以畏塵土也。如無馬尾羅，即以粗布袋下之。如取棗穰法。

陶隱居云：處處有，藥中多用之，湯浸去尖、皮，熬令黃。

陳藏器云：杏人本功外，殺蟲，燒令烟未盡，細研如脂，物裹内匿齒孔中。亦主産門蟲瘡癢不可忍者，去人皮、尖熬，別杵桂一分，和如泥，取杏核人⑮綿裹含，細細咽之。日五夜三。謹按：心腹中結伏氣，杏人、橘皮、桂心、訶梨勒皮爲丸。空心服三十丸。無忌。又燒令烟盡，研如泥，綿裹，内女人陰中，治蟲疽。

《勝金方》：治久患肺氣喘急至能治腹痹不通，發汗，主温病，治心下急滿痛，除心腹煩悶，瘧肺氣，咳嗽上氣、喘促，入天門冬煎，潤心肺，可和酪作湯，益潤聲氣，宿即動冷氣。

雷公云：凡使，須以沸湯浸少時，去皮膜，去尖，擘作兩片，用白火石并烏豆、杏人三件，於鍋子中，下東流水煮，從巳至午，其杏人色褐黃則去尖，然用。每修一斤，用白火石一斤，烏豆三合，水旋添，勿令色少⑭，免反血爲妙也。

孟詵云：杏，熱。面皯者取人，去皮，搗和鷄子白，夜卧塗面，明早以暖清酒洗之。人患卒啞，取杏人三分，去皮、尖熬，別杵桂一分，和如泥，取杏核人⑮綿裹含，細細咽之。日五夜三。謹按：心腹中結伏氣，杏人、橘皮、桂心、訶梨勒皮爲丸。空心服三十丸。無忌。又燒令烟盡，研如泥，綿裹，内女人陰中，治蟲疽。

《勝金方》：治久患肺氣喘急至一日一⑯換，夏月三四換，浸半月，取焙乾，爛研令極細。每服一棗大，薄荷一葉，蜜一鷄頭大，水一中盞同煎，取七分，食後温服，甚者不過兩⑰劑差，永不發動。忌腥物。

《食療》云：主熱風頭痛。又，燒令烟盡，去皮，以亂髮裹之，咬於所患齒下，其痛便止。熏諸蟲出并去風，便

差。重者不過再服。

《外臺秘要方》：治偏風，半身不遂，兼失音不語。生杏人七枚，不去皮、尖，日別從一七，漸加至七七枚，七七日周而復始。食後即以竹瀝下之，任意多少，日料一升取盡。又方：治耳聾。以杏人七個，去皮拍碎爲三分，以綿裹，於中著顆鹽如小豆許，以器承於飯甑中蒸之，候飯熟出裹。令患人側卧，和綿捻一裹，以油汁滴入耳中。久又以一裹，依前法。

《千金方》：治咳嗽旦夕加重，增寒壯熱，少喜多嗔，忽進退，面色不潤，積漸少食，狀若肺脉强緊者。杏人半斤，去皮、尖，入於瓶内，童子小便二斗，浸七日了，漉出，去小便，以暖水淘過，於沙盆内研成泥，别入瓷瓶中。以小便三升，煎之如膏。量其輕重，食上熟水下一錢匕。婦人、室女服之更妙。

又方：主卒中風，頭面腫。杵[18]杏人如膏，傅之。又方：治破傷風腫痛。熬杏人杵作膏，傅之良。

《梅師方》：治食狗肉不消，心下堅或脹，口乾，忽發熱妄語方。杏人一升去皮，水三升煎沸，去滓取汁爲三服，下肉爲度。

《食醫心鏡方》：主氣喘促，浮腫，小便澀。杏人一兩去尖、皮及雙人，水一[19]升，研濾取汁，煎減半投米煮粥，停冷，空心食之。又方：能下氣。主嗽，除痔下血不止。去尖、皮、雙人一兩，研濾取汁，於鐺中煮粥極熟，空心吃二合。又方：主五風，去野鷄病。杏人一兩去皮、尖、雙人捶碎，水三升，研濾取汁，煎減半，研一錢，銀、石器中，慢火熬成稀膏，瓷器盛。食後、夜卧，入少酥，沸湯點一匙匕服，治肺燥喘熱，大腸秘，潤澤五臟。如無上證，入鹽點佳。

《衍義》曰：杏核人，犬傷人，量所傷大小，爛嚼沃破處，以帛繫定，至差無苦。又湯去皮，研一升，以水一升半，翻復絞取稠汁，入生蜜四兩，甘草一莖約一錢，銀、石器中，慢火熬成稀膏，瓷器盛。食後、夜卧，入少酥，沸湯點一匙匕服，治肺燥喘熱，大腸秘，潤澤五臟。如無上證，入鹽點佳。

《子母秘録方》：治小兒臍赤腫。杏人杵如脂，内體中，相和傅臍腫上。

《傷寒類要方》：治温病食勞。以杏人五兩，酢二升，煎取一升，服之取汗差。

安石榴　味甘、酸，無毒。主咽燥渴，損人肺，不可多食。酸實殼，療下痢，止漏精。東行根，療蛔蟲、寸白。



《圖經》曰：安石榴，舊不著所出州土，或云本生西域。陸機與弟雲書云：張騫爲漢使外國十八年，得塗林

安石榴是也。今處處有之。一名丹若。《廣雅》謂之若榴。木不甚高大，枝柯附幹，自地便生，作叢，種極易息，折其條盤土中便生。花有黃、赤二色，實亦甘、酢二種。甘者可餐，酢者入藥。多食其實，則損人肺。東行根并殼，入殺蟲及染鬚髮口齒等藥。其花百葉者，主心熱吐血及衄血等。乾之作末，吹鼻中立差。

《藥性論》云：石榴皮，使，味酸，無毒。能治筋骨風，腰脚不遂，行步攣急，疼痛。主澀腸，止赤白下痢。一方：取汁止目淚下，治漏精。根青者，入染鬚方用。

陶隱居云：石榴，以花赤可愛，故人多植，尤爲外國所重。入藥惟根、殼而已。其味有甜、醋，藥家用醋者。子爲服食者所忌。

雷公云：凡使皮、葉、根，勿令犯鐵。若使石榴殼，不計乾濕，先用漿水浸一宿，至明漉出，其水如墨汁。若使枝、根、葉，并用漿水浸一宿，方可用。

孟詵云：石榴，温。多食損齒令黑。皮，炙令黃杵末，以棗肉爲丸，空腹三丸，日二服。治赤白痢腹痛者。取醋者一枚并子，搗汁頓服。

崔元亮《海上方》：療金瘡，刀斧傷破血流。以石灰一升，石榴花半斤，搗末，取少許傅上，捺少時，血斷便差。又，治寸白蟲，取醋石榴根，切一升，東南引者良。水二升三合，煮取八合，去滓，著少米作稀粥，空腹服之，即蟲下。

《千金方》：治寸白蟲。以酸石榴一握，净洗細剉，用水三升，煎取半碗已下，去滓，五更初温服盡，至明取下蟲一大團，永絶根本，一日吃粥補。

《古今録驗方》：治疔腫，以針刺四畔，用石榴末著瘡上，以麵圍四畔灸，以痛爲度。内末傅上急裹，經宿連根自出。

《經驗方》：治腸滑久痢，神妙無比。以石榴一個擘破，炭火簇燒令烟盡，急取出，不令作白灰，用瓷碗蓋一宿出火毒，爲末。用醋石榴一瓣，水一盞，煎湯服二錢，瀉亦治。

《孫真人方》：食之損肺。又方：治耳聾法：以八九月取石榴一，開上作孔如球子大，留臍子，内米醋滿石榴中，却以臍子蓋之，然後溲麵裹却石榴，無令醋出，塘灰火中燒麵熟，藥成。入少黑李子、仙沼子末，取水滴點耳内，不得輒轉。腦中痛勿驚。如此三夜，又點別耳，依前法，佳。又方：糞前有血，令人面色黃。石榴皮杵末，茄子枝湯下。

《十全方》：治寸白蟲。以酸石榴東引根一握，净洗細剉，用水三升，煎取半碗已下，去滓，五更初温服盡，至明取下蟲一大團，永絶根本，一日吃粥補。

《古今録驗方》：治冷熱不調，或下帶水，或赤白青黃者。酸石榴子五枚，合殼春，絞取二升汁，每服五合，至二升盡，即斷。小兒以意服之二三合。

《衍義》曰：安石榴，有酸、淡兩種，旋開單葉花，旋結實，實中子紅，孫枝甚多，秋後經雨則自坼裂㉑。道家謂之三尸酒，云三尸得此果則醉。河陰縣最多。又有一種，子白，瑩澈如水晶者，味亦甘，謂之水晶石榴。惟酸石榴皮合斷下藥，仍須老木所結及收之陳

久者，佳。微炙爲末，以燒粟米飯爲丸，梧子大，食前熱米飲下三十丸至五十丸，以知㊷爲度。如寒滑，加附子、赤石脂各一倍。

梨



梨　味甘、微酸，寒。多食令人寒中，金瘡，乳婦尤不可食。

《圖經》曰：梨，舊不著所出州土，今處處皆有，而種類殊別，醫家相承用乳梨、鵝梨。乳梨出宣城，皮厚而肉實，其味極長。鵝梨出近京州郡及北都，皮薄而漿多，味差短於乳梨，其香則過之，咳嗽，熱風，痰實藥多用之。其餘水梨、消梨、紫煤梨、赤梨、甘棠禦兒梨之類甚多，俱不聞入藥也。治卒患赤目，弩肉，坐卧痛者，取好梨一顆，搗絞取汁，黄連三枝碎之，以綿裹，漬令色變，仰卧注目中。又有紫花梨，療朝士復見鄜州馬醫趙鄂者，復診之，言心熱。唐武宗有此疾，百醫不效，青城山邢道人以此梨絞汁而進，帝疾遂愈。後復求之，苦無此梨。常山忽有一株，因緘實以進，帝多食之，解煩躁殊效，歲久木枯，不復有種者，今人不得而用之。

《唐本》注云：梨削貼湯火瘡，不爛，止痛，易差。又主熱嗽，止渴。葉，主霍亂，吐痢不止，煮汁服之。

《別本》注云：梨有數種，其消梨，味甘，寒，無毒。主客熱，中風不語，又療傷寒熱，解石熱氣，驚邪，嗽，消渴，利大小便。又有青梨、茅梨，并不任用。又有桑梨，惟堪蜜煮食。主口乾，生食不益人，冷中，不可多食。

《日華子》云：梨，冷，無毒。消風，療咳嗽，氣喘，熱狂，又除賊風，胸中熱結，作漿吐風痰。

《食療》云：金瘡及産婦不可食，大忌。

《北夢鎖言》云：有一朝士，見梁奉御，診之曰：風疾已深，請速歸去。朝士復見鄜州馬醫趙鄂者，復診之，言疾危，與梁所㊷説同矣。曰：只有一法，請官人試吃消梨，不限多少，咀齕不及，絞汁而飲。到家旬日，唯吃消梨，頓爽矣。

《梅師方》：治霍亂，心痛利，無汗升服。又云：正、二月勿食梨。

《錢相公方》：小兒寒疝腹痛，大汗出。濃煮梨葉汁七合，頓服，以意消息，可作三四度飲之。

《衍義》曰：梨，多食動脾，少則不及病，用梨之意須當斟酌。惟病酒煩渴人，食之甚佳，不能却疾。

李核人



李核人　味苦，平，無毒。主僵仆跌瘀血，骨痛。李根皮，大寒，主消渴，止心煩，逆奔氣。李實，味苦，除痼熱，調中。

《圖經》曰：李核人，舊不著所出州土，今處處有。李之類甚多，見《爾雅》者：有花無實李。李之無實者，一名趙李。李痤接慮李，即今之麥李，細實有溝道，與麥同熟，故名之。駁赤李。其子赤者是也。又有青李、緑李、赤李、房陵李、朱神李、馬肝李、黄李，散見書傳。美其味之可食。陶云：皆不入藥用。痤，俱禾切。

陶隱居云：李類又多，京口有麥李，麥秀時熟，小而甜脆，核不入藥。今此用姑熟所出南居李，解核如杏子者佳。凡實熟食之皆好，不可合雀肉食；又不可臨水上啖之。李皮水煎含，療齒痛佳。

《日華子》云：李，温，無毒。李樹根，氣，多食令人虚熱。又云：李，味苦，名郁李人，別是一種，在木部中第十四卷，非野李也。

浴湯。

《別本》注云：李類甚多，有緑李、黄李、紫李、朱李、水李，并堪食，味極甘美，其中人不入藥用。有野李，味苦，名郁李子，核人入藥用之。

《食醫心鏡》云：李，味酸，無毒。主除固熱調中。黄帝云：李不可和蜜食，食之損五臟。

崔元亮《海上方》：治面上黑子，取李核中人，去皮細研，以鷄子白和如稀餳塗，至晚每以淡漿洗之後塗胡粉，不過五六日有効。

《圖經》曰：文具附梅實條下。

《日華子》云：楊梅，熱，微毒。療嘔逆吐酒。忌生葱。

禹錫云：按孟詵云：楊梅，和五臟，能滌腸胃，除煩憒惡氣，不可多食，損齒及筋，亦治痢。燒灰服。

《經驗後方》：主一切傷損不可者瘡，止血生肌，無瘢痕，絶妙。和鹽核杵如泥，成梃子，竹筒中收。遇破即填，小可即傅，此藥功神妙。

楊梅　味酸，温，無毒。主去痰，止嘔噦，消食，下酒，乾作屑，臨飲酒時服方寸匕，止吐酒。多食令人發熱。

其樹若荔枝樹，而葉細陰青。其形似水楊子，而生青熟紅。肉在核上，無皮殼。生江南、嶺南山谷。四月、五月採。

橄欖　味酸、甘，温，無毒。主消酒，療鯁鮐毒。人誤食此魚肝迷悶者，可煮汁服之，必解。其木作楫撥，著魚皆浮出，故知物有相畏如此也。核中



橄欖

人，研傅唇吻燥痛。其樹似木槵子樹而高，端直，其形似生訶子，無棱瓣。生嶺南。八月、九月採。又有一種，名波斯橄欖，色類亦相似。其形、核作三瓣，可以蜜漬食之。生邕州。

音覽。鯸音侯。鮐音怡。

《圖經》曰：橄欖，生嶺南山谷。樹大廣諸郡皆有。木似木槵而㉕高，且端直可愛，秋晚實成，南人尤重。咀嚼滿口香久不歇，生啖及煮飲并解諸毒，人誤食鯸鮐肝，至迷悶者，飲汁，立差。

《日華子》云：橄欖，開胃，下氣，止渴。

禹錫云：按孟詵云：橄欖，主鯹魚毒，汁服之。中此魚肝、子毒，人立死，惟此木能解。生嶺南山谷。樹大數圍，實長寸許。生者漸高。八月熟，蜜藏極甜。其子先生者向下，後生者漸高。八月熟，蜜藏極甜。

《衍義》曰：橄欖，味澀，食久則甘，嚼汁咽，治魚鯁。

林檎



味酸、甘，温。不可多食，發熱澀氣，令人好睡，發冷痰，生瘡癤，脉閉不行。其樹似柰樹，其形圓如柰。六月、七月熟，今在處有之。

《圖經》曰：林檎，舊不著所出州土，今在處有之。或謂之來禽，木似柰，實比柰差圓，六七月熟。亦有甘、酢二種。甘者早熟，而味脆美；酢者差晚，須熟爛乃堪啖。病消渴者，宜食之，亦不可多，反令人心中生冷痰，今俗間醫人亦乾之，入治傷寒藥，謂之林檎散。

《日華子》云：林檎無毒，下氣，治霍亂肚痛，消痰。

禹錫云：按孟詵云：林檎，主止消渴。

陳士良云：此有三㉖種，大長者爲柰；圓者林檎，夏熟；小者味澀爲捺，秋熟。

《食療》云：林檎，温。主穀痢、泄精。東行根治白蟲，蛔蟲，消渴，好睡，不可多食。又云：味苦、澀，平，無毒。食之閉百脉。

《食醫心鏡方》：治水痢。以十枚半熟者，以水二升，煎取一升，和林檎，空心服之。

《子母秘録方》：治小兒痢。林檎、構子㉕杵取汁服，以意多與服之，差。又方：治小兒閃癖，頭髮堅黄，故瘵癃致身羸瘦。杵林檎末，以和醋傅上，癖和移處，就傅之。

胡桃



胡桃　味甘，平，無毒。食之令人肥健，潤肌，黑髮。取瓤燒令黑，末，斷烟，和松脂研，傅瘰癧瘡。又，和胡粉爲泥，拔㉘白鬚髮，以內孔中，其毛皆黑。多食利小便，能脫人眉，動風故也。去五痔。外青皮染髭及帛皆黑。其樹皮止水痢，可染褐。仙方取青皮壓油，和詹糖香塗毛髮，色如漆。生北土，云張騫從西域將來。其木，春斫洛間多有之。大株厚葉多陰。實亦有房，秋冬熟時採之。性熱，不可多食，動痰飲，除煩，令人能食，不得補下方亦用之。取肉合破故紙搗篩，蜜丸。朝服梧桐子大三十丸。又療壓撲損傷。搗肉和酒，溫頓服之便差。

《日華子》云：潤肌肉，益髮，食醾齒齾，細嚼解之。

禹錫云：按孟詵云：胡桃，不可多食，動痰飲，除煩，令人能食，不得并，漸漸食之，通經脉，潤血脉，黑鬚髮。又，服法：初日一顆，五日加一顆，至二十顆乃止。常服，骨肉細膩光潤，能養一切痔疾。

崔元亮《海上方》：療石淋，便中有石子者。胡桃肉一升，細米煮漿粥一升，相和頓服，即差。實上青皮，染髮及帛皆黑。其木皮中水，春研取沐頭，至黑。

《梅師方》：治火燒瘡。取胡桃瓤，燒令黑，杵如脂，傅瘡上。

《衍義》曰：胡桃，發風。陝、洛之間甚多，外有青皮包之，胡桃乃核也。核中桃㉙爲胡桃肉。須如此說，用時須以湯剥去肉上薄皮，過夏至，則不堪食㉚。有人患酒楂風，鼻上赤，將橘上核，微炒爲末，每服二錢匕，研，胡桃肉一個，同以溫酒調服，以知㉛爲度。

海松子　味甘，小溫，無毒。主骨節風，頭眩，去死肌，變白，散水氣，潤五臟，不饑。生新羅。如小栗，三角，其中人香美，東夷食之當果，與中土松子不同。

禹錫云：按《日華子》云：松子，去皮食之，甚香美，與雲南松子不同，雲南松子似巴豆，其味不厚，多食發熱毒。松子，味甘美，大温，無毒。主諸風，温腸胃。久服輕身，延年不老。味與卑古國偏桃人相似，其偏桃人，用與北桃人無異。



槝椇

榲桲　味酸、甘，微温，無毒。主温中，下氣，消食，除心間醋水，去臭，辟衣魚。生北土，似榠子而小。

禹錫云：按陳士良云：發毒熱，秘大小腸，聚胸中痰壅。不宜多食，澀血脉。

《日華子》云：除煩渴，治氣。

《衍義》曰：榲桲，食之須浄去上浮毛，不爾損人肺。花亦香，白色，諸果中惟此多生蟲，少有不蚵者。《圖經》言，欲卧，啖一兩枚而寢。如此，恐太多，痞塞胃脘。

榛子　味甘，平，無毒。主益氣力，寬腸胃，令人不饑，健行。生遼東山谷。樹高丈許，子如小栗，軍行食之當糧，中土亦有。鄭注《禮》云：榛似栗而小，關中鄙坊甚多。

《圖經》曰：文具附栗條下。

禹錫云：按《日華子》云：新羅榛子肥白人止饑，調中開胃，甚效。

獼猴桃　味酸，甘，寒，無毒。止暴渴，解煩熱，冷脾胃，動泄瀉，壓丹石，下石淋。熱壅反胃者，取汁和生薑汁服之。一名藤梨，一名木子，一名獼猴梨。生山谷。藤生著樹，葉圓有毛。其形似鷄卵大，其皮褐色，經霜始甘美可食。枝、葉殺蟲，煮汁飼狗，療瘕也。

陳藏器云：味鹹，温，無毒。主骨節風，癱瘓不隨，長年變白，野鷄肉痔病，調中下氣。皮中作紙，藤中汁至滑，下石淋，主胃閉，取汁和生薑汁，服之佳。

《食療》云：候熟收之，取瓤和蜜煎作煎，去人煩熱。久食亦得。令人冷，能止消渴。

《衍義》曰：獼猴桃，今永興軍㉜南山甚多，食之解實熱，過多則令人臟寒泄。十月爛熟，色淡緑，生則極酸，子繁細，其色如芥子，枝條柔弱，高二三丈，多附木而生。淺山傍道則有存者，深山則多爲猴所食。

柰　味苦，寒。多食令人臚脹，病人尤甚。臚音閭。

《圖經》曰：文具林檎條下。

陶隱居云：江東乃有，而北國最豐，皆作脯，不宜人。有林檎相似而小，亦恐非益人也。

禹錫云：按孟詵云：柰，主補中焦諸不足氣，和脾。卒患食後氣不通，生搗汁服之。

《日華子》云：柰，冷，無毒。治飽食多肺壅氣脹。

《食醫心鏡》云：柰子，味苦，寒澀，無毒。主忍饑，益心氣，多食虚脹。

菴羅果　味甘，温。食之止渴，動風氣。天行病後及飽食後，俱不可食之。又，不可同大蒜辛物食，令人患黄病。樹生，狀若林檎而極大。

禹錫等按：陳士良云：微寒，無毒。主婦人經脉不通，丈夫榮衛中血脉不行，久食令人不饑。葉似茶葉，可以作湯，療渴疾。

《衍義》曰：菴羅果，西洛甚多，亦梨之類也。其狀亦梨，先諸梨熟，七夕前後已堪啖，色黄如鵝梨，纔熟便松

軟，入藥，絶稀用。

無漏子　味甘，温，無毒。主温中益氣，除痰嗽，補虚損，好顔色，令人肥健。生波斯國，如棗。一云波斯棗。

《海藥》云：樹若栗木，其實如橡子，有三角，消食，止咳嗽，虚羸，悦人。久服無損也。

懸鈎根皮　味苦，平，無毒。主子死腹中不下，破血，殺蟲毒，卒下血，婦人赤帶下，久患痢，不問赤白，膿血，腹痛。并濃煮服之。子如梅酸美，人食之醒酒，止渴，除痰唾，去酒毒。莖上有刺如鈎，生江淮林澤。取莖燒爲末服之，亦主喉中塞也。

鈎栗　味甘，平。主不饑，厚腸胃，令人肥健。子似栗而圓小。生江南山谷。樹大數圍，冬月不彫。一名巢鈎子。又有雀子，小圓、黑，味甘。久食不饑。生高山，子小圓黑。又有櫧子，小於橡子，味苦，澀。止泄痢，破血，食之不饑，令健行。木皮、葉煮取汁，與産婦飲之，止血。皮樹如栗，冬月不彫。生江南。子能除惡血，止渴也。櫧音諸。

諸果有毒　桃、杏人雙有毒。五月食未成核果，令人發癰癤及寒熱。又秋夏果落地爲惡蟲緣，食之令人患九漏。桃花食之，令人患淋。李人不可和鷄子食之，患内結不消。

圖經衍義本草卷之三十六

---

❶唐本：晦明軒本作『别本』。
❷利：晦明軒本『利』下有『大』字。
❸痟：晦明軒本作『疳』。
❹如：晦明軒本作『數』。
❺頭：晦明軒本作『項』。
❻燥：晦明軒本作『瘙』。
❼止：晦明軒本作『出』。
❽防：晦明軒本作『痞』。
❾小大：晦明軒本無此二字。
❿一：晦明軒本作『深』。
⓫傅：晦明軒本作『種』。
⓬三：晦明軒本作『二』。
⓭升：晦明軒本作『斗』。
⓮色少：晦明軒本作『闕』。
⓯杏核人：晦明軒本作『李核大』。
⓰一：原脱，據晦明軒本補。
⓱兩：晦明軒本作『三』。
⓲杵：原作『桔』，據晦明軒本改。
⓳一：晦明軒本作『三』。
⓴急：晦明軒本作『煎』。
㉑裂：原作『列』，據晦明軒本改。
㉒知：原作『和』，據晦明軒本改。
㉓所：原作『新』，據晦明軒本改。
㉔葉：晦明軒本作『華』。
㉕而：原脱，據晦明軒本補。
㉖三：原作『二』，據晦明軒本改。
㉗子：原作『了』，據晦明軒本改。
㉘拔：原脱，據晦明軒本補。
㉙桃：晦明軒本作『穰』。
㉚食：原作『今』，據晦明軒本改。
㉛知：原作『和』，據晦明軒本改。
㉜軍：原作『車』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之三十七

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

米穀部上品



胡麻

胡麻　味甘，平，無毒。主傷中，虛羸，補五内，益氣力，長肌肉，填髓腦，堅筋骨，療金瘡，止痛，及傷寒温瘧，大吐後虛熱羸困。久服輕身不老，明耳目，耐饑渴，延年。以作油，微寒，利大腸，胞衣不落。生者摩瘡腫，生禿髮。一名巨勝，一名狗虱，一名方莖，一名鴻藏。生上黨川澤。

《圖經》曰：胡麻，巨勝也。生上黨川澤。青蘘，巨勝苗也。生中原川谷，今并處處有之。皆園圃所種，稀復野生。苗梗如麻，而葉圓鋭光澤。嫩時可作蔬，道家多食之。謹按《廣雅》云：狗虱，巨勝也；藤弘，胡麻也。陶隱居云：其莖方者名巨勝；圓者名胡麻。如此巨勝、胡麻爲二物矣。或云本生胡中，形體類麻，故名胡麻。又八穀之中，最爲大勝，故名巨勝。如此似然則仙方乃有服食胡麻、胡麻中，有一葉兩莢者爲一物二名也。然則仙方乃有服食胡麻、巨勝二法，功用小别。疑本一物而種之有二。如天雄、附子之類。故葛稚川亦云：胡麻是也。食甚甘❶，當九蒸曝，熬搗之，可以斷穀。又以白蜜合丸，曰静神丸，服之益肺，潤五臟。壓取油，主大❷熱秘腸結，服一合則通利。

《藥性論》云：葉，搗汁沐浴，甚良。又牛傷熱，搗汁灌之，立差。又患崩中血凝疰者，生取一升，搗，内熱湯❸中，絞取半升，立愈。巨勝者，仙經所重，白蜜一升，子一升，合之，名曰静神丸。常服之，治肺氣，潤五臟。其功至多，亦能休糧，填人骨髓，其❹有益於男子。患人虚而吸吸，加胡麻用。

《唐本》注云：此麻以角作八棱者爲巨勝，四棱者名胡麻。都以烏者良，白者劣爾。生嚼塗小兒頭瘡及浸淫惡瘡，大效。

禹錫云：按吴氏云：胡麻一名方金。神農、雷公：甘，平，無毒。秋採青蘘，一名夢神。

《抱朴子》云：巨勝一名胡麻，餌服之，不老，耐風濕。

新注云：胡麻、白大豆、棗三物同九蒸九曝，作團食❺，令人不饑，延年斷穀。又合蒼耳子爲散，服之治風。

《食療》云：潤五臟，主火灼。山田種，爲四棱。土地有異，功力同。休糧人重之。填骨髓❻，又補虚氣。

《聖惠方》：治五臟虚損，羸瘦，益氣力，堅筋骨。巨勝蒸曝各九遍，每取二合，用湯浸布裹，挼去皮再研，水濾取汁煎，和粳米煮粥食之。

《外臺秘要》：治手脚酸疼兼微腫。烏麻五升碎之，酒一升，浸一宿，

隨多少飲。

《千金方》：常服明目洞視。胡麻一石，蒸之三十遍，末，酒服，每日一升。又方：治腰脚疼痛。胡麻一升，新者熬令香，杵篩。日服一大升許，一升❼即永差。酒飲、羹汁、蜜湯皆可服之。

《經驗後方》：治暑毒。救生散：新胡麻一升，內❽炒令黑色，取出攤冷碾末，新汲水調三錢匕，或丸如彈子，新水化下。凡著熱，外不得以冷物逼，外得冷即死。

《修真秘旨》：神仙服胡麻法：服之能除一切痼病，至一年面光澤、不饑，三年水火不能害，行及奔馬，久服長生。上黨者尤佳。胡麻二斗，淨淘上甑蒸，令氣遍出，日乾，以水淘去沫，即蒸，如此九度。以湯脫去皮，簸令淨，炒令香，杵爲末，蜜丸如彈子大。每温酒化下一丸，忌毒物、生菜等。

《續齊諧記》：漢明帝永平十五年中，剡縣有劉晨、阮肇二人，入天台山採藥，迷失道路，忽逢一溪，過之、過遇二女，以劉、阮姓名呼之，如舊識耳。

《圖經》曰：文具胡麻條下。

陶隱居云：胡麻葉也。甚肥滑，亦可以沐頭，但不知云何服之。仙方❿并無用此法，正當陰乾，搗爲丸散。既服其實，故不復假苗。五符巨勝丸方亦云：葉名青蘘。本生大宛，度來千年爾。

《唐本》注云：青蘘，《本經》在草部上品中，既堪食，今從胡麻條下。

《衍義》曰：青蘘，即油麻葉也。此乃是所食之穀無疑，與白油麻爲一等，如川大黄、川當歸、川升麻、上黨人參、齊州半夏之類，不可與他土者更爲二物。蓋特以其地之所宜立名也。是知胡麻與白油麻爲一物，嘗官於順安軍，雄、霸州之間，備見之。又二條皆言無毒，治療大同。今之用白油麻，世不可一日闕也。然亦不至於大寒，宜兩審之。

青蘘　味甘，寒，無毒。主五臟邪氣，風寒濕痹，益氣，補腦髓，堅筋骨。久服耳目聰明，不饑，不老，增壽。巨勝苗也。生中原川谷。

麻蕡　味辛，平，有毒。主五勞七傷，利五臟，下血寒氣，破積，止痹，散膿，多食令人見鬼狂走。久服通神明，輕身。一名麻勃，此麻花上勃勃者。良。麻子，味甘，平，無



麻蕡

毒。主補中益氣，中風汗出，逐水，利小便，破積血，復血脉，乳婦産後餘疾，長髮，可爲沐藥。久服肥健不老，神仙。九月採，入土者損人。生太山川谷。畏牡蠣、白薇，惡茯苓。

《圖經》曰：麻蕡、麻子，生太山川谷，今處處有。皆園圃所蒔，績其皮以爲布者。麻蕡一名麻勃，麻上花勃勃者，七月七日採，麻子九月採，入土者不用。陶隱居以麻蕡爲牡麻，牡麻則無花也。又引蘇恭以爲即實，非花也。又引《爾雅》：蕡，枲實。及《禮》云：苴，麻之有蕡者，皆謂蕡爲子也。謂陶重出子條爲誤。按《本經》：麻蕡，主七傷，利五臟，多食令人狂走。觀古今方書，用麻子所治亦爾。又麻花，非所食之物，如蘇之論，似當矣。然朱子云：麻蕡味辛，麻子味甘，此又似二物。疑本草與《爾雅》、《禮記》有稱謂不同者耳。又古方亦有用麻花者，云味苦，主諸風及女經不利，以蘼蟲爲使。然則蕡也、子也、花也，其三物乎？其葉與桐葉合搗，浸水沐髮，令長潤。皮青淋湯濯瘀血。根煮汁冷服，主下血不止。今用麻人，極難去殼，醫家多以水浸，經三兩日，令殼破，曝乾，新瓦上擂取白用。

《藥性論》云：麻花，白麻是也。味苦，微熱，無毒。能治一百二十種惡風，黑色遍身苦癢，逐諸風惡血。主女人經候不通，蘼蟲爲使。又葉沐髮，長潤。青麻湯淋瘀血，又主下血不止。

陶隱居云：麻蕡即牡麻，牡麻則無實，今人作布及履用之。麻勃，方藥亦少用，術家合人參服，令逆知未來事。其子中人，合丸藥并釀酒，大善，然而其性滑利。麻根汁及煮飲之，亦主瘀血，石淋。

禹錫云：按《爾雅》云：黂，枲實。釋曰：枲，麻也；麻，蕡子也。《儀禮》注：苴⑫，麻之有黂者。又《禹貢》：青州厥貢岱畎絲枲是也。又曰荸麻。釋曰：苴，麻之盛子者也。一名荸，一名麻母。

《日華子》云：大麻，補虛勞，逐一切風氣，長肌肉，益毛髮，去皮膚頑痹，下水氣及下乳，止消渴，催生，治橫逆産。

陳士良云：大麻人，主肺臟，潤五臟，利大小便，疏風氣。不宜多食，損血脉，滑精氣，痿陽氣，婦人多食發帶疾。

《食療》云：微寒。治大小便不通，髮落，破血，不饑，能寒。取汁煮粥，去五臟風，潤肺，治關節不通，髮落，通血脉，治氣。青葉，甚長髮。研麻子汁，沐髮即生長。麻子一升，白羊脂七兩，蠟五兩，白蜜一合，和杵⑬，蒸食之，不饑。《洞神經》又取大麻，日中服子末三升；東行茱萸根剉八升，漬之。平旦服之二升，至夜蟲下。要見鬼者，取生麻子、菖蒲、鬼臼等分，杵爲丸，彈子大。每朝向日服一丸，服滿百日即見鬼也。

《聖惠方》：治生眉毛。用七月烏麻花，陰乾爲末。生烏麻油浸，每夜傅之。

《外臺秘要》：治瘰癧。七月七日出時收麻花，五月五日收葉，二件作炷子，於癧上灸百壯。又方：治虛勞，下焦虛熱，骨節煩疼，肌肉急，小便不利，大便數少，吸吸口燥少氣，淋石熱。大麻人五合研，水二升，煮去半分，服四五劑差。

《千金方》：治髮落不生，令長。麻子一升，熬黑壓油以傅頭，長髮妙。

又方：治風癲百病。麻人四升，水六升，猛火煮令牙生去滓，煎取七升。旦空心服，或發或不發，或多狂語，勿怪之。但人摩手足須定，凡進二⑭劑愈。

又方：主産後血不去。麻子五升，酒一升，漬一宿，明旦去滓，温服一升，先食。不差，方⑮再服一升，不吐不下，不得與男子通，一月將養如初，差。

《肘後方》：治淋下血。麻根十枚，水五升，煮取二升。一服血止，神驗。

《食醫心鏡》：治風水腹大，臍腰重痛，不可轉動。冬麻子半升碎，水研濾取汁，米二合，以麻子汁煮作稀粥，著葱、椒、薑、豉，空心服之。又方：主五淋，小便赤少，莖中疼痛。冬麻子一升，杵研濾取汁二升，和米三合煮粥，著葱、椒、薑、豉煮，空心服之。

《新續十全方》：令易産。大麻根三莖，水一升，煎取半升，頓服立産。衣不下服之亦下。

《子母秘録》：産後穢污不盡，腹滿。麻子三兩，酒五升，煮取一⑯升。分温二服，當下惡物。又方：治小兒赤白痢，多體弱不堪，大困重者。麻子一兩，攪服之，少時即瀉，治熱毒甚良。

白油麻　大寒，無毒。治虛勞，滑腸胃，行風氣，通血脉，主⑮頭浮風，潤肌。食後生啖一合，終身不輟。與乳母食，其孩子永不病生。若客熱，可作飲汁服之。停久者，發霍亂。又生嚼傅小兒頭上諸瘡良。久食抽人肌肉。



白油麻

《圖經》曰⑱：油麻，《本經》舊不著條。然古醫方多用之，無毒，滑腸胃，行風氣，久食消人肌肉，生則寒，炒熟則熱。仙方蒸以辟穀，壓笮爲油，大寒，發冷疾，滑精髓，發臟腑渴，令人脾

困，然治癰疽，熱病。《近效方》：婆羅門僧療大風疾，并壓丹石熱毒，熱風，手脚不遂。用消石一大兩，生烏麻油二大升，合内鐺中，以土墼蓋口，以紙泥固濟，勿令氣出，細進火煎之，其藥未熟時氣腥，候香氣發即熟，更以生油麻二大升和合，又微火煎之，以意斟量得所，即内不津器中。服法：患大風者，用火爲使，在室中重作小紙屋子，大合，病人力壯，日二服，服之三七日，外然火，令患人在紙屋中發汗，日服一頭面疱瘡皆滅。

《外臺秘要》：治胸喉間覺有癥蟲上下，偏聞葱、豉食香，此是髮蟲。油煎葱、豉令香，二日不食，張口而卧，將油、葱、豉致口邊。蟲當漸出，徐徐以物引去之。

《經驗後方》：治蚰蜒、蜘蛛子咬人。用油麻研傅之差。孫真人同。

《斗門方》：治産後脱腸不收。用油五斤煉熟，以盆盛後温却，令産婦坐油盆中，約一頓飯久。用皂角炙令脆，去粗皮爲末。少許吹入鼻中令嚏，立差，神效。

《衍義》曰：白油麻，與胡麻一等，但以其色言之，比胡麻差淡，亦不全白。今人止謂之脂麻，前條已具。炒熟乘熱壓出油，而謂之生油，但可點照。須再煎煉，方謂之熟油，始可食，復不中點照，亦一異也。如鐵自火中出而謂之生鐵，亦此義也。

飴糖　味甘，微温。主補虚乏，止渴，去血。飴，音貽。

陶隱居云：方家用飴糖，乃云膠飴，皆是濕糖如厚蜜者，建中湯多用之。其凝强及牽白者，不入藥。今酒麴、糖用蘗，猶同是米麥，而爲中上之異。糖當以和潤爲優，酒⑲以醺亂爲劣也。

《食療》云：主吐血，健脾。凝强者爲良。主打損瘀血，熬令焦，和酒服之，能下惡血。又，傷寒大毒軟⑳，於蔓菁、薤汁中煮一沸，頓服之。

《外臺秘要》：誤吞錢。取飴糖一斤，漸漸盡食之，環及釵便出。

《肘後方》：魚骨哽在喉中，衆法不能去。飴糖丸如鷄子黄大吞之。不出，大作丸用，妙。

《衍義》曰：飴糖，即餳是也，多食動脾風，今醫家用以和藥。糯與粟米作者佳，餘不堪用，蜀黍米亦可造。不思食人少食之，亦使脾胃氣和。唐·白樂天詩一楪較牙餳者是此。

---

❶甚甘：晦明軒本作『其實』。
❷大：晦明軒本作『天行』。
❸湯：原作『花』，據晦明軒本改。
❹其：晦明軒本作『甚』。
❺食：原作『良』，據晦明軒本改。
❻髓：原脱，據晦明軒本補。
❼一升：晦明軒本作『計服一斗』。
❽内：晦明軒本作『微』。
❾邀：原作『通』，據晦明軒本改。
❿高：晦明軒本作『髓』。
⓫方：原作『也』，據晦明軒本改。
⓬苴：原作『草』，據晦明軒本改。
⓭杵：原作『生』，據晦明軒本改。
⓮二：晦明軒本作『三』。
⓯方：晦明軒本作『夜』。

⑯一：晦明軒本作『二』。
⑰主：晦明軒本作『去』。
⑱《圖經》曰：此三字原脱，據晦明軒本補。
⑲酒：原脱，據晦明軒本補。
⑳軟：晦明軒本作『嗽』。

圖經衍義本草卷之三十八

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

米穀部中品

豆



生大豆　味甘，平。塗癰腫，煮汁飲殺鬼毒，止痛，逐水脹，除胃中熱痹，傷中，淋露，下瘀血，散五臟結積、内寒，殺烏頭毒。久服令人身重。炒爲屑，味甘。主胃中熱，去腫，除痹，消穀，止腹脹。生太山平澤。九月採。惡五參、龍膽，得前胡、烏喙、杏人、牡蠣良。

《圖經》曰：大豆黄卷及生大豆，生太山平澤，今處處有之。黄卷是以生豆爲蘗，待其芽出便曝乾取用，方書名黄卷皮，今蓐婦藥中用之。大豆有黑白二種，黑者入藥，白者不用。其緊小者爲雄豆，入藥尤佳。豆性本平，而修治之便有數等之效。煮其汁甚凉，可以壓丹石毒及解諸藥毒，作腐則寒而動氣，炒食則熱，投酒主風，作豉極冷，黄卷及醬皆平。牛食之温，馬食之凉，一體而用別，大抵宜作藥使耳。殺烏頭毒尤勝。仙方修製黄末，可以辟穀度饑歲。然多食令人體重，久則如故矣。

陳藏器云：大豆，炒令黑，烟未斷，及熱投酒中，主風痹，癱瘓，口噤，産後諸風，食罷，生服半兩，去心胸煩熱，熱風恍惚，明目，鎮心，温補。久服好顔色，變白，去風，不忘。煮食，寒。下熱氣腫，壓丹石煩熱。汁，解諸藥毒，消腫。大豆炒食極熱，煮食之及作豉極冷。黄卷及醬，平。牛食温，馬食

冷，一體之中，用之數變。

禹錫等按：《蜀本》注云：煮食之，主温毒水腫。

《日華子》云：黑豆，調中下氣，通關脉，制金石藥毒，治牛、馬温毒。

孟詵云：大豆，寒。和飯搗塗一切毒腫。療男女陰腫，以綿裹内之。主殺諸藥毒。謹按：煮飲服之，去一切毒氣，除胃中熱痹，腸中淋露，下淋血，散五臟結積内寒。和桑柴灰汁煮之，下水鼓腹脹。

《食療》云：微寒。主中風脚弱，産後諸疾。若和甘草煮湯飲之，去一切熱毒氣。善治風毒脚氣，煮食之，主心痛，筋攣，膝痛，脹滿。殺烏頭、附子毒。

《抱朴子❶内篇》云：相國張公文蔚，莊在東都柏坡，莊内有鼠狼穴，養四子爲蛇所食。鼠狼雄雌情切，乃於穴外扮土，恰容蛇頭俟其出穴。果入所扮處出頭，度其回轉不及，當腰咬斷而劈蛇腹，銜出四子，尚有氣。置於穴外，銜豆葉嚼而傅之，皆活。

《千金方》：治頭項强不得顧視。蒸大豆一升，令變色，内囊中枕之。又方：從高墜下，頭破腦出血，中風口噤。豆一升，熬去腥，勿使太熟，杵末，蒸之氣遍，令甑下盆中，以酒一升淋之。温服一升，覆取汗。傅膏瘡上。又方：治身腫浮。烏豆一升，水五升，煮取三升汁，去滓，食後服。又方：治産後風虚，五緩六急，手足頑痹，頭旋眼眩，血氣不調。大豆一升，炒令熱熟，投三升酒中，密封，飲之。

《廣利方》：治脚氣衝心，煩悶亂，不識人。大豆一升，水三升，濃煮取汁，頓服半升。如未定，可更服。

《傷寒類要》：辟温病。以新布盛大豆二斗，内井中一宿出，服七粒佳。

《子母秘録》：主産後中風困篤，或背强口噤，或但煩熱苦渴，或身頭皆重，或身癢極，嘔逆，直視，此皆虚熱中風。大豆三升，熬令極熟，候無聲，器盛，以酒五升沃之，熱投可得二升，盡服之，温覆令少汗出，身潤即愈。産後先以針挑不生齒處，令血出，用末少許在腹方：大豆半升，生薑八分，水二升，煎取一升已來，頓服差。又方：治赤痢，臍下痛。黑豆、茱萸子二件，搓摩，吞咽必宜，良。

《食醫心鏡》：治風毒攻心，煩躁恍惚。大豆半升净淘，以水二升，煮取七合，去滓，食後服。又方：治産後風煮取三升汁，去滓，内酒五升，更取三升，分温三服。不差，再合服之。又方：治口喎。大豆一升，炒令熱熟，投三升酒中，密封，飲之。

《肘後方》：治卒風不得語。煮豆煎汁如飴，含之，亦濃煮飲之佳。又方：從早夜連時不得眠。暮以新布火炙以熨目，并蒸大豆，更翻❷囊盛枕，枕冷後更易熱，終夜常枕熱豆，即立愈，證如前。

《經驗方》：治小兒、大人多年牙齒不生。用黑豆三十粒，牛糞火内燒令烟盡，細研，入麝香少許，一處研匀。先以針挑不生齒處，令血出，用末少許揩。不得見風，忌酸、鹹物。又方：治小兒斑瘡，豌豆瘡。熟煮大

豆，取汁服之佳。又方：治小兒湯火瘡。火❸煮大豆汁塗上，易差，無斑。

《楊氏產乳》：療有孕月數未足，子死腹中，母欲悶絶。取大豆三升，醋煮濃汁三升。頓服，立差。

《產書》：產後猶有餘血水氣者，宜服豆淋酒。黑豆五升熬之，令烟絶出，於瓷器中，以酒一斗❹焠之。

《衍義》曰：生大豆，有緑、褐、黑三種，亦有大、小兩等。其大者出江、浙、湖南、北，黑小者生他處。今用小者，力更佳。炒熟，以棗肉同搗之，爲麪，代糧。又治産後百病、血熱，并中風、疾痱、止痛、背强、口噤，但煩熱、癒瘂、若渴、身背腫、劇嘔逆，大豆五升，急水淘淨，無灰酒一斗，熬豆令微温❺出，傾入酒瓶中沃之。經一日以上，服酒一升，取差爲度。如素不飲酒，即量多少服。若口噤，即加獨活半斤，微微捶破同沃，仍增酒❻一斗二升。逐月旋作，恐酸壞，又可磴爲豆腐食之。

赤小豆

味甘、酸，平，無毒。主下水，排癰腫膿血，寒熱，熱中，消渴，止泄，利小便，吐逆，卒澼，下脹滿。



赤小豆

《圖經》曰：赤小豆，舊與大豆同條，蘇恭分之。今江、淮間尤多種蒔。今用最急用。其法用此豆主水氣，脚氣方最急用。其法用此豆五合，葫一頭，生薑一分，并碎破，商陸根一條，切，同水煮豆爛，湯成，適寒温，去葫薑。細嚼豆，空腹食之，旋旋啜汁令盡，腫立消，便止。韋宙《獨行方》療水腫從脚起，入腹則殺人，亦用赤小豆一斗，煮令極爛，取汁四五升，温漬膝以下。若已入腹，但服小豆，勿雜食，亦愈。

《藥性論》云：赤小豆，使，味甘。能消熱毒癰腫，散惡血不盡，煩滿，治水腫，皮肌脹滿。搗薄塗癰腫上，主小兒急黄爛瘡。取汁冷❼洗之，不過三度差。能令人美食。末與鷄子白調，塗熱毒癰腫，差。

陶隱居云：大、小豆共條，猶如葱、薤義也。以大豆爲蘗芽，生便乾之，名爲黄卷，用之亦熬，服食所須。煮大豆，主温毒水腫殊效。復有白大豆，不入藥。小豆性逐津液，久服令人枯燥矣。

陳藏器云：赤小豆和桑根白皮煮食之，主濕❽氣痹腫。小豆和通草煮食之，當下氣無限，名脱氣丸。驢食脚輕，人食體重。

《日華子》云：赤豆粉，治煩解熱毒，排膿，補血脉，解油衣粘綴甚妙。葉食明目。

禹錫云：按《蜀本》注云：病酒熱飲汁即愈。

《食療》云：和鯉魚爛煮食之，甚治脚氣及大腹水腫。別有諸治，具在魚條中。散氣，去關節煩熱。令人心孔開，止小便數。緑、赤者并可食。暴

痢後，氣滿不能食，煮一頓服之即愈。

孫真人云：赤、白豆合魚鮓食之成消渴，小豆醬合魚鮓食之成口瘡。

《肘後方》：辟温病。取小豆，新布囊盛之，置井中，三日出。舉家服，男十枚，女二十枚。又方：治腸痔，大便常血。小豆一升，苦酒五升，煮豆熟，出乾，復内法酒中，候酒盡止，末，酒服方寸匕，日三度。又方：産後心悶目不開。生赤小豆杵末，東流水服方寸匕。不差再服。

《千金方》：主産後不能食，煩滿方。小豆三七枚，燒作屑，篩，冷水頓服之佳。

《梅師方》：治熱毒下血，或因食熱物發動。以赤小豆杵末，水調下方寸匕。又方：治婦人乳腫不得消。小豆、莽草等分，爲末，苦酒和傅之，佳。

《食醫心鏡》：理脚腫滿轉上入腹殺人。豆一升，水五升，煮令極熟，去豆，適寒温浸脚，冷重暖。

《必效方》：治水穀痢。小豆一合，和蠟三兩，頓服愈。又方：治卒下血。小豆一升，搗碎，水三升，絞汁飲之。

《産寶》：治難産方。赤小豆生吞七枚，出。若是女，二七枚佳。

《修真秘旨》云：理淋方。惟赤小豆三合，慢火炒熟爲末，煨葱一莖細剉，暖酒調二錢匕服。男子、女人，熱淋、血淋并療。

《衍義》曰：食之行小便，久則虚人，令人黑瘦、枯燥。關西、河北、京東、西多食之。花治宿酒，渴病。

大豆黄卷　味甘，平，無毒。主濕痹，筋攣，膝痛，五臟胃氣結積，益氣，止毒，去黑皯，潤澤皮毛。

《圖經》曰：文具大豆條下。

《唐本》注云：以大豆爲芽蘗，生便乾之，名爲黄卷。用亦服食。

《食療》云：卷，蘗長五分者，破婦人惡血良。

《食醫心鏡》：理久風濕痹，筋攣膝痛，除五臟胃氣結聚，益氣，止毒，去黑痣面黯，潤皮毛。宜取大豆黄卷一

血。小豆一升，搗碎，水三升，絞汁飲之。

酒　味苦、甘、辛，大熱，有毒。主行藥勢，殺百邪惡毒氣。

陶隱居云：大寒凝海，惟酒不冰，明其性熱獨冠群物。藥家多須以行其勢。人飲之，使體弊神昏，是其有毒故也。昔三人晨行觸露，一人健，一人病，一人死。健者飲酒，病者食粥，死者空腹。此酒勢辟惡，勝於作食。

《唐本》注云：酒，有葡萄、秫、黍、粳、粟、麴、蜜等，作酒醴以麴爲。而葡萄、蜜等，獨不用麴。飲葡萄酒能消痰破癖。諸酒醇醨不同，惟米酒入藥用。

《日華子》云：酒，通血脉，厚腸胃，除風及下氣。

《圖經》曰：按陳藏器云：酒，本功外，殺百邪，去惡氣，通血脉，厚腸胃，潤皮膚，散石氣，消憂發怒，宣言暢意。書曰：若作酒醴爾，惟麴蘗。蘇恭乃廣引葡萄、蜜等爲之。乃以僞亂真，殊非酒本稱。至於入藥，更亦不堪。凡好酒欲熟，皆能候風潮而轉，此是合陰

陽矣。又云：甜糟，味鹹，温，無毒。主温中，冷氣，消食，殺腥，去草菜毒，藏物不敗，揉物能軟，潤皮膚，調腑臟，三歲已下有酒以物盛之，堪磨風瘙，止嘔噦，及煎魚菜。取臘月酒糟，以和粥成之。

《食療》云：紫酒，治角弓風。薑酒，主偏風中惡。桑椹酒，補五臟，明耳目。葱豉酒，解煩熱，補虚勞。蜜酒，療風疹。地黄、牛膝、虎骨、仙靈脾、通❾草、大❿豆、牛蒡、枸杞等，皆可和釀作酒，在別方。葡萄子釀酒，益氣調中，耐饑强志，取藤汁釀酒亦佳，狗肉汁釀酒，大補。

《外臺秘要》：治水下，或不下則滿溢，下之則虚竭，虚竭還腹，十無一活。以桑椹并心皮兩物細剉，重煮煎，取四斗以釀米，四升釀酒，一服一升。

《千金方》：斷酒方：以酒七升，著瓶中，硃砂半兩，細研著酒中，緊閉塞瓶口，安猪圈中，任猪摇動，經七日，頓飲之。又方：治耳聾。酒三升，漬牡荆子二升，碎之，浸七日去滓，任性飲❿盡，三十年聾差。

《經驗後方》：孫真人催産，以鐵器燒赤，焠酒吃，便令分解。

《廣利方》：治蛇咬瘡。暖酒淋洗瘡上，日三易。

《傷寒類要》：天行病毒攻手足，疼痛欲斷。作坑令深三尺，大小容足，燒令中熱，以酒灌坑中，著屐踞坑上，衣壅勿令泄氣。

《衍義》曰：酒，《吕氏春秋》曰：帝女儀狄造酒。《戰國策》曰：帝女儀狄造酒，進之於禹。然本草中已著酒名，信是，其粒細於⓬粱米，熟舂令白，亦以當白粱呼爲白粱酒。《戰國策》曰：帝女儀狄造酒。《素問》，首言以妄者，或呼爲粢諸⓭粟。陳者謂經三五年非儀狄明矣。又讀《素問》，有醇酒、春酒、清酒、好酒、美酒、葡萄酒、秫黍酒、粳酒、蜜酒、地黄酒。今有糯米以作粉尤解煩悶，爲常，以酒爲漿，如此則酒自黄帝始，非儀狄也。古方用酒，有灰酒、新熟無灰酒、地漿酒、社壇餘胙酒、糟下酒、白酒、清酒、好酒、美酒、葡萄酒、秫黍酒、粳酒、蜜酒、地黄酒。今有糯米粉入衆藥，和合爲麵，曰餅子酒。至於官務，亦用四夷酒，更別中國，不可取以爲法。今醫家所用酒，正宜斟酌。但飲家惟取其味，不顧入藥如何爾。然久之未見不作疾者，蓋此物損益兼行，可不謹歟！

粟米　味鹹，微寒，無毒。主養腎氣，去胃脾中熱，益氣。陳者味苦，主胃熱，消渴，利小便。

《圖經》曰：文具青粱米條下。

陶隱居云：江東所種及西間皆於諸粱⓮，北土常食，與粱有别。陶云非儀狄明矣。又讀《素問》，有醇酒、春酒、清酒、好酒、美酒、葡萄酒、秫黍酒、粳酒、蜜酒、地黄酒。今有糯米以作粉尤解煩悶，當白粱，又云或呼爲粢，粢則是穊，穊乃穄之異名也。甘⓯米泔汁，主霍亂，卒熱，心煩渴，飲數升立差。臭泔，止消渴尤良。米麥麵，味甘、苦，寒，無毒。主寒中，除熱渴，解煩，消石氣。蒸米麥熬磨作之，一名糗也。穄音祭。

陳藏器云：粉解諸毒，主卒得鬼打，水攪服之。亦主熱腹痛，鼻衄，并

水煮服之。粳粟總堪爲粉，粟强浸米至敗者損人。又云：泔，主霍亂，新研米清水和濾取汁服，亦主轉筋入腹。胃冷者不宜多食。酸泔，洗皮膚瘡疥，服主五野鷄病及消渴。下澱酸者，殺蟲及惡瘡，和臭樗皮煎服，主疳痢。樗皮一名武目樹。

《千金方》：治反胃，食即吐。搗粟米作粉，和水丸如梧子大。七枚爛煮内醋中，細吞之，得下便已。麵亦得用之。

《食醫心鏡》：主脾胃氣弱，食不消化，嘔逆反胃，湯飲不下。粟米半升杵如粉⑯，水和丸如梧子，煮令熟，點少鹽，空心和汁吞下。

《姚和衆方》：兒初生七日，助穀神以導達腸胃。研粟米煮粥飲，厚薄如乳，每日研與半粟殼。

《産寶方》：粢米粉熬令黑。以鷄子白和如泥，以塗帛上貼之，帛作穴，以泄癰毒氣，易之，效。

《衍義》曰：粟米，利小便，故益脾胃。

秫米　味甘，微寒。止寒熱，利大腸，療漆瘡。

《圖經》曰：文具丹黍米條下。

陶隱居云：此人以作酒及煮糖膠，或如小豆汁。秫米、黄耆各一兩，細剉，以水七升，煎取三升服。

《食醫心鏡》：主寒熱，利大腸，治漆瘡⑰及釀諸藥醪。

《唐本》注云：此米功用是稻秫也。今大都呼粟糯爲秫稻，秫爲糯矣。

《衍義》曰：秫米，初搗出淡黄白色，經久色如糯，用作酒者是。此米亦不堪爲飯，最黏，故宜酒。

《聖惠方》：治食鴨⑳肉成病，胸滿面赤，不下食。用秫米汁服一中盞。

《肘後方》㉑：治妊娠忽下黄水如膠，或如小豆汁。秫米、黄耆各一兩，細剉，以水七升，煎取三升服。

《食醫心鏡》：主寒熱，利大腸，治漆瘡。秫米飯食之，良。

粳米　味甘、苦，無毒。主益氣，止煩，止泄。

《圖經》曰：文具稻米條下。

陶隱居云：此即人常所食米，但有白、赤、小、大異族四五種，猶同一類也。前陳廩米亦是此種，以廩軍人，故曰廩爾。

《唐本》注云：傳稱食廩爲禄。廩，倉也。前陳倉米曰廩，字誤作廩，即廩軍米也。若廩軍新米，亦爲陳米㉒？

《日華子》云：補中，壯筋骨，補腸

胃。

禹錫云：按《蜀本》云：斷下痢，和胃氣，長肌肉，温中。

孟詵云：粳米，平。主益氣，止煩泄。其赤則粒大而香，不禁水停。其黄緑即實中。又，水漬有味，益人。都大新熟者動氣。經再年者亦發病。江南貯倉人皆多收火稻宜人，火稻宜人，温中益氣，補下元。燒之去芒，舂宿米食之，即不發病耳。

《外臺秘要》：蛟龍子生在芹菜上，食之入腹，變成龍子，須慎之。餳粳米、杏人、乳餅煮粥。食之三升，日三服，吐出蛟龍子，有兩頭。開皇二年，賈橋有人吐出蛟龍，大驗，無所忌。

《肘後方》：若遇荒年，穀貴，無可以充糧，應須藥濟命者。粳米十斗㉓，酒三升漬之，出暴之。又漬酒正㉔出，稍食之，渴飲之，辟三十日，足一斛三升，辟周年。又方：小兒新生三日，應開腸胃，助穀神，碎米濃作汁飲，如乳酪，與兒大豆許，數含飲之，頻與三豆許。三七日可與哺，慎不得取次與雜藥，紅雪少少得也。

《千金方》：倉米無毒。

《衍義》曰：粳米，白晚米爲第一，早熟米不及也。平和五臟，補益胃氣，其功莫逮。然稍生則復不益脾，過熟則佳。



梁米

青梁米　味甘，微寒，無毒。主胃痹，熱中，消渴，止泄痢，利小便，益氣補中，輕身長年。

陶隱居云：凡云梁米，皆是粟類，惟其芽頭色異爲分別爾。青梁出北，今江東少有。《氾勝之書》云：梁是秫粟，今俗用則不爾。氾音泛。

《唐本》注云：青梁殼穗有毛，粒青，米亦微青而細於黄、白梁也。穀粒似青稞而少粗。夏月食之，極爲清凉，但以味短色惡，不如黄、白梁，故人少種之。此穀早熟而收少也，作餳，清白勝餘米。

《日華子》云：健脾，治泄精。醋拌百蒸百暴，可作乾糧。

禹錫云：按孟詵云：青梁米，以純苦酒十㉕斗漬之，三日出，百蒸百暴，好裹藏之。遠行一餐，十日不饑。又方：以米一餐，四百九十日不饑。又方：以米升㉖，赤石脂三斤，合以水漬之，令足相淹。置於暖處二三日。上青白衣，搗爲丸，如李大。日服三丸，不饑。謹按《靈寶五符經》中，白鮮米九蒸九暴，作辟穀糧。此文用青梁米，未見有別出處，其米微寒，常作飯食之，澀於黄、白米，體性相似。

《食醫心鏡》：主胃痹㉗熱中，除渴，止痢，利㉘小便，益氣力，補中，輕身長年。以梁米炊飯食之。

《衍義》曰：青、黄、白梁米，此三種，食之不及黄粱。青、白二種，性皆

微涼，黃粱性甘平，豈非得土之中和氣多邪？今黃、白二種，西洛間農家多種，爲飯尤佳，餘用則不相宜。然其粒尖小於他穀，收實少，故能種者亦稀，白色者味淡。

黍米　味甘，温，無毒。主益氣補中，多熱，令人煩。

陶隱居云：荆、南㉙州及江北皆種此。其苗如蘆而異於粟，粒亦大。粟而多是秫，今人又呼秫粟爲黍，非也。北人作黍飯，方藥釀黍米酒，則皆用秫黍也。又有穄米與黍米相似，而粒殊大，食不宜人，言發宿病。

《唐本》注云：黍有數種，已備注前條，今此通論丹黑黍米爾，亦不似蘆，雖似粟而非粟也。穄即稷也，具釋後條。

禹錫云：按孟詵云：黍米，性寒。患鱉瘕者，以新熟赤黍米淘取泔汁，生服一升，不過三兩度愈。謹按：性寒，有少毒。不堪久服，昏五臟，令人好睡。仙家重此。作酒最勝餘糧。又，燒爲灰，和油塗杖瘡，不作瘢，止痛。不得與小兒食之，令不能行。若與小貓、犬食之，其脚便蹋曲，行不正。緩人筋骨，絶血脉。

《食療》云：合葵菜食之，成痼疾。於黍米中藏乾脯通。《食禁》云：牛肉不得和黍米、白酒食之，生寸白蟲。

《千金方》：治人、六畜天行時氣病，豌豆瘡方。濃煮黍穰汁洗之。一云：誕降嘉種，維秬維秠。李巡云：黑黍一名秬黍。秬即黑黍之大名也。秠，是黑黍米一稃有二米者，别名之。亦可煮乾芸苔洗之。

《肘後方》：食苦瓠中毒。煮黍穰㉚汁解之，飲數升止。

所灼未成瘡。黍米、女麪等分，各熬令焦，杵，下以鷄子白傅之。



丹黍米

丹黍米　味苦，微温，無毒。主咳逆，霍亂，止泄，除熱，止煩渴。

陶隱居云：此即赤黍米也，亦出北間，江東時有種，而非土所宜，多入神藥用。又，黑黍名秬，供釀酒祭祀用之。

禹錫云：按《爾雅》云：秬，黑黍。李巡云：黑黍一名秬黍。秬即黑黍之大名也。秠，是黑黍米一稃有二米者，别名之。亦可煮乾芸苔洗之。

《肘後方》：食苦瓠中毒。煮黍穰㉚汁解之，飲數升止。

所灼未成瘡。黍米、女麪等分，各熬令焦，杵，下以鷄子白傅之。

《傷寒類要》：傷寒後，男子陰易。米三兩煮薄飲，酒和飲之。發汗出愈，隨人加減。

《衍義》曰：丹黍米，黍皮赤，其米黃，惟可爲糜，不堪爲飯。黏著難解，然亦動風。

白粱米　味甘，微寒，無毒。主除熱，益氣。

陶隱居云：今處處有，襄陽竹根者最佳。所以夏月作粟食，亦以除熱。

《千金方》：主霍亂不吐。白粱粉米五合，水一升，和之頓服，如粥食。

《肘後方》：手足忽發疣。取粱粉，鐵鐺熬令㉜赤以塗之，以衆人唾和塗上，厚一寸，即消。

黃粱米　味甘，平，無毒。主益氣和中，止泄。

陶隱居云：黃粱，出青、冀州，此間不見有爾。

《唐本》注云：黃粱，出蜀、漢，兩浙間亦種之。穗大毛長，穀米俱粗於白粱，而收子少，不耐水旱。食之香美，逾於諸粱，人號爲竹根黃。

《外臺秘要》：小兒面上生瘡如火燒。以一升末㉜，蜜水和傅之，差爲度。又方：治霍亂煩躁。以黃粱米粉半升，水一升半，和絞如白飲，頓服。糯米亦得。

《肘後方》：治霍亂吐下後，大渴多飲則殺人。黃粱米五升，水一斗，煮取三升清澄，稍稍飲之。

《食醫心鏡》：主益氣和中，止泄痢，去當風卧濕，遇冷所中等病。以作麵，温，消穀，止痢。以上翻㉞用黃米粉、鷄子白和傅。

《千金方》：治孩兒赤丹不止。

蘗米　味苦，無毒。主寒中，下氣，除熱。

陶隱居云：此是以米爲蘗，非別米名也。米甘㉟米脂和傅面，亦使皮膚悦澤，爲熱不及麥蘗。

《唐本》注云：蘗米，按《日華子》云：蘗米，消宿食，開胃。又名黃



小麥　味甘，微寒，無毒。主除熱，止躁渴咽乾，利小便，養肝氣，止漏血、唾血。

陶隱居云：小麥合湯皆完用之，作麵則温，明穬麥亦當如此。今服食家啖麵，不及大穬麥，猶勝於米爾。

陳藏器云：麩，味甘，寒，無毒。和麵作餅，止泄痢，調中，去熱，健人。蒸熱袋盛，熨人馬冷。失腰脚，和醋

蒸，抱所傷折處[36]，止痛散血。人作麵，第三磨者凉，爲近麩也。小麥，皮寒肉熱。又云：麥苗，味辛，寒，無毒。主酒疸目黄，消酒毒暴熱。麥苗上黑微[37]名麥奴，主熱煩，解丹石，天行熱毒。又云：麵，味甘，温。補虚，實人膚體，厚腸胃，强氣力，性擁熱，小動風氣。又云：女麰，一名麩子。按麩子與黄蒸不殊。黄蒸，温補，消諸生物。北人以小麥，南人以粳米，皆六七月作之。蘇又云：磨破之，謂當完作之，亦呼爲黄衣，塵緑者佳。

《外臺秘要方》：治痢，色白不消者，爲末[38]下方。好麵炒，右一味，搗篩煮米粥，内麵方寸匕。又云：此療法[36]百行，師不救者。

《千金方》：治黄疸。取小麥苗，杵絞取汁，飲六七合，晝夜三四飲之，三四日便愈。

《經驗方》：治鼻衄。以冷水調麵漿，服之立差。

《兵部手集》：治嘔噦。麵、醋和作彈丸二三十個，以沸湯煮，别盛漿水二斗已來，彈丸湯内漉出於漿中，看外熱氣稍減，乘熱吞三兩個。噦定，即止吞餘者。加至七八丸尚未定，晚後飯前再作吞。

《衍義》曰：小麥，暴淋煎湯飲，爲麵作糊。入藥水調，治人中暑。馬病肺卒熱，亦以水調灌愈。生嚼成筋，可以黏禽蟲。

大麥　味鹹，温、微寒，無毒。主消渴，除熱，益氣調中。又云：令人多熱，爲五穀長。蜜爲之使。

陶隱居云：今稞麥，一名麰麥，似穬麥，惟皮薄爾。麰音牟。

《唐本》注云：大麥出關中，即青稞麥是。形似小麥而大，皮厚，故謂大麥，殊不似穬麥也。大麥麵，平胃，止消渴，除熱，治人中暑。馬病肺卒熱，亦以水調灌愈。以黏禽蟲。

《衍義》曰：大麥，性平、凉，有人患纏喉風，食不能下，將此麵作稀糊，令咽之，既滑膩容易下咽，以助胃氣。三伏中，朝廷作麵，以賜臣下，作蘗造

人肥白，滑肌膚。爲麵勝如[41]麥，無躁熱。又云：蘗，微暖，久食消腎，不可多食。

《聖惠方》：治妊娠欲去胎。以麥蘗二兩，水一盞半，煎至一盞，分温三服。

《兵部手集方》：治産後秘結膨脹不通轉，氣急，坐卧不安，供奉輔太初與崔家方。以麥蘗末一合，和酒服食，良久通轉。崔郎中云神效。

《衍義》曰：大麥，性平、凉，有人患纏喉風，食不能下，將此麵作稀糊，令咽之，既滑膩容易下咽，以助胃氣。三伏中，朝廷作麵，以賜臣下，作蘗造餳。

麩　味甘，大暖。療臟腑中風氣，調中下氣，開胃消宿食。主霍亂，心膈氣，痰逆，除腸胃中塞，不下食，令人有顏色，除煩，破癥結及補虚，去冷氣，去心腹脹滿。

陳士良云：大麥，補虚劣，壯血脉，益顏色，實五臟，思[40]穀食。久食令令香，六畜食米脹欲死者，煮麩汁灌之立消，落胎并下鬼胎。又，神麩，使，無

毒。能化水穀宿食癥氣，健脾暖胃。

《千金方》：治產後運絶。麪末，水服方寸匕。不差，更服即差。又方：治小腹堅大如盤，胸中滿，能食而不消。麪末服方寸匕，日三。

《肘後方》：治赤白痢下，水穀食不消。以麪熬粟米粥，服方寸匕，日四五止。又方：妊娠卒胎動不安，成㊷腰痛，胎轉搶心，下血不止。生麪半餅碎末，水和絞取汁，服三升。

《兵部手集方》：治小兒油丹赤腫。蕎麥麵、醋和傅之，良。

蕎麥　味甘，平、寒，無毒。實腸胃，益氣力。久食動風，令人頭眩。和猪肉食之，患熱風，脱人眉鬚，雖動諸病，猶挫丹石，能煉五臟滓穢，續精神。作飯與丹石人食之良。其飯法可蒸，使氣餾於烈日中暴令口開，使舂取人作飯。葉作茹，食之下氣，利耳目，多食即微泄。燒其穰作灰，淋洗六畜瘡，并驢、馬躁蹄。新補。見陳藏器、孟詵、蕭炳、陳士良、《日華子》。

《圖經》曰：文具附小麥條下。

《丹房玉鏡》：源蕎麥灰煮粉霜。



藊豆

藊豆　味甘，微温。主和中下氣。豆葉，主霍亂吐下不止。生藊豆，亦可單用。㊸藊音扁。

《藥性論》云：白藊豆，蒸炒以酒漬服之，至佳。主解一切草㊸毒，生嚼及煎湯服，取效。

陶隱居云：人家種之於籬援，其莢蒸食甚美，無正用取其豆者。葉乃單行用之。患寒熱病者，不可食也。

《日華子》云：平，無毒。補五臟。

《衍義》曰：藊豆，有黑、白、鵲三等，皆於豆脊方㊺白路。白者治霍亂轉筋。

豉　味苦，寒，無毒。主傷寒，頭痛寒熱，瘴氣惡毒，煩躁滿悶，虚勞喘吸，兩脚疼冷。又殺六畜胎子諸毒。

《圖經》曰：文具附大豆黄卷條下。

陶隱居云：豉，食中之常用。春夏天氣不和，蒸炒以酒漬服之，至佳。依康伯法：先以醋酒搜蒸暴燥，以麻油和，又蒸暴之，凡三過，乃末椒、乾薑屑合和，以進食，勝今作油豉也。患脚人常將其酒浸，以淬傅脚皆差。好者出襄陽、錢塘，香美而濃，取中心者彌善。

陳藏器云：蒲州豉，味鹹，無毒。主解煩熱，熱毒，寒熱，虚勞，調中，發汗，通關節，殺腥氣，傷寒鼻塞。作法與諸豉不同，其味烈。陝州又有豉汁，經年不敗，大除煩熱，入藥并不如今之

豉心，爲無鹽故也。

《日華子》云：治中毒藥，蠱氣，瘧疾，骨蒸，并治犬咬。

孟詵云：豉，能治久盜汗患者，以一升微炒令香，清酒三升漬，滿三日取汁，冷暖任人服之，不差，須作三兩劑，即止。

《聖惠方》：治口舌生瘡，胸膈疼痛。用焦豉細末，含一宿便差。

《外臺秘要方》：治蟲刺螫人方。好豉心以足爲限，但覺刺即熟嚼豉以傅之，少頃見豉中毛，即差。不見，又嚼傅之，晝夜勿絶，見毛爲度。

《千金方》：治酒病。豉、葱白各半升，水二升，煮取一升，頓服。又方：治被毆傷瘀血聚腹滿。豉一升，水三升，煮三沸，分服，不差再服。

《肘後方》：中緩風，四肢不收者。豉三升，水九升，煮取三升。分爲三服，日二作。亦可酒漬飲之。

《葛氏方》：治重下，此即赤白痢也。熬豉令小焦，杵服一合，日三，無比。又，豉熬令焦，水一升，淋取汁冷服，冷則酒淋，日三服，有效。

《梅師方》：傷寒，汗出不解，已三四日，胸中悶吐方。豉一升，鹽一合，水四升，煎升半，分三服當吐。

《食醫心鏡方》：主風毒，脚膝攣急，骨節痛。豉心五升，九蒸九暴，以酒一斗取浸[46]經宿，空心隨性緩飲之。

緑豆　味甘，寒，無毒。主丹毒，煩熱，風癗，藥石發動，熱氣奔豚，生研絞汁服。亦煮食，消腫，下氣，壓熱，解石。用之勿去皮，令人小壅，當是皮寒肉[47]平。圓小緑者佳。又有稙豆，苗子相似，主霍亂吐下。取葉搗絞汁，和少醋温服，子亦下氣也。稙音陟。

《日華子》云：緑豆，冷。益氣，除熱毒風，厚腸胃，作枕明目，治頭風痛。

禹錫云：按孟詵云：緑豆，平。諸食法：作餅炙，食之佳。謹按：補益，和五臟，安精神，行十二經脉，此最爲良。今人食皆撻去皮，即有少擁氣。若愈病，須和皮，故不可去。又，研汁煮飲服之，治消渴。又，去浮風，益氣力，潤皮肉，可長食之。

雷公云：益氣明目，治頭風。

舂杵頭細糠　主卒噎。

陶隱居云：食卒噎不下，刮取含之即去，亦是舂搗義爾。天下事理，多有相影響如此也。自草部今移。

《聖惠方》：治膈氣，咽喉噎塞，飲食不下。用碓觜上細糠，蜜丸如彈子大，非時含一丸咽津。

穬麥　味甘，微寒，無毒。主輕身，除熱。久服令人多力健行，以作蘗，温，消食和中。

陶隱居云：此是今馬所食者，性乃熱而云微寒，恐是作屑與合殼異也。服食家并食大、穬[48]二麥，令人輕健。

《唐本》注云：穬麥性寒，陶云性熱，非也。復云：作屑與合殼異。此皆江東少有，故斟酌言。

白豆　平，無毒。補五臟，益中，

助十二經脉，調中，暖腸胃。葉，利五臟，下氣。嫩者可作菜食，生食之亦佳，可常食。新補。見孟詵及《日華子》。

《孫真人食忌》：白豆，味鹹，腎之穀，腎病宜食，煞鬼氣。

圖經衍義本草卷之三十八

---

❶子：原脱，據晦明軒本。
❷翻：晦明軒本作『番』。
❸火：晦明軒本作『水』。
❹斗：晦明軒本作『升』。
❺温：晦明軒本作『烟』。
❻酒：晦明軒本『酒』下有『至』。
❼冷：晦明軒本作『令』。
❽濕：原作『温』，據晦明軒本改。
❾通：原脱，據晦明軒本補。
❿大：原作『本』，據晦明軒本改。
⓫飲：原作『限』，據晦明軒本改。
⓬於：原作『粟』，據晦明軒本改。
⓭諸：晦明軒本無『諸』字。
⓮粱：原作『粟』，據晦明軒本改。
⓯甘：晦明軒本作『其』。
⓰粉：原脱，據晦明軒本補。
⓱瘡：原脱，據晦明軒本補。
⓲北：原作『此』，據晦明軒本改。
⓳米：原作『水』，據晦明軒本改。
⓴鴨：原作『鳴』，據晦明軒本改。
㉑肘後方：晦明軒本作『梅師方』。
㉒米：晦明軒本作『乎』。
㉓十斗：晦明軒本作『一升』。
㉔正：晦明軒本作『次』。
㉕十：晦明軒本作『一』。
㉖升：晦明軒本作『斗』。
㉗痹：晦明軒本作『脾』。
㉘利：原脱，據晦明軒本補。
㉙南：晦明軒本作『郢』。
㉚稷：晦明軒本作『穰』。
㉛秬：原脱，據晦明軒本補。
㉜令：原作『止』，據晦明軒本改。
㉝末：原作『木』，據晦明軒本改。
㉞上翻：晦明軒本作『土番』。
㉟米甘：晦明軒本作『末其』。
㊱處：原作『姅』，據晦明軒本改。
㊲微：晦明軒本作『霉』。
㊳末：晦明軒本作『寒』。
㊴法：晦明軒本作『瀉』。
㊵思：晦明軒本作『化』。
㊶如：晦明軒本作『小』。
㊷成：晦明軒本作『或』。
㊸草：晦明軒本『草』下有『木』字。
㊹七：晦明軒本作『一』。
㊺方：晦明軒本作『有』。
㊻浸：原作『酒』，據晦明軒本改。
㊼肉：原作『均』，據晦明軒本改。
㊽穬：原作『利』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之三十九

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

米穀部下品

醋　味酸，温，無毒。主消癰腫，散水氣，殺邪毒。

陶隱居云：醋酒爲用，無所不入，愈久愈良，亦謂之醯。以有苦味，俗呼爲苦酒。丹家又加餘物，謂爲華池左味，但不可多食之，損人肌臟。

《日華子》云：醋，治産後婦人并傷損及金瘡血運，下氣，除煩，破癥結。治婦人心痛，助諸藥力，殺一切魚、肉、菜毒。又云：米醋功用同醋，多食不益男子，損顔色。

禹錫云：按陳藏器云：醋，破血運，除癥塊堅積，消食，殺惡毒，破結氣，心中酸水，痰飲。多食損筋骨。然藥中用之，當取二三年米酢良。蘇云葡萄、大棗皆堪作酢，緣渠是荆楚人，

土地儉嗇，果敗猶取以釀醋，糟醋猶不入藥，況於果乎。

孟詵云：多食損人胃。消諸毒氣，能治婦人産後血氣運。取美清醋煎，稍稍含之即愈。又，人口有瘡，以黄檗皮醋漬，含之愈。又，牛馬疫病，和灌。服諸藥，不可多食。不可與蛤肉同食，相反。又，江外人多爲米醋，北人爲糟醋。發諸藥，不可同食。研青木香服，止卒心痛、血氣等。又，大黄塗蜂蠆，亦取其收而不散也。今人食酸則齒軟，謂其水生木，黄塗腫，米醋飛丹用。

《外臺秘要方》：治轉筋。取故綿以釅醋浸，甑中蒸及熱用，裹病人脚，冷更易，勿停，差止。又方：治風毒腫，白虎病。以三年釅醋五升，熱煎三五沸，切葱白二三升，煮一沸許漉出，布帛熱裹，當病上熨之，差爲度。

《千金方》：治耳聾。以醇酢微火煎附子，削令尖塞耳，效。又方：治霍亂，心腹脹痛，煩滿短氣，未得吐下。飲好苦酒三升，小、老、羸者可飲一二升。

《肘後方》：治癰已有膿當壞。以苦酒和雀屎，傅癰頭上如小豆大，即穿。

《經驗後方》：治汗不溜，瘦却腰脚耳聾。米醋浸京三棱，夏浸四日，冬六日，杵爲末，醋湯調下。

《衍義》曰：醋，酒糟爲之，乞鄰者是此物。然有米醋、麥醋、棗醋。米醋最釅，入藥多用。穀氣全也，故勝糟醋。産婦房中常得醋氣則爲佳，酸益血也。磨雄黄塗蜂蠆，亦取其收而不散也。今人食酸則齒軟，謂其水生木，水氣弱，木氣盛，故如是。造靴皮須得此而紋皺，故知其性收斂，不負酸收之説。

稻米



稻米　味苦。主温中，令人多熱，大便堅。

《圖經》曰：稻米，有杭與粳同稻，有糯稻。舊不載所出州土，今有水田處皆能種之。稬以杭爲粳米，糯爲稻米者，謹按《爾雅》以杭、糯既通爲稻，而《本經》《詩·頌》云：多黍多稌。《禮記·内則》云：牛宜稌。《豳詩》云：十月獲稻。是一物也。《説文解字》云：沛國謂稻爲糯。粳，稌屬也。《字林》云：糯，黏稻也。粳，稻不黏者。今人呼之者，如《字林》所説也。《本經》稱號者，如《説文》所説也。前條有陳廩米，即粳米以廩軍人者是也。入藥最多，稻稈灰亦主病。見劉禹錫《傳信方》云：湖南李從事治馬墜撲損，用稻稈燒灰，用新熟酒未壓者，和糟入鹽和合，淋前灰，取汁，以淋痛處，立差。

陶隱居云：道家方藥有俱用稻米、粳米，此則是兩物矣。云稻米白如霜。又，江東無此，皆通呼粳爲稻爾。不知其色類，復云何也。

陳藏器云：糯米，性微寒，妊身與雜肉食不利子，作糜食一斗，主消渴。久食之，令人身軟。黍米及糯，飼小猫、犬，令脚屈不能行，緩人筋故也。又云：稻穰，主黃病，身作金色，煮汁浸之。又稻穀芒，炒令黃，細研作末，酒服之。

《日華子》云：糯米，凉，無毒。補中益氣，止霍亂。取一合，以水研服，煮粥。稻穰，治蠱毒，濃煎汁服。稻稈，治黃病通身，煮汁服之。

孟詵云：糯米，寒。使人多睡。發風，動氣，不可多食。又，霍亂後吐逆不止，清水研一碗，飲之即止。

蕭炳云：糯米，擁諸經絡氣，使四肢不收，發風昏昏。主痔疾，以駱駝脂作煎餅服之。空腹與服，勿令病人知。

《外臺秘要方》：治渴方：糯米二升，淘取泔，飲訖則定。若不渴，不須。一方：渴者服當飽，研糯米取白汁，恣飲之，以差爲度。

《梅師方》：治霍亂，心悸熱，心煩渴。以糯米水清研之，冷熟水混取米泔汁，任意飲之。

《簡要濟衆方》：治鼻衄不止，服藥不應，獨聖散：糯米微炒黃，爲末。每服二錢，新汲水調下。

《衍義》曰：稻米，今造酒者是此，水田米皆謂稻。前既言粳米，即此稻米，乃糯稻無疑。温，故可以爲酒，酒渴。《内則》云：魚宜菰、梁。按梁之類，消玉未聞。按糜、穈一物，性冷，塞北最多。《廣雅》云：穈也，如黍黑色。稗有二種：一黃白，一紫黑。其紫黑者，芒有毛，北人呼爲烏禾。又云：五穀，燒作灰熬，主惡瘡疥癬，蟲瘦疽瘡毒。塗之，和松脂、雄黃，燒灰更良。作法如甲煎爲之。

孟詵云：穈，益諸不足。山東多食。服丹石人發熱，食之熱消也。發三十六種冷病氣。八穀之中，最爲下苗。黍乃作酒，此乃作飯，用之殊途。不與瓠子同食，令冷病發。發即黍釀汁，飲之，即差。

《外臺秘要方》：治脚氣衝心悶，洗脚漬脚湯：以糜穰一石内釜中，多煮取濃汁，去滓，内椒目一斗，更煎十

穈米



穈米　味甘，無毒。主益氣，補不足。

陶隱居云：穈米亦不識，書多云黍與穈相似。又有稌，亦不知是何米。《詩》云：黍、穈、稻、粱、禾、麻、菽、麥，此即八穀也，俗人莫能證辨，如此穀稼

尚弗能明，而況芝英乎？稌音吐。

丹石❶毒，多食發冷氣，能解苦瓠毒，不可與川附子同服。

禹錫云：按陳藏器云：彫胡，是菰蔣草米，古今所貴。彫胡，性冷，止渴。《内則》云：魚宜菰、梁。按梁，亦粱之類，消玉未聞。按糜、穈一物，性冷，塞北最多。《廣雅》云：穈也，如黍黑色。稗有二種：一黃白，一紫黑。其紫黑者，芒有毛，北人呼爲烏禾。又云：五穀，燒作灰熬，主惡瘡疥癬，蟲瘦疽瘡毒。塗之，和松脂、雄黃，燒灰更良。作法如甲煎爲之。

孟詵云：穈，益諸不足。山東多食。服丹石人發熱，食之熱消也。發三十六種冷病氣。八穀之中，最爲下苗。黍乃作酒，此乃作飯，用之殊途。不與瓠子同食，令冷病發。發即黍釀汁，飲之，即差。

《外臺秘要方》：治脚氣衝心悶，洗脚漬脚湯：以糜穰一石内釜中，多煮取濃汁，去滓，内椒目一斗，更煎十

餘沸，漬脚三兩度，如冷，温漬洗，差。

《衍義》曰：稷米，今謂之穄米，先諸米熟。又其香可愛，故取以供祭祀。然發故疾，只堪爲飯，不黏著，其味淡也。



腐婢

腐婢　味辛，平，無毒。主痎瘧寒熱，邪氣，泄痢，陰不起，止消渴，病酒頭痛。生漢中，即小豆花也。七月採，陰乾。痎，音皆。

《圖經》曰：腐婢，小豆花也。生漢中，今處處有之。陶隱居以爲海邊有小木，狀似梔子，氣作臭腐，土人呼爲腐婢，疑是此。蘇恭云：山南相承，呼以爲葛花是也。今注云：小豆花，亦有腐氣。按《本經》云：主病酒頭痛。海邊小木，自主瘧及心腹痛。葛花不言主酒病。注云：并小豆花末，服方寸匕，飲酒不知醉也。然則三物皆有腐婢名，是異類同名耳。《本經》又，擊銅器於耳傍。此比甚多也。一説赤小豆花，亦主病酒。

禹錫云：按《藥性論》云：赤小豆，花名腐婢。能消酒毒，明目，散氣滿不能食。煮一頓服之。又下水氣，并治小兒丹毒熱腫。

《食醫心鏡》云：主❷癉瘧，寒熱邪氣，泄痢，陰氣不足，止渴及病酒頭痛。以小豆花於豉中煮，五味調和，作羹食之。

《外臺秘要方》：治渴，小便利❸復非淋。小豆藿一把，搗取汁，頓服。

醬　味鹹、酸，冷利。主除熱，止煩滿，殺百藥，熱湯及火毒。

陶隱居云：醬多以豆作，純麥者少。今此當是豆者，亦以久久者彌妙。又有肉醬、魚醬、皆呼爲醢，不入藥用。

《聖惠方》：治飛蛾入耳，醬汁灌入耳即出。又，擊銅器於耳傍。

《千金方》：治指掣痛。以醬清和蜜，任多少，温傅之愈。

《肘後方》：湯火燒灼未成瘡，豆醬汁傅之。

《衍義》曰：醬，聖人以謂不得即不食，意欲五味和、五臟悦而受之。此亦安樂之一❹端也。

陳廩米　味鹹、酸，温，無毒。主下氣，除煩渴，調胃，止泄。

陶隱居云：此今久入倉陳赤者，湯中多用之。人以作醋，勝於新粳米也。

禹錫云：按陳士良云：陳倉米，平胃口，止泄瀉，暖脾，去憊氣，宜作湯食。

《日華子》云：陳倉米，補五臟，澀腸胃。

《食療》云：炊作乾飯食之，止痢。補中益氣，堅筋骨，通血脉，起陽道。又，毒腫惡瘡，久陳者，蒸作飯，和酢封腫上，立差。卒心痛，研取汁服之。北

人炊之，於瓮中水浸令酸，食之暖五臟六腑之氣。

《食醫心鏡》云：除煩熱，下氣，調胃，止泄痢，作飯食之。

《衍義》曰：陳廩米，今《經》與諸家注説，皆不言是粳米，爲復是粟米。然粳、粟二米，陳者性皆冷，頻食之令人自利，與《經》所説稍戾。煎煮亦無膏膩。入藥者，今人多用新粟米。至如舂杵頭細糠，又復不言新、陳、粳、粟，然皆不及新稻、粟，二糠陳，則氣味已腐敗。



罌子粟

罌子粟　味甘，平，無毒。主丹石發動，不下食，和竹瀝煮作粥食之，極美。一名象穀，一名米囊，一名御米。花紅白色，似髇箭頭，中有米，亦名囊子。髇音孝。

《衍義》曰：罌子粟，其子一罌數千萬粒，大小如葶藶子，其色白。隔年種則佳。研子，以水煎，仍加蜜，爲罌粟湯，服石人甚宜飲。

師草實　味甘，平，無毒。主不饑，輕身。出東海洲島，似大麥，秋熟，一名禹餘糧，非石之餘糧也。

《海藥》云：其實如球子，八月收之。彼常食之物。主補虛羸乏損，温腸胃，止嘔逆。久食健人。一名然穀。中國人未曾見也。

寒食飯　主滅瘢痕，有舊瘢及雜瘡，并細研傅之。飯灰，主病後食勞❺。

《外臺秘要》云：治蛟龍瘕，寒食餳三升，每服五合，一日三服，遂吐出蛟龍，有兩頭及尾也。

狼尾草　子作黍食之，令人不饑。似茅，作穗，生潤澤地。《廣志》云：可作黍。《爾雅》云孟狼尾。今人呼爲狼茅子、蒯草子，亦堪食，如粳米，苗似茅。

胡豆子　與鹽煮食之。往往有之。

麥苗　味甘，辛，寒，無毒。主蠱，煮取汁，細絹濾，服之穩，即芒秕也。穩，與本切。

社酒　噴屋四壁去蚊蟲，内小兒口中令速語。此祭祀餘者酒也。

❶石：原作『不』，據晦明軒本改。
❷主：原『主』下有『寒熱泄痢』四字，據晦明軒本删。
❸利：原作『和』，據晦明軒本改。
❹一：原脱，據晦明軒本補。
❺勞：原作『病』，據晦明軒本改。

圖經衍義本草卷之四十

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

菜部上品

冬葵



冬葵子　味甘，寒，無毒。主五臟六腑寒熱，羸瘦，五癃，利小便，療婦人乳難內閉。久服堅骨，長肌肉，輕身延年。生少室山。十二月採之。黃芩爲之使。葵根，味甘，寒，無毒。主惡瘡，療淋，利小便，解蜀椒毒。葉，爲百菜主，其心傷人。

《圖經》曰：冬葵子，生少室山，今處處有。其子是秋種葵，覆養經冬，至春作子者，謂冬葵子，古方入藥用最多。苗葉作菜茹，更甘美。大抵性滑利，能宣導積壅，服丹石人尤相宜。煮汁單飲佳，仍利小腸，孕婦臨產煮葉食，則胎滑易產。暴乾葉將燒灰同作末，主金瘡。根主惡瘡，小兒吞錢，煮汁飲之出。

陶隱居云：以秋種葵，覆養經冬，至春作子，謂之冬葵，多入藥用，至滑利，能下石。春葵子亦滑，不堪餘藥用。根，故是常葵爾。多食。

《日華子》云：冬葵，久服堅筋骨。秋葵即是種早者，俗呼爲葵菜。

禹錫云：按《藥性論》云：冬葵子，臣，滑，平。能治五臟❶及奶腫，能下乳汁。根，治惡瘡，小兒吞錢不出，煮飲之，即出，神妙。若患天行病後食菜葉，以蒜齏啖之，則止。

孟詵云：葵，冷。主疳瘡生身面上，汁黃者。可取根作灰，和猪脂塗之。其性冷，若熱食之，亦令人熱悶，甚動風氣。久服丹石人，時吃一頓佳也。冬月葵菹汁，服丹石人發動，舌乾，咳嗽，每食後飲一盞，便卧少時。女人產其子，患瘡者吞一粒，便作頭。女人產時，可煮頓服之，佳。若生時困悶，以子一合，水二升，煮取半升，去滓，頓服之，少時便產。

《食療》云：主患腫未言❷頭破者，三日後，取葵子一百粒，吞之，當日瘡頭開。又，凡有難產，若生未得者，取一合搗破，以水二升，煮取一升已下，只可半升，去滓頓服之，則小便與兒便出。

《外臺秘要》云：天行斑瘡，須臾遍身，皆戴白漿，此惡毒氣。永徽四年，此瘡自西域東流於海內。但煮葵菜葉，以蒜齏啖之，則止。

《聖惠方》：小兒發斑，散惡毒氣。用生葵菜葉絞取汁，少少與服之。

《千金方》：小兒死腹中。葵子

末，酒服方寸匕。若口噤不開，格口灌之，藥下即活。《肘後方》同。又方：妊娠患淋。葵子一升，水三升，煮取二升，分爲二服。無葵子，用葵根一把。

《肘後方》：大便不通十日至一月。葵子三升，水四升，煮取一升，去滓服。不差更服。又方：治卒關格，大小便不通，脹滿欲死。葵子二升，水四升，煮取一升，頓服。內猪脂如鷄子一丸則彌佳。

《經驗後方》：治一切癰腫無頭。以葵菜子一粒，新汲水吞下，須臾即破。如要兩處破，服兩粒。要破處逐粒加之，驗。

《必效方》：治諸癭。先以泔清溫洗，以綿拭水，取葵菜微火暖，貼之瘡引膿，不過二三百葉，膿頭出肉生。忌諸雜厭及房室等。

《產寶方》：治妬乳及癰。葵莖及子爲末，酒服方寸匕，愈。

《產書方》：治倒生，手足冷，口噤。以葵子炒令黃搗末，酒服二錢匕，則順。

《衍義》曰：冬葵子，葵菜子也，四方皆有。苗性滑利，不益人。患癰癤，毒熱內攻，未出膿者，水吞三五枚，遂作竅，膿出。

蕪菁



蕪菁及蘆菔

味苦，溫，無毒。主利五臟，輕身益氣，可長食之。蕪菁即子，主明目。

《圖經》曰：蕪菁及蘆菔，舊不著所出州土，今南北皆通有之。蕪菁即蔓菁也，蘆菔即下萊菔，今俗呼蘿蔔是也。此二菜，北土種之尤多。蕪菁，四時仍有，春食苗，夏食心，亦謂之苔子，秋食莖，冬食根，河朔尤多種，亦可以備饑歲。菜中之最有益者惟此耳。常食之，通中益氣，令人肥健。菔音蔔。

陶隱居云：蘆菔是今溫菘，其根可食，葉不中啖。蕪菁根乃細於溫菘，而葉似菘，好食。西川惟種此，而其子與溫菘甚相似，小細爾。

陳藏器云：按《本草》：蕪菁，主急黃，黃疸及內黃，腹結不通。搗爲末，水絞汁服，當得嚏，鼻中出黃水及下痢。

孟詵云：蕪菁，消食下氣。其子，九蒸九暴，搗爲粉，服之長生。壓油塗頭，能變蒜髮。皺。又，搗子，水和服，治熱黃，結腹❸不通。少頃當瀉，一切惡物、沙石、草、髮并出。又利大小便。及治妬乳腫，取其根生搗後，和鹽、醋、漿水煮，取汁洗之，五六度差。又搗和鷄子白封之，亦妙。

《食療》云：溫。下氣，治黃疸，利小便。根主消渴，治熱毒風腫。食令人氣脹滿。

《傷寒類要》：神仙教子法：立春後有庚子日，溫蕪菁汁，合家大小并服，不限多少，可理時疾。

崔元亮《海上方》：但瞳子不壞者，療十得九愈。蔓菁子六升，一物蒸之，看氣遍，合甑下，釜中熱湯淋，乃暴令乾，還淋，如是三遍，即取杵篩爲末。食上清酒服二寸匕，日再。塗面膏亦有用者。

《聖惠方》：治風疹入腹，身體强，舌乾燥。便用蔓菁子三兩爲末，每服温酒下一錢匕。

《外臺秘要方》：治心腹脹。蔓菁子一大合，揀净搗熟，研水一升，更和研，濾取汁，可得一盞，頓服之。少頃轉利，或自吐，腹中自寬，或得汗，愈。又方：治瘭疽著手足肩背，累累如米起，色白，刮之汁出，復發熱。蕪菁子熟搗，帛裹傅之，即止。

《千金方》：常服明目，洞視，肥腸。蕪菁子三升，以苦酒三升，煮令熟，日乾，末下篩。以井花水服方寸匕，加至三匕，日三，無所忌。

《肘後方》：治瘡豌豆瘡。蔓菁根搗汁，挑瘡破，傅上，三食頃，即出。

《葛氏方》：卒腫毒起，急痛。蕪菁根大者，削去上皮熟搗，苦酒和如泥，煮三沸，急攪之，出傅腫，帛裹上，日再三易之。

《經驗後方》：治虚勞目暗。採三月蔓菁花，陰乾爲末。以井花水空心調下二錢匕。久服長生。

《集療方》：男子陰腫甚及大核痛，人所不能治者，蕪菁根搗傅之。

《子母秘録方》：治妊娠小便不利。蕪菁子末，水服方寸匕，日二。

《楊氏産乳方》同。

《衍義》曰：蕪菁、蘆菔，二菜也。蕪菁，今世俗謂之蔓菁。蘆菔，即蘿蔔也。蕪菁根食動氣。河東、太原所出極大，他處不及也，又出吐谷中。以井花水服方寸匕，加至三匕，無所忌。根食動氣。河東、太原所出極大，他處不及也，又出吐谷中。

《爾雅》釋：但名蘆菔，後於萊菔條中，不合更言及蘆菔二字，顯見重復。從《爾雅》爲正。

瓜蒂



瓜蒂　味苦，寒，有毒。主大水，身面、四肢浮腫，下水，殺蠱毒，咳逆上氣，及食諸果病在胸腹中，皆吐下之。去鼻中息肉，療黄疸。花❼，主心痛，咳逆。生嵩高平澤。七月採，陰乾。方書所用，多入之，謂之鷄毛菜。食心，正在春時。諸生嵩高平澤，今處處有之，亦園圃所蒔。舊説瓜有青、白二種，入藥當用青瓜蒂，七月採，陰乾。方書所用，多入吹鼻及❽吐膈散中。莖亦主鼻中息肉，齆鼻等。葉主無髮，搗汁塗之即生。心痛，咳逆。肉主煩渴，除熱，多食則動痼疾。又有越瓜，色正白，生越花主心痛，咳逆。肉主煩渴，除熱，多食則動痼疾。又有越瓜，色正白，生越中。胡瓜黄色，亦謂之黄瓜，別無可

用，食之亦不益人，故可略之。

陶隱居云：瓜蒂，多用早青蒂，此云七月採，便是甜瓜蒂也。人亦有用熟瓜蒂者，取吐⑨乃無異，此止於論其蒂所主爾。今瓜例皆冷利，早青者尤甚。熟瓜乃有數種，除瓤食之不害人，若覺多，即入水自漬便即消。

今按⑩：甜瓜有青、白二種，入藥當用青瓜蒂。前條白瓜子，《唐注》云甘瓜子，主腹內結聚，破潰膿血，最爲腸胃脾內壅要藥，正是此甜瓜子之功。前條便以白瓜子爲甘瓜子，非也。

《日華子》云：無毒。治腦塞，熱病，眼昏，吐痰。

禹錫云：按《藥性論》云：瓜蒂，此即甜瓜蒂也。使。莖主鼻中息肉，齆鼻。和小豆、丁香吹鼻，治黃疸。

雷公云：凡使，勿用白瓜蒂，要採取青綠色瓜，待瓜氣足，其瓜蒂自然落在蔓莖上。採得未用時，使榔榔葉裹，於東墻有風處，挂令吹乾用。

《食療》云：瓜蒂，主身面、四肢浮腫，殺蠱，去鼻中息肉，陰黃黃疸及暴急黃。取瓜蒂、丁香各七枚，小豆七粒，爲末，吹黑豆許於鼻中，少時黃水出，差。

《聖惠方》：治鼻中息肉。陳瓜蒂一分爲末，羊脂和少許，傅息肉上，日三。

《經驗方》：治遍身如金色。瓜蒂四十九個，須是六月六日收者，丁香四十九個，用甘鍋子燒烟盡爲度，細研爲末。小兒用半字，吹鼻內及揩牙，大人只用一字，吹鼻內，立差。

《日華子》云：冬瓜，冷，無毒。除煩，治胸膈熱毒癰腫毒及蜂疔。藤燒灰，可出綉點黯，洗黑黈，并洗瘡疥。絞汁服之。

《日華子》云：冬瓜，冷，無毒。除水脹，利小便，止渴。

陶隱居云：被霜後合取，置經年，破取核，水洗，燥，乃擂取人用之。冬瓜性冷利，解毒，消渴，止煩悶，直搗、濕穰，亦可漱練白緘。

禹錫云：按《藥性論》云：冬瓜，益氣耐老，除胸心煩，治胸膈熱毒癰腫毒及蜂疔。藤燒灰，可出綉點黯，洗黑黈，并洗瘡疥。只用一字，吹鼻內，立差。

《聖惠方》：治鼻中息肉。陳瓜蒂一分爲末，羊脂和少許，傅息肉上，日三。

《經驗方》：治遍身如金色。瓜蒂四十九個，須是六月六日收者，丁香四十九個，用甘鍋子燒烟盡爲度，細研爲末。小兒用半字，吹鼻內及揩牙，大人只用一字，吹鼻內，立差。

《日華子》云：冬瓜，冷，無毒。除煩，治胸膈熱毒癰腫毒及蜂疔。藤燒灰，可出綉點黯，洗黑黈，并洗瘡疥。絞汁服之。

《日華子》云：冬瓜，冷，無毒。除水脹，利小便，止渴。

陶隱居云：被霜後合取，置經年，破取核，水洗，燥，乃擂取人用之。冬瓜性冷利，解毒，消渴，止煩悶，直搗、濕穰，亦可漱練白緘。

禹錫云：按《藥性論》云：冬瓜，益氣耐老，除胸心煩，治胸膈熱毒癰腫毒及蜂疔。藤燒灰，可出綉點黯，洗黑黈，并洗瘡疥。只用一字，吹鼻內，立差。

《聖惠方》：治鼻中息肉。陳瓜蒂一分爲末，羊脂和少許，傅息肉上，日三。

《經驗方》：治遍身如金色。瓜蒂四十九個，須是六月六日收者，丁香四十九個，用甘鍋子燒烟盡爲度，細研爲末。小兒用半字，吹鼻內及揩牙，大人只用一字，吹鼻內，立差。

《日華子》云：冬瓜，冷，無毒。除煩，治胸膈熱毒癰腫毒及蜂疔。藤燒灰，可出綉點黯，洗黑黈，并洗瘡疥。絞汁服之。

白冬瓜　味甘，微寒。主除小腹水脹，利小便，止渴。

陶隱居云：被霜後合取，置經年，破取核，水洗，燥，乃擂取人用之。冬瓜性冷利，解毒，消渴，止煩悶，直搗、濕穰，亦可漱練白緘。

禹錫云：按《藥性論》云：冬瓜，益氣耐老，除胸心煩，治胸膈熱毒癰腫毒及蜂疔。藤燒灰，可出綉點黯，洗黑黈，并洗瘡疥。只用一字，吹鼻內，立差。

《聖惠方》：治鼻中息肉。陳瓜蒂一分爲末，羊脂和少許，傅息肉上，日三。

《經驗方》：治遍身如金色。瓜蒂四十九個，須是六月六日收者，丁香四十九個，用甘鍋子燒烟盡爲度，細研爲末。小兒用半字，吹鼻內及揩牙，大人只用一字，吹鼻內，立差。

《日華子》云：冬瓜，冷，無毒。除煩，治胸膈熱毒癰腫毒及蜂疔。藤燒灰，可出綉點黯，洗黑黈，并洗瘡疥。絞汁服之。

《日華子》云：冬瓜，冷，無毒。除

《古今録驗方》：治患痢日久，津液枯竭，四肢浮腫，口乾。冬瓜一枚，黄土泥厚裹五寸，煨令爛熟，去土絞汁服之。

《兵部手集方》：治水病初得危急。冬瓜不限多少，任吃，神效無比。

《衍義》曰：白冬瓜，一二斗許大，冬月收爲菜，壓去汁，蜜煎，代果。患發背及一切癰疽，削一大塊置瘡上，熱則易之，分散熱毒氣甚良。



白瓜

白瓜子　味甘，平、寒，無毒。主令人悦澤，好顔色，益氣不饑。久服輕身耐老。主除煩滿不樂，久服寒中。可作面脂，令面悦澤。一名水芝，一名白爪子。生嵩高平澤。冬瓜人也，八月採。爪，則巧切。

《圖經》曰：白瓜子，即冬瓜人也。生嵩高平澤，今在⑫處有之，皆園圃所蒔。其實生苗蔓下，大者如桶而更長，皮厚而有毛，初生青緑，經霜則白者⑫人家多藏蓄彌年，作菜果。入藥須霜後合取，置之經年，破出核洗，燥乃擂取人用之。亦堪單作服餌。又有末作湯飲，又作面藥，并令人顔色光澤。宗懔《荆楚歲時記》云：七月採瓜犀，以爲面脂。犀，瓣也。瓤亦堪作澡豆。其肉主三焦⑭渴疾，解積熱，利大小腸，壓丹石毒。

《日華子》云：冬瓜人，去皮膚風⑮，黑黯，潤肌膚。

《外臺秘要》云：補肝散，治男子五勞七傷，明目。白瓜子七升，絹袋盛，絞沸湯中，三遍訖，以酢五升，浸一宿，暴乾，搗下篩，酒服方寸匕，日三，久服，差。

《孫真人方》：治多年損傷不差。熬瓜子末，温酒服之。

《衍義》曰：白瓜子實，冬瓜人也，服食中亦稀用。



莧實

莧實　味甘，寒，無毒。主青盲，白翳，明目，除邪，利大小便，去寒熱，殺蛔蟲。久服益氣力，不饑輕身。一名馬莧，一名莫實，細莧亦同。生淮陽川澤及田中，葉如藍，十一月採。

《食療》云：葉，食動氣，令人煩悶，冷中損腹。不可與鱉肉同食，生癥癥。及取鱉甲如豆片大者，以莧菜封裹之，置於土坑内，上以土蓋之，一宿盡變成鱉兒也。又，五月五日採莧菜，

和馬齒莧爲末，等分調，與妊娠服之，易産⑯。

《衍義》曰：莧實，入藥亦稀，苗又謂之人莧，人多食之。莖高而葉紅可淹菜用。紅黄二色者，謂之紅人莧。

胡荽　味辛，温一云微寒，微毒。消穀，治五臟，補不足，利大小腸，通小腸氣，拔四肢熱，止頭痛，療沙瘕，豌豆瘡不出，作酒散⑰之，立出，通心竅。久食令人多忘，發腋臭，脚氣，根發痼疾。子，主小兒禿瘡，油煎傅之。亦主蠱，五痔及食肉中毒下血。煮，冷取汁服。并州人呼爲香荽，入藥炒用。

孫真人云：食之令人多忘，發痼疾，腋臭，蜜齒，口氣臭，金瘡疾。

《食療》云：平。利五臟，補筋脉。主消穀能食。若食多則令人多忘。

《外臺秘要方》：主齒疼。胡菓子五升，應是胡荽子也。以水五升，煮取一升，含之。

《經驗後方》：治小兒癆豆，欲令速出。宜用胡荽二三兩切，以酒二大盞煎令沸沃胡荽，便以物合定，不令泄氣。候冷去滓，微微從項已下噴，一身令遍，除面不噴。

《必效方》：主蠱毒神驗。以根絞汁半升，和酒服之，立下。又治熱氣結滯，經年數發。以半斤，五月五日採，陰乾，水七升，煮取一升半，去滓分服。性冷。本草云温，未解。又，消食，亦未差更服，春夏葉、秋冬根莖并用，亦可預備之。

《兵部手集方》：治孩子赤丹不止，以汁傅之差。《譚氏》方同。

《食醫心鏡方》：主通利腸胃，除消宿食，下氣。

《聖惠方》：治酒醉不醒。用荽子二合，細研，井花水一盞調，爲二服。

《傷寒類要方》：辟温病。荽菜如胸中煩熱，解酒渴。荽菜二斤，煮作羹啜之，止渴。作齏菹食。



菘　味甘，温，無毒。主通利腸胃，除胸中煩，解酒渴。菘，音嵩。

《日華子》云：凉，微毒。多食發皮膚風瘙癢。梗長，葉瘦，高者爲菘，葉闊厚短肥而痹及梗細者，爲蕪菁葉

苦菜　味苦，寒，無毒。主五臟邪氣，厭穀胃痹，腸澼，渴熱中疾，惡瘡。久服安心益氣，聰察，少卧，輕身耐老，耐饑寒，高氣不老。一名荼苦⑲，一名選，一名游冬。生益州川谷，山陵道傍，凌冬不死。三月三日採，陰乾。厭，於叶反，伏也。

陶隱居云：疑此即是今茗。茗一名茶，又令人不眠，亦凌冬不彫，而嫌其止生益州。益州乃有苦菜，正是苦蘵爾。上卷上品白英下已注之。《桐君録》云：苦菜，三月生扶疏，六月華從葉出，莖直黄，八月實黑。實落根復生，冬不枯。蘵音式。

《衍義》曰：苦菜，四方皆有，在北道則冬彫斃，生南方則冬夏常青。此《月令》小滿節後，所謂苦菜秀者是此。葉如苦苣，更狹，其緑色差淡，折之白乳汁出，常常點瘊⑳子，自落。味苦，花與野菊相似，春、夏、秋皆旋開花。去中熱，安心神。

黄蜀葵花　治小便淋及催生。又治諸惡瘡膿水，久不差者，作末，傅之，即愈。近道處處有之。春生苗葉，與蜀葵頗相似，葉尖狹，多刻缺，夏末開花，淺黄色，六七月採之，陰乾用。

《圖經》曰：文具附冬葵條下。

《經驗後方》：治臨産催産。以黄葵花，冷，無毒。治淋瀝，通小腸，催生落胎，療水腫，治一切瘡疥并瘢疵，土靨。花有五色，白者療痎瘧，去邪氣，陰乾末食之。小花者名錦葵，一名荾葵，功用更强。

《圖經》曰：凡葵有數種，有蜀葵，《爾雅》所謂菪，荾葵者是也。菪，古田切。

《爾雅》云：菪，荾葵。釋曰：菪，一名荾葵。郭璞曰：蜀葵也，似葵，華如槿花，戎蜀蓋其所自，因以名之。

孫真人云：食之，狗咬瘡不差。

《千金方》：治横生倒産。末葵花，酒服方寸匕。

《經驗後方》：治癰毒無頭，杵蜀葵末傅之。

《聖惠方》：治婦人白帶下，臍腹冷痛，面色痿黄，日漸虚困。以白葵花一兩，陰乾爲末，空心温酒下二錢匕。如赤帶下，用赤花。

《衍義》曰：文具附黄蜀葵花條下。

甜瓜　寒，有毒。止渴，除煩熱，多食令人陰下濕癢生瘡，動宿冷病，發虛熱，破腹。又令人懈惰弱，脚手無力。少食即止渴，利小便，通三焦間擁塞氣，兼主口舌鼻瘡。黑髮，搗汁塗之，即云：無毒。葉，治人無髮生。禹錫云：按《日華子》

《圖經》曰：文具附瓜蒂條下。

陳藏器序云：甘瓜子，止月經太過，爲末去油，水調服。

《食醫心鏡》云：治熱，去煩渴。取甜瓜去皮，食後吃之，煮皮作羹亦佳。

《孫真人食忌》：患脚氣人勿食甜瓜，其患永不除。又，五月甜瓜沉水者殺人。又，多食發黃疸病，動冷氣，令人虛羸，解藥力。兩蒂者殺人。

《千金方》：治口臭。杵乾甜瓜子作末，蜜和丸，每旦洗淨漱，含一丸如棗核大。亦用傅齒。

《衍義》曰：甜瓜，暑月服之，永不中暑氣，多食未有不下痢者。貧下多食，至深秋作痢爲難治，爲其消損陽氣故也。亦可以如白甜瓜煎漬收。

薺　味甘，温，無毒。主利肝氣，和中。其實，主明目，目痛。

陶隱居云：薺類又多，此是今人可食者，葉作菹羹亦佳。《詩》云：誰謂荼苦，其甘如薺是也。

《日華子》云：薺菜，利五臟。根，煮令熟，和醬、醋食。療目疼。

陳士良云：實，亦呼荝蓉子。主壅，去風毒邪氣，明目，去障翳，解熱毒，久食，視物鮮明。不可多食。

同蒿　味辛，温、平，無毒。似青蒿細軟。主胸膈中臭爛惡邪氣，利腸胃，通血脉，續不足氣。生食微動風氣，作羹食良，不與胡荽同食，令人汗臭氣。

《食醫心鏡》云：治五臟邪氣厭穀者，治脾胃腸澼，大渴熱中，暴疾惡瘡。

邪蒿　味辛，温，平，無毒。主安心氣，養脾胃，消水飲。又動風氣，熏人心，令人氣滿，不可多食。

羅勒　味辛，温，微毒。調中消食，去惡氣，消水氣，宜生食。又療齒根爛瘡，爲灰用甚良。不可過多食，壅病不見物，補五臟不足。其根、葉燒灰，能治赤白痢，極效。

孟詵云：薺子，入治眼方中用。不與麵同食，令人背悶。服丹石人不可食。

《聖惠方》：治暴赤眼，疼痛滲澀。薺菜根汁點目中。

《圖經》曰：此有三種：一種堪作生菜；一種葉大，二十步内聞香；一種似紫蘇葉。

陶隱居云：術家取羊角、馬蹄燒作灰，撒於濕地，遍踏之，即生。俗呼爲西王母菜，食之益人。

《外臺秘要方》云：治面上滅瘢方。木蘭香一斤，以三歲米醋浸令没，百日出暴乾，爲末，以傅之。用醋漿漬，百日出，日乾，末，服方寸匕。

石胡荽　寒，無毒。通鼻氣，利九竅，吐風痰。不任食，亦去翳，熟捼内鼻中，翳自落。俗名鵝不食草。

芥　味辛，温，無毒。歸鼻。主除腎邪氣，利九竅，明耳目，安中，久食温中。

《圖經》曰：芥，舊不著所出州土，今處處有之。似菘而有毛，味極辛辣，此所謂青芥也。芥之種亦多，有紫芥，莖、葉純紫，多作齏者，食之最美；有白芥，子粗大色白，如粱米，此入藥者最佳。

陶隱居云：似菘而有毛，味辣，好作菹，亦生食。其子可藏冬瓜。又有莧，以作菹，甚辣快。

《唐本》注云：此芥有三種：葉大粗者，葉堪食，子入藥用，熨惡疰至良。葉小子細者，葉不堪食，其子但堪爲齏爾。又有白芥，子粗大白色，如白粱米，甚辛美，從戎中來，《别録》云：子主射工及疰氣發無常處，丸服之，或搗爲末，醋和塗之，隨手有驗。

《衍義》曰：芥，萊菔根，即前條所謂蘆菔，今人止謂之蘿蔔，河北甚多，登、萊亦好。服地黄、何首烏人食之，則令人髭髮白。世皆言草木中，惟此下氣速者，爲其辛也。不然如生薑、芥子又辛也，何止能散而已。萊菔辛而又甘，故能散緩而又下氣速也。散氣用生薑，下氣用萊菔。

萊菔根　味辛、甘，温，無毒。散服及炮煮服食，大下氣，消穀，去痰癖，肥健人。生搗汁服，主消渴，試有大效。菔音匐。

《唐本》注云：陶謂温菘是也。其嫩葉作生菜食之。大葉熟啖，消食和中。根效在蕪菁之右。

《爾雅》云：葖，蘆菔。釋曰：紫花菘也。俗呼温菘，似蕪菁，大根，一名葖，俗呼雹葖，一名蘆菔，今謂之蘿蔔是也。

蕭炳云：蘿蔔根，消食，利關節，理顏色，練五臟惡氣，制麵毒。凡人飲食過度，生嚼下之，便消。研如泥制麵，作餺飥佳，飽食亦不發熱。亦主肺嗽吐血。酥煎食，下氣。

《衍義》曰：萊菔根，即前條所謂蘆菔，今人止謂之蘿蔔，河北甚多，登、萊亦好。服地黄、何首烏人食之，則令人髭髮白。世皆言草木中，惟此下氣速者，爲其辛也。不然如生薑、芥子又辛也，何止能散而已。萊菔辛而又甘，故能散緩而又下氣速也。散氣用生薑，下氣用萊菔。

荏子　味辛，温，無毒。主咳逆，下氣，温中，補體。葉，主調中，去臭氣。九月采，陰乾。

陶隱居云：荏狀如蘇大，白色，不

甚香。其子研之，雜米作糜，甚肥美，下氣，補益。東人呼爲菰，以其似蘇字，但除禾邊故也。笮其子作油，用㉑煎之，即今油帛及和漆所用者，服食斷穀亦用之，名爲重油。

胡瓜葉　味苦，平，小毒。主小兒閃癖，一歲服一葉已上，斟酌與之。生挼絞汁服，得吐下。根，搗傅胡刺毒腫。其實味甘，寒，有毒。不可多食，動寒熱，多瘧病，積寒㉒熱，發痓氣，令人虛熱，上逆少氣，發百病及瘡疥，損陰血脉氣，發脚氣。天行後不可食，小兒切忌，滑中，生痔蟲。不與醋同食。北人亦呼爲黄瓜，爲石勒諱，因而不改。

《千金髓》：水病肚脹至四肢腫。胡瓜一個破作兩片，不出子，以醋煮一半，水煮一半，俱爛，空心頓服，須臾下水。

越瓜　味甘，寒。利腸胃，止煩渴。不可多食，動氣，發諸瘡，令人虛弱不能行，不益小兒，天行病後不可食。又不得與牛乳、酪及鮓同餐，及空心食，令人心痛。

禹錫云：按陳藏器云：越瓜，大葵。葉圓似排風而無毛，花白，實若牛李子，生青熟黑，亦似排風子，但堪煮食，不任生啖。其實赤者名赤珠，服之變白令黑，不與葱、薤同食，根亦入藥用，今醫以治發背癰疽成瘡者，其方：龍葵根一兩，剉，麝香一分，研，先搗龍葵根，羅爲末，入麝香，研令匀，塗於瘡上，甚善。

白芥　味辛，温，無毒。主冷氣。色白，甚辛美，從西戎來。子，主射工及痓氣，上氣發汗，胸膈痰冷，面黄。生河東。

《圖經》曰：文具芥條下。

《日華子》云：白芥，能安五臟，功用與芥頗同。子，燒灰服，可辟邪魅。

《千金方》：治反胃，吐食上氣。小芥子日乾爲末，酒服方寸匕。

《肘後方》：治中風，卒不得語。以苦酒煮芥子，傅頸一周，以帛包之，一日一夕乃差。

龍葵　味苦，寒，無毒。食之解勞少睡，去虚熱腫。其子，療疔腫，所在有之。

《圖經》曰：龍葵，舊云所在有之，今近處亦稀，惟北方有之，北人謂之苦葵。葉圓似排風而無毛，花白，實若牛李子，生青熟黑，亦似排風子，但堪煮食，不任生啖。其實赤者名赤珠，服之變白令黑，不與葱、薤同食，根亦入藥用，今醫以治發背癰疽成瘡者，其方：龍葵根一兩，剉，麝香一分，研，先搗龍葵根，羅爲末，入麝香，研令匀，塗於瘡上，甚善。

苦耽　苗、子，味苦，寒，小毒。主傳尸伏連，鬼氣疰忤邪氣，腹内熱結，目黄不下食，大小便澀，骨熱咳嗽，多睡勞乏，嘔逆痰壅，痃癖痞滿。小兒無辜癮子，寒熱，大腹，殺蟲，落胎，去蠱毒。并煮汁服，亦生搗絞汁服，亦研傅小兒閃癖。生故墟垣塹間，高二三尺，子作角，如撮口袋，中有子如珠，熟則赤色。人有骨蒸多服之。關中人謂之洛神珠，一名王母珠，一名皮弁草。又有一種小者，名苦蘵。

苦苣　味苦，平一云寒。除面目及舌下黄，强力不睡。折取莖中白汁，傅疔腫，出根。及㉓取汁滴癰上，立潰。碎莖、葉傅蛇咬。根主赤白痢及骨蒸，并煮服之。今人種爲菜，生食之。久食輕身，少睡，調十二經脉，利五臟，霍亂後胃氣逆煩。生搗汁飲之，雖冷，甚益人。不可同血食一本作蜜，食作痔疾，苦苣即野苣也，野生者，又名褊苣。今人家常食爲白苣。江外、嶺南、吴人無白苣，嘗植野苣，以供厨饌。

《衍義》曰：苦苣，搗汁傅疔瘡，殊驗。青苗陰乾，以備冬月，爲末，水調傅。

苜蓿　味苦，平，無毒。主安中，利人，可久食。

陶隱居云：長安中乃有苜蓿園，北人甚重此，江南人不甚食之，故也。外國復别有苜蓿草，以療目，非此類也。

《唐本》注云：苜蓿莖、葉平，根寒。主熱病，煩滿，目黄赤，小便黄，酒疸。搗取汁，服一升，令人吐，愈。

《日華子》云：凉，去腹臟邪氣，脾胃間熱氣，通小腸。

《衍義》曰：苜蓿，唐·李白詩云：天馬常銜苜蓿花。是此。陝西甚多，飼牛、馬。嫩時，人兼食之，微甘淡，不可多食，利大小腸。有宿根，刈訖又生。

蕨　葉似老蕨，根如紫草。按蕨，味甘，寒，滑。去暴熱，利水道，令人睡，弱陽。小兒食之，脚弱不行。生山間，人作茹食之。四皓食芝而壽，夷、齊食蕨而夭，固非良物。《搜神記》曰：郗鑒鎮丹徒，二月出獵。有甲士折一枝，食之，覺心中淡淡成疾。後吐一小蛇，懸屋前，漸乾成蕨，遂明此物不可生食之。

《食療》云：寒。補五臟不足。氣壅經絡筋骨間，毒氣。令人脚弱不能行。消陽事，令眼暗，鼻中塞，髮落，不可食。又，冷氣人食之，多腹脹。

---

❶臟：晦明軒本作『淋』。
❷言：晦明軒本作『得』。
❸腹：晦明軒本作『實』。
❹即：晦明軒本作『根』。
❺苦：晦明軒本作『枯』。
❻中：晦明軒本作『渾』。
❼花：原作『秘』，據晦明軒本改。
❽及：原作『又』，據晦明軒本改。
❾吐：原作『土』，據晦明軒本改。
❿按：晦明軒本作『注』。
⓫汁：原作『主』，據晦明軒本改。
⓬在：晦明軒本作『處』。
⓭者：晦明軒本作『如』。
⓮焦：晦明軒本作『消』。
⓯剥：原作『則』，據晦明軒本改。
⓰産：原作『差』，據晦明軒本改。
⓱散：晦明軒本作『噴』。
⓲及：晦明軒本作『極』。
⓳苦：晦明軒本作『草』。
⓴瘕：原作『疾』，據晦明軒本改。
㉑用：晦明軒本作『日』。
㉒寒：晦明軒本作『瘀』。
㉓及：晦明軒本作『又』。

圖經衍義本草卷之四十一

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

菜部中品

蓼



蓼實　味辛，温，無毒。主明目，温中，耐風寒，下水氣，面目浮腫，癰瘍。葉，歸舌，除大小腸邪氣，利中益志。馬蓼，去腸中蛭蟲，輕身。生雷澤川澤。

《藥性論》云：蓼實，使，歸鼻。除腎氣，兼能去癥瘕。葉主邪氣。又云：食之多發心痛，令人寒熱，損骨髓。小兒頭瘡，搗末和白蜜一云和鷄子白塗上，蟲出不作瘢。

孟詵云：蓼子，多食令人吐水。亦通五臟擁氣，損陽氣。

《日華子》云：水蓼，性冷，無毒。蛇咬搗傅，根莖并用。又云：赤蓼，暖，暴脚軟人，燒灰淋汁浸，捋以蒸桑葉署，立愈。

《聖惠方》：治肝虚轉筋。用赤蓼莖、葉切作三合，水一盞，酒三合，煎至四合去滓，温分二服。

《外臺秘要方》：治夏月暍死，取濃煮汁三升灌之。

《經驗方》：治脚痛成瘡。先剉水蓼煮湯，令温熱得所，頻頻淋洗，疾瘡乾自安。

《斗門方》：治血氣攻心，痛不可忍。以蓼根細剉，酒浸服之，差。

《古今録驗方》：治霍亂轉筋。取蓼一手把，去兩頭，以水二升半，煮取一升半，頓服之。

《衍義》曰：蓼實，即《神農本經》第十一卷中水蓼之子。彼言蓼則用莖，此言實即用子，故此復論子之功，故分爲二條。春初以葫蘆盛水浸濕，高挂火上，晝夜使暖，遂生紅芽，取爲蔬，以備五辛盤。又一種水紅，與此相類，但苗莖高及丈。取子，微炒，碾爲細末，薄酒調二三錢服，治瘰癧瘡。久則效，效則已也。

葱



樓葱



葱實　味辛，温，無毒。主明目，補中不足。其莖葱白，平，可作湯，主傷寒，寒熱，出汗，中風，面目腫，傷寒

骨肉痛，喉痹不通，安胎，歸目，除肝邪氣，安中，利五臟，益目睛，殺百藥毒。葱根，主傷寒頭痛。葱汁，平，温。主溺血，解藜蘆毒。

《唐本》注云：葱有數種，山葱曰茗葱，療病以胡葱，主諸惡蛓，狐尿刺毒，山溪中沙虱、射工等毒。煮汁浸或搗傅大效，亦兼小蒜、茱萸輩，不獨爲用也。其人間食葱，又有一種，有凍葱，即經冬不死，分莖栽蒔而無子也；又有漢葱，冬即葉枯。食用入藥，凍葱最善，氣❶亦佳之。

《日華子》云：葱，治天行時疾，頭痛，熱狂，通大小腸，霍亂轉筋及賁豚氣，脚氣，心腹痛，目眩及止心迷悶。葱白二十莖，大棗二十枚，以水三升，煎取二升，分服。葱白及鬚，平。通氣，主傷寒頭疼。又，治瘡上有風水，腫疼秘澁。取青葉同乾薑、黄檗相和，煮作湯，浸洗之，立愈。

《孫真人食忌》云：正月勿多食生葱，食之發面上游風。若燒葱和蜜食，殺人。

《外臺秘要方》：治小便淋澁，或有血。取葱白三大握，搗裂汁，投酒少許，炒❸三兩滴入鼻中，差。

《傷寒類要方》：治婦人妊娠七月，若傷寒壯熱，赤斑變爲黑斑，溺血。以葱一把，水三升，煮令熱服之，取汗，食葱令盡。

《楊氏産乳方》：療胎動，五六個月，困篤難較者。葱白一大握，水三升，煎取一升，去滓頓服。又方：療胎動，腰痛搶心，或下血。取葱白不限多少，濃煮汁飲之。

《衍義》曰：葱實，葱初生名葱針，至夏則有花。於秋月植，作高溝壠，旋壅起，以備冬用，曰❹冬葱，其實一也。又有龍角葱，每莖上出歧如角。皮赤者名樓葱，可煎湯漬下部。子皆辛，色黑，有皺紋，作三瓣。此物大抵❺以發散爲功，多食昏人神。

《勝金方》：治鼻衄血。以葱白一握，搗裂汁，投酒少許，炒❸三兩滴入鼻中，差。

《傷寒類要方》：治婦人妊娠七月，若傷寒壯熱，赤斑變爲黑斑，溺血。以葱一把，水三升，煮令熱服之，取汗，食葱令盡。

《楊氏産乳方》：療胎動，五六個月，困篤難較者。葱白一大握，水三升，煎取一升，去滓頓服。又方：療胎動，腰痛搶心，或下血。取葱白不限多少，濃煮汁飲之。

《衍義》曰：葱實，葱初生名葱針，至夏則有花。於秋月植，作高溝壠，旋壅起，以備冬用，曰❹冬葱，其實一也。又有龍角葱，每莖上出歧如角。皮赤者名樓葱，可煎湯漬下部。子皆辛，色黑，有皺紋，作三瓣。此物大抵❺以發散爲功，多食昏人神。

韭　味辛、微酸，温，無毒。歸心，安五臟，除胃中熱，利病人，可久食。子，主夢泄精，溺白。根，主養髮。

韭



《圖經》曰：韭，舊不著所出州土，今處處有之。謹按許慎《說文解字》云：菜名，一種而久者，故謂之韭。故圃人種蒔，一歲而三四割之，其根不傷，至冬壅培之，先春而復生，信乎一種而久者也。在菜中，此物最温而益人，宜常食之。《易稽覽圖》云：政道得則陰物變爲陽。鄭康成注云：若葱變爲韭是也。然則葱冷而韭温，可驗矣。

陶隱居云：韭子入棘刺諸丸，主漏精；用根，入生髮膏；用葉，以煮鯽魚鮓，斷卒下痢多驗。但此菜殊辛臭，雖煮食之，便出猶奇薰灼，不如葱、薤熟即無氣，最是養性所忌也。

《日華子》云：韭，熱，下氣，補虛乏，和腑臟，益陽，止泄精，屎血，暖腰膝，除心腹中痼冷，胸中痹冷，痃癖氣及腹痛等食之。肥白人中風失音，研汁服。心脾骨痛甚，生研服。蛇、犬咬并惡瘡，搗傅。多食昏神暗目，酒後尤忌，不可與蜜同食。又云：子，暖腰膝，治鬼交甚效，入藥炒用。

秦運副云：有人消渴，引飲無度，或令食韭苗，其渴遂止。法要日吃三五兩，或炒或作羹，無入鹽，極效。但吃得十斤即佳，過清明勿吃，入醬無妨。

《聖惠方》：治虛勞腎損，夢中泄精。用韭子二兩，微炒爲散。食前酒下二錢匕。

《外臺秘要方》：治虛勞尿精。新韭子二升，十月霜後採，好酒八合漬一宿。明日日色好，童子向南搗一萬杵。平旦温酒服方寸匕，日再服，立差。

《肘後方》：卧忽不寤，勿以火照之，殺人；但痛嚙拇指甲際而唾其面，則活。取韭搗汁吹鼻孔，冬月用韭根取汁，灌口中。又方：男女夢與人交，精便泄出，此内虛邪氣感發。熬韭子搗末酒漬，稍稍服。

《經驗方》：治五般瘡癬。以韭根炒存性，旋搗末，以猪脂油調傅之，三度差。

《衍義》曰：韭，春食則香，夏食則臭，多食則昏神。子，止精滑甚良。未出糞土爲韭黄，最不益人，食即滯氣。蓋含噎鬱結之氣，故如是。孔子曰不時不食，正爲此輩。花，食之動風。

薤



薤　味辛、苦，温，無毒。主金瘡瘕敗，輕身，不饑耐老，歸於骨。菜芝也。除寒熱，去水氣，温中，散結，利病人。諸瘡中風寒水腫，以塗之。生魯山平澤。

《圖經》曰：薤，生魯山平澤，今處處有之。似韭而葉勝，多白無實。人家種者，有赤、白二種，赤者療瘡生肌，

白者冷補。皆春分蒔之，至冬而葉枯。《爾雅》云：䪥❻與薤同，鴻薈。又云：勤，山䪥。山䪥莖葉亦與家薤相類，而根長，葉差大，僅若鹿葱，體性亦與家薤同，然今少用。薤雖辛而不葷五臟，故道家長餌之，兼補虛，最宜人。凡用葱、薤，皆去青留白，云白冷而青熱也，故斷赤下方，取薤白同黄檗煮服之，言其性冷而解毒也。薈，烏外切。葝，巨盈切。

陶隱居云：葱、薤異物，而今共條。《本經》既無韭，以其同類故也，今亦取爲副品種數。方家多用葱白及葉中涕❼，名葱苒，無復用實者。葱亦有寒熱，白冷，青熱，傷寒湯不得令有青者。能消桂爲水，亦化五石，仙方所用。薤又温補，仙方及服食家皆須之，偏入諸膏用，不可生啖，葷辛爲忌。苒音冉。

《日華子》云：輕身，耐寒，調中，補不足。食之能止久痢冷瀉，肥健人。生食引涕唾。不可與牛肉同食，令人作癥瘕。四月不可食之。

孟詵云：薤，療諸瘡中風水腫，生搗，熱塗上，或煮之。白色者最好。雖有辛不葷五臟。學道人長服之，可通神，安魂魄，益氣，續筋力。

《肘後方》：救死，或先病，或常居寢卧奄忽而絶，皆是中惡。以薤汁鼻中灌。

《葛氏方》：治疥瘡。煮薤葉洗亦佳；搗如泥傅之亦得。又方：誤吞釵。取薤白曝令萎黄，煮使熟，勿切，食一大束，釵即隨出。

《梅師方》：有傷手足而犯❽惡露，殺人，不可治。以薤白爛搗，以帛囊之，著煻火使薤白極熱，去帛，以薤傅瘡，以帛急裹之，冷即易；亦可搗作餅子，以艾灸之，使熱氣入瘡中，水下差。又方：灸瘡腫痛。薤白切一升，猪脂一升細切，以苦酒浸經宿，微火煎三上三下，去滓傅上。

《食醫心鏡方》：主赤白痢下。薤白一握，切，煮作粥食之。又方：治諸瘡敗。能生肌，輕身，不饑，耐老。宜心歸骨，菜芝也。除寒熱，去氣，温中散結氣，利病人。諸瘡中風寒水腫，生杵傅之。

《范汪方》：治目中風腫痛。取薤白截，仍以膚上令❾遍膜，皆差。頭卒痛者，止之。又方：産後諸痢。宜煮薤白食，惟多益好。用肥羊肉去脂，作炙食之；或以羊腎脂炒薤白食，尤佳。

《産乳方》：療疳痢。薤白一握，生搗如泥，以粳米粉一物，蜜調相和，捏作餅，炙熟吃，不過三兩服。

《衍義》曰：薤，葉如金燈葉，差狹而更光。故古人言薤露者，以其光滑難貯之義。《千金》治肺氣喘急，用薤白，亦取其滑泄也。與蜜同搗，塗湯火傷，其效甚速。

蘇　味辛，温。主下氣，除寒中，其子尤良。

《圖經》曰：蘇，紫蘇也。舊不著所出州土，今處處有之。葉下紫色而氣甚香，夏採莖葉，秋採實。其莖并葉，通心經，益脾胃，煮飲尤勝，與橘皮相宜，氣方中多用之。實，主上氣咳逆，研汁煮粥尤佳，長食之，令人肥健。

蘇





若欲宣通風毒，則單用莖，去節大良。謹按《爾雅》云⑩謂蘇爲桂荏。蓋以其味辛而形類荏，乃名之。然而蘇有數種，有水蘇、勺⑪蘇、魚蘇、山魚蘇，皆是荏類。水蘇別條見下。

《藥性論》云：紫蘇子，無毒，主上氣咳逆，治冷氣及腰脚中濕風結氣。和高良薑、橘皮等分，蜜丸，空心下一將子研汁煮粥良，長服令人肥白身香。十丸。下一切宿冷氣及脚濕風。葉可生食，與一切魚肉作羹，良。

陶隱居云：葉下紫色而氣甚香。其無紫色不香似荏者，名野蘇，不堪用。其子主下氣，與橘皮相宜同療。

今⑫注：今俗呼爲紫蘇。

《日華子》云：紫蘇，補中益氣，治心腹脹滿，止霍亂轉筋，開胃下食并一切冷氣，止脚氣，通大小腸。又云：子，主調中，益五臟，下氣，止霍亂，嘔吐，反胃，補虛勞，肥健人，利大小便，破癥結，消五膈，止噦，潤心肺，消痰氣。

《聖惠方》：治風，順氣，利腸。以紫蘇子一升微炒，杵，以生絹袋盛，內於三斗清酒中，浸三宿，少少飲之，差。又方：治脚氣及風寒濕痹⑮，四肢攣急，脚疼不可踐地。用紫蘇二兩，杵碎，水二升，研取汁，以蘇子汁煮粳米二合，作粥，和葱、豉、椒、薑食之，止。

《外臺秘要方》：治夢失精。以子一升，熬杵爲末，酒服方寸匕，日再服。

《斗門方》：治失血。紫蘇不限多少，於大鍋內水煎，令乾後去滓，熬膏，以赤豆炒熟杵爲末，調煎爲丸如梧桐子大。酒下三十丸至五十丸，常服，差。

《金匱方》：治食蟹中毒。紫蘇煮汁飲之三升，以子汁飲之。

《衍義》曰：蘇，紫蘇也，背面皆紫者佳，其味微辛、甘，能散，其氣香。令人朝暮湯其汁飲，爲無益。醫家以謂芳草致豪貴之疾者，此有一焉。脾胃寒人飲之。子，治肺氣喘急。多泄滑，

往往人不覺耳。



水蘇

水蘇　味辛，微温，無毒。主下氣，殺穀，除飲食，辟口臭，去毒，辟惡氣。久服通神明，輕身耐老。主吐血、衄血、血崩。一名勞祖，一名芥苴。生九真池澤。七月採。苴音祖。苴，七余切。

《圖經》曰：水蘇，生九真池澤，今處處有之。多生水岸傍，苗似旋復，兩葉相當，大香馥，青、齊間呼爲水蘇，江左名爲薺蕳，吴、會謂之鷄蘇。南人多以作菜。主諸氣疾及脚腫。江北甚多，而人不取食。又江左人謂鷄蘇、水蘇是兩種。陳藏器謂薺蕳自是一物，非水蘇。水蘇葉有雁齒，香薷氣辛，薺蕳葉上有毛，稍長，氣臭。主冷氣泄痢，可爲生菜。除胃間酸水。

陶隱居云：方藥不用，俗中莫識。九⑯真遼遠，亦無能訪之。

《日華子》云：鷄蘇，暖。治肺痿，崩中，帶下，血痢，頭風目眩，産後中風及血不止。又名臭蘇、青白蘇⑰。

孟詵云：鷄蘇，一名水蘇。熟搗生葉，綿裹塞耳，療聾。又，頭風目眩者，以清酒煮汁一升服。産後中風，服之彌佳。可燒作灰汁及以煮汁，洗頭令髮香，白屑不生。又云：乾釀酒及清⑱酒，常服之佳。

《梅師方》：治吐血及下血并婦人漏下。鷄蘇莖、葉煎取汁，飲之。又方：治鼻衄血不止。以生鷄蘇五合，并香豉二合，合杵研，搓如棗核大，内鼻中，可止。



香薷

香薷　味辛，微温。主霍亂腹痛吐下，散水腫。薷音柔。

《圖經》曰：香薷，舊不著所出州土。陶隱居云：家家有之。今所在皆種，但北土差少，似白蘇而葉更細。十月中採，乾之，一作香菜，俗呼香茸。

《日華子》云：香菜，温。又云：香茸，作煎，除水腫，霍亂轉筋，煮飲服之，無不差者。若四肢煩冷，汗出而渴者，加蓼子同切，煮飲。

陶隱居云：家家有此，惟供生食。

禹錫云：按蕭炳云：今新定、新安有石上者，彼人名石香菜，細而辛，更絶佳。

孟詵云：香菜中食，不可多食。卒轉去熱風。生

筋，可煮汁頓服半升，止。又，乾末止鼻衄，以水服之。

《胡洽方》：治水病洪腫，香菜煎：取乾香菜五十斤，一物剉，內釜中，以水淹之，水出香菜上一寸，煮使氣力都盡，清澄之，嚴火煎，令可丸。一服五丸如梧子大，日漸增之，以小便利好。

《外臺秘要方》：治水病洪腫，氣脹，不消食。乾香薷五十斤焙，用濕者亦得，細剉內釜中，水浸之，出香薷上數寸，煮[19]使氣盡，去滓清澄之，漸微火煎令可丸。服五丸如梧桐子大，日三，稍稍加之，以小便利爲度。

《千金方》：治口臭，香薷一把，以水一斗，煮取三升，稍稍含之。

《肘後方》：舌上忽出血如簪孔者。香薷汁，服一升，日三服。

《食醫心鏡方》：主心煩，去熱。取煎湯作羹煮粥及生食并佳。

《子母秘録方》：治小兒白禿髮不生，汁出，慘痛。濃煮陳香薷汁，少許脂和胡粉，傅上。

《衍義》曰：香薷，生山野，荆湖南、北，二川皆有。兩京作圃種，暑月亦作蔬菜，治霍亂不可闕也，用之無不效。葉如茵蔯，花苣紫，在一邊成穗。凡四五十房爲一穗，如荆芥穗，別是一種香，餘如《經》。



假蘇





假蘇　味辛，温，無毒。主寒熱鼠瘻，瘰癧生瘡，破結聚氣，下瘀血，除濕痹。一名鼠黄，一名薑芥。生漢中川澤，今處處有之。葉似落藜而細，中川澤，初生香辛可啖，人取作生菜。古方稀用。近世醫家治頭風，虚勞，瘡疥，婦人血風等爲要藥。并取花實成穗者，暴乾入藥用，效甚速。

陶隱居云：方藥亦不復用。

《唐本》注云：此藥即菜中荆芥是也，薑、荆聲訛耳。先居草部中，今人食之，録在菜部也。

陳士良云：荆芥，主血勞，風氣壅滿，背脊疼痛，虚汗，理丈夫脚氣，筋骨煩疼及陰陽毒，傷寒頭痛，頭旋眼眩，手足筋急。本草呼爲假蘇，又别。按假蘇葉鋭圓，多野生，以香氣似蘇，故呼爲蘇。

《衍義》曰：假蘇，荆芥也，只用穗。治産後血暈及中風，目帶上，四肢强直。爲末二三錢，童子小便一小盞，調下咽，良久，即活，甚有驗。又治頭目風，荆芥穗、細辛、川芎等爲末，飯後湯點二錢。風瘙遍身，濃煎湯淋漬或坐湯中。

白蘘荷　微温。主中蠱及瘧。

《圖經》曰：白蘘荷，舊不著所出州土，今荆襄、江湖間多種之，北地亦有。春初生葉似甘蕉，根似薑而肥，其根莖堪爲菹。其性好陰，在末下生者尤美。

陶隱居云：今人乃呼赤者爲㉑蘘荷，白者爲覆菹，葉同一種爾。於人食之，赤者爲勝。藥用白者。中蠱者服其汁，并卧其葉，即呼蠱主姓名。亦主諸溪毒、沙虱輩。多食損藥勢，又不利脚。人家種白蘘荷，亦云辟蛇。

《聖惠方》：治風冷失聲，咽喉不利。以蘘荷根二兩，研，絞取汁，酒一大盞，相和令匀，不計時候，温服半錢。

《肘後方》同。

《外臺秘要方》：喉中及口舌生瘡爛。酒漬蘘荷根半日，含漱其汁，差。

《梅師方》：治卒中蠱毒，下血如雞肝，晝夜不絶，臟腑敗壞待死。葉密安病人席下，亦自説之，勿令病人知覺，令病者自呼蠱姓名。

《衍義》曰：白蘘荷，八九月間淹貯之，以備冬月作蔬果，治療只用生者。

薄荷　味辛、苦，温，無毒。主賊風傷寒發汗，頭惡氣，心腹脹滿，霍亂，宿食不消，下氣。煮汁服，亦堪生食。人家種之，飲汁發汗，大解勞乏。

《圖經》曰：薄荷，舊不著所出州土，今處處有之。莖、葉似荏而大㉑長，經冬根不死，夏秋採莖葉，暴乾。古方稀用，或與薤作齏食。近世醫家治傷風，頭腦風，通關格及小兒風涎，爲要切之藥，故人家園庭間多蒔之。又有胡薄荷，與此相類，但味少甘爲别。生江浙間，彼人多以作茶飲之，俗呼新羅薄荷。

《日華子》云：治中風失音，吐痰，除賊風，療心腹脹，下氣，消宿食及頭風等。

禹錫云：按《藥性論》云：薄荷，使。能去憤氣，發毒汗，破血，止痢，通利關節。尤與薤作菹相宜。新病差人勿食，令人虚汗不止。

陳士良云：吴菠薐，能引諸藥入榮衛，療陰陽毒，傷寒頭痛，四季宜食。又云：胡菠薐，主風氣，壅併攻胸膈，作茶服之，立效。俗呼爲新羅菠薐。

《食療》云：平。解勞，與薤相宜。發汗，通利關節。熱。

《外臺秘要方》：治水入耳。以汁點，之，差。

《經驗方》：治蜂螫。挼貼立效。

《食醫心鏡方》：煎豉湯，暖酒和飲、煎茶、生食之并宜。

《衍義》曰：薄荷，世謂之南薄荷，爲有一種龍腦薄荷，故言南以别之。小兒驚風，壯熱，須此引巡㉒，猫食之即醉，物相感爾。治骨蒸勞，用其汁與衆藥熬成膏。

蒸菜　味甘、苦，大寒。主時行壯熱，解風熱毒。蒸音甜。

陶隱居云：即今以作鮓蒸者。恭，作甜音，亦作忝。時行熱病初得，

便搗汁飲皆得除差。

陳藏器云：恭菜，搗絞汁服之，主冷熱痢，又止血生肌。人及禽獸有傷折，傅之立愈。又收取子，以醋浸之，揩面，令潤澤有光。

《日華子》云：甜菜，冷，無毒。炙作熟水飲，開胃，通心膈。

秦荻梨　味辛，温，無毒。主心腹冷脹，下氣，消食。人所啖者，生下濕地，所在有之。

陳藏器云：五辛菜，味辛，温。歲朝食之，助發五臟氣，常食温中，去惡氣，消食，下氣。《荆楚歲時記》亦作此説，熱病不可食之，損目。

禹錫云：按孟詵云：秦荻梨，生於菜中最香美，甚破氣。又，末之和酒服，療卒心痛，悒悒塞滿氣。又，子，末和大醋，封腫氣，日三易。

醍醐菜　雷公云：凡使，勿用諸件。草形似牛皮蔓，掐之有乳汁出，香甜入頂。採得，用苦竹刀細切，入沙盆中研如膏，用生細絹裹，挼取汁出，暖飲。并用每修事去根子。

《千金方》：治傷中崩絶赤。醍醐杵汁，拌酒煎沸，空心服一盞。又方：治月水不利。以葉絞汁，和酒煎，服一盞。

圖經衍義本草卷之四十一

---

❶氣：晦明軒本『氣』下有『味』字。
❷汁：晦明軒本作『器』。
❸炒：晦明軒本作『抄』。
❹曰：原作『口』，據晦明軒本改。
❺抵：原作『底』，據晦明軒本改。
❻鼿：原作『悟』，據晦明軒本改。
❼涕：原作『稊』，據晦明軒本改。
❽犯：原作『狠』，據晦明軒本改。
❾令：原作『冷』，據晦明軒本改。
❿云：晦明軒本無『云』字。
⓫勺：晦明軒本作『白』。
⓬今：原脱，據晦明軒本改。
⓭南齊·褚澄：疑當作『南齊書·褚澄傳』。
⓮久：晦明軒本作『五』。
⓯痹：原作『青』，據晦明軒本改。
⓰九：原作『方』，據晦明軒本改。
⓱蘇：原脱，據晦明軒本補。
⓬清：晦明軒本作『漬』。
⓰煮：原作『者』，據晦明軒本改。
⓴爲：原脱，據晦明軒本補。
㉑大：晦明軒本作『尖』。
㉒巡：晦明軒本作『藥』。

圖經衍義本草卷之四十二

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

菜部下品

苦瓠　味苦，寒，有毒。主大水，面目、四肢浮腫，下水，令人吐。生晋地川澤。

《藥性論》云：瓠瓤，使。治水浮腫，面目肢節腫脹，下大水氣類同輩，而有上下之殊，當是爲其苦爾。今瓠自忽有苦如膽，不可食，非別生一種也。又有瓠瓤，亦是瓠類，小者名瓢，食之乃勝瓠。凡此等，皆利水道，所以在夏月食之，大理自不及冬瓜也。瓤音婁。

《唐本》注云：瓠與冬瓜、瓠瓤全非類例，今此論性，都是瓜❶瓠瓤爾。陶謂瓠中苦者，大誤矣。瓠中苦者，不入藥用。冬瓜自依前説，瓠瓤與瓠，又須辨之。此二物苗葉相似，而實形有異，瓠味皆甜，時有苦者，而似越瓜，長者尺餘，頭尾相似。其瓠瓤，形狀大小非一。瓠，夏中便熟，秋末并枯；瓠瓤，夏末始實，秋中方熟，取其爲器，經霜乃堪。瓠與甜瓠瓤體性相似，但味甘冷，通利水道，止渴消熱，無毒，多食令人吐。苦瓠瓤爲療，一如《經》説，然瓠苦者不堪啖，無所主療，不入方用。

雷公云：味苦有毒。

《經驗方》：主消渴。

《肘後方》：療中蠱毒，吐血或下血，皆如爛肝者。苦瓠一枚，水二升，煮取一升服，立吐即愈。又方：用苦酒一升，煮令消，服，神效。

《傷寒類要方》：治黄疸。苦葫蘆瓤，如大棗許大，以童子小便二合，浸之三兩食頃❷。收兩酸棗許，分内兩鼻中，病人深吸氣，及黄水出，良。

《外臺秘要》云：治卒患腫滿。曾有人忽脚跌，腫漸上至膝，足不可踐地，主大水，頭面遍身大腫脹滿。苦瓠白瓤實，捻如大豆粒，以麵裹，煮一沸，空心服七枚。至午當出水一斗。三日大瘦乃差。三年内慎口味也。苦瓠須好者，無醬醯，細理，妍净者，不爾有毒，不用。

馬齒莧　主目盲，白翳，利大小便，去寒熱，殺諸蟲，止渴，破癥結，癰瘡。又，患脚氣及虚脹，冷氣人不可食之，尤甚。又壓熱，服丹石人方可食，餘人不白。和梳垢封疔瘡。又燒爲灰，和多年醋滓，先炙疔腫以封不可輒食。



馬齒莧

之，即根出。生搗絞汁服，當利下惡物，去白蟲。煎爲膏，塗白禿。又主三十六種風結瘡，以一釜煮，澄清，內蠟三兩，重煎成膏，塗瘡上，亦服之。

《圖經》曰：馬齒莧，舊不著所出州土，今處處有之。雖名莧類，而苗、葉與人莧輩都不相似。又名五行草，以其葉青、梗赤、花黃、根白、子黑也。此有二種，葉大者不堪用，葉小者爲勝，云其節葉間有水銀，每乾之，十斤中得水銀八兩至十兩者。然至難燥，當以木捶搗碎，向日東作架曝之，三兩日即乾，如經年矣。入藥則去莖節，大抵能肥腸，令人不思食耳。

陳藏器云：破痃癖，止消渴。又主馬惡瘡蟲。地猶活。

孟詵云：馬齒莧，又主馬毒瘡，以水煮，令服一升，并塗瘡上。濕癬、白禿，以❸馬齒膏和灰塗，效。治疳痢除一切風，傅杖瘡，良。及煮一碗和鹽、醋等，空腹食之，少時當出盡白蟲矣。

《食療》云：延年益壽，明目。患濕癬，白禿，取馬齒膏塗之。若燒灰傅之，亦良。作膏主三十六種風，可取馬齒一碩，水可二碩，蠟三兩，煎之成膏。亦治疳痢，一切風。又可細切煮粥，止痢，治腹痛。

《聖惠方》：治馬咬，毒入心。馬齒莧湯食之，差。又方：治反花瘡。用一斤燒作灰，細研，猪脂調傅之。

《外臺秘要》：治癮。馬齒菜陰乾燒灰，臘月猪脂和。以暖泔清❹洗瘡，拭乾傅之，三日❺。

《千金方》：治諸腋臭。馬齒草杵，以蜜和作團，紙裹之，以泥泥紙上，厚半寸，日乾，以火燒熟破，取更以少許蜜和，仍令熱，先以生布揩之，以藥夾腋下，令極痛難忍，然後以手巾勒兩臂，即差。

《肘後方》：療豌豆瘡。馬齒草燒灰傅瘡上，根須臾逐藥出。若不出，更傅，良。

《食醫心鏡》云：理脚氣，頭面浮腫，心腹脹滿，小便澀少。馬齒莧和少粳米、醬汁煮食之。又方：小兒血痢。取生馬齒莧絞汁一合，和蜜一匙匕，空心飲之。

《產寶方》：產後血痢，小便不通，臍腹痛。生馬齒菜杵汁三合，煎一沸下蜜一合，攪服。

《衍義》曰：馬齒莧，人多食之，然性寒滑。青黛條中已著。



葫

葫蒜也　味辛，温，有毒。主散癰

腫，蜇瘡，除風邪，殺毒氣。獨子者亦佳。歸五臟。久食傷人，損目明。五月五日採。

《圖經》曰：葫，大蒜也。舊不著所出州土，今處處皆有之，人家園圃所蒔也。每頭六七瓣，初種一瓣，當年便成獨子葫，至明年則復其本矣。然其花中有實，亦葫瓣狀而極小，亦可種之。五月五日採。謹按《本經》云：主散癰腫。李絳《兵部手集方》療毒瘡腫，號叫卧不得，人不別者。取獨頭蒜兩顆，細搗，以油麻和，厚傅瘡上，乾即易之。

陶隱居云：今人謂葫爲大蒜，謂蒜爲小蒜，以其氣類相如也。性最熏臭，不可食。俗人作齏以啖鱠肉，損性伐命，莫此之甚。此物惟生食，不中煮，以合青魚鮓食，令人發黄。取其條上子，初種之，成獨子葫，明年則復其本也。

《日華子》云：蒜，健脾，治腎氣，止霍亂吐瀉，腹痛，除邪，辟瘟，去蠱毒，療勞瘧，冷風，痃癖，瘟疫氣，傅風冷痛，蛇蟲傷，惡瘡疥，溪毒，沙虱，并搗貼之。熟醋浸之，經年者甚良。

孟詵云：蒜，久服損眼傷肝。治蛇咬瘡，取蒜去皮一升，搗，以小便一升，煮三四沸通人，即入漬損處，從朝至暮。初被咬未腫，速嚼蒜封之，六七易。又，蒜一升去皮，以乳二升，煮使出，貼左脚心；右鼻血出，貼右脚心；如兩鼻出，即貼兩脚下，差。血止，急以温水洗脚心。

《衍義》曰：葫，大蒜也，其氣極葷，然置臭肉中，掩臭氣。中暑毒人，爛嚼三兩瓣，以温水送之下咽，即知。仍禁冷水。又患暴下血，以葫五七枚，去梗皮，量多少入豆豉，搗爲膏。可丸，即丸梧子大，以米飲下五六十丸，無不愈者。又鼻衄，爛研一顆，塗兩足心下，纔止便拭去。又將紫皮者，横切作片子，厚一分，初患瘡發於背脊間未辨癰疽者，若陽滯於陰，即爲癰；陰滯於陽，即爲疽。癰即皮光赤，疽則皮肉紋起不澤。并以葫片覆之，用艾灸。如已痛灸至不痛；如不痛，灸至痛初覺，即便灸，無不效者。仍審度正，於痛不止。獨頭蒜摩螫處，痛止。又方：治蛇虺螫人，以獨頭蒜、酸草，擣絞傅所咬處。

《簡要濟衆方》：治鼻血不止，服藥不應。宜用蒜一枚，去皮細研如泥，攤一餅子如錢大，厚一豆許，左鼻血出，貼左脚心；右鼻血出，貼右脚心；如兩鼻出，即貼兩脚下，差。血止，急以温水洗脚心。

《外臺秘要》：治暴痢，搗蒜兩足下心下，纔止便拭去。又將紫皮者，横切作片子，厚一分，初患瘡發於背脊間未辨癰疽者，若陽滯於陰，即爲癰；陰滯於陽，即爲疽。癰即皮光赤，疽則皮肉紋起不澤。并以葫片覆之，用艾灸。如已痛灸至不痛；如不痛，灸至痛初覺，即便灸，無不效者。仍審度正，於

中心貼葫灸之。世人往往不悟此瘡，初見其瘡小，不肯灸，惜哉！



蒜　味辛，温，有小毒。歸脾、腎。主霍亂，腹中不安，消穀，理胃，温中，除邪痹毒氣。五月五日採之。

《圖經》曰：蒜，小蒜也，舊不著所出州土，今處處有之。生田野中，根、苗皆如葫而極細小者是也。五月五日採。謹按《爾雅》：蒿，山蒜。《説文》云：蒜，葷菜也。一云：菜之美者，雲夢之葷。生山中者名蒿。今《本經》謂大蒜爲葫，小蒜爲蒜。而《爾雅》、《説文》所謂蒜、葷菜者，乃今大蒜也；蒿乃今小蒜也。書傳載物之列名不同，如此用藥不可不審也。蒿，力的切。

《日華子》云：小蒜，熱，有毒。下氣，止霍亂吐瀉，消宿食，治蠱毒，傅蛇蟲，沙虱瘡。三月不可食。

孟詵云：小蒜亦主諸蟲毒，疔腫，甚良。不可常食。

《食療》云：主霍亂，心腹脹滿氣，消穀，治胃温中，除邪毒氣。五月五日採者上。又，去諸蟲毒、疔腫、毒瘡。不可常食。

《肘後方》：治霍亂未得吐下。小蒜一升吮咀，以水三升，煮取一升，頓服。

《兵部手集》[8]：治瘧，用蒜不拘多少，研極爛，和黄丹少許，以聚爲度，丸如鷄頭大，候乾。每服一丸，新汲水下，面東服，至妙。

《衍義》曰：蒜，小蒜也。又謂之蒿，苗如葱針，根白，大者如烏芋，子兼根煮食之。又謂之宅蒜，華佗用蒜齏，是此物。

茄子　味甘，寒。久冷人不可多食，損人動氣，發瘡及痼疾。一名落蘇。處處有之。根及枯莖、葉，主凍脚瘡，可煮作湯漬之，良。苦茄，樹小有刺。其子，以醋摩療癰腫。根亦作浴湯。生嶺南。



茄

《食療》云：平。主寒熱，五臟勞。不可多食，動氣，亦發痼疾。熟者少食之，無畏。患冷人不可食，發痼疾。又，根主凍脚瘡，煮湯浸之。

《勝金方》：治搕撲損，肌膚青腫方。茄子留花種通黄極大者，切作片如一指厚，新瓦上焙乾爲末。欲卧酒下，面東服，至妙。調三錢匕，一夜消盡，無痕迹也。

《靈苑方》：治腸風下血，久不止。茄蒂燒存性爲末，每服食前米飲調三錢匕。

《衍義》曰：茄子，新羅國出一種，

淡光微紫色，蒂長，味甘。今其子已遍中國蔬圃中，惟此無益，并無所治，止説損人。後人雖有處治之法，然終與《本經》相失。圃人又植於暖處，厚加糞壤，遂於小滿前後，求貴價以售。既不以時，損人益多，不時不食，烏可忽也。

馬芹子　味甘、辛，温，無毒。主心腹脹滿，下氣，消食。調味用之，香似橘皮，而無苦味。

《唐本》注云：生水澤傍，苗似鬼針、菾菜等，花青白色，子黄黑色，似防風子。唐本先附。

《日華子》云：馬芹，嫩時可食。子治卒心氣痛，炒食令人得睡。

禹錫云：按《蜀本圖經》云：花若芹，子如防風子而扁大。

《爾雅》云：茭，牛蘄。釋曰：似芹，可食菜也。而葉細鋭，一名茭，一名牛蘄，一名馬芹。子入藥用。

孟詵云：和醬食，諸味良。根及葉不堪食。卒心痛，子作末，醋服差。

蕓薹　味辛，温，無毒。主風游丹腫，乳癰。

《日華子》云：蕓薹，凉。治産後血風及瘀血。胡臭人不可食。

《别本》注云：破癥瘕結血。今俗方病人得吃蕓薹，是宜血病。

禹錫云：按孟詵云：若先患腰脚，不可多食，必加極。又，極損陽氣，發口瘡，齒痛。又，能生腹中蟲。

《衍義》曰：蕓薹，不甚香，經冬根不死，辟蠹，於諸菜中，亦不甚佳。

菠薐　冷，微毒。利五臟，通腸胃熱，解酒毒。服丹石人食之佳。北人食肉麵即平，南人食魚鱉水米即冷。不可多食，冷大小腸。久食令人脚弱不能行，發腰痛。不與鱔❾魚同食，發霍亂吐瀉。

劉禹錫《嘉話録》云：菠薐，本西國中有，自彼將其子來，如苜蓿、葡萄，因張騫而至也。本是頗陵國將來，語訛爾，時多不知也。

胡葱　味辛，温中消穀，下氣，殺蟲。久食傷神損性，令人多忘，損目明，尤發痼疾。患胡臭人不可食，令轉甚。其狀似大蒜而小，形圓皮赤，稍長而鋭。生蜀郡山谷。五月、六月採。

《食療》云：胡葱，平。主消穀，能食。久食之令人多忘。根，發痼疾。又，食著諸毒肉，吐血不止，痿黄甚者。取子一升，洗煮使破，取汁停冷。服半升，日一服，夜一服，血定止。又，患胡臭、䘌齒人不可食，轉極甚。謹按：利五臟不足氣，亦傷絶血脉氣，多食損神，此是熏物耳。

蒓　味甘，寒，無毒。主消渴，熱痹。

陶隱居云：蒓，性寒，又云冷，補，下氣，雜鯉魚作羹，亦逐水。而性滑，服食家不可多啖之也。

《唐本》注云：蒓，久食大宜人。合鮒魚爲羹，食之，主胃❿氣弱不下食⓫者，至效。又宜老人，此⓬應在上品中。三四月至七八月，通名絲蒓，味甜，體

軟；霜降已後至十二月，名瑰蒓，味苦，體澀。取以爲羹。

《晉書》云：張翰每臨秋風，思鱸魚蒓羹，以下氣也。

水蓴　味甘，平，無毒。主女子赤沃，止血，養精，保血脉，益氣，令人肥健，嗜食。一名水英。生南海池澤。蓴音芹。

陶隱居云：論蓴主療，合是上品，末解何意，乃在下。其二月、三月作英時，可作⑬菹及熟爚食⑭之。又有渣芹，可爲生菜，亦可生啖，俗中皆作芹字。

《別本》注云：即芹菜也。芹有兩種：荻芹，取根，白色；赤芹，取莖葉，并堪作菹及生菜。味甘，其性大寒，無毒。

《金匱方》：春秋二時，龍帶精入芹菜中。人遇食之爲病，發時手青，肚滿痛不可忍，作蛟龍病。肚硬糖二三升，日二度。吐出如蜥蜴二三，便差。

《子母秘録》：主小兒霍亂，吐痢。芹菜細切，煮熟汁飲，任性多少，得止。

蘩蔞　味酸，平，無毒。主積年惡瘡不愈。五月五日日中採，乾用之。

《圖經》曰：蘩蔞，即鷄腸草也。舊不著所出州土，今南中多生於田野間，近京下濕地，亦或有之。葉似荇菜而小，夏秋間生小白黄花，其莖梗作蔓，斷之有絲縷，又細而中空似鷄腸，因得此名也。《本經》作兩條，而蘇恭謹按《爾雅》：蔜，蔞蔞與縷同。釋曰：蔜，一名蔞蔞，一名鷄腸草，實一物也。今南北所生，或肥瘠不同，又其名多，人不盡見者，往往疑爲二物也。

《唐本》注云：此草即是鷄腸也，俱非正經所出。而一⑮處説異，多生濕地坑渠之側。流俗通謂鷄腸，雅士總名蘩蔞。《爾雅》物重名者，并云一物兩名。

《衍義》曰：蘩蔞，鷄腸草，一物也。鷄腸草，春開小花如緑豆大，莖、葉如園荽，初生則不言性味，故知一也。今雖分之爲二，其鷄腸草條中，獨直，長大即覆地。小户收之爲齏，食之烏髭髮。

鷄腸草　主毒腫，止小便利。

《唐本》注云：此草，即蘩蔞是也，剩出此條，宜除之。

今按鷄腸草，元在草部下品。唐注以爲剩出一條。詳此主療相似，其一物乎？今移附蘩蔞之下。

白苣　味苦，寒，一云平。主補筋骨，利五臟，開胸膈擁氣，通經脉，止脾氣，令人齒白，聰明，少睡。可常食之，患冷氣人食，即腹冷，不至苦損人。産後不可食，令人寒中，小腹痛。

陳藏器云：白苣如萵苣，葉有白毛。

落葵　味酸，寒，無毒。主滑中，散熱。實，主悦澤人面。一名天葵，一名繁露。

陶隱居云：又名承露，人家多種之。葉惟可飪鮓，性冷滑，人食之，惟⑯狗所嚙作瘡者，終身不差。其子紫色，

女人以漬粉傅面爲佳，多少入藥用。

堇　汁味甘，寒，無毒。主馬毒瘡，搗汁洗之并服之。堇，菜也。出《小品方》。

《萬畢方》云：除蛇蝎毒及癰腫。

《唐本》注云：此菜野生，非人所種。俗謂之堇菜，葉似戟，花紫色。唐本先附⑰。

《食療》云：堇菜，味苦。主鼠瘻，瘰癧，生瘡，結核，聚氣，下瘀血。葉主霍亂，與香菜同功。蛇咬，生杵傅之，毒即出矣。又，乾末和油煎成，摩結核上，三五度差。

戟　味辛，微温。主蠼螋溺瘡，多食令人氣喘。戟音戢。蠼音劬。螋音搜。

《圖經》曰：戟菜，味辛，微温。作蔓生，莖紫赤色。葉如蕎麥而肥。山南、江左人好生食之。然不宜多食，令人氣喘乏，虚弱，損陽氣，消精髓，素有脚弱病尤忌之。一啖令人終身不愈。關中謂之菹菜者是也。古今方家亦鮮用之。

《經驗方》：主背瘡熱腫。取汁蓋之，至瘡上開孔以歇熱毒，冷即易之，有生海中。又能解麵熱。

《千金方》：下熱氣。

雍菜　味甘，平，無毒。主解野葛毒，煮食之。亦生搗服之。嶺南種之，蔓生，花白，堪爲菜。云南人先食雍菜，後食野葛，二物相伏，自然無苦。又，取汁滴野葛苗，當時菸死，其相殺如此。張司空云：魏武帝啖野葛至一尺。應是先食此菜也。

苦賈　冷，無毒。治面目黄，强力，止困，傅蛇蟲咬。又，汁傅疔腫，即根出。蠶蛾出時，切不可取拗，令蛾子赤爛。蠶婦亦忌食。野苦賈五六回拗後，味甘滑於家苦賈，甚佳。

《日華子》云：治面目黄。

鹿角菜　大寒，無毒、微毒。下熱風氣，療小兒骨蒸熱勞。丈夫不可久食，發痼疾，損⑱經絡血氣，令人脚冷痹，損腰腎，少顔色。服石人食之，下石力也。出海州，登、萊、沂、密州并

碧蓮　平，微毒。補中下氣，理脾氣，去頭風，利益五臟。冷氣，不可多食，動氣。先患腹冷，食必破腹。莖灰淋汁洗衣，白如玉色。

東風菜　味甘，寒，無毒。主風毒壅熱，頭疼目眩，肝熱眼赤，亦堪入羹臛，煮食甚美。生嶺南平澤。莖高二三尺，葉似杏葉而長，極厚軟，上有細毛。先春而生，故有東風之號。

❶瓜：晦明軒本作『苦』。

❷頃：原作『須』，據晦明軒本改。

❸以：『以』下原衍『馬齒莧又主馬毒瘡，以水煮令服一升，并涂瘡上，濕癬白禿以』二十四字，據晦明軒本删。

❹清：晦明軒本作『漬』。
❺三日：晦明軒本作『日三』。
❻汗：原作『毛』，據晦明軒本改。
❼熱：晦明軒本作『熟』。
❽兵部手集：此四字原脱，據晦明軒本補。
❾鱔：原作『蛆』，據晦明軒本改。
❿主胃：原作『令人』，據晦明軒本改。
⓫食：原脱，據晦明軒本補。
⓬此：原作『只』，據晦明軒本改。
⓭作：原脱，據晦明軒本補。
⓮食：原脱，據晦明軒本補。
⓯一：晦明軒本作『二』。
⓰惟：晦明軒本作『爲』。
⓱附：原作『注』，據晦明軒本改。
⓲損：原作『治』，據晦明軒本改。

（高文鑄、張瑞賢、孫中堂點校）

002 葛仙翁肘後備急方

經名：肘後備急方。原名：肘後救卒方。簡稱：肘後方。晉葛洪撰，梁陶弘景、金楊用道增補。八卷。底本出處：《正統道藏》正乙部。參校本：明萬曆劉自化本，簡稱萬曆本。

目録

卷一

救卒中惡死方第一
救卒尸蹶死方第二
救卒客忤死方第三
治卒得鬼擊方第四
治卒魘寐不寤方第五
治卒中五尸方第六
治尸注鬼注方第七
治卒心痛方第八
治卒腹痛方第九
治心腹俱痛方第十
治卒心腹煩滿方第十一

卷二

治卒霍亂諸急方第十二
治傷寒時氣温病方第十三
治時氣病起諸勞復方第十四
治瘴氣疫癘温毒諸方第十五

卷三

治寒熱諸瘧方第十六
治卒發癲狂病方第十七
治卒得驚邪恍惚方第十八
治卒中風諸急方第十九
治卒風瘖不得語方第二十
治風毒脚弱痹滿上氣方第二十一
治服散卒發動困篤方第二十二
治卒上氣咳嗽方第二十三
治卒身面腫滿方第二十四

卷四

治卒大腹水病方第二十五
治卒心腹癥堅方第二十六
治心腹寒冷食飲積聚結癖方第二十七
治胸膈上痰癊諸方第二十八
治卒患胸痹痛方第二十九
治卒胃反嘔吐方第三十
治卒發黄疸諸黄病方第三十一
治卒患腰脊痛諸方第三十二
治虚損羸瘦不堪勞動方第三十三
治脾胃虚弱不能飲食方第三十四
治卒絶糧失食饑憊欲死方第三十五

卷五

治癰疽妬乳諸毒腫方第三十六
治腸癰肺癰方第三十七
治卒發丹火惡毒瘡方第三十八
治瘕癖疥漆瘡諸惡瘡方第三十九
治卒得癩皮毛變黑方第四十
治卒得蟲鼠諸瘻方第四十一
治卒陰腫痛頹卵方第四十二

卷六

治目赤痛暗昧刺諸病方❶第四十三
治卒耳聾諸病方第四十七❷
治耳爲百蟲雜物所入方第四十八
治卒食噎不下方第四十九
治卒諸雜物鯁不下方第五十
治卒誤吞諸物及患方第五十一
治面疱髮禿身臭心惛鄙醜方第五十二

卷七
治爲熊虎爪牙所傷毒痛方第五十三
治卒爲猘犬所咬毒方第五十四
治卒毒及狐溺棘所毒痛方第五十五
治卒青蛙蝮虺衆蛇所螫方第五十六
治蛇瘡敗蛇骨刺人入口繞身諸方第五十七
治卒入山草禁辟衆蛇藥術方第五十八
治卒蜈蚣蜘蛛所螫方第五十九
治卒蠆螫方第六十
治卒蜂所螫方第六十一
治卒蝎所螫方第六十二
治中蠱毒方第六十三
治卒中溪毒方第六十四
治卒中射工水弩毒方第六十五
治卒中沙虱毒方第六十六
治卒服藥過劑煩悶方第六十七
治卒中諸藥毒救解方第六十八
治食中諸毒方第六十九
治防避飲食諸毒方第七十
治卒飲酒大醉諸病方第七十一
卷八
治百病備急丸散膏諸要方第七十二
治牛馬六畜水穀疫癘諸病方第七十三

葛仙翁肘後備急方目録

❶方：此下各篇序號原無，今據正文順序補。
❷四十七：此上缺四十四、四十五、四十六篇目，疑誤。

葛仙翁肘後備急方序

醫有方古也，古以來著方書者，無慮數十百家，其方殆未可以數計，篇帙浩瀚，苟無良醫師，安所適從？況窮鄉遠地，有病無醫，有方無藥，其不罹夭折者幾希。丹陽葛稚川，夷考古今醫家之説，驗其方簡要易得，針灸分寸易曉，必可以救人於死者，爲《肘後備急方》，使有病者得之，雖無韓伯休，家自有藥；雖無封君達，人可爲醫，其以備急固宜。華陽陶弘景曰：葛之此製，利世實多，但行之既久，不無謬誤，乃著《百一方》，疏於備急之後，訛者正之，缺者補之，附以炮製、服食諸法，纖悉備具，仍區別内、外、他犯爲三條，可不費討尋，開卷見病，其以備急益宜。葛、陶二君，世共知爲有道之士，於學無所不貫，於術無所不通，然猶積年僅成此編。蓋一方一論，已試而後録之，非徒采其簡易而已，人能家置一帙，遇病得方，方必已病。如歷卞和之肆，舉

皆美玉；入伯樂之厩，無非駿足，可以人能起信，易而忽之邪？葛自序云：人可免夭横。意可見矣。自天地大變，此方湮没幾絶，間一存者，閎以自寶，是豈製方本意？連帥烏侯，風多疹疾，宦學之餘，留心於醫藥，前按察河南北道，得此方於平鄉郭氏，郭之婦翁，得諸汴之掖庭，變亂之際，與身存亡，未嘗輕以示人，迨今而出焉，天也。侯命工❶刻之，以趣其成，唯恐病者見方之晚也。雖然方之顯晦，而人之生死休戚係焉，出自有時，而隱痛惻怛，如是其急者，不忍人之心也，有不忍人之心，斯有不忍人之政矣。則侯之仁斯民也，豈直一方書而已乎？方之出，乃吾仁心之發見者也。因以序見命，特書其始末，以告夫未知者。至元丙子季秋穆亭段成己題。

❶工：原作『上』，據萬曆本改。

葛仙翁肘後備急方序

亦名《肘後卒救方》，隱居❶又名《百一方》

抱朴子丹陽葛稚川曰：余既窮覽墳索，以著述餘暇，兼綜術數，省仲景、元化、劉戴秘要、金匱、緑秩、黄素方，近將千卷，患其混雜煩重，有求難得，故周流華夏九州之中，收拾奇異，捃拾不能盡寫，又見周甘唐阮諸家，各作備遺逸，選而集之，便❷種類殊分，緩急易簡，凡爲百卷，名曰《玉函》。然非有力急，既不能窮諸病狀，兼多珍貴之藥，豈貧家野居所能立辦？又使人用針，自非究習醫方，素識明堂流注者，則身中榮衛尚不知其所在，安能用針以治之哉？是使鳥雁摯擊，牛羊搏噬，無以異也。雖有其方，猶不免殘害之疾，余今采其要約，以爲《肘後救卒》三卷，率多易得之藥，其不獲已須買之者，亦皆賤價，草石所在皆有。兼之以灸，灸但言其分寸，不名孔穴，凡人覽之，可了其所用，或不出乎垣籬之内，顧眄可具。苟能信之，庶免横禍焉。世俗苦於貴遠賤近，是古非今，恐見此方，無黄帝、倉公、和、鵲、踰跗之目，不能采用，安可强乎？

❶居：原作『名』，據萬曆本改。
❷便：萬曆本作『使』。

華陽隱居補闕肘後百一方序

太歲庚辰隱居曰：余宅身幽嶺，迄將十載，雖每植德施功，多止一時之設，可以傳方遠裔者，莫過於撰述，見葛氏《肘後救卒》，殊足申一隅之思。故備論證候，使曉然不夫生人所爲大患，莫急於疾。疾而不治，猶救火而不以水也。今輦掖左右，藥師易尋，郊郭之外，已似難值。況窮村迴野，遥山絶浦，其間枉夭，安可勝言？方術之書，卷軸徒煩，拯濟殊寡，欲就披覽，迷惑多端，抱朴此製，實爲深益。然尚闕漏未盡，輒更采集補闕，爲《肘後百凡一百一首，以朱書甄別，爲一方》，於雜病單治，略爲周遍矣。昔應琚爲百一詩，以箴規必行，今余撰此，蓋欲衛輔我躬，且《佛經》云：人用四大成身，一大輒有一百一病。是故深宜自想，上自通人，下達衆庶，莫不各加繕寫，而究括之。余又別撰《效驗方》五卷，具論諸病證，徒❶因藥變通，而并是大治，非窮居所資，若華軒鼎室，亦宜修省耳。葛序云：可以施於貧家野居。然亦不止如是，今搢紳君子，若常處閑佚，乃可披檢方書，或從可庸豎成醫。今所載諸方，皆灼然隔絶，或急速戎陳❸，城柵嚴阻，忽遇疾倉卒，唯拱手相看，曷若探之囊笥，則可用，但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡，形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，并難治之，方法不少，亦載其綱要。云：凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題秘要之説，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事詮詔，今通立定格，共爲成準，凡服藥不言先食者，皆在食前，應食後者，自各言之。凡服湯云三服再服者，要袍山源涯味❻，或疏或數，足令勞❼力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散曰三者，當取旦、中、暮進之。四五服，則一日之中，量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此，而別説用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，即皆是丸散，隨病輕重所須，多少無定，銖兩三種、五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥，宜

❶因藥變通，而并是大治，非窮居所資，若華軒鼎室，亦宜修省耳。葛序云：可以施於貧家野居。然亦不止如是，今搢紳君子，若常處閑佚，乃可披檢方書，或從可庸豎成醫。今所載諸方，皆灼然隔絶，或急速戎陳❸，城柵嚴阻，忽遇疾倉卒，唯拱手相看，曷若探之囊笥，則可用，但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡，形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，并難治之，方法不少，亦載其綱要。云：凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題秘要之説，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事詮詔，今通立定格，共爲成準，凡服藥不言先食者，皆在食前，應食後者，自各言之。凡服湯云三服再服者，要袍山源涯味❻，或疏或數，足令勞❼力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散曰三者，當取旦、中、暮進之。四五服，則一日之中，量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此，而別説用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，即皆是丸散，隨病輕重所須，多少無定，銖兩三種、五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥，宜

❷因藥變通，而并是大治，非窮居所資，若華軒鼎室，亦宜修省耳。葛序云：可以施於貧家野居。然亦不止如是，今搢紳君子，若常處閑佚，乃可披檢方書，或從可庸豎成醫。今所載諸方，皆灼然隔絶，或急速戎陳❸，城柵嚴阻，忽遇疾倉卒，唯拱手相看，曷若探之囊笥，則可用，但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡，形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，并難治之，方法不少，亦載其綱要。云：凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題秘要之説，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事詮詔，今通立定格，共爲成準，凡服藥不言先食者，皆在食前，應食後者，自各言之。凡服湯云三服再服者，要袍山源涯味❻，或疏或數，足令勞❼力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散曰三者，當取旦、中、暮進之。四五服，則一日之中，量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此，而別説用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，即皆是丸散，隨病輕重所須，多少無定，銖兩三種、五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥，宜

❸因藥變通，而并是大治，非窮居所資，若華軒鼎室，亦宜修省耳。葛序云：可以施於貧家野居。然亦不止如是，今搢紳君子，若常處閑佚，乃可披檢方書，或從可庸豎成醫。今所載諸方，皆灼然隔絶，或急速戎陳❸，城柵嚴阻，忽遇疾倉卒，唯拱手相看，曷若探之囊笥，則可用，但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡，形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，并難治之，方法不少，亦載其綱要。云：凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題秘要之説，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事詮詔，今通立定格，共爲成準，凡服藥不言先食者，皆在食前，應食後者，自各言之。凡服湯云三服再服者，要袍山源涯味❻，或疏或數，足令勞❼力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散曰三者，當取旦、中、暮進之。四五服，則一日之中，量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此，而別説用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，即皆是丸散，隨病輕重所須，多少無定，銖兩三種、五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥，宜

❹因藥變通，而并是大治，非窮居所資，若華軒鼎室，亦宜修省耳。葛序云：可以施於貧家野居。然亦不止如是，今搢紳君子，若常處閑佚，乃可披檢方書，或從可庸豎成醫。今所載諸方，皆灼然隔絶，或急速戎陳❸，城柵嚴阻，忽遇疾倉卒，唯拱手相看，曷若探之囊笥，則可用，但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡，形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，并難治之，方法不少，亦載其綱要。云：凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題秘要之説，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事詮詔，今通立定格，共爲成準，凡服藥不言先食者，皆在食前，應食後者，自各言之。凡服湯云三服再服者，要袍山源涯味❻，或疏或數，足令勞❼力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散曰三者，當取旦、中、暮進之。四五服，則一日之中，量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此，而別説用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，即皆是丸散，隨病輕重所須，多少無定，銖兩三種、五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥，宜

❺因藥變通，而并是大治，非窮居所資，若華軒鼎室，亦宜修省耳。葛序云：可以施於貧家野居。然亦不止如是，今搢紳君子，若常處閑佚，乃可披檢方書，或從可庸豎成醫。今所載諸方，皆灼然隔絶，或急速戎陳❸，城柵嚴阻，忽遇疾倉卒，唯拱手相看，曷若探之囊笥，則可用，但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡，形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，并難治之，方法不少，亦載其綱要。云：凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題秘要之説，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事詮詔，今通立定格，共爲成準，凡服藥不言先食者，皆在食前，應食後者，自各言之。凡服湯云三服再服者，要袍山源涯味❻，或疏或數，足令勞❼力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散曰三者，當取旦、中、暮進之。四五服，則一日之中，量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此，而別説用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，即皆是丸散，隨病輕重所須，多少無定，銖兩三種、五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥，宜

❻因藥變通，而并是大治，非窮居所資，若華軒鼎室，亦宜修省耳。葛序云：可以施於貧家野居。然亦不止如是，今搢紳君子，若常處閑佚，乃可披檢方書，或從可庸豎成醫。今所載諸方，皆灼然隔絶，或急速戎陳❸，城柵嚴阻，忽遇疾倉卒，唯拱手相看，曷若探之囊笥，則可用，但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡，形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，并難治之，方法不少，亦載其綱要。云：凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題秘要之説，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事詮詔，今通立定格，共爲成準，凡服藥不言先食者，皆在食前，應食後者，自各言之。凡服湯云三服再服者，要袍山源涯味❻，或疏或數，足令勞❼力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散曰三者，當取旦、中、暮進之。四五服，則一日之中，量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此，而別説用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，即皆是丸散，隨病輕重所須，多少無定，銖兩三種、五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥，宜

❼因藥變通，而并是大治，非窮居所資，若華軒鼎室，亦宜修省耳。葛序云：可以施於貧家野居。然亦不止如是，今搢紳君子，若常處閑佚，乃可披檢方書，或從可庸豎成醫。今所載諸方，皆灼然隔絶，或急速戎陳❸，城柵嚴阻，忽遇疾倉卒，唯拱手相看，曷若探之囊笥，則可用，但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡，形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，并難治之，方法不少，亦載其綱要。云：凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題秘要之説，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事詮詔，今通立定格，共爲成準，凡服藥不言先食者，皆在食前，應食後者，自各言之。凡服湯云三服再服者，要袍山源涯味❻，或疏或數，足令勞❼力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散曰三者，當取旦、中、暮進之。四五服，則一日之中，量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此，而別説用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，即皆是丸散，隨病輕重所須，多少無定，銖兩三種、五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥，宜

❽因藥變通，而并是大治，非窮居所資，若華軒鼎室，亦宜修省耳。葛序云：可以施於貧家野居。然亦不止如是，今搢紳君子，若常處閑佚，乃可披檢方書，或從可庸豎成醫。今所載諸方，皆灼然隔絶，或急速戎陳❸，城柵嚴阻，忽遇疾倉卒，唯拱手相看，曷若探之囊笥，則可用，但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡，形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，并難治之，方法不少，亦載其綱要。云：凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題秘要之説，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事詮詔，今通立定格，共爲成準，凡服藥不言先食者，皆在食前，應食後者，自各言之。凡服湯云三服再服者，要袍山源涯味❻，或疏或數，足令勞❼力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散曰三者，當取旦、中、暮進之。四五服，則一日之中，量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此，而別説用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，即皆是丸散，隨病輕重所須，多少無定，銖兩三種、五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥，宜

❾因藥變通，而并是大治，非窮居所資，若華軒鼎室，亦宜修省耳。葛序云：可以施於貧家野居。然亦不止如是，今搢紳君子，若常處閑佚，乃可披檢方書，或從可庸豎成醫。今所載諸方，皆灼然隔絶，或急速戎陳❸，城柵嚴阻，忽遇疾倉卒，唯拱手相看，曷若探之囊笥，則可用，但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡，形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，并難治之，方法不少，亦載其綱要。云：凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題秘要之説，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事詮詔，今通立定格，共爲成準，凡服藥不言先食者，皆在食前，應食後者，自各言之。凡服湯云三服再服者，要袍山源涯味❻，或疏或數，足令勞❼力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散曰三者，當取旦、中、暮進之。四五服，則一日之中，量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此，而別説用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，即皆是丸散，隨病輕重所須，多少無定，銖兩三種、五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥，宜

❿因藥變通，而并是大治，非窮居所資，若華軒鼎室，亦宜修省耳。葛序云：可以施於貧家野居。然亦不止如是，今搢紳君子，若常處閑佚，乃可披檢方書，或從可庸豎成醫。今所載諸方，皆灼然隔絶，或急速戎陳❸，城柵嚴阻，忽遇疾倉卒，唯拱手相看，曷若探之囊笥，則可用，但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡，形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，并難治之，方法不少，亦載其綱要。云：凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題秘要之説，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事詮詔，今通立定格，共爲成準，凡服藥不言先食者，皆在食前，應食後者，自各言之。凡服湯云三服再服者，要袍山源涯味❻，或疏或數，足令勞❼力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散曰三者，當取旦、中、暮進之。四五服，則一日之中，量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此，而別説用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，即皆是丸散，隨病輕重所須，多少無定，銖兩三種、五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥，宜

多宜少之分兩，非必止於若干分兩。假令日服三方寸匕，須差止，是三五兩藥耳。凡云末之，是搗篩如法。吮咀者，皆細切之。凡云湯煮，取三升，分三服，皆絞去滓，而後酌量也。字，方中用鳥獸屎作矢字，尿作溺字，牡鼠亦作雄字，乾作干字。凡云錢匕者，以大錢上全抄之，若云半錢，則是一錢抄取一邊爾，并用五銖錢也。方寸匕，即用方一寸抄之可也。刀圭准如兩大豆。炮、熬、炙、洗治諸藥，凡用半夏，皆湯洗五六度，去滑。附子、烏頭炮去皮，有生用者，隨方言之。礬石熬令汁盡，椒皆出汗，麥門冬皆去心，丸散用膠皆炙，巴豆皆去心皮熬，有生用者，隨而言之。杏人去尖皮熬，生用者，隨方言之。礬石熬令汁盡，葶藶皆熬，皂莢去皮子，藜蘆、枳殼、甘草皆炙，大棗、支子擘破，巴豆、桃杏人之類，皆別研搗如膏，乃和之。諸角皆屑之，麻黄皆去節。凡湯中用芒硝、阿膠、飴糖，皆絞去滓，内湯中，更微煮令消；紅雪、朴硝等皆狀此而入藥也。用麻黄即去節，先煮三五沸，掠去沫後，乃入餘藥。凡如上諸法，皆已具載在余所撰《本草》上卷中。今之人有此《肘後百一》者，未必得見《本草》，是以復疏方中所用者載之，此事若非留心藥術，不可盡知，則安得使之不僻繆也？案病雖千種，大略只有三條而已，一則府藏經絡因邪生疾，二則四支九竅内外交媾，三則假爲他物横來傷害。此三條者，今各以類而分別之，貴圖倉卒之時，披尋簡易故也。今以内疾爲上卷，外發爲中卷，他犯爲下卷，具列之云：

上卷三十五首治内病。
中卷三十五首治外發病。
下卷三十一首治爲物所苦病。

鹿鳴山續古序

觀夫古方藥品分兩，灸穴分寸不類者，蓋古今人體大小或異，藏府血脉亦有差焉，請以意酌量藥品分兩，古序已明，取所服多少配之，或一分爲兩，或二銖爲兩，以盞當升可也。如中卷末紫丸方，代赭、赤石脂各一兩，巴豆四十，杏仁五十枚，小兒服一麻子，百日者一小豆且多矣。若兩用二銖四粟，巴豆四，杏仁五枚，可療十數小兒，此其類也。灸之分寸，取其人左右中指中節可也。其使有毒狼虎性藥，乃急救性命者也，或遇發毒，急掘地作小坑，以水令滿，熟攪稍澄，飲水自解，名❶爲地漿。特加是説於品題之後爾。

❶徒：萬曆本作『候』，連上讀。
❷門：萬曆本作『闡』。
❸陳：萬曆本作『陣』。
❹齊：萬曆本作『濟』。
❺勞復：原作『復勞』，據文義改。
❻袍山源涯味：萬曆本作『視病源準候』。
❼勞：萬曆本作『勢』。

❶名：原作『石』，據萬曆本改。

附廣肘後方序

昔伊尹著《湯液》之論，周公設醫師之屬，皆所以拯救民疾，俾得以全生而盡年也。然則古之賢臣愛其君以及其民者，蓋非特生者遂之而已。人有疾病，坐視其危苦，而無以救瘳之，亦其心有所不忍也。仰惟國家受天成命，統一四海，主上以仁覆天下，輕稅損役，約法省刑，蠲積負，柔遠服，專務以德養民，故人臣奉承於下，亦莫不以體國愛民爲心，惟政府内外宗公，協同輔翼，以共固天，保無疆之業，其心則又甚焉於斯時也。蓋民罹兵火，獲見太平。邊境寧而盜賊息矣，則人無死於鋒鏑之慮。刑罰清而獄狂空矣，則人無死於桎梏之憂。年穀豐而畜積富矣，則人無死於溝壑之患。其所可虞者，獨民之有疾病夭傷而已。思亦有以救之，其不在於方書矣乎？然方之行於世者多矣，大編廣集，奇藥群品，自名醫貴胄，或不能以兼通而卒具，況可以施於民庶哉？於是行省乃得乾統間所刊《肘後方》善本，即葛洪所謂皆單行徑易，約而已驗，籬陌之間，顧眄皆藥，家有此方，可不用醫者也。其書經陶隱居增修而益完矣，既又得唐慎微《證類本草》，其所附方，皆洽見精取，切於救治，而卷帙尤爲繁重，且方隨藥著，檢用卒難，乃復摘録其方，分以類例，而附於《肘後》隨證之下，目之曰《附廣肘後方》，下監俾更加讎次，且爲之序，而刊行之。方雖簡要而該病則衆，藥多易求而論效則遠，將使家自能醫，人無夭横，以溥濟斯民於仁壽之域。以上廣國家博施愛物之德，其爲利豈小補哉。

林郎汴京國子監博士楊用道謹序。

葛仙翁肘後備急方卷之一

救卒中惡死方第一

救卒死，或先病痛，或常居寢卧，奄忽而絶，皆是中死。救之方：

一方，取葱黄心刺其鼻，男左女右，入七八寸。若使目中血出，佳。扁鵲法同是，後吹耳條中❶，葛當言此云爲之序，而刊行之。又可以筒吹之，并捧其肩上，側身遠之，莫臨死人上。

又方，令二人以衣壅口，吹其兩耳，極則易。又以葱葉刺耳，耳中、鼻中血出者莫怪，無血難治，有血是候。時當捧兩手忽放之，須臾死人自當舉手撈人，言痛乃止，男刺左鼻，女刺右鼻中，令入七八寸餘，大效。亦治自縊死。與此扁鵲方同。

又方，以綿漬好酒中，須臾置死人鼻中，手按令汁入鼻中，并持其手足，莫令驚。

又方，視其上唇裏弦弦者，有白如黍米大，以針決去之。

又方，以小便灌其面，數回即能語。此扁鵲方法。

又方，取皂莢如大豆，吹其兩鼻中，嚏則氣通矣。

又方，灸其唇下宛宛中承漿穴，十壯，大效矣。

又方，割雄鷄頸取血，以塗其面，乾復塗，并以灰營死人一周。

又方，以管吹下部，令數人互吹之，氣通則活。

又方，破白犬以搦心上。無白犬，白鷄亦佳。

又方，取雄鴨就死人口上，斷其頭，以熱血瀝口中，并以竹筒吹其下部，極則易人，氣通下即活。

又方，取牛馬糞尚濕者，絞取汁，灌其口中，令入喉，若口已禁者，以物强發之，若不可强者，乃扣齒下。若無新者，以人溺解乾者，絞取汁。此扁鵲云。

又方，以繩圍其死人肘腕，男左女右，畢，伸繩從背上大槌度以下，又從此灸，横行各半繩，此法三灸各三，即起。

又方，令爪其病人人中，取醒。不者，捲其手灸下紋頭，隨年。

又方，灸鼻人中，三壯也。

又方，灸兩足大指爪甲聚毛中，七壯。一云三七壯。

又方，灸臍中，百壯也。

扁鵲法又云：斷狗尾，取血飲之，并縛狗以枕之，死人須臾活。

又云：半夏末如大豆，吹鼻中。

又方，搗女青❸屑重一錢匕，開口内喉中，以水苦酒，立活。

按：此前救卒死四方并後尸蹶事，并是魏大夫傳中正一真人所説，扁鵲受長桑公子法，尋此傳出世，在葛後二十許年，無容知見，當是斯法久已在世，故或言楚王，或言趙王，兼立語次第，亦參差故也。

又張仲景諸要方，搗薤汁，以灌鼻中。

又方，割丹雄鷄冠血，管吹内鼻中。

又方，以鷄冠及血塗面上，灰圍四邊，立起。

又方，猪脂如鷄子大，苦酒一升，煮沸，以灌喉中。

又方，大豆二七枚，以鷄子白并酒和，盡以吞之。

救卒死而壯熱者，礬石半斤，水一斗半，煮消以漬脚，令没踝。

救卒死而目閉者，騎牛臨面，搗薤汁，灌之耳中，吹皂莢鼻中，立效。

救卒死而張目及舌者，灸手足兩爪後，十四壯了，飲以五毒諸膏散有巴豆者。

救卒死而四支不收，矢便者，馬矢一升，水三斗，煮取二斗以洗之。又取牛洞一升，温酒灌口中。洞者，稀糞也。灸心下一寸，臍上三寸，臍下四寸，各一百壯，差。

若救小兒卒死而吐利，不知是何病者，馬矢一丸，絞取汁以吞之。無濕者，水煮取汁。

又有備急三物丸散及裴公膏，并

在後備急藥條中，救卒死尤良，亦可臨時合用之。凡卒死中惡及尸蹶，皆天地及人身自然陰陽之氣，忽有乖離否隔，上下不通，偏竭所致。故雖涉死境，猶可治而生，緣氣未都竭也，當爾之時，兼有鬼神於其間，故亦可以符術而獲濟者。

附方

扁鵲云：中惡與卒死鬼擊亦相類，已死者，爲治皆參用此方。

搗菖蒲生根，絞汁灌之，立差。尸厥之病，卒死脉猶動，聽其耳中如微語聲，股間暖是也，亦此方治之，立起也。

孫真人治卒死方，以皂角末吹鼻中。

救卒死尸蹶方第二

尸蹶之病，卒死而脉猶動，聽其耳中循循如嘯聲，而股間暖是也。耳中雖然嘯聲而脉動者，故當以尸蹶。救之方：

以管吹其左耳中極三度，活。

又方，搗乾菖蒲，以一棗核大，著其舌下。

又方，灸鼻人中，七壯，又灸陰囊下去下部一寸，百壯。若婦人，灸兩乳中間。又云：爪刺人中良久，又針人中至齒，立起。

此亦全是魏大夫傳中扁鵲法，即趙太子之患。又張仲景云：尸一蹶，脉動而無氣，氣閉不通，故靜然而死也。

以菖蒲屑內鼻兩孔中，吹之。令人以桂屑著舌下。又云扁鵲法，治楚王效。

又方，剔左角髮，方二寸，燒末，以酒灌令入喉，立起也。

又方，以繩圍其臂腕，男左女右，繩從大椎上度，下行脊上，灸繩頭，五十壯，活。此是扁鵲秘法。

又方，熨其兩脅下，取竈中墨如彈丸，漿水和飲之。須臾三四，以管吹耳中，令三四人更互吹之。又，小管吹鼻孔，梁上塵如豆，著中吹之，令入差。

又方，白馬尾二七莖，白馬前脚目一枚，合燒之，以苦酒丸如小豆，開口吞二丸，須臾服一丸。

又方，針百會，當鼻中，入髮際五寸，針入三分，補之。針足大指甲下肉側去甲三分，又針足中指甲上各三分，大指之內去端韭葉。又針手少陰銳骨之端各一分。

又方，灸膻中穴二十八壯。

救卒客忤死方第三

客忤者，中惡之類也，多於道門門外得之，令人心腹絞痛脹滿，氣衝心胸。不即治，亦殺人。救之方：

灸鼻人中三十壯，令切鼻柱下也。以水漬粳米，取汁一二升，飲之。口已禁者，以物强發之。

又方，以繩圍其臂，以銅器若瓦器，貯熱湯，器著腹上。轉冷者，撤去衣，器親肉。大冷者，易以熱湯。取愈則止。

又方，以三重衣著腹上，銅器著衣

上，稍稍少許茅於器中燒之，茅盡益之，勿頓多也，取愈乃止。

又方，以繩橫度其人口，以度其臍去四面各一處，灸各三壯，令四火俱起，差。

又方，橫度口中折之，令上頭著心下，灸下頭五壯。

又方，真丹方寸匕，蜜三合，和服。口噤者，折齒下之。

扁鵲治忤有救卒符并服鹽湯法，恐非庸世所能，故不載。而此病即今人所謂中惡者，與卒死鬼擊亦相類，爲治皆參取而用之已死者。

搗生菖蒲根，絞取汁，含之立差。

卒忤停尸不能言者，桔梗燒二枚，末之，服。

又方，末細辛、桂，分等，內口中。

又方，鷄冠血和真朱，丸如小豆，內口中，與三四枚，差。

若卒口噤不開者，末生附子，置管中，吹內舌下，即差矣。

又方，人血和真朱，丸如梧桐子大二丸，折齒納喉中，令下。

華佗，卒中惡短氣欲死，灸足兩母指上甲後聚毛中，各十四壯，即愈。未差，又灸十四壯。前救卒死方，三七壯，已有其法。

又張仲景諸要方，麻黃四兩，杏人七十枚，甘草一兩，以水八升，煮取三升，分令嚥之，通治諸感忤。

又方，韭根一把，烏梅二十個，茱萸半斤，以水一斗煮之，以病人槲內中三沸，槲浮者生，沉者死。煮得三升，與飲之。

又方，桂一兩，生薑三兩，梔子十四枚，豉五合，搗，以酒三升，攪，微煮之，味出去滓，頓服取差。

飛尸走馬湯：巴豆二枚，杏人二枚，合綿纏，椎令碎，著熱湯二合中，指捻令汁出，便與飲之，炊間頓下飲，差。小量之，通治諸飛尸鬼擊。

又有諸丸散，并在備急藥中。客者客也，忤者犯也，謂客氣犯人也。此蓋惡氣，治之多愈，雖是氣來鬼鬼毒厲之氣，忽逢觸之其衰歇，故不能如自然惡氣治之。入身而侵克藏府經絡，差後猶宜更爲治，以消其餘勢。不爾，亟終爲患，令有時輒發。

附方

《外臺秘要》：治卒客忤停尸不能言，細辛、桂心等分，內口中。

又方，燒桔梗二兩，末，米飲服，仍吞麝香如大豆許，佳。

《廣利方》：治卒中客忤垂死，麝香一錢，重研，和醋二合，服之即差。

治卒得鬼擊方第四

鬼擊之病，得之無漸卒著，如人力❹刺狀，胸脅腹內絞急切痛，不可抑按，或即吐血，或鼻中出血，或下血。一名鬼排。治之方：

灸鼻下人中一壯，立愈。不差，可加數壯。

又方，升麻、獨活、牡桂分等，末，酒服方寸匕，立愈。

又方，灸臍下一寸二壯。

又方，灸臍上一寸七壯，及兩踵白肉際，取差。

又方，熟艾如鴨子大三枚，水五升，煮取二升，頓服之。

又方，鹽一升，水二升，和攪飲之，并以冷水噀之，勿令即得吐，須臾吐，即差。

又方，以粉一撮，著水中攪，飲之。

又方，以淳酒，吹內兩鼻中。

又方，斷白犬一頭，取熱犬血一升，飲之。

又方，割鷄冠血以瀝口中，令一嚥，仍破此鷄以搦心下，冷乃弃之於道邊，得烏鷄彌佗❺妙。

又方，牛子矢一升，酒三升，煮服之。大牛亦可用之。

又方，刀鞘三寸，燒末，水飲之。

又方，燒鼠矢，末服，如黍米，不能飲之，以少水知❻內口中。

又有諸丸散，并在備急藥條中，今巫實見人忽有被鬼神所擺拂者，或犯其行伍，或遇相觸突，或身神散弱，或愆負所貽，輕者因而獲免，重者多見死亡，猶如燕簡輩事，非爲虛也，必應死，亦不可，要自不得不救爾。

附方

《古今録驗》：療妖魅猫鬼病人不肯言鬼方，鹿角屑搗散，以水服方寸匕，即言實也。

治卒魘寐不寤方第五

卧忽不寤，勿以火照，火照之殺人，但痛嚙其踵及足拇指甲際，而多唾其面即活。又治之方：

末皂角，管吹兩鼻中，即起，三四日猶可吹。又，以毛刺鼻孔中，男左女右，展轉進之。

又方，以蘆管吹兩耳，并取病人髮二七莖，作繩納鼻孔中，割雄鷄冠取血，以管吹入咽喉中，大效。

又方，末寵下黄土，管吹入鼻中。

又方，以牛蹄或馬蹄，臨魘人上，末雄黄并桂，吹鼻中，并佳。

又方，取井底泥，塗目畢，令人垂頭於井中，呼其姓名，即便起也。

又方，取韭搗以汁，吹鼻孔。冬月可掘取根，取汁灌於口中。

又方，以鹽湯飲之，多少約在意。

又方，以其人置地，利刀畫地，從肩起，男左女右，令周面以刀鋒刻❼病人鼻，令入一分，急持勿動，其人當鬼神語求哀，乃問：阿誰，何故來？當自乞去，乃以指滅向所畫地，當肩頭數寸，令得去，不可不具詰問之也。

又方，以瓦甑覆病人面上，使人疾打破甑，則寤。

又方，以牛蹄或馬蹄，臨魘人上，亦可治卒死。青牛尤佳。

又方，搗雄黄，細篩，管吹納兩鼻中。桂亦佳。

又方，菖蒲末，吹兩鼻中，又末內舌下。

又方，以甑帶左索縛其肘後，男左女右，用餘稍急絞之，又以麻縛脚，乃詰問其故，約敕解之，令一人坐頭守，一人於户内呼病人姓名，坐人應曰：諾在。便蘇。

卒魘不覺，灸足下大指聚毛中，二十一壯。

人喜魘及惡夢者，取火死灰，著履中，合枕。

又方，帶雄黄，男左女右。

又方，灸兩足大指上聚毛中，灸二十壯。

又方，用真麝香一子，於頭邊。

又方，以虎頭枕尤佳。

辟魘寐方，取雄黄如棗核，繫左腋下，令人終身不魘寐。

又方，真赤鬫方一赤以枕之。

又方，作犀角枕佳，以青木香内枕中，并帶。

又方，驫治卒魘寐久，書此符於紙，燒令惡❽，以少水和之，内死人口中，懸鑒死者耳前打之，喚死者名，不過半日即活。

魘卧寐不寤者，皆魂魄外游，爲邪所執，録欲還未得所，忌火照，火照遂不復入，而有燈光中魘者，是本由明出，但不反身中故耳。

附方

《千金方》：治鬼魘不悟，皂莢末刀圭，起死人。

治卒中五尸方第六

五尸者飛尸、遁尸、風尸、沉尸、尸注也，今所載方兼治之，其狀腹痛脹急，不得氣息，上衝心胸，旁攻兩脅，或磊塊涌起，或攣引腰脊。兼治之方：

灸乳後三寸，十四壯，男左女右，不止，更加壯數，差。

又方，灸心下三寸，六十壯。

又方，灸乳下一寸，隨病左右，多其壯數，即差。

又方，以四指尖其痛處，下灸指下際數壯，令人痛，上爪其鼻人中，又爪其心下一寸，多其壯，取差。

又方，粳米二升，水六升，煮一沸，服之。

又方，猪肪八合，銅器煎小沸，投者，内喉中，搖頓令下，立差。

又方，破鷄子白，頓吞七枚，不可再服。

又方，理當陸根熬，以囊貯，更番熨之，冷復易。雖有五尸之名，其例皆相似，而有小異者。飛尸者，游走皮膚，洞穿鑿血脉，每發不可得近，見尸喪，聞哀哭便作也。風尸者，淫躍四肢，不知痛之所在，每發昏恍，得風雪便作也。沉尸者，纏結藏府，衝心脅，每發絞❾切，遇寒令❿便作也。尸注者，舉身沉重，精神錯雜，常覺昏廢，依節氣改變，輒致大惡。此一條，别有治，後熨也。凡五尸，即身中尸鬼接引也，共爲病害，經術甚有消滅之方，而非世徒能用。今復撰其經要，以救其敝。方：

雄黄一兩，大蒜一兩，令相和似彈丸許，内二合熱酒中服之，須臾差。未差更作，已有疢者，常畜此藥也。

又方，乾薑、桂分等，末之，鹽孔⓫指撮，熬令青，末，合水服之，即差。

又方，搗蔾藜子，蜜丸，服如胡豆二丸，日三。

又方，粳米二升，水六升，煮一沸，服之。

又方，猪肪八合，銅器煎小沸，投苦酒八合，相和，頓服，即差。

又方，掘地作小坎，水滿中，熟攪，取汁服之。

又方，取屋上四角茅，内銅器中，以三赤布覆腹，著器布上，燒茅令熱，隨痛追逐，蹠下癢即差。若瓦屋，削取

藏府，每發刺痛，變作無常也。

四角柱燒之，亦得。極大神良者也。

又方，桂一赤，薑一兩，巴豆三枚，合搗末，苦酒和如泥，以傅尸處，燥即差。

又方，烏臼根，剉二升，煮令濃，去滓，煎汁凡五升，則入水一兩，服五合至一升，良。

又方，忍冬莖葉，剉數斛，煮令濃，取汁煎之，服如鷄子一枚，日二三服，佳也。

又方，燒亂髮、熬杏人等分，搗膏和丸之，酒服桐子大三丸，日五六服。

又方，龍骨三分，藜蘆二分，巴豆一分，搗和，井花水服，如麻子大，如法丸。

又方，漆葉，暴乾搗末，熟煮切食之，令盡。亦用蒜齏。

又方，斷鱉頭，燒末水服，可分爲三度，當如肉者，不盡，後發更作。

又方，雄黃一分，梔子十五枚，芍藥一兩，水三升，煮取一升半，分再服。

又方，梔子二七枚，燒末服。

又方，乾薑、附子各一兩，桂二分，巴豆三十枚，去心，并生用，搗篩，蜜和，搗萬杵，服二丸，如小豆大。此藥無所不治。

又飛尸入腹刺痛死方，凡犀角、射罔、五注丸，并是好藥，別在大方中。治卒有物在皮中，如杯不動搖，掣痛不可堪，過數日即煞人。方：

巴豆十四枚，龍膽一兩，半夏、土瓜子各一兩，桂一斤半，合搗碎，以兩布囊貯，蒸熱，更番以熨之。亦可煮飲少少服之。

此本在雜治中，病名曰陰尸，得者多死。

治尸注鬼注方第七

尸注鬼注病者，葛云即是五尸之中尸注，又挾諸鬼邪爲害也，其病變動，乃有三十六種至九十九種，大略使人寒熱，淋瀝，怳怳默默，不的知其所苦，而無處不惡，累年積月，漸就頓滯，以至於死，死後復傳之旁人，乃至滅門。覺知此候者，便宜急治之，方：

取桑樹白皮曝乾，燒爲灰，得二斗許，著甑中蒸，令氣浹便下，以釜中湯三四斗，淋之又淋，凡三度，極濃止，澄清，取二斗，以漬赤小豆二斗一宿，曝乾，乾復漬灰，汁盡止，乃濕蒸令熟，以羊肉若鹿肉作羹，進此豆飯，初食一升至二升，取飽滿。微者三四斗愈，極者七八斗。病去時，體中自覺疼癢淫淫。或若根本不拔，重爲之，神驗也。

又方，桃人五十枚，破研，以水煮取四升，一服盡當吐，吐病不盡，三兩日更作。若不吐，非注。

又方，杜蘅一兩，莖一兩，人參半兩許，瓠子二七枚，搗末散，平旦温服方寸匕，晚當吐百種物，若不盡，後更服之也。

又方，獺肝一具，陰乾搗末，水服方寸匕，日三。一具未差，更作。姚云神良。

又方，朱砂、雄黃各一兩，鬼臼、罔草各半兩，巴豆四十枚，去心皮，蜈蚣

兩枚，搗，蜜和丸，服如小豆。不得下，服二丸，亦長將行之。姚氏燒髮灰，熬杏人紫色分等，搗如脂，猪脂和，酒服梧桐子大，日三服，差。

又有華佗狸骨散、羊脂丸諸大藥等，并在大方中。及成帝所受淮南丸，并療疰易滅門，女子小兒多注車、注船，心悶亂，頭痛，吐，有此疹者宜辟方。

車前子、車下李根皮、石長生、徐長卿各數兩分等，粗搗作方，囊貯半合，繫衣帶及頭；若注船，下暴慘，以和此共帶之。又臨入船，刻取此船，自燒作屑，以水服之。

附方

《子母秘録》：治尸注，燒亂髮，如鷄子大，爲末，水服之，差。

《食醫心鏡》：主傳尸，鬼氣，咳嗽，痃癖，注氣，血氣不通，日漸羸瘦方，桃人一兩，去皮尖杵碎，以水一升，以鹽一合半煮汁，著米煮粥，空心食之。

治卒心痛方第八

治卒心痛，桃白皮煮汁，宜空腹服之。

又方，桂末，若乾薑末，二藥并可單用，温酒服方寸匕，須臾六七服，差。

又方，驢矢，絞取汁五六合，及熱頓服，立定。

又方，東引桃枝一把，切，以酒一升，煎取半升，頓服，大效。

又方，生油半合，温服，差。

又方，黄連八兩，以水七升，煮取二升，去滓，頓服之。

一升五合，去滓，温服五合，每日三服。

又方，當户以坐，若男子病者，令婦人以一杯⑫水以飲之；若婦人病者，令男子以一杯水以飲之，得新汲水尤佳。又，以蜜一分，水二分飲之，益良也。

又方，敗布裹鹽如彈丸，燒令赤，指按心下宛宛中，取愈。

又方，白艾成熟者三升，以水三升，煮取一升，去滓，頓服之。若爲客氣所中者，當吐之蟲物。

又方，苦酒一杯，鷄子一枚，著中合攪，飲之。好酒亦可用。

又方，取竈下熱灰，篩，去炭分，以布囊貯，令灼灼爾，便更番以熨痛上，冷，更熬熱。

又方，蒸大豆，若煮之，以囊貯，更番熨痛處，冷復易之。

又方，切生薑若乾薑半升，以水二升，煮取一升，去滓，頓服。

又方，炙手中央長指端，三壯。

又方，好桂削去皮，搗篩，温酒服三方寸匕。無桂者，末乾薑，佳。

又方，橫度病人口折之，以度心厭下，灸度頭，三壯。

又方，畫⑬地作五行字，撮中央土，以水一升，攪飲之也。

又方，吴茱萸二升，生薑四兩，豉

一升，酒六升，煮三升半，分三服。

又方，人參、桂心、栀子擘、甘草炙、黄芩各一兩，水六升，煮取二升，分三服，奇效。

又方，桃人七枚，去皮尖，熟研，水合頓服，良。亦可治三十年患。

又方，附子二兩，炮，乾薑一兩，搗蜜丸，服四丸，如梧子大，日三。

又方，吴茱萸一兩半，乾薑、淮上桂心一兩，白术二兩，人參、橘皮、椒去閉口及子汗、甘草炙、黄芩、當歸、桔梗各一兩，附子一兩半炮，搗篩，蜜和爲丸，如梧子大，日三，稍加至十丸十五丸，酒飲下，飯前食後任意，效驗。

又方，桂心八兩，水四升，煮取一升，分三服。

又方，苦參三兩，苦酒升半，煮取八合，分再服，亦可用水。無煮者，生亦可用。

又方，龍膽四兩，酒三升，煮取一升半，頓服。

又方，吴茱萸五合，桂一兩，酒二升半，煎取一升，分二服，效。

又方，吴茱萸二升，生薑四兩，豉一升，酒六升，煮取二升半，分爲三服。

又方，白鷄一頭，治之如⑭食法，水三升，煮取二升，去鷄煎汁，取六合，内苦酒六合，入真珠一錢，復煎取六合，内末麝香如大豆二枚，頓服之。

又方，桂心、當歸各一兩，栀子十四枚，搗爲散，酒服方寸匕，日三五服，亦治久⑮心病發作有時節者也。

又方，桂心二兩，烏頭一兩，搗篩，蜜和爲丸，一服如梧子大三丸，漸加之。

暴得心腹痛如刺方，苦參、龍膽各二兩，升麻、栀子各三兩，苦酒五升，煮取二升，分三服。

治心痺心痛方，蜀椒一兩，熬令黄，末之，以狗心血丸之，如梧子，服五丸，日五服。

治心下堅痛，大如碗，邊如旋盤，名爲氣分，飲水所結方，枳實七枚炙，术三兩，水一斗，煮取三升，分爲三服，當稍軟也。

若心下百結積來去痛者方，吴茱萸末一升，真射罔如彈丸一枚，合搗，以鷄子白和丸，丸如小豆大，服二丸，即差。

治久患常痛不能飲食，頭中疼重及左右一寸，并百壯。又與物度頸及射罔、吴茱萸分等，搗末，蜜和丸，如麻子，服二丸，日三服，勿吃熱食。

又方，灸心鳩尾下一寸，名巨闕，度脊如之，令正相對也，凡灸六處。

治久患常痛不能飲食，頭中疼重方，烏頭六分，乾薑四分，搗末，蜜丸，酒飲服，如大豆四丸，稍加入⑯方，附子一分，搗末，苦酒二分，人參三分，細辛五分，乾薑三兩，枳實五枚，水五升，煮取三升，分三服。亦可加术二兩，膠飴半斤。

治心肺傷動冷痛方，桂心二兩，猪腎二枚，水八升，煮取二升，分三服。

治心痛多唾，似有蟲方，取六畜心，生切作十四臠，刀縱橫各割之，以真丹一兩，粉肉割中，旦⑰悉吞之，入雄黃、射香佳。

饑而心痛者，名曰饑疝，龍膽、附子、黃連分等，搗篩，服一錢匕，日三度服之。

附方

《藥性論》：主心痛，中惡，或連腰臍者。

鹽如鷄子大，青布裹，燒赤，内酒中，頓服，當吐惡物。

《拾遺·序》：延胡索止心痛，末之，酒服。

《聖惠方》：治久心痛，時發不定，多吐清水，不下飲食，以雄黃二兩，好醋二升，慢火煎成膏，用乾蒸餅丸，如梧桐子大，每服七丸，熱酒下。

又方，治九種心痛妨悶，用桂心一分，爲末，以酒一大盞，煎至半盞，去滓，稍熱服，立效。

又方，治寒疝心痛，四肢逆冷，全不飲食，用桂心二兩，爲散，不計時候，熱酒調下一錢匕。

《外臺秘要》：治卒心痛，乾薑爲末，水飲調下一錢。

又方，治心痛，當歸爲末，酒服方寸匕。

又《必效》：治蜎心痛，熊膽如大豆，和水服，大效。

又方，取鰻鱺魚，淡炙令熟，與患人食一二枚，永差，飽食彌佳。

《經驗方》：治四十年心痛不差，黍米淘汁，温服，隨多少。

《經驗後方》：治心痛，薑黄一兩，桂穰三兩，爲末，醋湯下一錢匕。

《簡要濟衆》：治九種心痛及腹脅積聚滯氣，筒子乾漆二兩，搗碎，炒烟出，細研，醋煮麵糊和丸，如梧桐子大，每服五丸至七丸，熱酒下，醋湯亦得，無時服。

《姚和衆》：治卒心痛，郁李人三七枚，爛嚼，以新汲水下之，飲温湯尤妙，須臾痛止，却煎薄鹽湯熱呷之。

《兵部手集》：治心痛不可忍十年五年者，隨手效。以小蒜醯醋煮，頓服之，取飽，不用著鹽。

治卒腹痛方第九

治卒腹痛方，書舌上作風字，又畫紙上作兩蜈蚣相交，吞之。

又方，治心痛，搗桂末，服三寸匕。苦酒，人參，上好乾薑，亦佳。

又方，粳米二升，以水六升，煮二七沸，飲之。

又方，食鹽一大把，多飲水送之，忽當吐，即差。

又方，掘土作小坎，水滿坎中，熟攪取汁，飲之。

又方，令人騎其腹，溺臍中。

又方，米粉一升，水二升，和飲。

又方，使病人伏卧，一人跨上，兩手抄舉其腹，令病人自縱重輕舉抄之，令去床三尺許，便放之，如此二七度，止拈取其脊骨，皮深取痛引之，從龜尾至頂乃止，未愈更爲之。

又方，令卧枕高一尺許，拄膝使腹皮踧氣入胸，令人抓其臍上三寸便愈，

能乾嚥吞氣數十遍者彌佳。此方亦治心痛，此即伏氣。

治卒得諸疝，小腹及陰中相引，痛如絞，自汗出，欲死方，搗沙參末，篩，服方寸匕，立差。

此本在雜治中謂之寒疝，亦名陰疝，此治不差，可服諸利丸下之，作走馬湯亦佳。

治寒疝腹痛，飲食下唯不覺其流行方，椒二合，乾薑四兩，水四升，煮取二升，去滓，內飴一斤，又煎取半分，再服，數數服之。

又方，半夏一升，桂八兩，生薑一升，水六升，煮取二升，分爲二服。

治寒疝來去，每發絞痛方，吳茱萸三兩，生薑四兩，豉二合，酒四升，煮取二升，分爲二服。

又方，附子一枚，椒二百粒，乾薑半兩，半夏十枚，大棗三十枚，粳米一升，水七升，煮米熟，去滓，一服一升，令盡。

又方，肉桂一斤，吳茱萸半升，水五升，煮取一升半，分再服。

又方，牡蠣、甘草、桂各二兩，水五升，煮取一升半，再服。

又方，宿烏鷄一頭，治如食法，生地黃七斤，合細剉之，著甑蔽中蒸，銅器承，須取汁，清旦服，至日晡令盡，其間當下諸寒癖訖，作白粥漸食之。久疝者，下三劑。

附方

《博濟方》：治冷熱氣不和，不思飲食，或腹痛疠刺，山梔子、川烏頭等分，生搗爲末，以酒糊丸，如梧桐子大，每服十五丸，炒生薑湯下。如小腸氣痛，炒茴香、葱、酒任下二十丸。

《經驗方》：治元藏氣發久冷，腹痛虛瀉。

應急大效玉粉丹：生硫黃五兩，青鹽一兩，已上衮細研，以蒸餅爲丸，如緑豆大，每服五丸，熱酒空心服，以食壓之。

《子母秘録》：治小腹疼青黑，或亦不能喘，苦參一兩，醋一升半，煎八合，分二服。

《聖惠方》：治寒疝，小腹及陰中相引痛，自汗出，以丹參一兩，杵爲散，每服熱酒調下二錢匕，佳。

治心腹俱痛方第十

治心腹俱脹痛，短氣欲死，或已絶方，取梔子十四枚，豉七合，以水二升，先煮豉，取一升二合，絞去滓，內梔子，更煎取八合，又絞去滓，服半升，不愈者，盡服之。

又方，浣小衣，飲其汁一二升，即愈。

又方，桂二兩，切，以水一升二合，煮取八合，去滓，頓服。無桂者，著乾薑亦佳。

又方，烏梅二七枚，以水五升，煮一沸，內大錢二七枚，煮得二升半，强人可頓服，羸人可分爲再服，當下便愈。

又方，茱萸二兩，生薑四兩，豉三合，酒四升，煮取二升，分爲三服，即差。

又方，乾薑一兩，巴豆二兩，搗，蜜

丸，一服如小豆二丸，當吐下，差。

治心腹相連常脹痛方，狼毒二兩，附子半兩，搗篩，蜜丸如梧子大，日一服一丸，二日二丸，三日後服三丸，再一丸，至六日，服三丸，自一至三以常服，即差。

又方，吴茱萸一合，乾薑四分，附子、細辛、人參各二分，搗篩，蜜丸如梧子大，服五丸，日三服。

凡心腹痛，若非中惡、霍亂，則是皆宿結冷熱所爲，今此方可采以救急，差後，要作諸大治，以消其根源也。

附方

《梅師方》：治心腹脹堅痛悶不安，雖未吐下欲死，以鹽五合，水一升，煎令消，頓服，自吐下食出即定，不吐更服。

孫真人方：治心腹俱痛，以布裹椒薄注上火熨，令椒汗出，良。

《十全方》：心脾痛，以高良薑細剉，炒，杵末，米飲調下一錢匕，立止。

治卒心腹煩滿方第十一

治卒心腹煩滿，又胸脅痛欲死方，以熱湯令灼灼爾，漬手足，復易。秘方。

又方，青布方寸，鹿角三分，亂髮灰二錢匕，以水二升，煮令得一升五合，去滓，盡服之。

又方，剉薏苡根，濃煮取汁，服三升。

又方，取比輪錢二十枚，水五升，煮取三沸，日三服。

又方，搗香菜汁，服一二升。水煮乾薑亦佳。

又方，即用前心痛梔子豉湯法，差。

又方，黄芩一兩，杏人二十枚，牡蠣一兩，水三升，煮取一升，頓服。

治厥逆煩滿常欲嘔方，小草、桂、細辛、乾薑、椒各二兩，附子二兩炮，搗，蜜和丸，服如桐子大四丸。

治卒吐逆方，灸乳下一寸，七壯即愈。

又方，灸兩手大拇指内邊爪後第一紋頭各一壯。又，灸兩手中央長指爪下一壯，愈。

此本雜治中，其病亦是痰壅霍亂之例，兼宜依霍亂條法治之，人卒在此上條，患者亦少，皆因他病兼之耳，或從傷寒未復，或從霍亂吐下後虚燥，或是勞損服諸補藥痞滿，或觸寒熱邪氣，或食飲協毒，或服藥失度，并宜各循其本源爲治，不得專用此法也。

附方

《千金方》：治心腹脹短氣，以草豆蔻一兩，去皮，爲末，以木瓜生薑湯下半錢。

《斗門方》：治男子女人久患氣脹心悶，飲食不得，因食不調，冷熱相擊，致令心腹脹滿方，厚朴，火上炙令乾，又蘸薑汁炙，直待焦黑爲度，搗篩如麵，以陳米飲調下二錢匕，日三服，良。亦治反胃，止瀉，甚妙。

《經驗方》：治食氣遍身黄腫，氣喘，食不得，心胸滿悶。

不蛀皂角，去皮子，塗好醋炙令焦，爲末，一錢匕，巴豆七枚，去油膜，二件以淡醋及研好墨爲丸，如麻子大，每服三丸，食後陳橘皮湯下，日三服，隔一日增一丸，以利爲度。如常服，消酒食。

《梅師方》：治腹滿不能服藥，煨生薑，綿裹，內下部中，冷即易之。

《聖惠方》：治肺藏壅熱煩悶，新百合四兩，蜜半盞，和蒸令軟，時時含一棗大，嚥津。

葛仙翁肘後備急方卷之一

---

❶中：原作『申』，據萬曆本改。
❷華他：萬曆本作『華佗』，下文同此。
❸青：原作『背』，據萬曆本改。
❹力：萬曆本作『刀』。
❺佗：萬曆本作『佳』。
❻知：萬曆本作『和』。
❼刻：萬曆本作『刺』。
❽惡：萬曆本作『黑』。
❾絞：原作『級』，據萬曆本改。
❿令：萬曆本作『冷』。
⓫孔：萬曆本作『三』。
⓬杯：原作『怀』，據萬曆本改。
⓭盡：萬曆本作『晝』。
⓮如：原作『加』，據萬曆本改。
⓯久：原作『又』，據萬曆本改。
⓰入：萬曆本作『又』。
⓱旦：原作『二』，據萬曆本改。

葛仙翁肘後備急方卷之二

治卒霍亂諸急方第十二

凡所以得霍亂者，多起飲食，或飲食生冷雜物，以肥膩酒鱠而當風履濕，薄衣露坐，或夜卧失覆之所致。

初得之便務令暖，以炭火布其所卧下，大熱減之，又并蒸被絮若衣絮，自苞冷易熱者，亦可燒地，令熱水沃，敷薄布，席卧其上，厚覆之，亦可作灼灼爾，熱湯著瓮中，漬足令至膝，并銅器貯湯，以著腹上，衣藉之，冷復易。亦可以熨斗貯火著腹上。如此而不净者，便急灸之，但明案次第，莫爲亂灸，須有其病，乃隨病灸之，未有病莫預灸，灸之雖未即愈，要萬不復死矣。莫以灸不即而止灸。霍亂艾丸，若不大，壯數亦不多。本方言七壯爲可，四五十無不便，火下得活。服舊方，用理中丸及厚朴大豆豉通脉半夏湯。先輩所用藥者難得，今但疏良灸之法及單行

數方，用之有效，不減於貴藥，已死未久者，猶可灸。

餘藥乃可難備，而理中丸、四順厚朴諸湯，可不預合，每向秋月，常買自隨。

卒得霍亂，先腹痛者，灸臍上十四壯，名太倉，在心厭下四寸，更度之。

先洞下者，灸臍邊一寸，男左女右，十四壯，甚者至三十四十壯，名大腸募，洞者宜瀉。

先吐者，灸心下二寸，十四壯。又，并治下痢不止。上氣，灸五十壯。名巨闕，正心厭尖頭下一寸是也。

先手足逆冷者，灸兩足內踝上一尖骨是也，兩足各七壯，不愈加數。名三陰交，在內踝尖上三寸是也。

轉筋者，灸蹶心當拇指大聚筋上，六七壯。名涌泉。又，灸足大指下約中，一壯，神驗。

又方，灸大指上爪甲際，七壯。

轉筋入腹痛者，令四人捉手足，灸臍左二寸，十四。灸股中大筋上去陰一寸。

若啘者，灸手腕第一約理中，七壯。名心主，當中指。

下利不止者，灸足大指本節內側，寸白肉際，左右各七壯。名大都。

乾嘔者，灸手腕後三寸，兩筋間是，左右各七壯。名間使。若正厥嘔絶，灸之便通。

《小品方》起死。

吐且下利者，灸兩乳連黑外近腹白肉際，各七壯，亦可至二七壯。

若吐止而利不止者，灸臍一夫納中七壯，又云臍下一寸，二七壯。

若煩悶湊滿者，灸心厭下三寸，七壯。名胃管。

又方，以鹽內臍中，上灸二七壯。

若繞臍痛急者，灸臍下三寸，三七壯。名關元。良。

治霍亂神秘起死灸法，以物橫度病人人中，屈之從心鳩尾飛度以下灸，先灸中央畢，更橫灸左右也，又灸脊上以物圍，令正當心厭，又夾脊左右一寸，各七壯，是腹背各灸三處也。

華佗治霍亂已死，上屋喚魂，又以諸治皆至，而猶不差者。

捧病人腹卧之，伸臂對以繩度兩頭，肘尖頭依繩下夾背脊大骨肉中，去脊各一寸，灸之百壯。不治者，可灸肘椎。已試數百人，皆灸畢即起坐。佗以此術傳子孫，代代皆秘之。

右此前并是灸法。

治霍亂心腹脹痛，煩滿短氣，未得吐下方，鹽二升，以水五升，煮取二升，頓服，得吐愈。

又方，生薑若乾薑一二升，㕮咀，以水六升，煮三沸，頓服。若不即愈，更可作。無新藥，煮滓亦得。

又方，飲好苦酒三升，小老羸者可飲一二升。

又方，温酒一二升，以蠟如彈丸一枚，置酒中，消乃飲。無蠟，以鹽二方寸匕代，亦得。

又方，桂屑半升，以暖飲二升和之，盡服之。

又方，濃煮竹葉湯五六升，令灼已轉筋處。

又方，取楠若樟木，大如掌者，削

之，以水三升，煮三沸，去滓，令灼之也。

又方，服乾薑屑三方寸匕。

又方，取蓼若葉細切，二升，水五升，煮三沸，頓服之。煮乾蘇若生蘇汁，即亦佳。

又方，小蒜一升，㕮咀，以水三升，煮取一升，頓服之。

又方，以暖湯漬小蒜五升許，取汁服之，亦可。

又方，以人血合丹服，如梧子大二丸。

又方，生薑一斤，切，以水七升，煮取一升，分爲三服。

又方，取賣解家機上垢如鷄子大，温酒服之，差。

又方，飲竹瀝少許，亦差。

又方，乾薑二兩，甘草二兩，附子一兩，水三升，煮取一升，内猪膽一合，相和，分爲三服。

又方，蘆蓬茸一大把，濃煮，飲二升，差。

若轉筋方，燒鐵令赤，以灼踵白肉際上近後，當縱鐵，以隨足爲留停，令成瘡，兩足皆爾，須臾間，熱入腹不復轉筋，便愈。可脱刀燒蝦尾用之，即差。

又方，煮苦酒三沸以摩之，合少粉尤佳，以絮胎縛，從當膝下至足。

又方，燒梔子二七枚，研末服之。

又方，桂、半夏等分，末方寸匕，水一升，和服之，差。

又方，生大豆屑，酒和服方寸匕。

又方，燒蜈蚣膏，傅之即差。

苦轉筋入腸中，如欲轉者。

取鷄矢白一寸，水六合，煮三沸，頓服之，勿令病者知之。

又方，苦酒煮衣絮，絮中令温，從轉筋處裹之。

又方，燒編薦索三撮，仍酒服之，即差。

又方，釜底黑末，酒服之，差。

若腹中已轉筋者。

當倒擔病人頭在下，勿使及也❶，腹中平乃止。

若兩臂脚及胸脅轉筋。

取鹽一升半，水一斗，煮令熱灼灼爾漬手足。在胸脅者，湯洗之。轉筋入腹中，倒擔病人令頭在下，腹中平乃止。若極者，手引陰，陰縮必死，猶在，倒擔之可活耳。

若注痢不止，而轉筋入腹欲死。

生薑一兩累，擘破，以酒升半，煮合三四沸，頓服之，差。

治霍亂吐下後，心腹煩滿方。

梔子十四枚，水三升，煮取二升，内豉七合，煮取一升，頓服之。嘔者，加橘皮二兩。若煩悶，加豉一升，甘草一兩，蜜一升，增水二升，分爲五服。

治霍亂煩躁，卧不安穩方。

葱白二十莖，大棗二十枚，水三升，煮取二升，頓服之。

治霍亂吐下後大渴，多飲則煞人。方：

以黄米五升，水一斗煮之，令得三升，清澄，稍稍飲之，莫飲余物也。

崔氏云理中丸方：

甘草三兩，乾薑、人參、白术各一兩，搗下篩，蜜丸如彈丸，覺不住，更服

一枚，須臾，不差，仍温湯一斗，以麋肉中服之，頻頻三五度，令差。亦可用酒服。

四順湯：治吐下腹乾嘔，手足冷不止。

乾薑、甘草、人參、附子各二兩，水六升，煮取三升半，分爲三服。若下不止，加龍骨一兩。腹痛甚，加當歸二兩。《胡洽》用附子一枚，桂一兩。人霍亂亦不吐痢❷，但四支脉沉，肉冷汗出渴者，即差。

厚朴湯：治煩嘔腹脹。

厚朴四兩炙，桂二兩，枳實五枚炙，生薑三兩，以水六升，煮取二升，分爲三服。

凡此湯四種，是霍亂諸患皆治之，不可不合也。霍亂若心痛尤甚者，此爲挾毒，兼用中惡方治之。

附方

孫真人治霍亂。

以胡椒三四十粒，以飲吞之。

《斗門方》：治霍亂。

用黄杉木劈開作片一握，以水濃煎一盞服之。

《外臺秘要》：治霍亂煩躁。

燒亂髮如鷄子大，鹽湯三升，和服之。不吐，再服。

又方，治霍亂腹痛吐痢。

取桃葉三升，切，以水五升，煮取一升三合，分温二服。

《梅師方》：治霍亂心痛，利，無汗。

取梨葉枝一大握，水三升，煎取一升服。

又方，治霍亂後煩躁，卧不安穩。

用赤蓼莖葉切三合，水一盞，酒三合，煎至四合，去滓，温分二服。

又方，治肝虚轉筋。

以鹽半斤，水煮少時，熱漬之佳。

《孫尚藥》：治脚轉筋，疼痛攣急者。

松節一兩，細剉如米粒，乳香一錢，右件藥，用銀石器内慢火炒令焦，只留三分性，出火毒，研細，每服一錢至二錢，熱木瓜酒調下。應時筋病皆治之。

《古今録驗方》：治霍亂轉筋。

取蓼一手把，去兩頭，以水二升半，煮取一升半，頓服之。

服此，四肢漸暖，神識便省。

回陽散：天南星爲末，每服三錢，入京棗三枚，水一盞半，同煎至八分，温服。未省，再服。

《聖惠方》治霍亂轉筋垂死。

敗蒲席一握，細切，漿水一盞，煮汁，温温頓服。

又方，治肝虚轉筋。

用赤蓼莖葉切三合，水一盞，酒三合，煎至四合，去滓，温分二服。

又方，治肝風虚轉筋入腹。

以鹽半斤，水煮少時，熱漬之佳。

《孫尚藥》：治脚轉筋，疼痛攣急者。

松節一兩，細剉如米粒，乳香一錢，右件藥，用銀石器内慢火炒令焦，只留三分性，出火毒，研細，每服一錢至二錢，熱木瓜酒調下。應時筋病皆治之。

《古今録驗方》：治霍亂轉筋。

取蓼一手把，去兩頭，以水二升半，煮取一升半，頓服之。

《集效方》治吐瀉不止，或取轉，多四肢發厥，虚風，不省人事，

治傷寒時氣瘟病方第十三

治傷寒及時氣瘟病，及頭痛，壯熱脉大，始得一日方。

取旨兑根、葉合搗三升許，和之真丹一兩，水一升，合煮，絞取汁，頓服之，得吐便差。若重，一升盡服，厚覆取汗，差。

又方，小蒜一升，搗取汁二合，頓服之，不過再作便差。

又方，烏梅二七枚，鹽五合，以水三升，煮取一升，去滓，頓服之。

又方，取生杼木，削去黑皮，細切一升，以水二升五合煎，去滓，一裹白一升，以水二升五合煎，去滓，一服八合，三服差。

又方，取术丸子二七枚，以水五升，煮取一升半，去滓，頓服汁，當吐下，愈。

又方，雞子一枚，著冷水半升，攪與合，乃復煮三升水極令沸，以向所和水投湯中，急攪令相得，適寒温，頓服取汗。

又方，以真丹塗身令遍，面向火坐，令汗出，差。

又方，取生蘘荷根、葉，合搗絞取汁，服三四升。

又方，取乾艾三斤，以水一斗，煮取一升，去滓，頓服取汗。

又方，取猪膏如彈丸者，温服之，腹中當絞吐，便覆取汗，便差。

又方，取比輪錢一百五十七枚，以水一斗，煮取七升，服汁盡之，須臾，復以五升水，更煮令得一升，以水二升投中合，令得三升，出錢飲汁，當吐毒出也。

又方，取猪膏如彈丸者，温服之，日三服，三日九服。

又方，烏梅三十枚，去核，以豉一升，苦酒三升，煮取一升半，去滓，頓服。

又方，取术丸子二七枚，以水五升，煮取一升半，去滓，頓服。亦可服藜蘆吐散三兩，五升水，煎取二升，分再服，必得汗。若不汗，更加麻黄二兩，又用葱湯研米二合，水一升，煮之，少時下鹽、豉，後内葱白四物，令火煎取三升，分服取汗也。

又方，豉一升，小男溺三升，煎取一升，分爲再服，取汗。

又方，葛根四兩，水一斗，煎取三升，煎取升半，一服。搗生葛汁，服一二升，亦爲佳也。

若汗出不歇，已三四日，胸中惡，欲令吐者，豉三升，水七升，煮取二升半，去滓，内蜜一兩，又煮三沸，頓服，安卧，當得吐。不差，更服取差。秘法，傳於子孫也。

又方，生地黄三斤，細切，水一斗，煮取三升，分三服。亦可服藜蘆吐散及苦參龍膽散。

若已五六日以上者。

可多作青竹瀝，少煎令減，爲數數飲之，厚覆取汗。

又方，大黄、黄連、黄檗、梔子各半兩，水八升，煮六七沸，内豉一升，葱白

七莖，煮取三升，分服，宜老少。

又方，苦參二兩，生地黄半斤，水八升，煮取一升，分再服，或吐下毒，則愈。

若已六七日，熱極，心下煩悶，狂言見鬼欲起走。

用乾茱萸三升，水二升，煮取一升後，去滓，寒温服之，得汗便愈。此方恐不失，必可用也，秘方。

又方，大蚓一升，破去，令熟，去滓服之。直生絞汁及水煎之并善。又，絞糞汁，飲數合至一二升，謂之黄龍湯，陳久者佳。

又方，取白犬，從背破取血，破之多多爲佳，當及熱以薄胸上，冷乃去之，此治垂死者活。無白犬，諸純色者亦可用之。

又方，取桐皮，削去上黑者，細擘之，長斷令四寸一束，以酒五合，以水一升，煮取一升，去滓，頓服之，當吐下青黄汁數升，即差。

又方，鷄子三枚，芒消方寸匕，酒三合，合攪，散消盡，服之。

又方，黄連三兩，黄檗、黄芩各二兩，梔子十四枚，水六升，煎取二升，分再服，治煩嘔不得眠。

治時氣行垂死，破棺千金煮湯。

苦參一兩，吮咀，以酒二升半，舊方用苦參酒煮，令得一升半，去滓，適寒温，盡服之，當間苦寒吐毒如溶膠便愈。

又方，大錢百文，水一斗，煮取八升，内麝香當門子李子大，末，稍稍與飲至盡，或汗或吐之。

治温毒發斑，大疫難救，黑膏。生地黄半斤，切碎，好豉一升，猪脂二斤，合煎五六沸，令至三分減一，絞去滓，末雄黄、麝香如大豆者，内中攪和，盡服之，毒從皮中出，即愈。

又方，用生蝦蟆，正爾破腹去腸，乃搗吞食之。得五月五日乾者，燒末，亦佳矣。

黑奴丸，《胡洽》、《小品》同，一名水解丸，又一方加小麥黑勃一兩，名爲麥奴丸。支同此注。

麻黄二兩，大黄二兩，黄芩一兩，芒消一兩，釜底墨一兩，竈突墨二兩，梁上塵二兩，搗，蜜丸如彈丸，新汲水五合，末一丸，頓服之。若渴，但與水，須臾，寒寒了，汗出便解。日移五赤，不覺，更服一丸。此治五六日，胸中大熱，口噤，名爲壞病，不可醫治，用此黑奴丸。

又方，大青四兩，甘草、膠各二兩，豉八合，以水一斗，煮二物，取三升半，去滓，内膠，分作四服，盡，又合此。治得至七八日，發汗不解及吐下大熱，甚佳。

又方，大黄三兩，甘草二兩，麻黄二兩，杏人三十枚，芒消五合，黄芩一兩，巴豆二十粒熬，搗，蜜丸和如大豆，服三丸，當利毒。利不止，米飲止之。

家人視病者，亦❸可先服取利，則不相染易也。此丸，一二日便服之。

麻黄解肌，一二日便服之。

麻黄、甘草、升麻、芍藥、石膏各一兩，杏人三十枚，貝齒三枚，末之，以水三升，煮取一升，頓服，覆取汗出，即愈，便食豉粥，補虚即宜也。

又方，麻黄二兩，芒消一兩，釜底墨一兩，苓、桂各一兩，生

薑三兩，以水六升，煮取二升，分爲四服。

亦可服葛根解肌湯，葛根四兩，芍藥二兩，麻黄、大青、甘草、黄芩、石膏、桂各一兩，大棗四枚，以水五升，煮取二升半，去滓，分爲三服，微取汗。

三日已上至七八日不解者，可服小柴胡湯。柴胡八兩，人參、甘草、黄芩各三兩，生薑八兩，無者，乾薑三兩，半夏五兩，湯洗之，大棗十二枚，水九升，煮取二升半，分爲三服，微覆取汗半日，須臾便差。若不好，更作一劑。

若有熱實，得汗不解，復❹滿痛，煩躁，欲謬語者，可服大柴胡湯方，柴胡半斤，大黄二兩，芍藥二兩，枳實十枚，半夏五兩，洗之，生薑五兩，大棗十二枚，水一斗，煮取四升，當分爲四服，當微利也。

此四方最第一急須者，若幸可得藥，便可不營之，保無死憂，諸小治爲防以窮極耳。若病失治，及治不差，十日已上，皆名壞病，唯應服大小鱉甲湯。此方藥分兩乃少，而種數多，非備急家所辦，故不載。凡傷寒發汗，皆不可使流離❺過多，一服得微汗，汗潔便止，未止粉之，勿當風。初得傷寒，便身重腰背痛，煩悶不已，脉浮，面赤斑斑如錦文，喉咽痛，或下痢，或狂言欲走，此名中陽毒，五日可治，過此死。宜用此方。

雄黄、甘草、升麻、當歸、椒、桂各一分，水五升，煮取二升半，分三服，温覆取汗。服後不汗，更作一劑。

若身重背强，鼈鼈如被打，腹中痛，心下强，短氣嘔逆，唇青面黑，四肢冷，脉沉細而緊數，此名中陰毒，五日可治，過此死。用此方。

甘草、升麻各二兩，當歸、椒各一分，鱉甲一兩，以水二斗，煮取一升，頓服，立止。

天行諸痢悉主之，黄連三兩，黄檗、當歸、龍骨各二兩，以水六升，煮取二升，去滓，入蜜七合，又火煎取一升半，分爲三服，效。

天行毒病，挾熱腹痛，下痢。升麻、甘草、黄連、當歸、芍藥、桂心、黄檗各半兩，以水三升，煮取一升，服之當青湯方。

大青四兩，甘草三兩，膠二兩，豉八合，赤石脂三兩，以水一斗，煮取三升，分三服，盡更作，日夜兩劑，愈。

又方，但以水五升，豉一升，梔子十四枚，韭白一把，煮取三升半，分爲三服。

又方，龍骨半斤，搗碎，以水一斗，煮取五升，使極冷，稍稍飲，其間或得汗，即愈矣。

又方，黄連、當歸各二兩，乾薑一兩，赤石脂二兩，蜜丸如梧子，服二十丸，日三夜再。

又方，黄連二兩，熟艾如鴨卵大，以水二斗，煮取一升，頓服，立止。

天行諸痢悉主之，黄連三兩，黄檗、當歸、龍骨各二兩，以水六升，煮取二升，去滓，入蜜七合，又火煎取一升半，分爲三服，效。

天行毒病，挾熱腹痛，下痢。升麻、甘草、黄連、當歸、芍藥、桂心、黄檗各半兩，以水三升，煮取一升，服之當

天行四五日，大下熱痢。黄連、黄檗各三兩，龍骨三兩，艾如鷄子大，以水六升，煮取二升，分爲二服。忌食猪肉、冷水。

若下膿血不止者，赤石脂一斤，乾薑一兩，粳米一升，水七升，煮米熟，去滓，服七合，日二。

又方，赤石脂一斤，乾薑二兩，水五升，煮取三升，分二服。若絞臍痛，加當歸一兩，芍藥二兩，加水一升也。

若大便堅閉，令利者。大黄四兩，以水四升，煮取一升二合，分再服，得通者，止之。

若十餘日不大便者，服承氣丸。大黄、杏人各二兩，枳實一兩，芒消一合，搗，蜜和丸如彈丸，和湯六七合服之，未通更服。

若下痢不能食者，黄連一升，烏梅二十枚，炙燥并得搗末，蠟如棋子大，蜜一升，合於微火上，令可丸，丸如梧子大，一服二丸，日三。

若小腹滿不得小便方。細末雌黄，蜜和丸，取如棗核大，内溺孔中令半寸，亦以竹管注陰，令痛朔之，通。

又方，末滑石三兩，葶藶子一合，水二升，煮取七合，服。

又方，搗生葱，薄小腹上，參易之。

治胸脅痞滿，心塞氣急，喘急方。人參、朮各一兩，枳實二兩，乾薑一兩，搗，蜜和丸，一服一枚。

又方，赤蘇一把，水三升，煮取二兩。吐，加牡蠣二兩。

丸，不愈更服。

毒病攻喉咽腫痛方。令痛朔之，以布藉喉，以熨布上，冷復易。

又方，取真藷茄❻爪甲大，内口中，以牙小嚼汁，以漬喉，當微覺異爲佳也。

毒病後攻目方。煮蜂窠以洗之，日六七度，佳。

又方，冷水漬青布以掩之。

若生翳者，燒豉二七粒，末，内管鼻中以吹之。

治傷寒嘔不止方。甘草一兩，升麻兩，生薑三兩，橘皮二兩，水三升，煮取二升，頓服之，愈。

又方，乾薑六分，附子四分，末，以苦酒丸，如梧子大，一服三丸，日三服。

治傷寒嘔不止方。甘草三兩，橘皮一升，水五升，煮取三升，分服，日三，取差。

又方，熟洗半夏，末服之，一錢一服。

又方，赤蘇一把，水三升，煮取二升，稍稍飲。

又方，乾薑六分，附子四分，末，苦酒丸，如梧子大，服三丸，日三服。

比歲有病時行，仍發瘡，頭面及身，須臾周匝，狀如火瘡，皆戴白漿，隨決隨生，不即治，劇者多死。治得差後，瘡瘢紫黑，彌歲方滅。此惡毒之氣。世人云：永徽四年，此瘡從西東流，遍於海中，煮葵菜，以蒜齏啖之，即止。初患急食之，少飯下菜亦得。以建武中於南陽擊虜所得，仍呼爲虜瘡，諸醫參詳作治，用之有效方。

取好蜜通身上摩，亦可以蜜煎升麻，綿沾洗之，苦酒漬彌好，但痛難忍。

其餘治猶依傷寒法，但每多作毒意防之。用地黃黑膏亦好。

治時行病發黃方，茵陳六兩，大黃二兩，梔子十二枚，以水一斗，先煮茵陳，取五升，去滓，內二物，又煮取三升，分四服。亦可兼取黃疸中雜治法，差。

比歲又有虜黃病，初唯覺四體沉沉不快，須臾見眼中黃漸至面黃，及舉身皆黃，急令溺白紙，紙即如檗染者，此熱毒已入內，急治之。若初覺，便作瓜蒂赤豆散，吹鼻中，鼻中黃汁出數升者，多差。若已深，應看其舌下兩邊，有白脉彌彌處，蘆刀割破之，紫血出數升，亦歇。然此須慣解割者，不解割忽傷亂舌下青脉，血出不止，便煞人。方可燒紡斡鐵，以灼此脉令焦，兼瓜蒂雜巴豆搗爲丸服之，大小便亦去黃汁，破灼已後，禁諸雜食。又云：有依黃坐，黃復，須分別之。方：

切竹煮飲之，如飲。

又方，搗生瓜根，絞取汁，飲一至二三升。

又方，醋酒浸鷄子一宿，吞其白數枚。

又方，竹葉切，五升，小麥七升，石膏三兩，末，綿裹之，以水一斗五升，煮取七升，一服一升，盡吃即差也。

又方，生葛根汁二升，好豉一升，梔子三七枚，茵陳切一升，水五升，煮取三升，去滓，內葛汁，分爲五服。

又方，金色脚鷄，雌鷄血，在治如食法，熟食肉飲汁令盡，不過，再作亦可，下少鹽豉佳。

治毒攻手足腫疼痛欲斷方，用虎杖根，剉，煮，濾，適寒温，以漬足，令踝上有赤許水止之。

又方，以稻穰灰汁漬足。

又方，酒煮苦參以漬足，差。

又方，鹽豉及羊尿一升，搗，令熟，以漬之。

又方，煮羊桃汁漬之，雜少鹽豉尤好

若病人齒無色，舌上白，或喜睡眠，憒憒不知痛癢處，或下痢，急治下部。不曉此者，但攻其上，不以下爲意，下部生蟲，蟲食其肛，肛爛見五臟便死。治之方：

取鷄子白，内漆合攪，還内殼中，仰頭吞之，當吐蟲，則愈。

又方，燒馬蹄作灰，細末，猪脂和，塗綿以導下部，日數度，差。

又方，桃人十五枚，苦酒二升，鹽一合，煮取六合，服之。

又方，燒艾於管中薰之，令烟入下部，中少雄黄雜妙，此方是溪温，故爾兼取彼治法。

又有病蜃下不止者，烏頭二兩，女萎、雲實各一兩，桂二分，蜜丸如桐子，水服五丸，一日三服。

治下部卒痛如鳥啄之方，赤小豆、大❼豆各一升，合搗，兩囊貯，蒸之令熟，更互坐，即愈。

此本在雜治中，亦是傷寒毒氣所攻。故凡治傷寒方甚多，其有諸麻黄、葛根、桂枝、柴胡、青龍、白虎、四順、四逆二十餘方，并是至要者，而藥難盡備，且診候須明悉，别所在撰大方中，今唯載前四方，尤是急須者耳。其黄水四升，煎取一升半，分服，當吐。

《聖惠方》：治傷寒四日，已嘔吐，更宜吐。以苦參末，酒下二錢，得吐差。

又方，治時氣熱毒，心神煩燥，用藍澱半大匙，以新汲水一盞服。

又方，治時氣，頭痛不止，用朴消三兩，搗羅爲散，生油調塗頂上。

又方，治時氣煩渴，用生藕汁一中盞，入生蜜一合，令勻，分二服。

《勝❽金方》：治時疾熱病，狂言心燥。苦參不限多少，炒黄色爲末，每服二錢，水一盞，煎至八分，温服。連煎三服，有汗無汗皆差。

《博濟方》：治陰陽二毒傷寒，黑龍丹。舶上硫黄一兩，以柳木槌研三兩日，巴豆一兩，和殼記個數，用二升，錫子一口，先安硫黄，鋪錫底，次安巴豆，又以硫黄蓋之，醯醋半升已來澆之，盞子蓋合，令緊蜜，更以濕紙周回固濟，縫勿令透氣，縫紙乾，更以醋濕之，文武火熬，常著人守之，候裏面巴

附方

《必效方》：治天行一二日者，麻黄一大兩，去節，以水四升，煮，去沫，取二升，去滓，著米一匙及豉，爲稀粥，取强一升，先作熟湯，浴淋頭百餘碗，然後服粥，厚覆取汗，於夜最佳。

《梅師方》：治傷寒汗出不解，已

豆作聲數已半爲度，急將鐺子離火，便入臼中急搗令細，再以少米醋并蒸餅少許，再搗，令冷可丸，如鷄頭大。若是陰毒，用椒四十九粒，葱白二莖，水一盞，煎至六分，服一丸。陽毒用豆豉四十九粒，葱白二莖，水一盞，同煎，吞一丸，不得嚼破。

《孫用和方》：治陽毒入胃，下血頻，疼痛不可忍。鬱金五個大者，牛黄一皂莢子，别細研，二味同爲散，每服用醋漿水一盞，同煎三沸，温服。

《孫兆口訣》：治陰毒傷寒，手足逆冷，脉息沉細，頭疼腰重，兼治陰毒，咳逆等疾方。

川烏頭、乾薑等分，爲粗散，炒令轉色，放冷，再搗，爲細散，每一錢，水一盞，鹽一撮，煎取半盞，温服。

又方，治陰勝隔陽傷寒，其人必燥熱而不欲飲水者是也，宜服霹靂散。附子一枚，燒爲灰，存性爲末，蜜水調下，爲一服而愈，此逼散寒氣，然後熱氣上行，而汗出乃愈。

《聖惠方》：治陰毒傷寒，四肢逆冷，宜熨。以吴茱萸一升，酒和匀，濕絹袋二隻，貯蒸令極熱，熨脚心，候氣通暢匀暖即停熨，累驗。

唐·崔元亮療時疾發黄，心狂煩熱，悶不認人者。取大栝樓一枚黄者，以新汲水九合浸❾，淘取汁，下蜜半大合，朴消八分，合攪令消盡，分再服，便差。

《外臺秘要》：治天行病四五日，結胸滿痛，壯熱，身體熱。

苦參一兩，剉，以醋二升，煮取一升二合，盡飲之，當吐即愈。天行毒病，非苦參、醋藥不解，及温覆取汗愈。

又方，救急治天行後嘔逆不下食，食入即出。取羊肝如食法，作生淡食，不過三度即止。

又方，以鷄卵一枚，煮三五沸，出以水浸之，外熟内熱則吞之，良。

《聖惠方》：治時氣，嘔逆不下食。用半夏半兩，湯浸洗七遍，去滑，生薑一兩，同剉碎，以水一大盞，煎至六分，去滓，分二服，不計時候温服。

《深師方》：治傷寒病惋不止。半夏熟洗，乾，末之，生薑湯服一錢匕。

《簡要濟衆》：治傷寒咳噫不止，及噦逆不定。

香❿一兩，乾柿蒂一兩，焙乾，搗末，人參湯下一錢，無時服。

《外臺秘要》：治天行毒病，衄鼻是熱毒，血下數升者，好墨末之，鷄子白丸如梧子，用生地黄汁下一二十丸，如人行五里再服。

又，療傷寒已八九日至十餘日，大煩渴，熱勝而三焦有瘡暨者，多下或張口吐舌呵吁，目爛，口鼻生瘡，吟語不識人，除熱毒，止痢方。

龍骨半斤，碎，以水一斗，煮取四升，沉之井底令冷，服五合，漸漸進之，恣意飲，尤宜老少。

《梅師方》：治熱病後下痢膿血不止，不能食。

白龍骨末，米飲調方寸匕服。

《食療》：治傷寒熱毒下血。羚羊角末，服之即差。又療疝氣。

《聖惠方》：治傷寒狐惑，毒蝕下部，肛外如暨，痛癢不止。雄黄半兩，

先用瓶子一個，口大者，内入灰，上如裝香火，將雄黄燒之，候烟出，當病處熏之。

又方，主傷寒下部生瘺瘡。用烏梅肉三兩，炒令燥，杵爲末，煉蜜丸如梧桐子大，以石榴根皮煎湯，食前下十丸。

《外臺秘要方》：崔氏療傷寒手足疼欲脱。取羊屎煮汁以灌之，差止。亦療時疾，陰囊及莖熱腫，亦可煮黄檗等洗之。

《梅師方》：治傷寒發豌豆瘡，未成膿。研芒消，用猪膽汁和，塗上效。

《經驗後方》：治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透，心煩狂燥，氣喘妄語，或見鬼神。

龍腦一錢，細研，旋滴猪心血和丸，如鷄頭肉大，每服一丸，紫草湯下，少時心神便定，得睡，瘡後發透，依常將息取安。

《藥性論》云：虎杖治大熱煩燥，止渴利小便，壓一切熱毒，暑月和甘草煎，色如琥珀可愛，堪著，嘗之甘美，瓶置井中，令冷徹如水，白瓷器及銀器中貯，似茶啜之，時人呼爲冷飲子，又且尊於茗，能破女子經候不通，搗以酒浸，常服。有孕人勿服，破血。

治時氣病起諸復勞方第十四

凡得毒病愈後，百日之内，禁食猪、犬、羊肉，并傷血；及肥魚久腻、乾魚則必大下痢，下則不可復救。又禁食麵食、胡蒜、韭薤、生菜、蝦鮅輩，食此多致復發，則難治，又令到他年數發也。

治篤病新起早勞及食飲多，致欲死方。

燒鱉甲，服方寸匕。

又方，以水服胡粉少許。

又方，粉三升，以暖水和服之，厚覆取汗。

又方，乾蘇一把，水五升，煮取二升，盡服之。無乾者，生亦可用，加生薑四兩，豉一升。

又方，鼠矢兩頭尖者二七枚，豉五合，以水三升，煎半，頓服之，可服温覆取汗，愈。有麻子人内一升，加水一升，彌良。亦可内枳實，葱白一虎口也。

又方，取伏鷄子殼碎之，熬令黄黑，細末，熱湯服一合，温覆取汗。

又方，大黄、麻黄各二兩，梔子人十四枚，豉一升，水五升，煮取三升，分再服，當小汗及下痢。

又方，濃煮甘皮服之，蘆根亦佳。

覺多而發復方，燒飯篩末，服方寸匕良。

治交接勞復，陰卵腫，或縮入腹，腹中絞痛，或便絶方。

燒婦人月經衣，服方寸匕。

又方，取狗子一枚，撞之三十六，放於户中，逐使喘極，乃刺脅下，取血一升，酒一升，合和飲之。若卒無者，但服血，慎勿便[11]冷。應用猳狗。

又方，取所交接婦人衣，覆男子上一食久，活。

又方，取猳狗肫脛及血，和酒飲之，

差。

又方，刮青竹茹二升，以水三升，煮令五六沸，然後絞去滓，以竹茹湯温服之。此方亦通治勞復⑫。

又方，礬石一分，消三分，末，以大麥粥清，可方寸匕一服，熱毒隨大小便出。

又方，取蓼子一大把，水挼取汁，飲一升。乾者，濃取汁服之，葱頭搗，以苦酒和服，亦佳。

又方，蚯蚓數升，絞取汁，服之良。若差後，病男接女，病女接男，安者陰易，病者發復，復者亦必死。

卒陰易病，男女温病，差後雖數十日，血脉未和，尚有熱毒，與之交接者，即得病曰陰易，殺人甚於時行，宜急治之。

令人身體重，小腹急熱，上腫胸，頭重不能舉，眼中生瞶，膝脛拘急欲死方。

取婦人褌親陰上者，割取燒末，服方寸匕，日三，小便即利，而陰微腫者，此當愈。得童女褌亦良。若女病，亦可用男褌。

又方，鼠矢兩頭尖者二七枚，藍一把，水五升，煮取二升，盡服之，温覆取汗。

又方，蚯蚓二十四枚，水一斗，煮取三升，一服，仍取汗并良。

又方，末乾薑四兩，湯和頓服，温覆取汗，得解止。

又方，男初覺，便灸陰三七壯，若已盡，甚至百壯，即愈，眼無妨，陰道瘡復常。

兩男兩女并不自相易，則易之爲名，陰陽交換之謂也。

凡欲病人不復，取女人手足爪二十枚，又取女中下裳帶一尺燒灰，以酒若米飲服之。

大病差後，小勞便鼻衄。

左顧牡蠣十分，石膏五分，搗末，酒服方寸匕，日三四。亦可蜜丸服，如梧子大服之。

大病差後，多虚汗，及眼中流汗方。

杜仲、牡蠣分等，暮卧水服，五匕則停，不止更作。

治瘴氣疫癘溫毒諸方第十五

辟瘟疫藥干散：大麻人、柏子人、

乾薑、細辛各一兩，附子半兩，炮，搗篩，正旦以井華水舉家各服方寸匕，疫極則三服，日一服。

老君神明白散：术⑬一兩，附子三兩，烏頭四兩，桔梗二兩半，細辛一兩，搗篩，正旦服一錢匕，一家合藥，則一里無病，此帶行所遇，病氣皆消。若他人有得病者，便温酒服之方寸匕，亦得。病已四五日，以水三升，煮散服一升，覆取汗出也。

赤散方：牡丹五分，皂莢五分，炙之，細辛、乾薑、附子各三分，肉桂二分，真珠四分，搗篩爲散，初覺頭强邑邑，便以少許内鼻中，吸之取吐，温酒服方寸匕，覆眠得汗，即差。晨夜行及視病，亦宜少許，以内粉粉身佳。牛馬疫，以一匕著舌下，溺灌，日三四度，甚妙也。

度瘴散，辟山瘴惡氣，若有黑霧鬱勃及西南温風，皆爲疫癘之候。方：

麻黄、椒各五分，烏頭三分，細辛、术、防風、桔梗、桂、乾薑各一分，搗篩，平旦，酒服一錢匕。辟毒諸惡氣，冒霧行，尤宜服之。

太乙流金方：雄黄三兩，雌黄二兩半，羖羊角二兩，帶心前并門户上，月旦青布裹一刀圭，中庭燒温，病人亦燒熏之，即差。

辟天行疫癘，雄黄、丹砂、巴豆、礬石、附子、乾薑分等，搗，蜜丸，平旦向日吞之一丸，如胡麻大，九日止，令無病。

常用辟温病散方：真珠、肉桂各一分，貝母三分，熬之，鷄子白熬令黄黑，三分，搗篩，歲旦服方寸匕。若歲中多病，可月月朔望服之，有病即愈，病人服者，當可大效。

虎頭殺鬼方：虎頭骨五兩，朱砂、雄黄、雌黄各一兩半，鬼臼、皂莢、蕪荑各一兩，搗篩，以蠟蜜和如彈丸，絳囊貯，家中懸屋四角，月朔望夜半，中庭燒一丸。一方有菖蒲、黎蘆，無虎頭、鬼臼、皂莢，作散帶之。

趙泉黄膏方：大黄、附子、細辛、乾薑、椒、桂各一兩，巴豆八十枚，去心皮，搗細，苦酒漬之宿，臘月猪膏二斤，煎三上三下，絞去滓，蜜器貯之，初覺勃色便熱，如梧子大一丸，不差，又服亦可。火炙以摩身體數百遍，佳。并治賊風，走游皮膚，并良。可預合之，便服即愈也。

單行方術，西南社中柏東南枝，取暴乾，末，服方寸匕，立差。

又方，正月上寅日搗女青屑，三角囊貯，繫户上帳前，大吉。

又方，馬蹄木，搗屑二兩，絳囊帶之，男左女右。

又方，正月朔旦及七月，吞麻子、小豆各二七枚。又，各二七枚，投井中。又，以附子二枚，小豆七枚，令女子投井中。

又方，冬至日，取雄赤鷄作臘，至立春煮食盡，勿分他人。二月一日，取東行桑根大如指，懸門户上，又人人帶之。

又方，埋鵲於圊前。

斷温病令不相染著，斷髮仍使長七寸，盜著病人卧席下。

又方，以繩度所住户中壁，屈繩結之。

又方，密以艾灸病人床四角各一壯，不得令知之，佳也。

又方，取小豆，新布囊貯之，置井中三日出，舉家男服十枚，女服二十枚。

又方，桃木中蟲矢，末，服方寸匕。

又方，鮑魚頭，燒三指撮，小豆七枚，合末服之，女用豆二十七枚。

又方，熬豉雜土酒漬，常將服之。

又方，以鯽魚密致卧下，勿令知之。

又方，柏子人、細辛、糝米、乾薑三分，附子一分，末，酒服方寸匕，日服三，服十日。

又方，用麥蘗，服糝米、乾薑，又云麻子人，可作三種服之。

附方

《外臺秘要》：辟瘟方。

取上等朱砂一兩，細研，白蜜和丸，如麻子大，常以太歲日平旦，一家大小，勿食諸物，面向東立，各吞三七丸，永無疾疫。

葛仙翁肘後備急方卷之二

葛仙翁肘後備急方卷之三

治寒熱諸瘧方第十六

治瘧病方，鼠婦、豆豉二七枚，合搗，令相和，未發時服二丸，欲發時服一丸。

又方，青蒿一握，以水二升漬，絞取汁，盡服之。

又方，用獨父蒜，於白炭上燒之，末，服方寸匕。

又方，五月五日，蒜一片去皮，中破之，刀割，合容巴豆一枚，去心皮，内蒜中令合，以竹挾以火炙之，取可熱，搗爲三丸，未發前服一丸，不止，復與一丸。

又方，取蜘蛛一枚，蘆管中密塞，正長跪，向日叉手，當閉氣，以書墨注管中以綰頸，過發時，乃解去也。

又方，日始出時，東向日再拜，畢，其管兩耳中，各七注，又丹書舌上，言子日死，畢，復再拜，還去勿顧，安卧勿

---

❶也：萬曆本作『地』。

❷痢：原作『瘌』，據萬曆本改。

❸亦：原作『不』，據萬曆本改。

❹復：疑當作『腹』。

❺離：原作『雅』，據萬曆本改。

❻茄：疑當作『茹』。

❼大：原作『人』，據萬曆本改。

❽勝：原脱，據萬曆本補。

❾浸：底本此下内容與『治卒風瘡不得語方第二十』之後半部分，及『治風毒脚弱痹滿上氣方第二十一』之前半部分重出，系錯簡所致，今據萬曆本删。又此下至本篇末『一切熱毒』前内容原脱，今據萬曆本補。

❿香：此前疑脱『丁』字。

⓫便：疑當作『使』。

⓬復：原作『後』，據萬曆本改。

⓭术：原作『木』，據萬曆本改。

食，過發時斷，即差。

又方，多煮豉湯，飲數升，令得大吐，便差。

又方，取蜘蛛一枚，著飠中，合丸吞之。

又方，臨發時，搗大附子下篩，以苦酒和之，塗背上。

又方，鼠婦蟲子四枚，各一以飴糖裹之，丸服便斷，即差。

又方，常山，搗下篩成末，三兩，真丹一兩，白蜜和，搗百杵，丸如梧子，先發服三丸，中服三丸，臨卧服三丸，無不斷者，常用效。

又方，大開口，度上下脣，以繩度心頭，灸此度下頭百壯，又灸脊中央五十壯，過發時，灸二十壯。

又方，破一大豆去皮，書一片作日字，一片作月字，左手持日，右手持月，吞之立愈，向日服之，勿令人知也。

又方，皂莢三兩，去皮炙，巴豆一枚。

又方，巴豆一枚，去心皮，射菌如巴豆大，棗一枚，去皮，合搗成丸，先發各服一丸，如梧子大也。

又方，常山、知母、甘草、麻黄等分，搗，蜜和丸如大豆，服三丸，比發時令過畢。

又方，常山三兩，甘草半兩，水酒各半升，合煮取半升，先發時一服，比發令三服盡。

又方，常山三兩，剉，以酒三升，漬二三日，平旦作三合服，欲嘔之，臨發又服二合，便斷。舊酒亦佳，急亦可煮。

又方，常山三兩，甘草半兩，知母一兩，搗，蜜丸，至先發時，服如梧子大十丸，次服減七丸八丸，後五六丸，即差。

又方，先發二時，以炭火床下，令脊脚極暖被覆，過時乃止，此治先寒後熱者。

又方，先炙鰲甲，搗末方寸匕，至時令三服盡，用火炙，無不斷。

又方，常山三兩，搗篩，鷄子白和丸，空腹三十丸，去發食久三十丸，發時三十丸，或吐或否也，從服藥至過發時，勿飲食。

又方，藜蘆、皂莢各一兩，炙，巴豆二十五枚，并搗，熬令黄，依法搗，蜜丸如小豆，空心服一丸，未發時一丸，臨發時又一丸，勿飲食。

又方，牛膝莖葉一把，切，以酒三升服，令微有酒氣。不即斷，更作，不過三服而止。

又方，末龍骨方寸匕，先發一時，以酒一升半，煮三沸，及熱盡服，温覆取汗，便即效。

又方，常山三兩，甘草半兩，搗，蜜丸，至先發時，服如梧子大十丸，次服減七丸八丸，後五六丸，即差。

又方，若發作無常，心下煩熱，取常山二兩，甘草一兩半，合以水六升，煮取二升，分再服，當快吐，仍斷，勿飲食。

老瘧久不斷者，常山三兩，鱉甲一兩，炙，升麻一兩，附子一兩，烏賊骨一兩，以酒六升漬❶之，小令近火，一宿成，服一合，比發可數作。

治温瘧不下食，知母、鱉甲炙、常山各二兩，地骨皮三兩切，竹葉一升切，石膏四兩，以水七升，煮二升五合，分温三服。忌蒜、熱麵、猪、魚。

治瘴瘧，常山、黄連、豉熬各三兩，附子二兩，炮，搗篩，蜜丸，空腹服四丸，欲發三丸，飲下之，服藥後至過發時，勿吃食。

若兼諸痢者，黄連、犀角各三兩，牡蠣、香豉各二兩，并熬，龍骨四兩，搗篩，蜜丸，服四十丸，日再服，飲下。

無時節發者，常山二兩，甘草一兩半，豉五合，綿裹，以水六升，煮取三升，再服，快吐。

無問年月，可治三十年者，常山、黄連各三兩，酒一斗，宿漬之，曉以瓦釜煮取六升，一服八合，比發時令得三服，熱當吐，冷當利，服之無不差者，半料合服得。

勞瘧積久，衆治不差者，生長大牛膝一大虎口，以水六升，煮取二升，空腹一服，欲發一服。

禳一切瘧，是日抱雄鷄，一時令作大聲，無不差。

又方，未發頭向南卧，五心及額舌七處，閉氣書鬼字。

咒法，發日執一石於水濱，一氣咒云：眢眢圓圓，行路非難，捉取瘧鬼，送與河官，急急如律令。投於水，不得回顧。

治一切瘧，烏梅丸方。甘草二兩，烏梅肉熬、人參、桂心、肉從蓉、知母、牡丹各二兩，常山、升麻、桃人去皮尖熬，烏豆皮熬膜取皮各三兩，桃人研，欲丸入之，搗篩，蜜丸，蘇屠臼搗一萬杵，發日五更酒下三十丸，平旦四十丸，欲發四十丸，不發日空腹四十丸，晚三十丸，無不差，徐服。後十餘日，吃肥肉發之也。

乞見瘧，白驢蹄二分，熬，大黄四分，緑豆三分，末，砒霜二分，光明砂半分，雄黄一分，搗，蜜丸如梧子，發日平旦冷水服二丸，七日内忌油。

附方

《外臺秘要》：治瘧不痊，乾薑、高良薑等分，爲末，每服一錢，水一中盞，煎至七分服。

《聖惠方》：治久患瘧勞瘴等方，用鱉甲三兩，塗酥，炙令黄，去裙爲末，臨發時温酒調下二錢匕。

治瘧，用桃人一百個，去皮尖，於乳鉢中細研成膏，不得犯生水，候成膏，入黄丹三錢，丸如梧子大，每服三丸，當發日，面北用温酒吞下，如不飲酒，井花水亦得。五月五日午時合，忌鷄犬婦人見。

又方，用小蒜，不拘多少，研極爛，和黄丹少許，以聚爲度，丸如鷄頭大，候乾，每服一丸，新汲水下，面東服，至妙。

治卒發癲狂病方第十七

治卒癲疾方，灸陰莖上宛宛中三壯，得小便通則愈。

又方，灸陰莖上三壯，囊下縫二七壯。

又方，灸兩乳頭三壯，又灸足大指本聚毛中七壯，灸足小指本節七壯。

又方，取葶藶一升，搗三千杵，取白犬倒懸之，以杖犬，令血出，承取以和葶藶末，服如麻子大一丸，三服取差。

又方，莨菪子三升，酒五升漬之，出曝乾，漬盡酒止，搗，服一錢匕，日三，勿多，益狂。

又《小品》癲狂莨菪散　莨菪子三升，末之，酒一升，漬多日出，搗之，以向汁和，絞去滓，湯上煎，令可丸，服如小豆三丸，日三，口面當覺急，頭中有蟲行者，額及手足應有赤色處，如此必是差候。若未見，服取盡矣。

又方，末房葵，温酒服一刀圭至二三，身潤又小不仁爲候。

又方，自縊死者繩，燒三指撮，服之。

凡癲疾，發則仆地，吐涎沫，無知强掠起如狂，反遺糞者，難治。

治卒發狂方，燒蝦蟆，搗末，服方寸匕，日三服之，酒服。

又方，卧其人著地，以冷水淋其面，爲終日淋之。

治卒狂言鬼語方，針其足大拇指爪甲下入少許，即止。

又方，以甄帶急合縛兩手，火灸左右脅，握肘頭文俱起七壯，須臾，鬼語自道姓名，乞去，徐徐詰問，乃解手耳。

凡狂發則欲走，或自高貴稱神聖，皆應備諸火炙，乃得永差耳。

若或悲泣呻吟者，此爲邪魅非狂，自依邪方治之，《近效方》已生蠶紙作灰，酒水任下，差療風癲也。

附方

《斗門方》：治癲癎，用艾於陰囊下穀道正門當中間，隨年道❷灸之。

《千金方》：治風癲百病，麻人四升，水六升，猛火煮，令牙生，去滓，煎取七合，旦空心服，或發或不發，或多言語，勿怪之，但人摩手足須定，凡進三劑愈。

又方，治狂邪發無時，披頭大叫，欲殺人，不避水火，苦參以蜜丸如梧子大，每服十丸，薄荷湯下。

《外臺秘要》：治風癎，引脅牽痛，發作則吐，耳如蟬鳴，天門冬，去心皮，曝乾，搗篩，酒服方寸匕。若人久服，亦能長生。

《廣利方》：治心熱風癎，爛龍角，濃研汁，食上服二合，日再服。

《經驗後方》：治大人小兒久患風癎，纏喉喝嗽，遍身風疹，急中涎潮。

等此藥不太吐逆，只出涎水，小兒服一字。瓜蒂不限多少，細碾爲末，壯年一字，十五已下、老怯半❸字，早晨井花水下，一食須含沙糖一塊，良久涎如水出，年深涎盡，有一塊如涎布，水上如鑒矣，涎盡食粥一兩日，如吐多困甚，即嚥麝香湯一盞，即止矣。麝細研，温水調下。昔天平尚書覺昏眩，即服之，取涎有效。

《明皇雜録》云：開元中有名醫紀朋者，觀人顏色談笑，知病深淺，不待診脉。帝聞之，召於掖庭中，看一宫人，每日晨❹則笑歌啼號，若狂疾，而足大促力，頓仆於地而然。乃飲以雲母湯，令熟寐，覺而失所苦，問之乃言：因太華公主載誕，宫中大陳歌吹，某乃

主謳，懼其聲不能清且長，吃炙炰蹄羹飽，而當筵歌大曲，曲罷覺胸中甚熱，戲於砌臺上，高而墜下，久而方惺，病狂足不能及地。

治卒得驚邪恍惚方第十八

治人心下虛悸方，麻黃、半夏等分，搗，蜜丸，服如大豆三丸❺，日二❻，稍增之。半夏湯洗去滑，乾。

治驚憂怖迫遥❼，或驚恐失財，或激憤惆悵，致志氣錯越，心行違僻不得安定者。

龍骨、遠志、茯❽神、防風、牡蠣各二兩，甘草七兩，大棗七枚，以水八升，煮取二升，分再服，日日作之，取差。

又方，茯苓❾、乾地黃各四兩，人參、桂❿各三兩，甘草二兩，麥門冬一升，去心，半夏六兩，洗滑，生薑一斤，以水一斗，又殺烏鷄取血及肝心，煮三升，分四服，日三夜一，其間少食無爽，作三劑差。

又方，白雄鷄一頭，治如食，真珠四兩，切，薤白四兩，以水三升，煮取二升，宿勿食，旦悉食鷄等及飲汁盡。

又有鎮心定志諸丸，在大方中。

治卒中邪鬼，恍惚振噤方，灸鼻下人中，及兩手足大指爪甲本，令艾丸在穴上各七壯，不止，至十四⓫壯愈。此事本在雜治中。

治女人與邪物交通，獨言獨笑，悲思恍惚者，末⓬雄黃一兩，以松脂二兩溶和，虎爪攪，令如彈丸，夜內火籠中燒之，令女人侵坐其上，被急自蒙，唯出頭耳，一爾未差，不過三劑，過自斷也。

又方，雄黃一兩，人參一兩，防風一兩，五味子一升，搗篩，清旦以井水服方寸匕，三服差。

師往以針五枚內頭髻中，狂病者則以器貯水，三赤新布覆之，橫大刀於上，悉乃矜莊，呼見其人，其人必欲起走，慎勿聽，因取一噴之，一呵視，三通乃熟，拭去水，指彈額上近髮際，問欲愈乎？其人必不肯答，如此二七彈乃答，欲因杖針刺鼻下人中近孔內側，空停針，兩耳根前宛宛動中停針，又削鼻直上入髮際一寸，橫針又刺鼻直上入，乃具詰問，憐憐醒悟，則乃止矣。

若男女喜夢與鬼通致恍惚者，鋸截鹿角屑，酒服三指撮，日三。

附方

張仲景：主心下悸，半夏、麻黃丸。二物等分，末，蜜丸如小豆，每服三丸，日三。

《簡要濟衆方》：每心藏不安，驚悸善忘，上鬲風熱化痰。

白石英一兩，朱砂一兩，同研爲散，每服半錢，食後夜卧，金銀湯調下。

心中客熱，膀胱間連脊下氣妨，常旦憂愁不樂，兼心忪者。

取莎草根二大斤，切熬令香，以生絹袋貯之，於三大斗無灰清酒中浸之，春三月浸一日，即堪服，冬十月後，即七日，近暖處乃佳。每空腹服一盞，日夜三四服之，常令酒氣相續，以知爲度。若不飲酒，即取莎草根十兩，加桂心五兩，蕪荑三兩，和搗爲散，以蜜和爲丸，搗一千杵，丸如梧子大，每空腹

以酒及薑蜜湯飲汁等下二十丸，日再服，漸加至三十丸，以差爲度。

治中風諸急方第十九

治卒中急風，悶亂欲死方。灸兩足大指下橫文中，隨年壯，又別有續命湯。

若毒急不得行者，內筋急者。灸內踝，外筋急者，灸外踝上，二十壯。若有腫痹，虛者取白斂二分，搗，服半刀圭，每日可三服。

若眼上睛垂者，灸目兩眦後，三壯。

若不識人者，灸季脅頭，各七壯，此脅小肋屈頭也。

不能語者，灸第二槌，或第五槌上，五十壯。又別有不得語方，在後篇中矣。

又方，豉、茱萸各一升，水五升，煮取二升，稍稍服。

若眼反口噤，腹中切痛者，灸陰囊下第一橫理，十四壯。又別有服膏之方。

若狂走欲斫刺人，或欲自殺，罵詈不息，稱鬼語者。

灸兩口吻頭赤肉際各一壯，又灸兩肘屈中五壯，又灸背胛中間三壯，三日報灸三，倉公秘法，又應灸陰囊下縫三十壯。又別有狂邪方。

若發狂者，取車轂中脂如鷄子，熱温淳苦酒，以投脂甚攪令消，服之令盡。

若心煩恍惚，腹中痛滿，或時絶而復蘇者。取釜下土五升，搗篩，以冷水八升和之，取汁，盡服之，口已噤者，强開，以竹筒灌之，使得下，人便愈，甚妙。

若身體角弓反張，四肢不隨，煩亂欲死者。

清酒五升，鷄白矢一升，搗篩合和，揚之千遍，乃飲之，大人服一升，日三，少小五合，差。

又方，豉、茱萸各一升，水五升，煮取二升，稍稍服。

若眼身無不痛，顛倒煩滿欲死者。

取頭垢如大豆大服之，并囊貯大豆，蒸熟，逐痛處熨之，作兩囊更番爲佳。若無豆，亦可蒸鼠壤土熨。

若但腹中切痛者，取鹽半斤，熬令黄黑，以酒五升漬取汁[13]，以物强發口灌之畢，取汗。

又方，獨活四兩，桂二兩，以酒水二升，煮取一升半，分爲三服，開口與之，温卧[14]，火炙令取汗。

若身直不得屈伸反覆者，取槐皮

黄白者切之，以酒共水六升，煮取二升，去滓，適寒温，稍稍服之。

又方，刮枳樹皮，取一升，以酒一升，漬一宿，服五合至一升，酒盡更作，差。

若口喎僻者，銜奏灸口吻口横文間，覺火熱便去艾，即愈，勿盡艾，盡艾則太過。若口左僻灸右吻，右僻灸左吻。又灸手中指節上一丸，喎右灸左也。又有灸口喎法，在此後也。

又方，取空青末，著口中，入咽即愈。姚同。

又方，取蜘蛛子摩其偏急頰車上，候視正則止，亦可向火摩之。

又方，牡蠣、礬石、附子、竈中黄土分等，搗末，以三歲雄鷄[15]冠血和傅，急上，持水著邊，視欲還正，便急洗去藥，不著更塗[16]上，便愈。

又方，鱉甲、烏頭塗之，欲正，即揭去之。

若四肢逆冷，吐清汁[17]，宛轉啼呼者。

取桂一兩，㕮咀，以水三升，煮取二升，去滓，適寒温，盡服。

若關節疼痛，蒲黄八兩，附子一兩，炮，合末之，服一錢已[18]，日三，稍增至方寸匕。

若骨節疼煩，不得屈伸，近之則痛，短氣得汗[19]出，或欲腫者。

附子二兩，桂四兩，朮三兩，甘草二兩，水六升，煮取三升，分三服，汗出愈也。

若中暴風，白汗出如水者。

石膏、甘草各等分，搗，酒服方寸匕，日移一丈輒一服也。

若中緩風，四支不收者。

黎蘆一兩，去蘆頭，濃煎，防風湯浴過，焙乾，碎切，炒微褐[23]色，搗爲末[24]，每服半錢，温水調下，以吐出風涎爲效。如人行二里未吐，再服。

又治膽風毒氣，虚實不調，昏沉睡多。

酸棗人一兩，生用，金挺蠟茶二兩，以生薑汁塗，炙令微焦，搗羅爲散，每服二錢，水七分，煎六分，無時温服。

《孫尚藥》：治卒中風，昏昏若醉，開關散：天南星搗爲末，白龍腦，二件各等分，研，自五月五日午時合，患者只一字至半錢。

《簡要濟衆》：治中風噤不開，涎潮吐方。

用皂角一挺，去皮，塗猪脂，炙令黄色，爲末，每服一錢匕，非時温酒服。如牙關不開，如氣實脉大，調二錢匕。如牙關不開，用白梅揩齒，口開即灌藥，以吐出風涎，差。

治中風不省人事，牙關緊急者。

大病，故傷人也，此證風涎潮於上膈，痹氣不通，宜用

急救稀涎散：猪牙皂角四挺，須是肥實不蚛，削去黑皮，晋礬一兩，光明通瑩者，二味同搗，羅爲細末，再研斗浸之，春夏一七日，秋冬二七日後爲散。如有患者，可服半錢，重者三字匕，温水調灌下，不大嘔吐，只是微微涎稀令出，或一升二升，當時惺惺，次緩而調治，不可便大段治，恐過傷人命。累經效，不能盡述。

《梅師方》：療癱緩風，手足戰曳，口眼喎斜，語言蹇澁，履步不正。

神驗烏龍丹：川烏頭去皮臍了，五靈脂各五兩，右爲末，入龍腦、麝香，研令細勻，滴水丸如彈子大，每服一丸，先以生薑汁研化，次暖酒調服之，一日兩服，空心晚食前服，治一人只三十丸，服得五七丸，便覺抬得手，移得步，十丸可以自[25]。

《聖惠方》：治一切風疾，若能久服，輕身明目，黑髭駐顔。

用南燭樹，春夏取枝葉，秋冬取根皮，揀擇細剉，五升，水五斗，慢火煎取二斗，去滓，别於净鍋中慢火煎如稀餳，以瓷瓶貯，温酒下一匙，日三服。

又方，治風立有奇效。用木天蓼

取牛蒡莖葉搗，取濃汁二升，合無灰酒一升，鹽花一匙頭，火煎令稠成膏，以摩痛處，風毒散自止。亦主時行頭痛。摩時須極力令作熱，乃速效。冬月無葉，用根代之亦可。

《經驗後方》：治中風及壅滯，以旋覆花洗塵令淨，搗末，煉蜜丸，如梧子大，夜卧以茶湯下五丸至七丸、十丸。

又方，解風熱，疏積熱、風壅，消食，化氣，導血，大解壅滯。

大黄四兩，牽牛子四兩，半生半熟，爲末，煉蜜爲丸，如梧子大，每服茶下一十丸，如要微動，吃十五丸，冬月宜服，并不搜攪人。

《集驗方》：治風熱心躁，口乾，狂言，渾身壯熱及中諸毒，龍腦甘露丸。

寒水石半斤，燒半日，淨地坑内，盆合四面，濕土壅起，候經宿取出，入甘草末、天竺黄各二兩，龍腦二分，糯米膏丸，彈子大，蜜水磨下。

《食醫心鏡》：主㉚中風心肺風熱，手足不隨，及風痹不任，筋脉五緩，恍惚煩躁。熊肉一斤，切，如常法調和作腌臘，空腹食之。

又主風攣拘急偏枯，血氣不通利。

雁肪四兩，煉，濾過，每㉛日空心暖酒一杯，肪一匙頭，飲之。

同經曰：治歷節諸風，骨節疼痛，晝夜不可忍者。

没藥半兩，研，虎腦骨三兩，塗酥炙黄色，先搗，羅爲散，與没藥同㉜研令細，温酒㉚調二錢，日三服，大佳。

《聖惠方》：治歷節風，百節疼痛不可忍。

用虎頭骨一具，塗酥炙、黑附子炮裂去皮臍各一兩，爲末，每服温酒調下二錢匕，日再服。

《外臺秘要方》：治癧瘍風及三年。

酢磨烏賊魚骨，先布磨，肉赤即傅之。

又治癧瘍風，酢磨硫黄，傅之，止。

《聖惠方》：治癧瘍風，用羊蹄菜遍，不能五十遍，亦可二十遍，用以煉酥三升，温和松脂三升，熟攪令極稠，旦空腹以酒服方寸匕，日三，數食麵粥爲佳。慎血腥、生冷、酢物、果子一百日，差。

又方，松節酒，主歷節風，筋脉疼痛如解落。

松節二十斤，酒五斗，漬二七日，服一合，日五六服。

《斗門方》：治白虎風所患不以，積年久㉟治無效，痛不可忍者。

用腦、麝、楓、柳皮不限多少，細剉焙乾，浸酒常服，以醉爲度，即差。今之寄生楓樹上者，方堪用，其葉亦可製砒霜粉，尤妙矣。

《經驗後方》：治白虎風，走注疼痛，兩膝熱腫。

虎脛骨塗酥炙、黑附子炮裂去皮臍各一兩，爲末，每服温酒調下二錢匕，日再服。

《外臺秘要

浸淫漸長，有似癬，但無瘡可治，鰻鱺魚脂傅之，先拭剥上，刮使燥痛後，以魚脂傅之，一度便愈，甚者不過三度。

《聖惠方》：治白駁，用蛇蜕，燒末醋調，傅上佳。

又方，治中風煩熱，皮膚瘙癢，用醍醐四兩，每服酒調下半[36]匙。

《集驗方》：治風氣客於皮膚，瘙癢不已。

蜂房炙過，蟬蜕等分，爲末，酒調一錢匕，日三二服。

又方，蟬蜕、薄苛等分，爲末，酒調一錢匕，日三服。

《北夢瑣言》云：有一朝士見梁奉御，診之曰：風疾已深，請速歸去。朝士復見鄜州馬醫趙鄂者，復診之，言疾危。與梁所説同矣。曰：只有一法，請官人試吃消梨，不限多少，咀齕不及，絞汁而飲。到家旬日，唯吃消梨，頓爽矣。

《千金方》：治頭風頭痛，大豆三升，炒令無聲，先以貯一斗二升，瓶一隻，貯九升清酒，乘豆熱即投於酒中，蜜泥封之七日，温服。

孫真人方，治頭風痛，以豉湯洗頭避風，即差。

《千金翼》：治頭風，搗葶藶子，以湯淋取汁洗頭上。

又主頭風沐頭，吴茱萸二升，水五升，煮取三升，以綿染拭髮根。

《聖惠方》：治頭風痛，每欲天陰雨風先發者。

用桂心一兩，爲末，以酒調如膏，用傅頂上并額角。

陳藏器《拾遺·序》云：頭疼欲死，鼻内吹消石末愈。

日華子云：治頭痛，水調决明子，貼太陽穴。

又方，决明子作枕，勝黑豆，治頭風，明目也。

《外臺秘要》：治頭疼欲裂，當歸二兩，酒一升，煮取六合，飲至再服。

《孫兆口訣》云：治頭痛。

附子炮、石膏煅等分，爲末，入腦、麝少許，茶酒下半錢。

《斗門方》：治卒頭痛，白僵蠶碾爲末，去絲，以熟水二錢匕，立差。

又方，治偏頭痛，用京芎細剉，酒浸服之，佳。

《博濟方》：治偏頭疼，至靈散，雄黄、細辛等分，研令細，每用一字已下，左邊疼吹入右鼻，右邊疼吹入左鼻，立效。

《經驗後方》：治偏頭疼絶妙，蕈撥爲末，令患者口中含温水，左邊疼，令左鼻吸一字，右邊疼，令右鼻吸一字，效。

《集驗方》：治偏正頭疼，穀精草一兩，爲末，用白麵調，攤紙花子上，貼疼處，乾又換。

偏頭疼方，用生蘿卜汁一蜆殼，仰卧，注鼻，左痛注左，右痛注右，左右俱注亦得，神效。

《外臺秘要》：頭風白屑如麩糠方。

竪截楮木作枕，六十日一易新者。

治卒風瘖不得語方第二十

治卒不得語方，以苦酒煮瓜子，薄

頸一周，以衣苞，一日一夕乃解，即差。

又方，煮大豆煎其汁，令如飴，含之。亦但濃煮，飲之。

又方，煮豉汁，稍服之一日，可美酒半升中攪，分三服。

又方，用新好桂，削去皮，搗篩，三指撮，著舌下，嚥之。

又方，剉穀枝葉，酒煮熱灰中，沫出，隨多少飲之。

治卒失聲，聲噎不出方。橘皮五兩，水三升，煮取一升，去滓，頓服，傾合服之。

又方，濃煮苦竹葉，服之差。

又方，搗蘘荷根，酒和絞，飲其汁。此本在雜治中。

又方，通草、乾薑、附子、茯神各一兩，防風、桂、石膏各二兩，麻黄一兩半，白朮半兩，杏人三十枚，十物搗篩，爲末，蜜丸如大豆大，一服七丸，漸增加之，凡此皆中風。又有竹瀝諸湯甚多，此用藥雖少，而是將治所患，一劑不差，更應服之。

又方，針大槌旁一寸五分，又刺其下停針之。

又方，礬石、桂，末，綿裹如棗，內舌下，有唾出之。

又方，燒馬勒銜鐵令赤，內一升苦酒中，破一鷄子，合和飲之。

若卒中冷，聲嘶啞者，甘草一兩，桂二兩，五味子二兩，杏人三十枚，生薑八兩，切，以水七升，煮取二升，爲二服，服之。

附方

《經驗後方》：治中風不語，獨活一兩，剉，酒二升，煎一升，大豆五合，炒有聲，將藥酒熱投，蓋良久，温服三合，未差再服。

又方，治中風不語，喉中如拽鋸聲，口中涎沫。取藜蘆一分，天南星一個，去浮皮，却臍子上陷一個坑子，內入陳醋一橡斗子，四面用火逼，令黄色，同一處搗，再研極細，用生蜜爲丸，如赤豆大，每服三丸，温酒下。

《聖惠方》：治中風，以大聲咽喉不利。以蘘荷根二兩，研，絞取汁，酒一大盞，相和令匀，不計時候，温服半盞。

治風毒脚弱痹滿上氣方第二十一

脚氣之病，先起嶺南，稍來江東，或行起忽弱，或小腹不仁，或時冷時熱，皆其候也。不即治，轉上入腹。便發氣，則殺人。治之多用湯酒摩膏，種效[37]既多，不但一劑，今只取單效，用兼灸法。

取好豉一升，三蒸三曝乾，以好酒三斗，漬[38]之三宿可飲，隨人多少。欲預防，不必待時，便與酒煮豉服之。脚弱其得小愈，及更營諸方服之，并及灸之。

次服獨活酒方，獨活五兩，附子五末，附子三兩，生用，切，以酒一斗，漬經三宿，服從一合始，以微痹爲度。

又方，白礬石二斤，亦可用鐘乳，水二斗，漬四五日，稍飲之。若此有氣，加蘇子二升也。

又方，好硫黄三兩，末之，牛乳五升，先煮乳水五升，仍内硫黄，煎取三升，一服三合。亦可直以乳煎硫黄，不用水也。卒無牛乳，羊乳亦得。

又方法，先煎牛乳三升，令減半，以五合，輒服硫黄末一兩，服畢，厚蓋取汗，勿令得風，中間更一服，暮又一服。若已得汗，不復更取，但好將息將護之。若未差，愈後數日中亦可更作。若長將亦可煎爲丸。北人服此治脚多效，但須極好硫黄耳，可預備之。

若脛已滿，捏之没指者，但勒飲烏犢牛溺二三升，使小便利，息漸漸消。當以銅器，尿取新者爲佳。無烏牛，純黄者亦可用之。

又方，取牽牛子，搗，蜜丸，如小豆大五丸，取令[39]小便利。亦可正爾吞之。其子黑色，正似梂子核形，市人亦賣之。

又方，三白根，搗碎，酒飲之。

又方，酒若水煮大豆，飲其汁。又，食小豆亦佳。又，生研胡麻，酒和服之，差。

又方，大豆三升，水一斗，煮取九升，内清酒九升，又煎取九升，稍稍飲之。小便利，則腫歇也。

其有風引、白鷄、竹瀝、獨活諸湯，及八風、石斛、狗脊諸散，并别在大方中。金芽酒最爲治之要，今載其方。

蜀椒、茵芋、金牙、細辛、茵草、乾地黄、防風、附子、地膚、蒴藋、升麻各四兩，人參三兩，羌活一斤，牛膝五兩，十四物切，以酒四斗，漬七日，飲二三合，稍加之。亦治口不能言，脚屈，至良。又有側子酒，亦效。

若田舍貧家，此藥可釀，拔葜及松節、松葉皆善。

拔葜净洗，剉之一斛，以水三斛，煮取九斗，以漬麯，及煮去滓，取一斛漬飯，釀之如酒法，熟即取飲，多少任意，可頓作三五斛。若用松節、葉，亦依准此法，其汁不厭濃也。患脚屈，積年不能行，腰脊攣痹，及腹内緊結者，服之不過三五劑，皆平復。如無釀，水邊商陸亦佳。

其灸法孔穴亦甚多，恐人不能悉皆知處，今止疏要者，必先從上始，若直灸脚，氣上不泄則危矣，先灸大椎。

在項上大節高起者，灸其上面一穴耳，若氣，可先灸百會五十壯，穴在頭頂凹中也。

肩井各一百壯。

在兩肩小近頭凹處，指捏之，安令正得中穴耳。

次灸膻中五十壯。

在胸前兩邊對乳胸厭骨解間，指按覺氣翕翕爾是也。一云正胸中一穴也。

次灸巨闕。

在心厭尖尖四下一寸，以赤度之，凡灸以上部五穴，亦足治其氣。若能灸百會、風府[40]、胃管及五藏腧，則益佳，視病之寬急耳。諸穴出《灸經》，不可具載之。

次乃灸風市百壯。

在兩髀外，可平倚垂手直掩髀上，當中指頭大筋上，捻之，自覺好也。

次灸三里二百壯。

以病人手横掩，下并四指，名曰一

夫，指至膝頭骨下指中節是其穴，附脛骨外邊捻之，凹凹然也。

次灸上廉一百壯。

又灸三里下一夫。

次灸下廉一百壯。

又在上廉下一夫。

次灸絶骨二百壯。

在外踝上三寸餘，指端取踝骨上際，屈指頭四寸便是，與下廉頗相對，分間二穴也，此下一十八穴，并是要穴，餘伏兔、犢鼻穴，凡灸此壯數，不必頓畢，三日中報灸合盡。

又方，孔公孽二斤，石斛五兩，酒二斗浸，服之。

附方

《斗門方》：治卒風毒，腫氣急痛，以柳白皮一斤，剉，以酒煮令熱，帛裹熨腫上，冷再煮，易之，甚妙也。

《聖惠方》：治走注風毒疼痛，用小芥子，末，和鷄子白調傅之。

《經驗後方》：治風毒骨髓疼痛，芍藥二分，虎骨一兩，炙，爲末，夾絹袋貯，酒三升，漬五日，每服二合，日三服。

《食醫心鏡》：除一切風濕痹，四肢拘攣。

蒼耳子三兩，搗末，以水一升半，煎取七合，去滓，呷之。

又，治筋脉拘攣，久風濕痹，下氣，除骨中邪氣，利腸胃，消水腫，久服輕身益氣力。

薏苡人一升，搗，爲散，每服以水二升，煮兩匙末，作粥，空腹食。

又主㊶補虛，去風濕痹，醍醐二大兩，暖酒一杯，和醍醐一匙飲之。

《經驗方》：治諸處皮裏面痛，何首烏，末，薑汁調成膏，痛處以帛子裹之，用火炙鞋底熨之，妙。

孫真人方：主脚氣及上氣，取鯽魚一赤長者，作膾，食一兩頓差。

唐本注云：脚氣。

煮荭草濃汁漬之，多差。

《簡要濟衆》：治脚氣連腿腫滿，黑附子一兩，去皮臍，生用，搗爲散，生薑汁調如膏，塗傅腫上，藥乾再調塗之，腫消爲度。

蘇恭云：凡患脚氣，每旦任意飽食，午後少食，日晚不食，如饑可食豉粥。若暝不消，欲致霍亂者：

即以高良薑二兩，打碎，以水三升，煮取一升，頓服盡，即消，待極饑乃食一飽㊷薄粥，其藥唯極飲之良。若卒無高良薑，母薑一兩代之，以清酒一升，煮令極熟，和滓食之，雖不及高良薑，亦大效矣。

治服散卒發動困㊸篤方第二十二

凡服五石護命更生及鍾乳寒食之散，失將和節度，皆致發動其病，無所不爲，若發起倉卒，不以漸而至者，皆是散勢也，宜及時救解之，若四肢身外

有諸一切痛違常者。

皆即冷水洗數百遍，熱有所衝，水漬布巾，隨以搦之。又水漬冷石以熨之，行飲暖酒，逍遥起行。

若心腹内有諸一切疾痛違常，煩悶悒恍者，急解之，取冷，熱取温酒飲一二升，漸漸稍進，覺小寬更進冷食，其心痛者，最急，若肉冷，口已噤，但折齒下熱酒差。

若腹内有結堅熱癖使衆疾者，急下之。

梔子十四枚，豉五合，水二升，煮取一升，頓服之。熱甚已發瘡者，加黄芩二兩。

癖食猶不消，惡食畏冷者更下。

好大黄末半升，芒消半升，甘草二兩，半夏、黄芩、芫花各一分，搗爲散，藏密器中。欲服，以水八升，煮大棗二十枚，使爛，取四升，去棗，乃内藥五方寸匕攪和，著火上，三上三下，畢，分三服，旦一服便利者，亦可停。若不快，更一服。下後即作酒粥，食二升，次作水飧進之，不可不即食，胃中空虚，得熱入，便煞人矣。

得下後應長將備急大黄、葶藶、豉各一合，杏人、巴豆三十枚，搗，蜜丸如胡豆大，旦服二枚。利者減之，痞者加之。

解散湯方丸散酒甚多，大要在於將冷，及數自下，惟取通利，四體欲常勞動，又不可失食致饑，及餿飯臭魚肉，兼不可熱飲食、厚衣、向火、冒暑遠行，亦不宜過風冷。大都每使於體粗，即便差耳。

治卒上氣咳嗽方第二十三

治卒上氣鳴息便欲絶方。

搗韭絞汁，飲一升許，立愈。

又方，細切桑根白皮三升，生薑三兩，吴茱萸半升，水七升，酒五升，煮三升，盡服之。一升入口，則氣下。

千金不傳方。

又方，茱萸二升，生薑三兩，以水七升，煮取二升，分爲三服。

又方，麻黄四兩，桂、甘草各二兩，杏人五十枚，熬之，搗爲散，温湯服方寸匕，日三。

又方，末人參，服方寸匕，日五六。

氣嗽不問多少時者，服之便差方。

陳橘皮、桂心、杏人去尖皮熬，三物等分，搗，蜜丸，每服飯後須茶湯下二十丸，忌生葱。史侍郎傳。

治卒厥逆上氣，又兩心脅下痛滿

《食療》云：若丹石熱發。

菰根和鯽魚煮作羹食之，三兩頓即便差耳。

淹淹欲絶方，温湯令灼灼爾，以漬兩足及兩手，數易之也。

此謂奔豚病，從卒驚怖憂追得之，氣下縱縱，衝心胸臍間，築築發動，有時不治，煞人。諸方用藥皆多，又必須煞豚，唯有一湯，但可辦耳。

甘草二兩，人參二兩，桂心二兩，茱萸一升，生薑一斤，半夏一升，以水一斗，煮取三升，分三服。此藥宜預蓄，得病便急合之。

又方，麻黄二兩，杏人一兩，熬令黄，搗散，酒服方寸匕，數服之，差。

治卒乏氣，氣不復，報肩息方。

乾薑三兩，吮咀，以酒一升漬之，每服三合，日三服。

又方，度手拇指折度心下，灸三壯，差。

又方，麻黄三兩，先煎去沫，甘草二兩，以水三升，煮取一升半，分三服。此三方，并各小投杯湯，有氣疹者，亦可以藥搗作散，長將服之。多冷者，加乾薑三兩。多痰者，加半夏三兩。

治大走馬及奔趁喘乏，便飲冷水，因得上氣發熱方。

用竹葉三斤，橘皮三兩，以水一斗，煮取三升，去滓，分爲三服，三日一劑，良。

治大熱行極，及食熱餅，竟飲冷水過多，衝咽不即消，仍以發氣，呼吸喘息方。

大黄、乾薑、巴豆等分，末，服半錢匕，若得吐下，即愈。

若猶覺停滯在心胸膈中不利者。

瓜蒂二分，杜衡三分，人參一分，搗篩，以湯服一錢匕，日二三服，效。

治肺痿咳嗽，吐涎沫，心中温温，烟[44]燥而不渴者。

生薑五兩，人參二兩，甘草二兩，大棗十一枚，水三升，煮取一升半，分又方，甘草二兩，以水三升，煮取二升，分一升半，紫苑四合，銅器於湯上煎，可丸，服如杏子大一丸，日可三服。

又方，甘草二兩，生天門冬，搗取汁一斗，酒一斗，飴一升，紫苑四合，銅器於湯上煎，可丸，服如杏子大一丸，日可三服。

又方，甘草二兩，乾薑三兩，棗十二枚，水三升，煮取一升半，分爲再服。

治大走馬及奔趁喘乏，便飲冷水，因得上氣發熱方。

用竹葉三斤，橘皮三兩，以水一斗，煮取三升，去滓，分爲三服，三日一劑，良。

治大熱行極，及食熱餅，竟飲冷水過多，衝咽不即消，仍以發氣，呼吸喘息方。

大黄、乾薑、巴豆等分，末，服半錢匕，若得吐下，即愈。

若猶覺停滯在心胸膈中不利者。

瓜蒂二分，杜衡三分，人參一分，搗篩，以湯服一錢匕，日二三服，效。

治肺痿咳嗽，吐涎沫，心中温温，烟[44]燥而不渴者。

生薑五兩，人參二兩，甘草二兩，大棗十一枚，水三升，煮取一升半，分爲再服。

又方，甘草二兩，以水三升，煮取二升，分一升半，分再服。

又方，生天門冬，搗取汁一斗，酒一斗，飴一升，紫苑四合，銅器於湯上煎，可丸，服如杏子大一丸，日可三服。

又方，甘草二兩，乾薑三兩，棗十二枚，水三升，煮取一升半，分爲再服。

卒得寒冷上氣方。

乾蘇葉三兩，陳橘皮四兩，酒四升，煮取三升，去滓，分爲再服。

治卒得咳嗽方。

丸梧子大，服十四丸。

又方，烏雞一頭，治如食法，以好酒漬之半日，出雞，服酒。一云苦酒一斗，煮白雞，取三升，分三服，食雞肉，則良。

莫與鹽食，則從大椎下第五節下、六節上搗篩，以湯服一錢匕，日二三服，效。

治肺痿咳嗽，吐涎沫，心中温温，烟[44]燥而不渴者。

生薑五兩，人參二兩，甘草二兩，大棗十一枚，水三升，煮取一升半，分爲再服。

又方，甘草二兩，以水三升，煮取二升，分一升半，分再服。

又方，生天門冬，搗取汁一斗，酒一斗，飴一升，紫苑四合，銅器於湯上煎，可丸，服如杏子大一丸，日可三服。

又方，甘草二兩，乾薑三兩，棗十二枚，水三升，煮取一升半，分爲再服。

卒得寒冷上氣方。

乾蘇葉三兩，陳橘皮四兩，酒四升，煮取三升，去滓，分爲再服。

治卒得咳嗽方。

丸梧子大，服十四丸。

又方，烏雞一頭，治如食法，以好酒漬之半日，出雞，服酒。一云苦酒一斗，煮白雞，取三升，分三服，食雞肉，則良。

莫與鹽食，則從大椎下第五節下、六節上空間，灸一處，隨年。并治上氣。

又方，灸兩乳下黑白肉際，各百壯，即愈。亦治上氣。灸胸前對乳一處，須隨年壯也。

又方，桃人三升，去皮，搗，著器

中，密封頭，蒸之一炊，傾出曝乾，絹袋貯，以内二斗酒中六七日，可飲四五合，稍增至一升，吃之。

又方，飴糖六兩，乾薑六兩，末之，豉二兩，先以水一升，煮豉三沸，去滓，内飴糖消，内乾薑，分爲三服。

又方，以飴糖雜生薑屑，蒸三斗米下，食如彈子丸，日夜十度服。

又方，猪腎二枚，細切，乾薑三兩，末，水七升，煮二升，稍稍服，覆取汗。

又方，炙烏心食之，佳。

又方，生薑汁、百部汁和同合煎，再宿，火暖，服一升，日再服。

又方，椒二百粒，搗末之，杏人二百枚，熬之，棗百枚，去核，合搗，令極熟，稍稍合如棗許大，則服之。

又方，生薑三兩，搗取汁，乾薑屑三兩，杏人一升，去皮熬，合搗爲丸，服三丸，日五六服。

又方，芫花一升，水三升，煮取一升，去滓，以棗十四枚，煎令汁盡，一日一食之，三日訖。

又方，熬搗葶藶一兩，乾棗三枚，水三升，先煮棗，取一升，去棗，内葶藶，煎取五合，大人分三服，小兒則分爲四服。

又華佗五嗽丸：炙皂莢、乾薑、桂等分，搗，蜜丸如桐子，服三丸，日三。

又方，錯取松屑一升，桂二分，皂莢二兩，炙，去皮子，搗，蜜丸如桐子大，服十五丸，小兒五丸，日一二服。

又方，屋上白蜆殼，搗末，酒服方寸匕。

又方，末浮散石服，亦蜜丸。

又方，猪脬一具，薄切，以苦酒煮食，令盡，不過二服。

又方，芫花二兩，水二升，煮四沸，去滓，内白糖一斤，服如棗大，勿食鹹酸。亦治久咳嗽者。

治久咳嗽上氣十年二十年，諸藥不差方，猪脬三具，棗百枚，酒三升，漬數日，服三二合，加至四五合，服之不久，差。

又方，生龜一隻，著坎中就溺之，令没，龜死，漬之三日出，燒末，以醇酒一升，和屑如乾飯，頓服之，須臾大吐，嗽囊出則差。小兒可服半升。

又方，生龜三，治如食法，去腸，以水五升，煮取三升，以漬麴釀，秫米四升，如常法熟，飲二升，令盡，此則永斷。

又方，蝙蝠除頭，燒令焦，末，飲服之。

附方

孫真人方：治咳嗽。

皂莢燒研碎二錢匕，豉湯下之。

《十全博救方》：治咳嗽。

天南星一個，大者，炮令裂，爲末，每服一大錢，水一盞，生薑三片，煎至五分，温服，空心、日午、臨卧時各一服。

《簏中方》：治咳嗽含膏丸。

曹州葶藶子　母、貝母各一兩，三物同搗篩，以棗肉半兩，别銷沙糖一兩半，同入藥中，和爲丸，大如彈丸，每服以新綿裹一丸，含之，徐徐嚥津，甚者不過三丸。今醫

亦多用。

崔知悌療久嗽熏法。

每旦取款冬花如鷄子許，少蜜拌細研，湯浸冰[45]餅心爲丸，如粟米大，每服三丸五丸，甘草水服，服後睡良久，又用一瓦碗鑽一孔，孔内安一小竹筒，筆管亦得，其花使潤，内一升鐵鐺中，又用一瓦碗鑽一孔，孔内安一小竹筒，筆管亦得，其筒稍長，作碗鐺相合，及撞筒處，皆麵泥之，勿令漏氣，鐺下著炭，少時款冬烟自從筒出，則口含筒，吸取烟嚥之，如胸中少悶，須舉頭，即將指頭捻筒頭，勿使漏烟氣，吸烟使盡，止。凡如是五日一爲之，待至六日，則飽食羊肉餺飥一頓，永差。

《勝金方》：治久嗽、暴嗽、勞嗽，金粟丸。

葉子雌黄一兩，研細，用紙筋泥固濟，小合子一個令乾，勿令泥厚，將藥入合子内，水調赤石脂封合子口，更以泥封之，候乾，坐合子於地上，上面以末入窖，瓦坯子彈子大，擁合子令作一大子，上用炭十斤，簇定，頂著火一熨斗，籠起，令火從上漸熾，候火消三分去一，看瓦坯通亦，别去火，候冷，開合子取藥，當如鏡面光明紅色，入乳鉢内細研，湯浸冰[45]餅心爲丸，如粟米大，每服三丸五丸，甘草水服，服後睡良久，妙。

《崔元亮海上方》：療嗽單驗方。

取好梨去核，搗取汁一茶碗，著椒四十粒，煎一沸，去滓，即内黑餳一大兩，消訖，細細含嚥，立定。

《楊氏産乳》：療上氣急滿，坐卧不得方。

驚甲一大兩，炙令黄，細搗爲散，取燈心一握，水二升，煎取五合，食前服一錢匕，食後蜜水服一錢匕。

劉禹錫《傳信方》：李亞治一切嗽所，更内一分，杵如膏，又内一分，杵熟止，先食含之，嚥汁。

孟詵云：卒咳嗽。

以梨一顆，刺作五十孔，每孔内以椒一粒，以麵裹，於熱火灰中煨令熟，出停冷，去椒食之。

又方，梨一顆去核，内酥、蜜、麵裹燒令熟，食之。

又方，取梨肉内酥中煎，停冷食之。

又方，搗梨汁一升，酥一兩，蜜一兩，地黄汁一升，緩火煎，細細含嚥。凡治嗽皆須待冷，喘息定後方食，熱食之反傷矣，冷嗽更極不可救，如此者，可作羊肉湯餅飽食之，便卧少時。

《千金方》：治小兒大人咳逆上氣。

杏人三升，去皮尖，炒令黄，杵如膏，蜜一升，分爲三分，内杏人，杵令得服三丸五丸，甘草水服，服後睡良久，妙。

《崔元亮海上方》：療嗽單驗方。

取好梨去核，搗取汁一茶碗，著椒四十粒，煎一沸，去滓，即内黑餳一大兩，消訖，細細含嚥，立定。

《楊氏産乳》：療上氣急滿，坐卧不得方。

驚甲一大兩，炙令黄，細搗爲散，取燈心一握，水二升，煎取五合，食前服一錢匕，食後蜜水服一錢匕。

劉禹錫《傳信方》：李亞治一切嗽所，更内一分，杵如膏，又内一分，杵熟止，先食含之，嚥汁。

孟詵云：卒咳嗽。

以梨一顆，刺作五十孔，每孔内以椒一粒，以麵裹，於熱火灰中煨令熟，出停冷，去椒食之。

又方，梨一顆去核，内酥、蜜、麵裹燒令熟，食之。

又方，取梨肉内酥中煎，停冷食之。

又方，搗梨汁一升，酥一兩，蜜一兩，地黄汁一升，緩火煎，細細含嚥。凡治嗽皆須待冷，喘息定後方食，熱食之反傷矣，冷嗽更極不可救，如此者，可作羊肉湯餅飽食之，便卧少時。

《千金方》：治小兒大人咳逆上氣。

杏人三升，去皮尖，炒令黄，杵如膏，蜜一升，分爲三分，内杏人，杵令得所，更内一分，杵如膏，又内一分，杵熟止，先食含之，嚥汁

馬兜零二兩，只用裏面子，去却殼，酥半兩，入碗内，拌和勻，慢火炒乾，甘草一兩，炙，二味爲末，每服一錢，水一盞，煎六分，温呷。或以藥末含嚥津，亦得。

治痰嗽喘急不定。

桔梗一兩半，搗羅爲散，用童子小便半升，煎取四合，去滓，温服。[46]

楊文蔚治痰嗽利胸膈方。

栝樓肥實大者，割開[47]子净洗，搥破刮皮，細切，焙乾，半夏四十九個，湯洗十遍，槌破，焙，搗羅爲末，用洗栝樓熟水并瓤，同熬成膏，研細爲丸，如梧子大，生薑湯下二十丸。

《深師方》：療久咳逆上氣，體腫短氣脹滿，晝夜倚壁不得卧，常作水鷄聲者，白前湯主之。

白前二[48]兩，紫苑、半夏洗各三兩，大戟七合，切，四物以水一斗，漬一宿，明日煮取三升，分三服。禁食羊肉、餳，大佳。

《梅師方》：治久患嗄呷咳嗽，喉中作聲不得眠。取白前搗爲末，温酒調二錢匕服。

又方，治上氣咳嗽，呷呀息氣，喉中作聲唾黏。以藍實葉水浸良久，搗絞取汁一升，空腹頓服，須臾，以杏人研取汁，煮粥食之，一兩日將息，依前法更服，吐痰盡方差。

《兵部手集》：治小兒大人咳逆短氣，胸中吸吸，咳出涕唾，嗽出臭膿涕舌咽乾，又不可服凉藥。

好黄耆四兩，甘草一兩，爲末，每服三錢，如茶點羹粥中，亦可服。

《杜壬方》：治上焦有熱，口舌咽中生瘡，嗽有膿血。桔梗一兩，甘草二兩，右爲末，每服二錢，水一盞，煎六分，去滓，温服，食後細呷之。亦治肺壅。

《經驗方》：治咳嗽甚者，或有吐血，吐血。

人參好者，搗爲末，每服三錢匕，雞子清調之，五更初服便睡，去枕仰卧，只一服愈。年深者，再服。忌腥、鹹、鮓、醬、麵等，并勿過醉飽，將息佳。

《經驗後方》：定喘化涎。

猪蹄甲四十九個，净洗控乾，每個上黄皮，剉細，入糯米四兩，焙乾，一處搗爲末，與服，米飲調下一兩錢。

《斗門方》治肺破出血，忽嗽血不止者。

用海犀膏一大片，於火上炙令焦黄色，後以酥塗之，又炙再塗，令通透。

可碾爲末用，湯化三大錢匕，放令服之，即血止。水膠是也，大驗。

《食醫心鏡》：主上氣咳嗽，胸膈痞滿氣喘。

桃人三兩，去皮尖，以水一升，研取汁，和粳米二合，煮粥食之。

又，治一切肺病，咳嗽膿血不止。好酥五斤，熔三遍，停取凝，當出醍醐，咫[49]一合差。

又主[50]積年上氣咳嗽，多痰喘促，唾膿血。以蘿卜子一合，研，煎湯，食上服之。

治卒身面腫滿方第二[51]十四

治卒腫滿，身面皆洪大方。

大鯉一頭，醇酒三升，煮之令酒乾盡，乃食之，勿用醋及鹽豉他物雜也，不過三兩服。差。

又方，灸足內踝下白肉，三壯，差。

又方，大豆一斗，熟煮，漉，飲汁及食豆，不過數度必愈，小豆尤佳。

又方，取鷄子黃白[52]相和，塗腫處，乾復塗之。

又方，杏葉剉，煮令濃，及熱漬之。亦可服之。

又方，車下李核中人十枚，研令熟，粳米三合，研，以水四升，煮作粥，令得二升，服之，三作加核也。

又方，大豆一升，以水五升，煮二升，去豆，內酒八升，更煮九升，分三四服，腫差後渴，愼不可多飲。

又方，鯉魚一頭，重五斤者，以水二斗，煮取斗半，去魚，澤漆五兩，茯苓三兩，桑根小皮切三升，澤瀉五兩，又煮取四升，分四服。服之小便當利，漸消也。

又方，皂莢剥炙令黃，剉三升，酒一斗漬，石[53]器煮令沸，服一升，日三服，盡更作。

若腫偏有所起處者。

以水和灰以塗之，燥復更塗。

又方，赤豆、麻子合搗，以傅腫上。

又方，水煮巴豆，以布沾以拭之。

又方，切章陸二升，以酒三升，漬三宿，服五合至一升，日三服之。凡此滿，或是虛氣，或是風冷氣，或是水飲氣，此方皆治之。

治腫入腹，苦滿急，害飲食方。

大戟、烏翅末各二兩，搗篩，蜜和丸，丸如桐子大，旦服二丸，當下漸退，更取令消，乃止之。

又方，葶藶子十兩，椒目三兩，□[53]子□[54]，服十丸，日三服。

又方，鯉魚一頭，重五斤者，以水二斗，煮取斗半，去魚，澤漆五兩，茯苓三兩，吳茱萸二兩，搗，蜜和丸如桐

勿近目及陰，療身體暴腫[57]如吹者。

若但是腫者。

剉葱，煮令爛以漬之，日二[58]四度。

又方，兔絲子一升，酒五升，漬二三宿，服一升，日三服，差。

若腫從脚起，稍上進者，入腹則煞人，治之方，小豆一斛，煮令極爛得四五斗汁，温以漬膝已下，日二爲之，數日消盡。若已入腹者，不復漬，但煮小豆食之，莫雜吃飯及魚、鹽，又專飲小豆汁。無小豆，大豆亦可用。如此之病，十死一生，急救之。

又方，削楯或桐木，煮取汁以漬之，并飲少許。加小豆妙。

又方，生猪肝一具，細切，頓食之，勿與鹽乃可，用苦酒，妙。

又方，煮豉汁飲，以滓傅脚。

附方

《備急方》：療身體暴腫滿。

榆皮搗屑，隨多少雜米作粥食，小便利。

《楊氏産乳》：療通體遍身腫，小便不利。

猪苓五兩，搗篩，煎水三合，調服方寸匕，加至二匕。

《食醫心鏡》：主[59]氣喘促，浮腫小便澀。

杏人一兩，去尖皮，熬，研，和米煮粥極熟，空心吃二合。

葛仙翁肘後備急方卷之三

---

❶漬：原作『清』，據萬曆本改。
❷道：萬曆本作『數』。
❸半：原作『畢』，據萬曆本改。
❹昃：原作『具』，據萬曆本改。
❺丸：原作『九』，據萬曆本改。
❻日二：萬曆本作『日三』。
❼遥：萬曆本作『逐』。
❽茯：原作『蔡』，據萬曆本改。
❾苓：原作『茶』，據萬曆本改。
❿桂：原作『林』，據萬曆本改。
⓫四：原作『曰』，據萬曆本改。
⓬末：原作『木』，據萬曆本改。
⓭汁：原作『升』，據萬曆本改。
⓮卧：原作『時』，據萬曆本改。
⓯鷄：原作『鴯』，據萬曆本改。
⓰塗：原作『淦』，據萬曆本改。
⓱汁：原『汗』，據萬曆本改。
⓲已：萬曆本作『匕』。
⓳汗：原作『源』，據萬曆本改。
⓴漬：原作『稹』，據萬曆本改。
㉑狸：原作『稭』，據萬曆本改。
㉒目：原作『日』，據萬曆本改。
㉓炒微褐：原作『妙微碭』，據萬曆本改。
㉔搗爲末：原作『搗搗末』，據萬曆本改。
㉕自：此下萬曆本有『梳頭』二字。
㉖較：據文義當作『效』。
㉗杏：原作『杳』，據文義改。
㉘及：萬曆本作『又』。
㉙主：原作『王』，據萬曆本改。
㉚主：原作『王』，據萬曆本改。
㉛每：原作『毋』，據萬曆本改。
㉜同：原作『洞』，據萬曆本改。
㉝酒：原作『天』，據萬曆本改。
㉞外：原作『内』，據文義改。
㉟久：原作『父』，據萬曆本改。
㊱宇：萬曆本作『半』。
㊲效：萬曆本作『數』。
㊳漬：原作『清』，據萬曆本改。
㊴令：原作『合』，據萬曆本改。
㊵府：原作『庵』，據萬曆本改。
㊶主：原作『王』，據萬曆本改。
㊷飽：萬曆本作『碗』。
㊸困：原作『因』，據目録及萬曆本改。
㊹烟：疑當作『咽』。
㊺冰：萬曆本作『蒸』。
㊻温：原作『遏』，據萬曆本改。
㊼開：原作『聞』，據萬曆本改。

㊽二：原作『又』，據萬曆本改。
㊾咫：萬曆本作『服』。
㊿又主：原作『人王』，據萬曆本改。
(51)二：原作『一』，據目録及萬曆本改。
(52)白：原作『曰』，據萬曆本改。
(53)□：萬曆本作『茯』。
(54)□：萬曆本作『大』。
(55)石：原作『不』，據萬曆本改。
(56)皮：原作『及』，據萬曆本改。
(57)腫：原作『服』，據萬曆本改。
(58)二：萬曆本作『三』。
(59)主：原作『王』，據萬曆本改。

葛仙翁肘後備急方卷之四

治卒大腹水病方第二十五

水病之初，先目上腫起如老蠶，色俠頭脉動，股裏冷，脛中滿，按之没指，腹内轉側有節聲，此其候也。不即治，須臾體稍腫，肚盡脹。按之隨手起，則病已成，猶可爲治，此皆從虚損大病，或下痢後，婦人産後，飲水不即消，三焦受病，小便不利，乃相結漸漸生聚，遂流諸經絡故也。治之方：

葶藶一升，熬，搗之於臼上，割生雄鶵鷄，合血共頭，共搗萬杵，服如梧子五丸，稍加至十丸，勿食鹽。常食小豆飯，飲小豆汁，鱧魚佳也。

又方，防風、甘草、葶藶各一兩，搗，苦酒和丸，如梧子大三丸，日三服，常服之，取消平乃止。

又方，雄黄六分，麝香三分，甘遂、芫花、人參各二分，搗，蜜和丸，服如豆大二丸，加至四丸，即差。

又方，但以春酒五升，漬葶藶子二升，隔宿，稍服一合，小便當利。

又方，葶藶一兩，杏人二十枚，并熬黄色，搗，分十服，小便去，立差。

又方，《胡洽》水銀丸，大治水腫，利小便。姚同。葶藶、椒目各一升，芒消六兩，水銀十兩，水煮水銀三日三夜，乃以合搗六萬杵，自相和丸，服如大豆丸，日三服，日增一丸，至十丸，更從一起，差後，食牛羊肉自補，稍稍飲之。

又方，多取柯枝皮剉，濃煮煎，令可丸，服如梧子大三丸，須臾，又一丸，當下水，後將服三丸，日三服。此樹一名木奴，南人用作船。

又方，真蘇合香、水銀、白粉等分，蜜丸，服如大豆二丸，日三，當下水，節飲好自養。無蘇合，可闕之也。

又方，取草麻繩熟者二十枚，去皮，研之，水解得三合，日一服，至日中許，當吐下，諸水汁結裹。若不盡，三日後更服三十枚，猶未盡，更復作。差後，節飲及鹹物等。

又方，小豆一升，白鷄一頭，治如食法，以水三斗，煮熟，食滓飲汁，稍相令盡。

又方，取青雄鴨，以水五升，煮取飲汁一升，稍稍飲，令盡，厚覆之，取汗❶，佳。

又方，取胡燕卵中黄，頓吞十枚。

又方，取蛤螻炙令熟，日食十個。

又方，若唯腹大動摇水聲，皮膚黑，名曰水蠱。巴豆九十枚，去皮心，杏人六十枚，去皮尖，并熬令黄，搗，和之，服如小豆大一枚，以水下爲度，勿飲酒，佳。

又方，鬼扇細搗絞汁，服如鷄子，即下水，更復取水蠱。若湯研麻子汁飲之。

又方，慈彌草三十斤，子三石，煮取一石，去滓，更湯上煎，令可丸，服如皂莢子，三九至五六丸，水隨小便去，即飲糜粥養之。

又方，白茅根一大把，小豆三升，水三升，煮取干，去茅根，食豆，水隨小便下。

又方，鼠尾草、馬鞭草各十斤，水一石，煮取五斗，去滓更煎，以粉和爲丸，服如大豆大二丸，加至四五丸。禁肥肉、生冷，勿食。

腫滿者，白椹樹白皮一握，水二升，煮取五合，白檳榔大者二枚，末之，内更煎三五沸，湯成，下少許紅雪，服之。

又，將服牛溺、章陸、羊肉臛及香柔煎等，在腫滿條中。其十水丸諸大方，在別卷。若止皮膚水，腹内未有者，服諸發汗藥，得汗便差，然慎護風寒爲急。若唯腹大，下之不去，便針臍下二寸，入數分令水出，孔合須腹減乃止。

附方

李絳《兵部手集方》：療水病，無問年月深淺，雖復脉惡，亦主之。

大戟、當歸、橘皮各一大兩，切，以水一大升，煮取七合，頓服，利水二三斗，勿恠至重，不過再服便差。禁毒食一年，水下後更服，永不作。此方出張尚客。

《外臺秘要》：治水氣。

章陸根白者去皮，切如小豆許一大盞，以水三升，煮取一升，已上爛，即取粟米一大盞，煮成粥，仍空心服。若一日兩度服，即恐利多，每日服一頓即微利，不得雜食。

又，療水病腫。

鯉魚一頭極大者，去頭尾及骨，唯取肉，以水二斗，赤小豆❷一大升，和魚肉煮，可取二升，已上汁生，布絞去滓，頓服盡，如不能盡，分爲二服，後服温令暖。服訖當下利，利盡即差。

又方，卒患腫滿，曾有人忽脚胅腫，漸上至膝，足不可踐地，至大水頭面，遍身大腫脹滿，苦瓠白瓤實，捻如大豆粒，以麵裹煮一沸，空心服七枚，至午當出水一斗，三日水自出不止，大瘦乃差，三年内慎口味也。苦瓠須好者，無靨翳細理妍净者，不爾有毒不用。

《聖惠方》：治十種水不差垂死。

用猪肉半斤，切，粳米三合，水三升，葱、椒、薑、豉作粥食之。

又方，治十種水病，腫滿喘促不得卧。

以螻蛄五枚，乾爲末，食前湯調半錢匕至一錢，小便通，效。

《食醫心鏡》：治十種水病不差垂死。

青頭鴨一隻，治如食法，細切，和米并五味，煮令極熟作粥，空腹食之。

又方，主水氣脹滿浮腫，小便澀少。

白鴨一隻，去毛腸洗饋，飯半升，以飯、薑、椒釀鴨腹中，縫定，如法蒸，候熟食之。

《楊氏産乳》：療身體腫滿，水氣急，卧不得。

郁李人一大合，搗爲末，和麥麪，搜作餅子，與吃入口，即大便通利氣，便差。

《梅師方》：治水腫，坐卧不得，頭面身體悉腫。

取東引花桑枝，燒灰淋汁，煮赤小豆，空心食，令飽，饑即食盡，不得吃飯。

又方，治水腫，小便澀。

黄牛尿飲一升，日至夜小便利，差。勿食鹽。

又方，治心下有水。

白术三兩，澤瀉五兩，剉，以水三升，煎取一升半，分服。

《千金翼》：治小便不利，膀胱水氣流滯。

以浮萍日乾，末，服方寸匕，日一二服良。

《經驗方》：河東裴氏傳經效，治水腫及暴腫。

葶藶三兩，炒杵六千下，令如泥，即下漢防己末四兩，取緑頭鴨就藥臼中截頭，瀝血於臼中，血盡，和鴨頭更搗五千下，丸如梧桐子，患甚者，空腹白湯下十丸，稍可者五丸，頻服，五日止。此藥利小便，有效如神。

《韋宙獨行方》：療水腫，從脚起，入腹則殺人。

用赤小豆一斗，煮令極爛，取汁四五升，温漬膝以下。若以入腹，但服小豆，勿雜食，亦愈。此灰入染絳，用葉中釀酒也。

李絳《兵部手集方》亦著此法，云曾得效。

治卒心腹癥堅方第二十六

治卒暴癥，腹中有物如石，痛如刺，晝夜啼呼，不治之，百日死。方：

牛膝二斤，以酒一斗漬，以密❸封於熱灰火中，温令味出，服五合至一升，量力服之。

又方，用葫藶根亦如此，尤良。

姚云：牛膝洒酒，神驗也。

又方，多取當陸根搗蒸之，以新布藉腹上，藥披著布上，勿腹上，冷復之，晝夜勿息。

又方，五月五日，葫十斤，去皮，桂一尺二寸，竈中黄土如鴨子一枚，合搗，以苦酒和塗，以布搭病，不過三，差。

又方，取橉木燒爲灰，淋取汁八升，以釀一斛米，酒成服之，從半合始，不知，稍稍增至一二升，不盡一劑皆愈。此灰入染絳，用葉中釀酒也。橉，直

忍切。

凡癥堅之起，多以漸生，如有卒覺，便牢大，自難治也。腹中癥有結積，便害飲食，轉羸瘦，治之多用陷冰、玉壺、八毒諸大藥，今止取小易得者。

取虎杖根，勿令影臨水上者，可得石餘，杵熟煮汁，可丸，以秫米五六升，炊飯內，日中塗藥後可飯，取差。

又方，亦可取根一升，搗千杵，酒漬之，從少起，日三服。此酒治癥，乃勝諸大藥。

又方，蠶矢一石，桑柴燒灰，以水淋之五度，取生鱉長一尺者，內中煮之爛熟，去骨細擘，剉，更煎，令可丸，丸如梧子大，一服七丸，日三。

又方，射罔二兩，椒三百粒，搗末，雞子白和爲丸，如大麻子，服一丸，漸至如大豆大，一丸至三丸爲度。

又方，大猪心一枚，破頭去血，搗末，雄黃、麝香當門子五枚，巴豆百枚，去心皮生用，心縫，以好酒於小銅器中煎之，令心没欲歇，隨益盡三升，當糜爛，煎令可丸如麻子，服三丸，日三服。酒盡不糜者，出搗蜜丸之，良。又大黃末半斤，朴消三兩，蜜一斤，合於湯上煎，可丸如梧子，服十丸，日三服之。

治鱉癥伏在心下，手揣見頭足，時時轉者。

白雌鷄一雙，絶食一宿，明旦膏煎飯飼之，取其矢，無問多少，於銅器中以溺和之，火上敷，可搗末，服方寸匕，日四五服，須消盡乃止，常飼鷄取矢，差畢，煞鷄單食之。亦治心下有物，大如杯，不得食者。

治婦人臍下結物大如杯升，月經不通，發作往來，下痢羸瘦，此爲氣瘕，按之若牢强，肉癥者，不可治，未者可治。

末乾漆一斤，生地黃三十斤，搗，絞取汁，火煎乾漆令可丸，食後服，如梧子大三丸，日三服，即差。

治兩脅下有氣結者。

狼毒二兩，旋覆花一兩，附子二兩，炮之，搗篩，蜜和丸，服如梧子大二丸，稍加至三丸，日三服。

附方

《外臺秘要方》：療心腹宿癥，卒得癥。

取朱砂細研，搜飯令朱多，以雄鷄一隻，先餓三日，後以朱飯飼之，著鷄深二三寸，作大火炷六七枚，燃之令膏暖，重紙覆癥上，以器熨之，晝夜勿息，膏盡更益也。

又方，茱萸三升，碎之，以酒和煮，令熟布帛物裹以熨癥上，冷更均番用之，癥當移去，復逐熨，須臾消止。亦可用好□□□□茱萸末，以鷄子白和射菌服之。

又方，竈中黃土一升，先搗葫熟，內上復搗，以苦酒澆令浥涓，先以塗布一面❺仍搭病上，以塗布上，乾復易之，取令消止，差。

治婦人臍下結物大如杯升，月經不通，發作往來，下痢羸瘦，此爲氣瘕，按之若牢强，肉癥者，不可治，未者可治。

末乾漆一斤，生地黃三十斤，搗，絞取汁，火煎乾漆令可丸，食後服，如梧子大三丸，日三服，即差。

附方

《外臺秘要方》：療心腹宿癥，卒得癥。

取朱砂細研，搜飯令朱多，以雄鷄一隻，先餓三日，後以朱飯飼之，著鷄深二三寸，作大火炷六七枚，燃之令膏暖，重紙覆癥上，以器熨之，晝夜勿息，曝燥爲末，温清酒服

方寸匕至二錢，日三服，若病困者，晝夜可六服。一鷄少，更飼一鷄，取足服之，俟愈即止。

又，療食魚肉等成癥結在腹，并諸毒氣方。

狗糞五升，燒末之，綿裹，酒五升，漬再宿，取清分十服，日再，已後日三服，使盡，隨所食癥結即便出矣。

《千金方》：治食魚鱠及用生肉，住胸膈不化，必成癥瘕。

搗馬鞭草汁飲之一升，生薑水亦得，即消❻。

又方，治肉癥思肉不已，食訖復不出即死。

思。

白馬尿三升，空心飲，當吐肉，肉

治心腹寒冷食飲積聚結癖方第二十七

治腹中冷癖，水穀癥結，心下停痰，兩脅痞滿，按之鳴轉，逆害飲食。

取大蟾蜍一枚，去皮及腹中物，支解之，芒消大人一升，中人七合，瘦弱人五合，以水六升，煮取四升，一服一升，二服後未得下，更一升，得下，則九日十日一作。

又方，茱萸八兩，消石一升，生薑一斤，以酒五升，合煮，取四升，先服一服一升，不痛者止，勿再服之，下病後，好將養之。

又方，大黃八兩，蓴蘑四兩，并熬，芒消四兩，熬令汁盡，熟搗，蜜和丸，丸如梧子大，食後服三丸，稍增五丸。

又方，狼毒三兩，附子一兩，旋覆花三兩，搗蜜丸服，如梧子大，食前三丸，日三服。

又方，巴豆三十枚，去心，杏人二十枚，并熬，桔梗六分，藜蘆四分，皂莢三分，并炙之，搗，蜜和丸如胡豆大，未食服一丸，日二。欲下病者，服二丸，長將息，百日都好，差。

又方，貝母二兩，桔梗二兩，礬石一兩，巴豆一兩，去心皮生用，搗千杵，蜜和丸如梧子，一服二丸，病後少少減

髮。

《勝金方》：治膜外氣及氣塊方。

延胡索不限多少，爲末，猪胰一具，切作塊子，炙熟，蘸藥末食之。

丸，日三服。

又方，巴豆三十枚，去心，杏人二十枚，并熬，桔梗六分，藜蘆四分，皂莢三分，并炙之，搗，蜜和丸如胡豆大，未食服一丸，日二。欲下病者，服二丸，長將息，百日都好，差。

又方，茱萸八兩，消石一升，生薑一斤，以酒五升，合煮，取四升，先服一服一升，不痛者止，勿再服之，下病後，好將養之。

又方，大黃八兩，蓴蘑四兩，并熬，芒消四兩，熬令汁盡，熟搗，蜜和丸，丸如梧子大，食後服三丸，稍增五丸。

又方，狼毒三兩，附子一兩，旋覆花三兩，搗蜜丸服，如梧子大，食前三丸，日三服。

又方，巴豆三十枚，去心，杏人二十枚，并熬，桔梗六分，藜蘆四分，皂莢三分，并炙之，搗，蜜和丸如胡豆大，未食服一丸，日二。欲下病者，服二丸，長將息，百日都好，差。

又方，貝母二兩，桔梗二兩，礬石一兩，巴豆一兩，去心皮生用，搗千杵，蜜和丸如梧子，一服二丸，病後少少減

解之，芒消大人一升，中人七合，瘦弱人五合，以水六升，煮取四升，一服一升，二服後未得下，更一升，得下，則九日十日一作。

又方，茱萸八兩，消石一升，生薑一斤，以酒五升，合煮，取四升，先服一服一升，不痛者止，勿再服之，下病後，好將養之。

又方，大黃八兩，蓴蘑四兩，并熬，芒消四兩，熬令汁盡，熟搗，蜜和丸，丸如梧子大，食後服三丸，稍增五丸。

又方，狼毒三兩，附子一兩，旋覆

丸，當吐利。吐利不盡，更服二丸。

服四神丸下之，亦佳。

中候黑丸，治諸癖結痰癊第一良。

桔梗四分，桂四分，巴豆八分，去心皮，杏人五分，去皮，芫花十二分，并熬令紫色，先搗三味藥成末，又搗巴豆、杏人如膏，合和又搗二千杵，丸如胡豆大，服一丸，取利，至二三丸。兒生十日欲癇，皆與一二丸如粟粒大，諸腹内不便，體中覺患，便服，得一兩行利則好也。

硫黄丸，至熱，治人之大冷，夏月温飲食，不解衣者。

硫黄、礬石、乾薑、茱萸、桂、烏頭、附子、椒、人參、細辛、皂莢、當歸，十二種分等，隨人多少，搗，蜜丸，如梧子大，一服十丸至二十丸，日三服。若冷痢者，加赤石脂、龍骨，即便愈也。

露宿丸，治大寒冷積聚方。

礬石、乾薑、桂、桔梗、附子炮、皂莢各三兩，搗篩，蜜丸，如梧子大，酒下十丸，加至一十五丸。

附方

《外臺秘要》：療癖方。

大黄十兩，杵，篩，醋三升，和勻，白蜜兩匙，煎堪丸，如梧桐子大，一服三十丸，生薑湯吞下，以利爲度，小者減之。

《聖惠方》：治伏梁氣在心下，結聚不散。

用桃奴二兩，爲末，空心温酒調二三升，須臾適吐，適吐畢又暖，飲盡二三升，須臾吐膽乃止，不即差。

但單煮米作濃飲二三升許，適冷飲，如此數過，劇者，須臾吐膽乃止，不損人而即差。

治胸中多痰，頭痛不欲食及飲酒，則瘀阻痰方。

常山二兩，甘草一兩，松蘿一兩，水半，初服七合，取吐，吐不盡，餘更分二服，後可服半夏湯。

治胸膈上痰癊諸方第二十八

治卒頭痛如破，非中冷，又非中風方。

釜月下墨四分，附子三分，桂一分，搗篩，以冷水服方寸匕，當吐。一方無桂。

又方，苦參、桂、半夏等分，搗下篩，苦酒和以塗，痛則差。

又方，烏梅三十枚，鹽三指撮，酒三升，煮取一升，去滓，頓服，當吐，愈。

此本在雜治中，其病是胸中膈上，痰厥氣上衝所致，名爲厥，頭痛，吐之即差。

又方，杜蘅三兩，松蘿三兩，瓜蒂一兩，赤小豆四兩，搗

末，温湯三合和服，便安卧，欲擿之，不吐，更服之。

又方，先作一升湯，投水一升，名爲生熟湯，及食三合鹽，以此湯送之，須臾欲吐，便擿出，未盡，更服二合，飲湯二升後，亦可更服湯，不復吐也。

又方，常山四兩，甘草半兩，水七升，煮取三升，内半升蜜，服一升，不吐更服，無蜜亦可。

方中能月服一種，則無痰水之患。又有旋覆五飲，在諸大方中。若胸中痞寒❾短氣膈者。膈，敷逼切。

甘草二兩，茯苓三兩，杏人五十枚，碎之，水一斗三升，煮取六升，分爲五服。

又方，桂四兩，朮、甘草二兩，附子炮，水六升，煮取三升，分爲三服。

膈中有結積，覺駭駭不去者。

藜蘆一兩，炙，末之，巴豆半兩，去皮心熬之，先搗巴豆如泥，入藜蘆末，又搗萬杵，蜜丸如麻子大，服一丸至二三丸。

膈中之病，名曰膏肓，湯丸徑過，針灸不及，所以作丸含之，令氣勢得相熏染，有五膈丸方。麥門冬十分，去心，甘草十分，炙，椒、遠志、附子炮、乾薑、人參、桂、細辛各六分，搗篩，以上好蜜丸，如彈丸，以一丸含稍稍嚥其汁，日三丸，服之，主短氣，心胸滿，心下堅，冷氣也。

此疾有十許方，率皆相類。此丸最勝，用藥雖多，不合五膈之名，謂憂膈、氣膈、恚膈、寒膈，其病各有診別，在大方中又有七氣方，大約與此大同小別耳。

附方

《聖惠方》：治痰厥頭痛。

以烏梅十個，取肉，鹽二錢，酒一中盞，合煎至七分，去滓，非時温服，吐即佳。

又方，治冷痰飲惡心。

用藭撥一兩，搗爲末，於食前用清粥飲調半錢服。

又方，治痰壅嘔逆，心胸滿悶不下食。

用厚朴一兩，塗生薑汁，炙令黄，爲末，非時粥飲調下二錢匕。

《千金翼》論曰：治痰飲吐水，無時節者，其源以冷飲過度，遂令脾胃氣羸，不能消於飲食，飲食入胃，則皆變成冷水，反吐不停者。

赤石脂散主之。

赤石脂一斤，搗篩，服方寸匕，酒飲自任，稍稍加至三匕，服盡一斤，則終身不吐淡水，又不下痢，補五藏，令人肥健。有人痰飲服諸藥不效，用此方遂愈。

《御藥院方》：真宗賜高祖相國，去痰清目，進飲食，生犀丸。

川芎十兩，緊小者，粟米泔浸，三日換，切片子，日乾爲末，作兩料，每料入麝、腦各一分，生犀半兩，重湯煮，蜜杵爲丸，小彈子大，茶酒嚼下一丸。痰加朱砂半兩；膈壅加牛黄一分、水飛鐵粉一分；頭目昏眩加細辛一分；口眼喎斜，炮天南星一分。

又方，治膈壅風痰。

半夏不計多少，酸漿浸一宿，温湯洗五七遍，去惡氣，日中曬乾，搗爲末，

漿水搜餅子，日中乾之，再爲末，每五兩，入生腦子一錢，研匀，以漿水濃脚，丸鷄頭大⑩，紗袋貯，通風處陰乾，每一丸，好茶或薄荷湯下。

王氏《博濟》：治三焦氣不順，胸膈壅塞，頭昏目眩，涕唾痰涎，精神不爽。

利膈丸：牽牛子四兩，半生半熟，不虫皂莢塗酥二兩，爲末，生薑自然汁煮，糊丸如桐子大，每服二十丸，荆芥湯下。

《經驗後方》：治頭風化痰。

川芎不計分兩，用淨水洗浸，薄切片子，日乾或焙，杵爲末，煉蜜爲丸，如小彈子大，不拘時，茶酒嚼下。

又方，治風痰。

鬱金一分，藜蘆十分，各爲末，和令匀，每服一字，用温漿水一盞，先以少漿水調下⑪，餘者水漱口，都服便以食壓之。

《外臺秘要》：治一切風痰，風霍亂，食不消，大便澼。

訶梨勒三枚，搗取末，和酒頓服三五度，良。

《勝金方》：治風痰。

白僵蠶七個，直者，細研，以薑汁一茶脚，温水調灌之。

又方，治風痰。

以蘿蔔子爲末，温水調下一服。

又方，搗栝樓實大者一枚，切，薤白半升，以白酒七升，煮取二升，分再服，亦可加半夏四兩，湯洗去滑，則用之。

又方，橘皮半斤，枳實四枚，生薑半斤，水四升，煮取二升，分再服。

又方，枳實、桂等分，搗末，橘皮湯下方寸匕，日三服。

仲景方，神效。

又方，桂、烏喙、乾薑各一分，人參、細辛、茱萸各二分，貝母二分，合搗，蜜和丸，如小豆大，一服三丸，日三服之。

若已差復發者。

下韭根五斤，搗絞取汁，飲之愈。

附方

杜壬治胸膈痛徹背心，腹痞滿氣

治卒患胸痹痛方第二十九

胸痹之病，令人心中堅痞忽痛，肌中苦痹，絞急如刺，不得俛⑫仰，其胸前皮皆痛，不得手犯，胸滿短氣，咳嗽引痛，煩悶自汗出，或徹引背膂，不即治

不得通，及治疾噦。

大栝樓，去瓤，取子熟炒，別研，和子皮，麵糊爲丸，如梧桐子大，米飲下十五丸。

治卒胃反嘔噦方第三十

葛氏治卒乾嘔不息方。

破鷄子去白，吞中黄數枚，即愈也。

又方，搗葛根，絞取汁，服一升許。

又方，一云蔗汁温令熱服一升，日三。一方，生薑汁服一升。

又方，灸兩腕後兩筋中一穴，名間使，各七壯，灸心主尺澤亦佳。

又方，甘草、人參各二兩，生薑四兩，水六升，煮取二升，分爲三服。

治卒嘔噦又厥逆方。

用生薑半斤，去皮切之，橘皮四兩，擘之，以水七升，煮三升，去滓，適寒温，服一升，日三服。

又方，蘡薁藤斷之，當汁出，器承取，飲一升。生葛藤尤佳。

治卒噦不止方。

飲新汲井水數升，甚良。

又方，痛爪眉中夾間氣也。

又方，以物刺鼻中各一分來許，皂莢内鼻中令嚏，差。

又方，但閉氣仰引之。

又方，好豉二升，煮取汁服之也。

又方，香蘇激⑭煮汁，頭⑮服一二升，良。

又方，粢米三升，爲粉，井花水服之，良。

又方，用枇杷葉一斤，拭去毛，炙，水一斗，煮取三升。服蘆根亦佳。

治食後喜嘔吐者。

燒鹿角灰二兩，人參一兩，豉半升，米飲不已方。

治人忽惡心不已方，主嘔噦穀不得下，眩悸，半夏三升，人參三兩，白蜜一升，以水一斗二升，煎，揚之一百二十遍，煮下三升半，温服一升，日再。亦治膈間痰飲。

又方，半夏三升，生薑半斤，茯苓三兩，大黄四兩，甘草二兩，水二升，煮取一升半，分爲再服之。

治人食畢噫醋，及醋心方。

人參一兩，茱萸半斤，生薑六兩，大棗十二枚，水六升，煮取二升，分爲再服也。

噦不止，半夏洗，乾末之，服一匕，則立止。

又方，乾薑六分，附子四分，炮，搗，苦酒丸如梧子，服三丸，日三效。

附方

張仲景方：治反胃嘔吐，大半夏湯。

半夏三升，人參三兩，白蜜一升，以水一斗二升，煎，揚之一百二十遍，煮下三升半，温服一升，日再。亦治膈間痰飲。

又方，主嘔噦穀不得下，眩悸，半夏加茯苓湯。

半夏一升，生薑半斤，茯苓三兩，三升，煮取一升半，分爲三服。

又方，但多嚼豆蔻子及咬檳榔，亦佳。

《千金方》：治反胃，食即吐。

搗粟米作粉，和水丸，如梧子大七

枚，爛煮，内醋中細吞之，得下便已。麵亦得用之。

又方，治乾嘔，若手足厥冷，宜食生薑。此是嘔家聖藥。

治心下痞堅不能食，胸中嘔噦。生薑八兩，細切，以水三升，煮取一升，半夏五合，洗去滑，以水五升，煮取一升，二味合煮，取一升半，稍稍服之。

又方，主乾嘔。

取羊乳一杯，空心飲之。

《斗門方》：治翻胃。

用附子一個，最大者，坐於磚上，四面著火，漸逼碎，入生薑自然汁中，又依前火逼乾，復淬之，約生薑汁盡，盡半碗許，搗羅爲末，用粟米飲下一錢，不過三服，差。

《經驗方》：治嘔逆反胃散。

大附子一個，生薑一斤，細剉，煮，研如麵糊，米飲下之。

又方，治丈夫婦人吐逆，連日不止，粥食湯藥不能下者，可以應用此候效摩丸。

五靈脂，不夾土石，揀精好者，不計多少，搗羅爲末，研，狗膽汁和爲丸，如鷄頭大，每服一丸，煎熱生薑酒摩令極細，更以少生薑酒化以湯，湯藥令極熱，須是先做下粥，温熱得所，左手與患人藥吃，不得嗽口，右手急將粥與患人吃，不令太多。

又方，碧霞丹，治吐逆立效。

北來黄丹四兩，篩過，用好米醋半升，同藥入銚内。煎令乾，却用炭火三秤，就銚内煅透紅，冷，取研細爲末，用粟米飯丸，如桐子大，煎酵湯下七丸，不嚼，只一服。

孫真人《食忌》：治嘔吐。

以白檳榔一顆，煨，橘皮一分，炙，爲末，水一盞，煎半盞服。

《廣濟方》：治嘔逆不能食。

訶梨勒皮二兩，去核，熬，爲末，蜜和丸如梧桐子大，空心服二十丸，日二服。

《食醫心鏡》：主脾胃氣弱，食不消化，嘔逆反胃，湯飲不下。

粟米半升，杵細，水和丸如梧子大，煮令熟，點少鹽，空心和汁吞下。

《金匱玉函方》：治五噎心膈氣滯，煩悶吐逆不下食。

蘆根五兩，剉，以水三大盞，煮取二盞，去滓，不計時温服。

《外臺秘要》：治反胃，昔幼年經患此疾，每服食餅及羹粥等，須臾吐出，貞觀許奉御兄弟及柴、蔣等家，時稱名醫，奉敕令治，罄竭各人所長，竟不能療，漸羸憊，候絶朝夕，忽有一衛士云：服驢小便極驗。旦服二合，後食唯吐一半，晡時又服二合，人定時，食粥，吐即便定，迄至今日午時奏之，大内中，五六人患反胃，同服，一時俱差。此藥稍有毒，服時不可過多，承取尿，及熱服二合，病深七日以來服之良。後來療人，并差。

又方，治嘔。

麻仁三兩，杵，熬，以水研取汁，著少鹽吃，立效。李諫議用極妙。

又方，治丈夫婦人吐逆，連日不止，連咳四五十聲者。

取生薑汁半合，蜜一匙頭，煎令

熟，温服，如此三服，立效。

又方，治咳噫。

生薑四兩，爛搗，入蘭香葉二兩，椒末一錢匕，鹽和麵四兩，裹作燒餅熟煨，空心吃，不過三兩度，效。更加枳殼一橘皮二兩，湯浸去瓤，剉，以水一升，煎之五合，通熱頓服，更加枳殼一兩，去瓤炒，同煎之服，效。吃噫。

《孫尚藥方》：治諸吃噫。

《梅師方》：主胃反，朝食暮吐，暮食朝吐，旋旋吐者。

以甘蔗汁七升，生薑汁一升，二味相和，分爲三服。

又方，治醋心。

檳榔四兩，橘皮二兩，細搗爲散，空心生蜜湯下方寸匕。

《兵部手集》：治醋心，每醋氣上攻如釅醋。

吳茱萸一合，水三盞，煎七分，頓服，縱濃亦須强服。近有人心如蜇破，服此方後，二十年不發。

治卒發黃疸諸黃病第三十一

治黃疸方。

蕪菁子五升，搗篩，服方寸匕，日三，先後十日，愈之。

又方，燒亂髮，服一錢匕，日三服。

秘方，此治黃疸。

又方，搗生麥苗，水和絞取汁，服三升，以小麥勝大麥，一服六七合，日三四。此酒疸也。

又方，取藜蘆著灰中炮之，令小變色，搗，下篩末，服半錢匕，當小吐，不過數服。此秘方也。

又方，取小豆、秫米、鷄矢白各二分，搗篩，爲末，分爲三服，黃汁當出。此通治面目黃，即差。

疸病有五種，謂黃疸、穀疸、酒疸、女疸、勞疸也。黃汗⑯者，身體四肢微腫，胸滿不得汗，汗出如黃檗汁⑰，由大汗出卒入水所致，方：

猪脂一斤，温令熱，盡服之，日三，當下，下則稍愈。

又方，栀子十五枚，栝蔞子三枚，苦參三分，搗末，以苦酒漬鷄子二枚，令軟，合黃白以和藥，搗丸，如梧子大，每服十丸。日五六除熱不吐，即下自消也。

又方，黃雌鷄一隻，治之，剉生地黃三斤，内腹中，急縛仰置銅器中，蒸令極熟，絞取汁，再服之。

又方，生茅根一把，細切，以猪肉一斤，合作羹，盡啜食之。

又方，柞樹皮燒末，服方寸匕，日三服。

又方，黃連十五分，水四升，煮取一升半，分爲再服。此藥亦治温病發黃。

又方，茵陳六兩，水一斗二升，煮取六升，去滓，内大黃二兩，栀子十四枚，煮取三升，分爲三服。

又方，甘草一尺，栀子十五枚，黃檗十五分，搗篩，爲末，分爲三服。此秘方也。

又方，麻黃一把，酒五升，煮取二升半，可盡服，汗出差。

若變成疸者，多死，急治之方。

土瓜根搗取汁，頓服一升，至三服，須病汗，當小便去，不爾，更服之。

穀疸者，食畢頭旋，心怫鬱不安而發黃，由失饑大食，胃氣衝熏所致，治之方。

茵陳四兩，水一斗，煮取六升，去滓內大黃二兩，梔子七枚，煮取二升，分三服，溺去黃汁差。

又方，苦參三兩，龍膽一合，末，牛膽丸如梧子，以生麥汁服五丸，日三服。

酒疸者，心懊痛，足脛滿，小便黃，飲酒發赤斑黃黑，由大醉當風入水所致，治之方。

黃耆二兩，木蘭一兩，末之，酒服方寸匕，日三服。

又方，大黃一兩，枳實五枚，梔子七枚，豉六合，水六升，煮取二升，分爲三服。

又方，芫花、椒目等分，燒末，服半錢，日一兩遍。

女勞疸者，身目皆黃，發熱惡寒，小腹滿急，小便難，由大勞大熱交接，交接後入水所致，治之方。

消石、礬石等分，末，以大麥粥飲服方寸匕，日三，令小汗出，小便當去黃汁也。

又方，亂髮如鷄子大，猪膏半斤，煎令消盡，分二服。

附方

《外臺秘要》：治黃疸。

柳枝，以水一斗，煮取濃汁半升，服令盡。

又方，治陰黃汗染衣，涕唾黃。

取蔓菁子搗末，平旦以井花水服一匙，日再，加至兩匙，以知爲度。每夜小便，重浸少許帛子，各書記日，色漸退白，則差，不過服五升。

《圖經》曰：黃疸病及狐惑病，并猪苓散主之。

猪苓、茯苓、术等分，杵末，每服方寸匕，水調下。

《食療》云：主心急黃。

以百合蒸過，蜜和食之，作粉尤佳。紅花者，名山丹，不堪食。

治黃疸。

用秦艽一大兩，細剉，作兩貼子，以上好酒一升，每貼半升酒，絞取汁，去滓，空腹分兩服，或利便止，就中好酒人易治。凡黃有數種，傷酒曰酒黃，夜食、誤食鼠糞亦作黃，因勞發黃，多痰涕，目有赤脉，日益憔悴，或面赤惡心者是。崔元亮用之，及治人皆得，方極效。

秦艽須用新好羅文者。

《傷寒類要》：療男子婦人黃疸病，醫不愈，耳目悉黃，食飲不消，胃中脹熱生黃衣，在胃中有乾屎，使病爾三，燥屎下去乃愈。

用煎猪脂一小升，温熱頓服之，日又方，治黃百藥不差。

煮驢頭熟，以薑齏啖之，并隨多少飲汁。

又方，治黃疸，身眼皆如金色。

猪苓散主之。

不可使婦人鷄犬見，取東引桃根，切細如箸若釵股以下者一握，以水一大升，煎取一小升，適温，空腹頓服，後三五日，其黃離離如薄雲散，唯眼最後差，百日方平復，身黃散後，可時時飲一盞清酒，則眼中黃易散，不飲則散遲。忌食熱麵、猪、魚等肉。此是徐之才家秘方。

《正元廣利方》：療黃，心煩熱口乾，皮肉皆黃。

以秦艽十二分，牛乳一大升，同煮，取七合，去滓，分溫再服，差。此方出於許人則。

治卒患腰脊痛諸方第三十二

葛氏治卒腰痛諸方，不得俯仰方。

正立倚小竹，度其人足下至臍，斷竹，及以度後當脊中，灸竹上頭處，隨年壯。畢，藏竹勿令人得矣。

又方，鹿角長六寸，燒，搗末，酒服之。鹿茸尤佳。

又方，取鱉甲一枚，炙，搗篩，服方寸匕，食後，日三服，

又方，桂八分，牡丹四分，附子二分，搗末，酒服一刀圭，日再服。

治腎氣虛衰，腰脊疼痛，或當風卧濕，爲冷所中，不速治，流入腿膝，爲偏枯冷痹緩弱，宜速治之，方：

獨活四分，附子一枚大者，炮，杜仲、茯苓、桂心各八分，牛膝、秦艽、防風、芎藭、芍藥六分，細辛五分，乾地黃十分，甘草五分，乾漆五分，搗篩，酒服一匕，日三服。

又方，

乾地黃十分，切，水九升，煮取三升，空腹，分服方寸匕，日五六服。

治反腰有血痛方。

搗杜仲三升許，以苦酒和，塗痛上，乾復塗。并灸足踵白肉際，三壯。

治腎腰痛。

生葛根嚼之，嚥其汁，多多益佳。

又方，生地黃搗，絞取汁三升，煎取二升，内蜜一升，和一升，日三服。不差，則更服之。

又方，灸腰眼中七壯。

腎腰者，猶如反腰忽轉而俛之。

治腰中常冷如帶錢方。

甘草、乾薑各二兩，茯苓、朮各四兩，水五升，煮取三升，分爲三服。《小品》云：温。

治脊卒痛如打方。

以繩横度兩乳中間，屈繩從乳横度，以趁痛脊下，灸繩下屈處，三十壯便愈。此本在雜治中。

隱居效方：腰背痛方。

杜仲一斤，切，酒二斗，漬十日，服

三合。

附方

《千金方》：治腰脚疼痛。

胡麻一升，新者，熬令香，杵篩，日服一小升，計服一斗，即永差，酒飲、蜜湯、羹汁皆可，服之佳。

《續千金方》：治腰膝疼痛傷敗。

鹿茸不限多少，塗酥，炙紫色，爲末，温酒調下一錢匕。

《經驗方》：治腰脚痛。

威靈仙一斤洗，乾，好酒浸七日，爲末，麵糊丸，桐子大，以浸藥酒下二十丸。

《經驗後方》：治腰疼神妙。

用破故紙爲末，温酒下三錢匕。

又方，治腎虚腰脚無力。

生栗袋貯，懸乾，每日平明吃十餘顆，次吃猪腎粥。

又方，治丈夫腰膝積冷痛，或頑麻無力。

菟絲子洗秤一兩，牛膝一兩，同浸於銀器内，用酒過一寸，五日，曝乾爲末，將元浸酒再入少醇酒作糊，搜和丸，如梧桐子大，空心酒下二十丸。

《外臺秘要》：療腰痛。

取黄狗皮，炙，裹腰痛處，取暖徹爲度，頻即差也。徐伯玉方同。

《斗門方》：治腰痛。

用大黄半兩，更入生薑半兩，同切如小豆大，於鐺内炒令黄色，投水兩碗，至五更初頓服，天明取下腰間惡血物，用盆器貯，如鷄肝樣，即痛止。

又方，治腰重痛。

用檳榔爲末，酒下一錢。

《梅師方》：治卒腰痛，暫轉不得。

鹿角一枚，長五寸，酒二升，燒鹿角令赤，内酒中浸一宿，飲之。

《崔元亮海上方》：治腰脚冷風氣。

以大黄二大兩，切如棋子，和少酥炒，令酥盡，入藥中，切不得令黄焦，則無力。搗篩，爲度，每服二錢，温酒下，日二服，後吃三五匙水飯壓之，至三七日，加至三錢匕，服之令人光澤，三年老變爲少，此藥治腰膝去風，久服延年。

《修真方》：神仙方。

菟絲子一斗，酒一斗，浸良久，漉出暴乾，又浸，以酒盡爲度，每服二錢，温酒下，日二服，後吃三五匙水飯壓之，至三七日，加至三錢匕，服之令人光澤，三年老變爲少，此藥治腰膝去風，久服延年。

治虚損羸瘦不堪勞動方第三十三

治人素有勞根，苦作便發，則身百節皮膚無處不疼痛，或熱筋急方。

古人用毒藥攻病，必隨人之虚實而處置，非一切而用也。姚僧垣初仕，梁武帝因發熱，欲服大黄，僧垣曰：大黄乃是快藥，至尊年高，不可輕用。帝弗從，幾至委頓。元帝常有心腹疾，諸醫咸謂宜用平藥，可漸室通，僧垣曰：脉洪而實，此有宿食，非用大黄無差理。帝從而遂愈。以此言之，今醫用一毒藥而攻衆病，其偶中病，便謂此方之神奇，其差誤乃不言用藥之失，如此者衆矣，可不戒哉！

取白柘東南行根一尺，刮去上皮，取中間皮，以燒屑，亦可細切搗之，以酒服三方寸匕，厚覆取汗，日三服。無酒，以漿服之。白柘，是柘之無刺者也。

治卒連時不得眠方。

暮以新布火炙以熨目，并蒸大豆，更番囊貯枕，枕冷復更易熱，終夜常枕熱豆，即立愈也。

此二條本在雜治中，并皆虛勞，患此疾，雖非乃颺急，不即治，亦漸瘵人，後方勞救，爲力數倍，今故略載諸法。

凡男女因積勞虛損，或大病後不復常，若四體沉滯，骨肉疼酸，吸吸少氣，行動喘憞，或小腹拘急，腰背强痛，心中虛悸，咽乾唇燥，面體少色，或飲食無味，陰陽廢弱，悲憂慘戚，多卧少起，久者積年，輕者才百日，漸至瘦削，五藏氣竭，則難可復振。治之湯方。

甘草二兩，桂三兩，芍藥四兩，生薑五兩，無者亦可用乾薑，大棗二七枚，以水九升，煮取三升，去滓，內飴八兩，分三服，間日復作一劑。復可將諸丸散耳，黃蘗加二兩，人參二兩，爲佳。

又方，烏雌鷄一頭，治如食法，以生地黃一斤，切，飴糖二升，內腹內，急縛，銅器貯甑中，蒸五升米久，須臾取出，食肉、飲汁，勿啖鹽，三月三度作之。姚云神良。并止盜汗。

又方，甘草一兩，白朮四兩，麥門冬四兩，牡蠣二兩，大棗二十枚，膠三兩，水八升，煮取二升，再服。

又方，黃耆、枸杞根白皮、生薑三兩，甘草、麥門冬、桂各二兩，生米三合，水九升，煮取三升，分四服。

又方，羊腎一枚，切，朮一升，以水一斗，煮取九升，服一升，日二三服，一日盡，冬月分二日服，日可再服。

又有建中腎瀝湯法諸丸方。

乾地黃四兩，茯苓、薯蕷、桂、牡丹、山茱萸各二兩，附子、澤瀉一兩，搗，蜜丸如梧子。治大風冷。

又方，苦參、黃連、菖蒲、車前子、忍冬、枸杞子各一升，搗，蜜丸如梧子大，服十丸，日三服。

有腎氣大丸法諸散方。

朮一斤，桂半斤，乾地黃、澤瀉、茯苓各四兩，搗篩，飲服方寸匕，日三兩服，佳。

又方，生地黃二斤，麵一斤，搗，炒乾，篩，酒服方寸匕，日三服。

附方

枸杞子酒，主補虛，長肌肉，益顏色，肥健人，能去勞熱。用生枸杞子五升，好酒二斗，研，搦匀碎，浸七日，漉去滓，飲之，初以三合爲始，後即任意飲之。《外臺秘要》同。

《食療》：補虛勞，治肺勞，止渴，去熱風。

用天門冬，去皮心，入蜜煮之，食後服之。若曝乾，入蜜丸，尤佳。亦用洗面，甚佳。

又方，雀卵白和天雄末、菟絲子末爲丸，空心酒下五丸。主男子陰萎不

起，女子帶下，便溺不利，除疝瘕，決癰腫，續五藏氣。

《經驗方》：暖精氣，益元陽。

白龍骨、遠志等分，爲末，煉蜜丸如梧桐子大，空心卧時冷水下三十丸。

又方，除盜汗及陰汗。

牡蠣爲末，有汗處粉之。

《經驗後方》：治五勞七傷，陽氣衰弱，腰脚無力，羊腎蓯蓉羹法。

羊腎一對，去脂膜，細切，肉蓯蓉一兩酒浸一宿，刮去皺皮，細切，相和作羹，葱白鹽五味等如常法事治，空腹食之。

又方，治男子女人五勞七傷，下元久冷，烏髭鬢，一切風病，四肢疼痛，駐顔壯氣。

補骨脂一斤，酒浸一宿，放乾，却用烏油麻一升和炒，令麻子聲絶，即擂去，只取補骨脂爲末，醋煮麵糊丸，如梧桐子大，早晨温酒鹽湯下二十丸。

又方，固陽丹。

菟絲子二兩，酒浸十日，水淘，焙乾爲末，更入杜仲一兩，蜜炙，搗，用薯蕷末酒煮爲糊，丸如梧桐子大，空心用酒下五十丸。

《食醫心鏡》：益丈夫，興陽，理腿膝冷。

淫羊藿一斤，酒一斗浸，經三日，八月九月采，帶子者最好，細剉，二斗，去滓，净洗釜令乾，再瀉汁，安釜中，以微火煎可二大斗，即取猪膽十枚相和，煎一大斗半，除火待冷，以新瓷器貯，每欲服時，取甘草二三兩，熟炙，搗末，以煎和，搗一千杵，爲丸，空腹粥飲下二十丸，漸增至三十丸止。

《崔元亮海上方》：療骨蒸鬼氣。

取童子小便五大斗，澄過，青蒿五斤，酒一斗浸，經三日，净洗釜令乾，再瀉汁，安釜中，以猛火煎取三大斗，去滓，内好大釜中，以猛火煎取三大物相和，内好大釜中，以猛火煎取三大斗，去滓，净洗釜令乾，再瀉汁，安釜中，以微火煎可二大斗，即取猪膽十枚相和，煎一大斗半，除火待冷，以新瓷器貯，每欲服時，取甘草二三兩，熟炙，搗末，以煎和，搗一千杵，爲丸，空腹粥飲下二十丸，漸增至三十丸止。

治脾胃虚弱不能飲食方第三十四

治卒得食病，似傷寒，其人但欲卧，七八日不治煞人方。

按其脊兩邊有陷處，正灸陷處兩頭，各七壯，即愈。

治食魚鱠及生肉，住胸膈中不消化，吐之又不出，不可留，多使成癥方。

朴消如半鷄子一枚，大黄一兩，凡二物咬咀，以酒二升，煮取一升，去滓，

盡服之，立消。若無朴消者，芒消代之，皆可用。

治食生冷雜物，或寒時衣薄當風，或夜食便卧，不即消，心腹煩痛脹急，或連日不化方。

燒地令極熱，即敷薄薦莞席，向卧覆取汗，即立愈也。

治食過飽煩悶，但欲卧而腹脹方。

熬麵令微香，搗，服方寸匕，得大麥生麵益佳，無麵以糜亦得。

此四條本在雜治中，皆食飲脾胃家事，令胃氣充實，則永無食患。食宜先治其本，故後疏諸法。

腹中虚冷，不能飲食，食輒不消，羸瘦，致之四肢厁弱，百疾因此互生。

生地黄十斤，搗絞取汁，和好麵三斤，以日曝乾，更和汁盡止，未食後，服半合，日三，稍增至三合。

又方，麵半斤，麥蘗五升，豉五合，杏仁二升，皆熬令黄香，搗篩，丸如彈，服一枚，後稍增之。

又方，大黄、芍藥各半斤，搗末之，芒消半斤，以蜜三斤，於銅器中湯上煎可丸，如梧子大，服七丸至十丸。

又方，麵一斤，乾薑十兩，茱萸一升，鹽一彈，合搗，蜜和如彈丸，日三服。

又方，术二斤，麵一斤，熬令黄，搗，蜜丸，如梧子大，服三十丸，日三。若大冷，可加乾薑三兩；若患腹痛，加當歸三兩；羸弱，加甘草二兩，并長將息，徐以麵术法。療産後心下停水，仍須利之。

治脾胃氣弱，水穀不得下，遂成不復受食方。

大麻子三升，大豆炒黄香，合搗篩，食前一二方寸匕，日四五服，佳矣。

治飽食便卧，得穀勞病，令人四肢煩重，嘿嘿欲卧，食畢輒甚方。

大麥蘗一升，椒一兩，并熬，乾薑三兩，搗末，服方寸匕，日三四服。

附方

《食醫心鏡》：治脾胃進食。

下食，虚弱無力，鶻突羹。

鯽魚半斤，細切，起作鱠，沸豉汁熱投之，著胡椒、乾薑、蒔蘿、橘皮等末，空腹食之。

《近世方》：主脾胃虚冷不下食，積久羸弱成瘵者。

温州白乾薑一物，漿水煮，令透心潤濕，取出焙乾，搗篩，陳廩米煮粥飲，丸如桐子，一服三五十丸，湯使任用，其效如神。

《食療》：治胃氣虚，風熱不能食。

生薑汁半鷄子殼，生地黄汁少許，蜜一匙頭，和水三合，頓服立差。

《經驗方》：治脾元氣發歇痛不可忍者。

吴茱萸一兩，桃仁一兩，和炒，令茱萸焦黑，後去茱萸，取桃仁，去皮尖，研細，葱白三莖，煨熟，以酒浸，温分二服。

《經驗後方》：治脾胃進食。

茴香二兩，生薑四兩，同搗令匀，生器内濕紙蓋一宿，次以銀石器中，文武火炒，令黄焦爲末，酒丸如梧子大，每服十丸至十五丸，茶酒下。

《外臺秘要》：治久患氣脹。

烏牛尿，空心温服一升，日一服，

氣散即止。

治卒絕粮失食饑憊欲死方第三十五

粒食者，生人之所資，數日乏絶，便能致命。《本草》有不饑之文，而醫方莫言斯術者，當以其涉在仙奇之境，非庸俗所能遵故也，遂使荒饉之歲，餓尸横路，良可哀乎。今略載其易爲者云，若脱值奔竄在無人之鄉，及墮墜溪谷空井深冢之中，四顧迥絶，無可藉口者，便須飲水服氣。其服法如左。

閉口以舌料上下齒，取津液而嚥之，一日得三百六十嚥便佳。漸習乃可至千，自然不饑。三五日小疲極，過此便漸輕强。復有食十二時六戊者諸法，恐危逼之地，不能曉方面，及時之早晚，故不論此。若有水者，卒無器，便與左手貯，祝曰：丞掾吏之賜，真乏糧，正赤黄，行無過城下，諸醫以自防。畢，三叩齒，右手指三叩左手，如此三遍，便飲之。後復有杯器，貯水尤佳，亦左手執，右手以物扣之如法，日服三升，便不復饑，即差。

若可得游涉之地周行山澤間者。

但取松、柏葉，細切，水服二合，日中二三升，便佳。又，掘取白茅根，洗净，切，服之。此三物得行曝燥，石上搗碎服，服者食方寸，辟一日，又有大豆者，取含光明帀熱，以水服，盡此則輕，日行五百里。

《野人閑話》云伏虎尊師煉松脂末，服一二升，辟十日。草中有术，天門冬、麥門冬、黄精、萎蕤、貝母，或生或熟，皆可單食，樹木上自耳，及檀、榆白皮，并可辟饑也。

若遇荒年穀貴，無以充粮，應須藥濟命者。

取稻米一斗，淘汰之，百蒸百曝，搗。日一餐以水得三十日都止，則可終身不食，日行三百里。

又方，粳米一斗，酒三升，漬之，出曝之，又漬，酒盡止出，稍食之，渴飲之，辟三十日。足一斛二升，辟周年。

有守中丸藥法。

其疏諸米豆者，是人間易得易作，且不乖穀氣，使質力無減耳，恐肉穢之身，忽然專御藥物，或非所堪，若可得頻管則自更。按余所撰穀方中求也。

附方

《聖惠方》：絶穀昇仙不食法。

取松實搗爲膏，酒調下三錢，日三，則不饑，渴飲水，勿食他物，百日身輕，日行五百里。

《野人閑話》云伏虎尊師煉松脂，五度以水煮過，令苦味盡取，得後每一斤煉了松脂，入四兩茯苓末，每晨水下一刀圭，即終年不食，而後延齡，身輕清爽。

《抱朴子》云：漢成帝時，獵者於終南山見一人，無衣服，身皆生黑毛，跳坑越澗如飛，乃密伺其所在，合圍取得，乃是一婦人，問之，言：我是秦之宫人，關東賊至，秦王出降，驚走入山，饑無所食，洎欲餓死，有一老公教我吃松、柏葉實，初時苦澀，後稍便吃，遂不復饑，冬不寒，夏不熱。此女是秦人，至成帝時，三百餘載也。

葛仙翁肘後備急方卷之四

---

❶汗：原作『汁』，據萬曆本改。
❷豆：原作『五』，據萬曆本改。
❸密：萬曆本作『蜜』。
❹陷：原作『昏』，據萬曆本改。
❺面：原作『回』，據萬曆本改。
❻消：原作『丁』，據萬曆本改。
❼牽：原作『丸』，據萬曆本改。
❽丸如：原作『九知』，據萬曆本改。
❾寒：疑當作『塞』。
❿大：原作『火』，據萬曆本改。
⓫下：原作『百』，據萬曆本改。
⓬倪：原作『倪』，據萬曆本改。
⓭光：萬曆本作『先』。
⓮激：萬曆本作『濃』。
⓯頭：萬曆本作『頓』。
⓰汗：原作『汁』，據《金匱要略方論·黃疸病脉證并治第十五》改。
⓱汁：原作『汗』，據《金匱要略方論·黃疸病脉證并治第十五》改。

葛仙翁肘後備急方卷之五
治癰疽妬乳諸毒腫方第三十六
隱居效方：治羊疽疿瘡有蟲癢。
附子八分，藜蘆二分，末，傅之，蟲自然出。
葛氏療奶發，諸癰疽發背及乳方。
比灸其上百壯。
又方，熬粢粉令黑，鷄子白和之，塗縛上以貼癰，小穿練上，作小口泄毒氣，燥易之，神秘。
又方，釜底上❶揭以鷄子中黃和塗之，乾復易，神效。
又方，用鹿角、桂、鷄屎，別揭，燒，合和，鷄子白和塗，乾復上。
又，癰已有膿，當使壞方。
取白鷄兩翅羽肢各一枚，燒服之，即穿。姚同。
又方，吞薏苡子一枚，勿多。
又方，以苦酒和雀矢，塗癰頭上，如小豆。
葛氏，若已結癰，使聚不更長方。
又方，神效水磨，出《小品》。
又方，醋和茱萸，若揭薑或小蒜傅之，并良。
一切惡毒腫。
蔓菁根一大握，無，以龍葵根代之，乳頭香一兩，光明者，黃連一兩，宣州者，杏仁四十九枚，去尖用，柳木取三四錢，白色者，各細剉，揭三二百杵，團作餅子，厚三四分，可腫處大小貼之，乾復易，立散，別貼膏藥治瘡處，佳。
葛氏療癰發數十處方。
取牛矢燒，揭末，以鷄子白和塗之，乾復易，神效。
又方，用鹿角、桂、鷄屎，別揭，燒，合和，鷄子白和塗，乾復上。
又，癰已有膿，當使壞方。
取白鷄兩翅羽肢各一枚，燒服之，即穿。姚同。
又方，吞薏苡子一枚，勿多。
又方，以苦酒和雀矢，塗癰頭上，如小豆。
葛氏，若已結癰，使聚不更長方。
磨傅并良。

小豆末塗，若鷄子白和尤佳，即差。

又方，芫花末、膠汁和貼上，燥復易，化爲水。若潰後膿血不止急痛。取生白楸葉，十重貼上，布帛寬縛之。

乳腫。

桂心、甘草各二分，烏頭一分，炮，搗爲末，和苦酒塗紙覆之，膿化爲水，則神效。

葛氏，婦女乳癰妬腫。

削柳根皮熟搗，火温，帛囊貯，熨之，冷更易，大良。

又方，取研米槌煮令沸，絮中覆乳，以熨上，當用二枚，牙熨之，數十回止。姚云神效。

乳癰方。

大黄、茵草、伏龍肝竈下黄土也、生薑各二分，先以三物，搗篩，又合生薑搗，以醋和塗，乳痛則止，極驗。用生薑。用生薑四分，分等，余比見用鯽魚立驗。此方《小品》佳。

姚氏：乳癰。

大黄、鼠糞濕者、黄連各一分，二物爲末，鼠矢更搗，以黍米粥清和，傅乳四邊，痛即止，愈。無黍米，用粳米并得。

又方，牛馬矢傅，并佳。此并消去。

《小品》妬方。

黄芩、白斂、芍藥分等，末，篩，漿服一錢匕，日五服。若右乳結者，將左乳汁服。左乳結者，將右乳汁服，散消根。姚同此方，必愈。

姚方：搗生地黄傅之，熱則易。小豆亦佳。

又云：二三百衆瘡不差，但堅紫色者。

用前柳根皮法云，熬令温，熨腫，一宿愈。

凡乳汁不得泄，内結名妬乳，乃急於癰。

徐玉療乳中瘰癧起痛方。

大黄、黄連各三兩，水五升，煮取一升二合，分三服，得下，即愈。

葛氏，卒毒腫起，急痛方。

蕪菁根大者，削去上皮，熟搗，苦酒和如泥，煮三沸，急攪之出，傅腫，帛裹上，日再三易。用子亦良。

又方，燒牛矢末，苦酒和，傅上，乾復易。

又方，水和石灰封上。又，苦酒磨升麻，若青木香，或紫檀，以磨傅上，良。

又方，取水中萍子草，熟搗，以傅上。

又，已入腹者。

麝香、熏陸香、青木香、鷄舌香各一兩，以水四升，煮取二升，分爲再服。

若惡核腫結不肯散者。

吴茱萸、小蒜分等，合搗傅之。丹蒜亦得。

又方，搗鯽魚以傅之。

若風腫多癢，按之隨手起，或隱疹方。

但令痛以手摩捋，抑按，日數度，自消。

又方，以苦酒磨桂，若獨活，數傅

之，良。

身體頭面忽有暴腫處如吹方。

巴豆三十枚，連皮碎，水五升，煮取三升，去滓，綿沾以拭腫上，趁手消，勿近口。

皮肉卒腫起，狹長赤痛名牖。

鹿角五兩，白斂一兩，牡蠣四兩，附子一兩，搗篩，和苦酒，塗帛上，燥復易。

《小品》癰結腫堅如石，或如大核，色不變，或作石癰不消。

鹿角八兩，燒作灰，白斂二兩，麤理黃色，磨石一斤，燒令赤，三物搗作末，以苦酒和泥，厚塗癰上，燥更塗，取消止。內服連翹湯下之。姚方云：燒石令極赤，內五升苦酒中，令減半止，搗石和藥，先用所苦酒中，復燒，又內餘，苦酒不足，添上用。

姚方，若發腫至堅而有根者，名曰石癰。

當上灸百壯，石子當碎出。不出者，可益壯。癰疽、瘤、石癰、結筋、瘭癧，皆不可就針角。針角者，少有不及禍者也。

又，癰未潰方。

茜草末，和鷄子白，塗紙令厚，貼上，燥復易，得痛自差。

癰腫振燄不可棖方。

大黃搗篩，以苦酒和，貼腫上，燥易，不過三，即差減，不復作膿，自消除，甚神驗也。

癰腫未成膿。

取牛耳垢封之，即愈。

若惡肉不盡者，食肉藥食去，以膏塗之，則愈。

食肉方。

取白炭灰、荻灰等分，煎令如膏，此不宜預作。十日則歇，并可與去黑子。此大毒，若用效驗，本方用法。

凡癰腫，用：

栝蔞根、赤小豆，皆當內苦酒中，五宿出，熬之畢，搗爲散，以苦酒和，塗紙上貼腫，驗。

隱居效方，消癰腫。

白斂二分，藜蘆一分，爲末，酒和如泥，貼上，日三，大良。

疽瘡骨出。

黃連、牡蠣各二分，爲末，先鹽酒洗，後傅。

葛氏，忽得熛疽著手足肩，累累如米豆，刮汁出，急療之。

熬蕪菁，熟搗，裹以展轉其上，日夜勿止。

若發疽於十指端，及色赤黑，甚難療，宜按大方，非單方所及。

若骨疽積年，一捏一汁出，不差。

熬末膠飴勃瘡上，乃破生鯉魚以搦之，如炊頃，刮視有小蟲出，更洗，傅藥蟲盡則便止，差。

姚方云熛疽者，肉中忽生一黿子，如豆粟，劇者如梅李大，或赤或黑，或白或青，其黵有核，核有深根，應心小久，四面悉腫，疱黯黕紫黑色，能爛壞筋骨，毒入臟腑，煞人。南方人名爲搦著毒。

著厚肉處皆割之，亦燒鐵令赤，烙赤三上，令焦如炭，亦灸黯炮上，百壯爲佳，早春酸摹葉薄其四面，防其長也，飲葵根汁、犀角汁、升麻汁，折其熱

內外。療依丹毒法也。

劉涓子療癰疽發壞，出膿血，生肉，黄耆膏。

黄耆、芍藥、大黄、當歸、芎藭、獨活、白芷、薤白各一兩，生地黄三兩，九物切，猪膏二升半，煎三上三下，膏成，絞去滓，傅充瘡中，摩左右，日三。

又，丹癰疽始發，浸淫進長，并少小丹搨方。

升麻、黄連、大黄、芎藭各二兩，黄芩、芒消各三兩，當歸、甘草炙、羚羊角各一兩，九物㕮咀，水一斗三升，煮取五升，去滓，還内鐺中，芒消上杖攪，令成膏，適冷熱，貼帛搨腫上，數度，便隨手消散。王練甘林所秘方，慎不可近陰。

又，熛瘡浸淫多汁，日就浸大胡粉散。

胡粉熬、甘草炙、蔄茹、黄連各二分，四物搗散，篩，以粉瘡，日三，極驗。

諸疽瘡膏方。

蠟、亂髮、礬石、松脂各一兩，猪膏四兩，五物先下髮，髮消下礬石，礬石消下松脂，松脂消下蠟，蠟消下猪膏，塗瘡上。

赤龍皮湯，洗諸敗爛瘡方。

槲樹皮切三升，以水一斗，煮取五升，春夏冷用，秋冬温用，洗乳瘡及諸敗瘡，洗了則傅膏。

發背上初欲癰，便服此大黄湯。

大黄、甘草炙、黄芩各二兩，升麻二兩，栀子一百枚，五物以水九升，煮取三升半，服得快下數行便止，不下則更服。

療發背及婦人發乳，及腸癰，木占斯散。

木占斯、厚朴炙、甘草炙、細辛、栝樓、防風、乾薑、人參、桔梗、敗醬各一兩，十物搗爲散，酒服方寸匕，晝七夜四，以多爲善。病在上常吐，在下膿血，此謂腸癰之屬，其癰腫即不痛。長服療諸疽痔，若瘡已潰，便早愈，發背無有不療，不覺腫去。時長服，去敗醬，多療婦人發乳、諸産、癥瘕益良。并劉涓子方。

劉涓子療癰消膿，木占斯散方。

木占斯、桂心、人參、細辛、敗醬、乾薑、厚朴炙、甘草炙、防風、桔梗各一兩，十物爲散，服方寸匕，入咽覺流入瘡中。若癰疽灸，不發壞者，可服之，瘡末壞去敗醬，此藥或時有癰令成水者。

癰腫瘰癧核不消，白蘞薄方。

白蘞、黄連、大黄、黄芩、茵草、赤石脂、吴茱萸、芍藥各四分，八物搗篩，以鷄子白和如泥，塗故帛上薄之，開小口，乾即易之，差。

發背欲死者。

取冬瓜，截去頭，合瘡上，瓜當爛，截去更合之，瓜未盡，瘡已斂小矣，即用膏養之。

又方，伏龍肝末之，以酒調，厚傅其瘡口，乾即易，不日平復。

又方，取梧桐子葉，鏊上煿成灰，絹羅，蜜調傅之，乾即易之。

癰腫雜效方，療熱腫。

以家芥子并柏葉搗，傅之，無不愈，大驗。得山芥更妙。又，搗小芥子末，醋和作餅子，貼腫及瘰癧，數看消

即止，恐損肉，此療馬附骨，良。

又方，燒人糞作灰，頭醋和如泥，塗腫處，乾數易，大驗。

又方，取黃色雄黃、雌黃色石，燒熱令赤，以大醋沃之，更燒醋沃，其石即軟如泥，刮取塗腫，若乾，醋和，此大秘要耳。

灸腫令消法。

取獨顆蒜橫截厚一分，安腫頭上，炷如梧桐子大，灸蒜上百壯，不覺消，數數灸，唯多爲善，勿令大熱，但覺痛即擎起蒜，蒜燋更換用新者，不用灸損皮肉，如有體乾，不須灸。余嘗小腹下患大腫，灸即差。每用之，則可大效也。

又方，生參□□□頭上核，又磁石末和醋，傅之。

又方，甘草□□塗此蕉子不中食。

又方，鷄腸草傅。

又方，白蘞末傅，并良。

又熱腫癰。

烽膠數塗，一日十數度，即差。療小兒癰子，尤良，每用神效。

一切毒腫，疼痛不可忍者。

搜麵團腫頭如錢大，滿中安椒，以麵餅子蓋頭上，灸令徹痛，即立止。

又方，搗葶藶人，傅之立差。

手脚心風毒腫。

生椒末、鹽末等分，以醋和傅，立差。

癰疽生臭惡肉者。

以白薑茹散傅之，看肉盡便停，但傅諸膏藥。若不生肉，傅黃耆散。薑茹、黃耆，止一切惡肉。仍不盡者，可以七頭赤皮薑茹爲散，用半錢匕，和白暖熨之，有赤絡脉起如蚓狀。

此由春冬惡風入絡脉之中，其血瘀所作，宜服五香連翹，饒去血，傅丹參膏，積日乃差。余度山嶺即患，常服五香湯，傅小豆得消。以下并姚方。

惡核病者，肉中忽有核如梅李，小者如豆粒，皮中慘痛，左右走，身中壯熱癢惡寒是也。此病卒然如起，有毒入腹殺人，南方多有此患。宜服五香連翹湯，以小豆傅之，立消，若餘核，亦得傅丹參膏。

惡肉病者，身中忽有肉，如赤小豆粒突出，便長如牛馬乳，亦如鷄冠狀，亦宜服漏蘆湯，外可以燒鐵烙之，日三烙，令稍燋。

以升麻膏傅之。

氣痛之病，身中忽有一處，如打撲之狀，不可堪耐而左右走，身中發作，有時痛，靜時便覺其處，冷如霜雪所加。

此皆由冬温至春，暴寒傷之，宜先服五香連翹散數劑。又以白酒煮楊柳皮暖熨之，有赤點點處，宜鑱去血也。

五香連翹湯，療惡肉、惡脉、惡核、瘰癧、風結腫氣痛。

木香、沉香、鷄舌香各二兩，麝香半兩，薰陸一兩，夜干、紫葛、升麻、獨活、寄生、甘草炙、連翹各二兩，大黃三兩，淡竹瀝三升，十三物以水九升，煮減半，內竹瀝三升，分三服，大良。

漏蘆湯，療癰疽、丹瘭毒腫、惡肉。

漏蘆、白薇、黃芩、白薇、枳實炙、

升麻、甘草炙、芍藥、麻黄去節各二兩，大黄三兩，十物以水一斗，煮取三升。若無藥，用大黄下之，佳。其丹毒，須針鑱去血。

丹參膏，療惡肉、惡核、瘰癧、風結、諸脉腫。

丹參、蒴藿各二兩，秦膠、獨活、烏頭、白及、牛膝、菊花、防風各一兩，茵草葉、躑躅花、蜀椒各半兩，十二物切，以苦酒❷二升，漬之一宿，猪膏四斤，俱煎之，令酒竭，勿過燋，去滓，以塗諸疾上，日五度。塗故布上貼之。此膏亦可服，得大行即須少少服。《小品》同。

升麻膏，療丹毒腫熱瘡。

升麻、白蘞、漏蘆、芒消各二兩，黄芩、枳實、連翹、蛇銜各三兩，梔子二十枚，蒴藿根四兩，十物切，春令細，納器中，以水三升，漬半日，以猪脂五升，煎令水竭，去滓，傅之，日五度。若急合，即水煎。極驗方。

葛氏療卒毒腫起急痛。

柳白皮酒煮令熱，熨上，痛止。

附方

《勝金方》：治發腦、發背及癰疽、熱瘾、惡瘡等。

臘月兔頭，細剉，入瓶内密封，惟久愈佳，塗帛上，厚封之，熱痛傅之，如冰頻換，差。

《千金方》：治發背、癰腫，已潰未潰方。

香豉三升，少與水和，熟搗成泥。可腫處作餅子，劑方圓大於瘡一分，熱傅覆，孔上布豉餅，以艾烈其上，灸之使温，温而熱，勿令破肉。如熱痛，即急易之，患當減，快得分穩，一日二度。灸之如先有瘡孔中汁出，即差。

《外臺秘要》：療惡寒嗇嗇似欲發背，或已生瘡腫癮瘰起方。

消石三兩，以暖水一升和，令消待冷，取故青布揲三重，可似赤處方圓，濕布搦之，熱即換，頻易立差。

《集驗方》：治發背。

以蝸牛一百個活者，以一升浄瓶入蝸牛，用新汲水一盞，浸瓶中，封系，自晚至明，取出蝸牛放之，其水如涎，將真蛤粉不以多少，旋調傅，以鷄翎掃之瘡上，日可十餘度，其熱痛止，瘡便愈。

《崔元亮海上方》：治發背秘法。

以甘草三大兩，生搗，别篩末，大麥麵九兩，於大盤中相和，攪令匀，取上等好酥少許，别捻入藥，令匀，百沸水搜如餅子，劑方圓大於瘡一分，熱傅腫上，以油片及故紙隔，令通風，冷則換之，已成膿，水自出，未成腫，便内消。當患腫著藥時，常須吃黄耆粥，甚妙。

又一法，甘草一大兩，微炙，搗碎，水一大升浸之，器上横一小刀子，置露中經宿，平明以物攪令沫出，吹沫服之，但是瘡腫發背，皆可服，甚效。

《梅師方》：治諸癰疽發背，或發乳房，初起微赤，不急治之，即死速。消方。

搗苧根傅之，數易。

《聖惠方》：治附骨疽及魚眼瘡。

用狗頭骨，燒烟薰之。

張文仲方，治石癰堅如石，不作膿者。

生章陸根，搗，擦之，燥即易，取軟爲度。

《子母秘録》：治癰疽、痔瘻瘡及小兒丹。

水煮棘根汁，洗之。

又方，末蟛蜞，傅之。

《小品方》：治疽初作。

以赤小豆末，醋和傅之，亦消。

《博濟方》：治一切癰腫未破，疼痛大小，攤於布上，糝木香末於中，又再攤地黄一重，貼於腫上，不過三五度。

日華子云：消腫毒。

以生地黄杵如泥，隨腫大小，攤於故布裹腫處，取湯熱洗之，即差。

又方，治癰，一切腫未成膿，拔毒。

牡蠣白者，爲細末，水調塗，乾更塗。

水調決明子末塗。

《食療》：治癰腫。

栝樓根，苦酒中熬燥，搗篩之，苦酒和，塗紙上，攤貼，服金石人宜用。

楊文蔚方，治癰未潰。

栝樓根、赤小豆等分，爲末，醋調塗。

《千金方》：治諸惡腫，失治有膿。

燒棘針作灰，水服之，經宿頭出。

又方，治癰瘡中冷，瘡口不合。

用鼠皮一枚，燒爲灰，細研，封瘡口上。

孫真人云：主癰發數處。

取牛糞，燒作灰，以鷄子白和，傅之，乾即易。

孫真人《食忌》：主一切熱毒腫。

章陸根，和鹽少許，傅之，日再易。

《集驗方》：治腫。

柳枝如脚指大。長三尺，二十枚，水煮令極熱，以故布裹腫處，取湯熱洗之，即差。

又方，治癰，一切腫未成膿，拔毒。

牡蠣白者，爲細末，水調塗，乾更塗。

又❸方，治毒熱，足腫疼欲脱。

酒煮苦參以蒜和作泥，塗用布上貼之，如乾則再易。

《外臺秘要》：治癰腫。

伏龍肝，以苦酒和塗紙上，攤貼，服金石人宜用。

又方，凡腫已潰未潰者。

以白膠一片，水漬令軟，納納然腫之大小，貼當頭，上開孔。若已潰還合者，膿當被膠急撮之，膿皆出盡。未有膿者，腫當自消矣。

又方，燒鯉魚作灰，酢和，塗之一切腫上，以差爲度。

又，療熱毒病，攻手足腫，疼痛欲脱方。

取蒼耳汁以漬之。

又方，水煮馬糞汁以漬之。

《肘後方》：治毒攻手足腫，疼痛欲斷。

猪蹄一具，合葱煮，去滓，内少許鹽，以漬之。

《經驗後方》：治一切癰腫無頭。

以葵菜子一粒，新汲水吞下，須臾即破，如要兩處破，服兩粒，要破處，逐粒加之，驗。

又方，治諸癰不消已成膿，懼針不得破，令速決。

取白鷄翅下第一毛，兩邊各一莖，燒灰，研，水調服之。

又方，凡腫已潰未潰者。

又，《梅師方》：取雀屎塗頭上，即

易破。雄雀屎佳，堅者爲雄。

謹按：雄黄治瘡瘍尚矣。《周禮·瘍醫》：凡療瘡以五毒攻之。鄭康成注云：今醫方有五毒之藥，作之合黄埶，置石膽、丹砂、雄黄、礬石、磁石其中，燒之三日三夜，其烟上著，以鷄羽掃取之，以注創，惡肉破骨則盡出。故翰林學士楊億嘗筆記：直史館楊嵎年少時，有瘍生於頰，連齒輔車外腫，若覆甌，内潰出膿血，不輟吐之，痛楚難忍，療之百方，彌年不差。人語之，依鄭法，合燒藥成，注之創中，少頃，朽骨連兩牙潰出，遂愈，後更安寧。信古方攻病之速也。黄❹埶若今市中所貨，有蓋瓦合也，近世合丹藥，猶用黄瓦甌，亦名黄埶，事出於古也。埶音武。

《梅師方》：治産後不自乳，見畜積乳汁結作癰，取蒲公草，搗傅腫上，日三四度易之。俗呼爲蒲公英，語訛爲僕公罌是也。水煮汁服，亦得。

又方，治妬乳乳癰。

取丁香，搗末，水調方寸匕服。

又方，治乳頭裂破。

搗丁香末傅之。

《千金方》：治妬乳。亦治陰腫。

梁上塵，醋和塗之。

《靈苑方》：治乳痛癰初發，腫痛結硬，欲破膿，令一服，差。

以北來真樺皮，無灰酒服方寸匕，就之卧❺，及覺已差。

《聖惠方》：主婦人乳癰不消。

右用白麵半斤，炒令黄色，用醋煮鷄屎末，服方寸匕，須臾三服，愈。

爲糊，塗於乳上，即消。

《産寶》：治乳及癰腫。

《梅師方》亦治乳頭破裂，方同❻。

《簡要濟衆》：治婦人乳癰不消。

葛氏：大人小兒卒得惡瘡不可名識者。

燒竹葉，和鷄子中黄塗，差。

又方，取蛇床子合黄連二兩，末，粉瘡上用者，猪脂和塗，差。

又方，燒蛇皮，末，以猪膏和，塗之。

又方，煮柳葉，若皮，洗之亦可，内立效。

《楊炎南行方》：治吹奶疼痛不可忍。

用穿山甲炙黄、木通各一兩，自然銅半兩生用，三味搗羅爲散，每服二錢，温酒調下，不計時候。

《食醫心鏡》云：治吹奶不癢不痛，腫硬如石。

以青橘❼皮一兩，湯浸去穰，焙爲末，非時温酒下二錢匕。

治腸癰肺癰方第三十七❽

治卒發丹火惡毒瘡方第三十八❾

少鹽。此又療面上瘡。

又方，臘月猪膏一升，亂髮如鷄子大，生鯽魚一頭，令煎，令消盡，又内雄黄、苦參末二兩，大附子一枚，末，絞令凝，以傅諸瘡，無不差。《胡洽》療瘑疽疥，大效。

瘡中突出惡肉者。

末烏梅屑傅之，又末硫黄傅上，燥⑩著唾和塗之。

惡瘡連痂癢痛。

搗扁豆封，痂落即差，近方。

治瘑癬疥漆瘡諸惡瘡方第三十九⑪

《小品》：療瘑癬疥惡瘡方。

水銀、礬石、蛇床子、黄連各二兩，四物搗篩，以臘月猪膏七合，并下水銀，攪萬度，不見水銀，膏成，傅瘡，并小兒頭瘡，良。龔⑫慶宣加薑茹一兩。療諸瘡，神驗無比。

姚療瘑疥。

目⑬雄黄一兩，黄連二兩，松脂二兩，髮灰如彈丸，四物熔猪膏與松脂合，熱搗，以薄瘡上，則大良。

又，療惡瘡粉方。

水銀、黄連、胡粉熬令黄各二兩，下篩，粉瘡。瘡無汁者，唾和之。

小兒身中惡瘡。

取笋汁自澡洗，以笋殼作散，傅之效。

人體生惡，瘡似火自爛。

胡粉熬黑、黄檗、黄連分等，下篩，粉之也。

卒得惡瘡。

蒼耳、桃皮作屑，内瘡中，佳。

頭中惡瘡。

胡粉、水銀、白松脂各二兩，臘月猪膏四兩，合松脂煎，以水銀、胡粉合研，以塗上，日再。《胡洽》云：療小兒頭面瘡。又一方，加黄連二兩，亦療得禿瘡。

惡瘡，雄黄膏方。

雄黄、雌黄并末、水銀各一兩，松脂二兩，羊腎脂半斤，亂髮如鷄子大，以黄汁煎松脂及牛酥各如鷄子大，先於地上合煎，去滓，内水銀，傅瘡，日再。

雄黄六分，薑茹、礬石各二分，末瘡中，日二。

療瘡方，最去面上粉刺方。

黄連八分，糯米、赤小豆各五分，吳茱萸一分，胡粉、水銀各六分，搗黄連等，下篩，先於掌中研水銀，使極細，和藥使相入，以生麻油總稀稠得所，洗瘡拭乾，傅之，但是瘡即療，神驗不傳。

甘家松脂膏，療熱瘡尤嘣膿，不痂無瘢方。

松脂、白膠香、薰陸香各一兩，當歸、蠟各一兩半，甘草一兩，并切猪脂、羊腎脂各半合許，生地黄汁亦半合，以松脂等末，内脂膏、地黄汁中，微火煎令黄，下臘，絞去滓，塗布，貼瘡，極有驗。甘家秘不能傳，此是半劑。

地黄膏，療一切瘡已潰者，及炙貼之無痂，生肉去膿神秘方。

地黄汁一升，松脂二兩，薰陸香一兩，羊腎脂及香令消，即内羊脂、酥，并更用蠟半鷄子大，一時相和，緩火煎，水盡膏成，去滓，塗帛，貼瘡，日一

二易。加故緋一片，亂髮一鷄子許大，療年深者，十餘日即差。生肉秘法。

婦人頰上瘡，差後每年又發，甘家秘方塗之，永差。

黄礬石二兩，燒令汁盡，胡粉一兩，水銀一兩半，搗篩，礬石、胡粉更篩，先以片許猪脂於瓷器内熟研，水銀令消盡，更加猪脂，并礬石、胡粉，和使粘稠，洗面瘡以塗上，又别熬胡粉令黄，塗膏訖，則薄此粉，數日即差。甘家用大驗。

療瘑瘡，但是腰脚已下名爲瘑，此皆有蟲食之，蟲死即差，此方立驗。

醋泔澱一碗，大麻子一盞，白沙鹽末各一抄，和掩以傅瘡，乾更傅，先温泔淨洗，拭乾，傅一二度，即差。孔如針穴，皆蟲食，大驗。

效方，惡瘡三十年不愈者。

大黄、黄芩、黄連各一兩，爲散，洗瘡淨，以粉之，日三，無不差。又，黄檗分等，亦佳。

葛氏療白禿方。

殺猪即取肚，破去屎，及熱以反搦頭上，須臾，蟲出著肚，若不盡，更作，取令無蟲即休。

又方，末藜蘆，以臘月猪膏和塗之。五月漏蘆草，燒作灰，膏和使塗之，皆先用鹽湯洗，乃傅。

又方，羊蹄草根，獨根者，勿見風日及婦女鷄犬，以三年醋研和如泥，生布拭瘡令去，以傅之。

姚方，以羊肉如作脯法，炙令香，及熱以榻[14]上，不過三四日，差。

又方，先以皂莢湯熱洗，拭乾，以少油麻塗，再三，即差。

附方

《千金方》：治遍身風癢生瘡疥。以蒺藜子苗煮湯洗之，立差。《千金翼方》同。

又方，茵陳蒿不計多少，煮濃汁洗之，立差。

《千金翼方》：瘡癬初生，或始痛不可忍，搔之，黄水出，差後復發。取羊蹄根去土，細切，搗，以大醋和，浄洗傅上，一時間，以冷水洗之，日一傅，差。若爲末傅之妙。

《外臺秘要》：治癬瘡方。

取蟾蜍，燒灰，末，以猪脂和，傅之。

又方，治乾癬，積年生痂，搔之黄水出，每逢陰雨即癢。用斑猫半兩，微炒爲末，蜜調傅之。

又，治疥方。

搗羊蹄根，和猪脂塗上。或著鹽少許，佳。

《斗門方》：治疥癬。

用藜蘆，細搗爲末，以生油調傅之。

王氏《博濟》：治疥癬滿身作瘡，不可治者。

何首烏、艾[15]等分，以水煎令濃，於盆内洗之，甚能解痛，生肌肉。

《簡要濟衆》：治癬瘡久不差。

羊蹄根，搗絞取汁，用調膩粉少許

如膏，塗傅癬上，二五遍即差。如乾，即猪脂調和傅之。

《鬼遺方》：治疥癬。松膠香研細，約酌入少輕粉，衮令勻，凡疥癬上，先用油塗了，擦末，一日便乾，頑者三兩度。

《聖惠方》：治癬濕癢。用楮葉半斤，細切，搗爛，傅癬上。

《楊氏産乳》：療瘡疥。燒竹葉爲末，以鷄子白和之塗上，不過三四次，立差。

《十全方》：治疥瘡。巴豆十粒，火炮過黄色，去皮膜，右順手研如麵，入酥少許，膩粉少許，同研勻，爪破，以竹篦子點藥，不得落眼裏及外腎上，如熏炙著外腎，以黄丹塗，甚妙。

《經驗方》：治五般瘡癬。以韭根炒存性，旋搗末，以猪脂油調傅之，三度差。

《千金方》：療漆瘡。用湯潰⑯芒硝令濃，塗之，乾即易之。

譚氏治漆瘡。漢椒湯洗之，即愈。

《千金翼》：治漆瘡。羊乳傅之。

《集驗方》：治漆瘡。取蓮葉乾者一斤，水一斗，煮取五升，洗瘡上，日再，差。

《斗門方》：治漆咬。用韭葉研傅之。《食醫心鏡》同。

《千金方》：主大人小兒風瘙癮瘾，心迷悶方。

巴豆二兩，槌破，以帛染拭之。

《外臺秘要》：塗風瘾。取枳實，以醋漬令濕，火炙令熱，適寒温，用熨上，即消。

《斗門方》治癮瘾。

楝皮濃煎浴之。

《梅師方》：治一切瘾。以水煮枳殼爲煎，塗之，乾即又塗之。

又方，以水煮芒硝塗之。

又，治風癮瘾方。

以水煮蜂房，取二升，入芒硝，傅上，日五度，即差。

《聖惠方》：治風瘙癮瘾，遍身癢成瘡。

用鹽沙一升，水二斗，煮取一斗二升，去滓，温熱得所，以洗之。宜避風。

《千金翼》：療丹癮瘾方。

酪和鹽熱煮，以摩之手下消。

又，主大人小兒風瘾。

茱萸一升，酒五升，煮取一升，帛染拭之。

初虞世治皮膚風熱，遍身生癮瘾。

牛蒡子、浮萍等分，以薄荷湯調下二錢，日二服。

《經驗後方》：治肺毒瘡如大風疾，緑雲散。

以桑葉好者，淨洗過，熟蒸一宿後，日乾爲末。水調二錢匕，服。

《肘後方》：治卒得浸淫瘡，轉有汁多起，心早治之，續身周匝則殺人。

以鷄冠血傅之，差。

又方，以水煮芒硝塗之。

又，療大人小兒卒得月蝕方。

於月望夕取兔屎，及内蝦蟆腹中，

合燒爲灰，末，以傅瘡上，差。

《集驗方》：療月蝕瘡。

虎頭骨二兩，搗碎，同猪脂一升，熬成膏，黄，取塗瘡上。

《聖惠方》：治反花瘡。

用馬齒莧一斤，燒作灰，細研，猪脂調傅之。

又方，治諸瘡腐肉，如螳出數寸。

用硫黄一兩，細研，腐肉上薄塗之，即便縮。

《鬼遺方》：治一切瘡肉出。

以烏梅燒爲灰，研末，傅上，惡肉立盡，極妙。

《簡要濟衆方》傅瘡藥。

黄蘗子四兩，爲末，以冷水調傅瘡上，乾即旋傅之。

《兵部手集》：治服丹石人有熱瘡，疼不可忍方。

用紙環圍腫處，中心填硝石令滿，匙抄水淋之，覺其不熱，疼即止。

治頭瘡，及諸熱瘡。

先用醋少許，和水净洗去痂，再用温水洗裹乾，百草霜，細研，入膩粉少許，生油調塗，立愈。

治惡瘡。

唐人記其事云：江左嘗有商人左膊上有瘡如人面，亦無它苦，商人戲滴酒口中，其面亦赤色，以物食之，亦能食，食多則寬，膊内肉脹起，或不食之，則一臂痹。有善醫者，教其歷試諸藥，金石草木之類，悉試之無苦，至貝母，其瘡乃聚眉閉口，商人喜曰：此藥可治也。因以小葦筒毀其口，灌之，數日成痂，遂愈，然不知何疾也。謹按：《本經》主金瘡。此豈金瘡之類歟？

治卒得癩皮毛變黑方第四十

癩病方。

初覺皮膚不仁，或淫淫苦癢如蟲行，或眼前見物如垂絲，或癮瘕赤黑，此即急療，蠻夷酒，佳善。

療白癩。

苦參五斤，酒三斗，漬，飲勿絶。并取皮根，末服，效驗。

又方，艾千莖，濃煮，以汁漬麪作酒，常飲使醺醺。姚同。

姚方，大蝮蛇一枚，切勿令傷，以酒漬之，大者一斗，小者五升，以糠火温，令下，尋取蛇一寸許，以臘月猪膏和，傅瘡，差。

亦療鼠瘻諸惡瘡。

苦參二斤，露蜂房二兩，麪二斤，水三斗，漬藥二宿，去滓，黍米二升，釀熟，稍飲，日三。一方加猬皮，更佳。

附方

《聖惠方》：治大風癩疾，骨肉疽敗，百節疼酸，眉鬚墮落，身體習習癢痛。

以馬先蒿，細剉，炒爲末，每空心及晚食前温酒調下二錢匕。

又方，治大風疾，令眉鬚再生。

用側柏葉，九蒸九曝，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大，日三服夜一服，熟水下五丸十丸，百日即生。

又方，治大風，頭面髭髮脱落。

以桑柴灰，熱湯淋取汁洗面，以大豆水研取漿，解澤灰，味彌佳，次用熟水入緑豆，去皮取净，不過十度，良，二

日一沐頭，一日一洗面。

又方，治白癩。

用馬鞭草不限多少，爲末，每服食前用荆芥薄荷湯調下一錢匕。

《食療》：治癩。

可取白蜜一斤，生薑二斤，搗取汁，先稱同鐺，令知斤兩，即下蜜於鐺中，消之，又秤五斤兩，下薑汁於蜜中，在即休，微火煎，令薑汁盡，秤蜜斤兩，平旦服棗藥已成矣。患三十年癩者，勢不可救。因爲洋許大一丸㊦，一日三服，酒飲任下。忌生冷醋滑臭物。功用甚多，活人衆矣，不能一一具之。

《外臺秘要》：治惡風疾。

松脂，煉，投冷水中二十次，蜜丸服二兩，飢即服之，日三，鼻柱斷離者三百日差。斷鹽及房室。

《抱朴子》云：

趙瞿病癩，歷年醫不差，家乃賫粮弃送於山穴中，瞿自怨不幸，悲嘆涕泣。經月，有仙人經穴見之，哀之，具問其詳。瞿知其異人也，叩頭自陳乞命，於是仙人取囊中藥賜之，教其服。百余日，瘡愈，顏色悦，肌膚潤。仙人再過視之，瞿謝活命之恩，乞遺其方，仙人曰：此是松脂，彼中極多，汝可煉服之，長服身轉輕，力百倍，登危涉險，終日不困，年百歲，齒不墮，髮不白，夜卧常見有光，大如鏡。

《感應神仙傳》云：崔言者，職隸左親騎軍，一旦得疾，雙眼昏，咫尺不辨人物，眉髮自落，勢不可救。因爲洋瘡如癬，皆謂惡疾，熱勢不可檢本方。多發頭兩邊，累累有核。姚方，鼠瘻腫核痛，未成膿方。以柏葉傅著腫上，熬鹽著葉上，熨令熱氣下，即消。

姚云：凡有腫，皆有相主，患者宜絶，及熟，香氣酷烈，引滿而飲之，斯須悉化爲水，唯毛髮存焉。僉載之説，恐不可輕用。

治卒得蟲鼠諸瘻方第四十一

後有瘰癧

皂角刺一二斤，爲灰，蒸久曬，研爲末，食上濃煎大黄湯，調一錢匕服一旬，鬢髮再生，肌膚悦潤，愈，眼目倍常明。得此方後，却入山不知所之。

《朝野僉載》云：

商州有人患大風，家人惡之，山中爲起茅屋，有烏蛇墜酒罌中，病人不知，飲酒漸差，罌底尚有蛇骨，方知其由也。用道謹按：李肇國史補云：李肇國史補云：商州有人患大風，取猫狸一物，料理作羹如食法，空心進之，鼠子死出。又，當生吞，其功彌效。

又方，取鼠中者一枚，亂髮如鷄子大，燒作灰，以酒服之，日三。

又方，取猫狸一物，料理作羹如食法，空心進之，鼠子死出。又，當生吞，其功彌效。

又方，取鼠中者一枚，亂髮如鷄子大，燒作灰，以酒服之，日三。

又方，取猫狸一物，料理作羹如食法，空心進之，鼠子死出。又，當生吞，其功彌效。

又方，取鼠中者一枚，亂髮如鷄子大，燒作灰，以酒服之，日三。

大，以三歲臘月猪脂煎之，令鼠骨肉及髮消盡，半塗之，半酒服，鼠從瘡中出。姚云：秘不傳之法

劉涓子鼠瘻方。

以龜殼、甘草炙、桂心、雄黄、乾薑、狸骨炙，六物分等，搗，下蜜和，内瘡中，無不差。先灸作瘡，後與藥良。

又方，柞木皮五升，以酒一斗，合煎，熟出皮，煎汁令得二升，服之盡，有宿肉出，愈。

又，瘻瘡坐肉膏。

楝樹白皮、鼠肉、當歸各二兩，薤白三兩，生地黄五兩，臘月猪脂三升，煎膏成，傅之，孔上令生肉。

葛氏，若瘡多而孔小，是蟻瘻，方：

燒鱣鯉甲，猪膏和傅。

又方，燒蜘蛛二七枚，傅良。

又，瘻方。

煎桃葉、枝作煎，淨洗瘡了，内孔中，大驗方。

葛氏，若著口裏。

東行楝根，細剉，水煮，取清汁含之，數吐，勿嚥。

肉瘻方。

槐白皮搗丸，綿裹内下部中，傅，效。

鼠瘻方。

石南、生地黄、雌黄、雄黄、茯苓、黄連各二兩，爲散，傅瘡上，日再。

又方，礬石三分，燒，斑猫一分，炙，去頭足，搗下，用醋和，服半匕，須臾瘻蟲從小便中出。姚云不過三。《删繁方》。

附方

《肘後方》：治風瘻。

露蜂房一枚，炙令黄赤色，爲末，每用一錢，臘月猪脂匀調，傅瘡上。

《千金方》：治鼠瘻。

以鷄子一枚，米下熬半日，取出黄，熬令黑，先拭瘡上汁，令乾，以藥内瘡孔中，三度即差。蛇床子末，和鷄子黄傅之，亦良。

又方，搗蕪菁根，若馬鞭草，傅并良。姚同。

又方，鷄翮六枚，燒，并蛇床子末分等，合服，少隨卵左右傅卵，佳。姚方無蛇床子。

《千金翼》：治蟻瘻。

取鮫鯉甲二七枚，末，猪膏和傅之。

《聖惠方》：治螻蛄瘻。

用槲葉燒灰，細研，以泔別浸槲葉，取洗瘡，拭之，内少許灰於瘡中。

又方，治一切瘻。

煉成松脂，末，填瘡孔令滿，日三四度用之。

治卒陰腫痛顇卵方第四十二

葛氏，男子陰卒腫痛方。

灸足大指第二節下横文理正中央，五壯佳。姚云：足大指本，三壯。

又方，桃核中仁，熬，末，酒服如彈丸。姚云不過三。

又⑱方，竈中黄土，末，以鷄子黄和，傅之。

亦良。

又方，揭蕪菁根，若馬鞭草，傅并良。姚同。

又方，鷄翮六枚，燒，并蛇床子末分等，合服，少隨卵左右傅卵，佳。姚方無蛇床子。

小兒陰疝，發時腫痛。

依仙翁前灸法，隨左右灸，差。

隨痛加刺方。

但服生夜干汁取下，亦可服丸藥下之，云作走馬湯，亦在尸注中有。

陰丸卒縮入腹，急痛欲死，名陰疝。

狼毒四兩，防風二兩，附子三兩，燒，蜜丸，服三丸，如桐子大，日夜三度。

陰莖中卒痛不可忍。

雄黄、礬石各二兩，甘草一尺，水五升，煮取二升，漬。姚云：療大如斗者。

葛氏，男子陰瘡損爛。

煮黄檗洗之。又，白蜜塗之。

又方，黄連、黄檗分等，末之，煮取肥猪肉汁，漬瘡訖，粉之。姚方，蜜煎甘草末，塗之，比者見有陰頭腫，項下瘡欲斷者，猪肉汁漬。依姚方，即神效。

陰蝕欲盡者。

蝦蟆、兔矢分等，末，勃瘡上。

陰癢汁出。

嚼生大豆黄，塗之。亦療尿灰瘡。

姚療陰癢生瘡。

嚼胡麻，塗之。

葛療陰囊下濕癢皮剥。

烏梅十四枚，錢四十文，三指撮鹽，苦酒一升，於銅器内總漬九日，日洗之。又，煮槐皮，若黄檗汁及香葉汁，并良。

療人陰生瘡，膿出臼方。

高昌白礬一小兩，搗細，麻人等分，研，煉猪脂一合，於瓷器中和攪如膏。然後取槐白皮切，作湯，以洗瘡上，拭令乾，即取膏塗上，然後以楸葉帖上，不過三。

又，陰瘡有二種。

一者作臼膿出，曰陰蝕瘡。二者但亦作瘡，名爲熱瘡。若是熱，即取黄檗一兩，黄芩一兩，切，作湯洗之，仍取黄連、黄檗，作末傅之。

女子陰瘡。

末硫黄，傅上。姚同。又，燒杏仁，搗，塗之。

又方，末雄黄、礬石各二分，麝香半分，搗，傅。姚同。

若陰中痛。

礬石二分，熬，大黄一分，甘草半分，末，綿裹如棗以導之，取差。

若有息肉突出。

以苦酒三升，漬烏喙五枚三日，以洗之，日夜三四度。

若苦癢搔之痛悶。

取猪肝炙熱，内陰中，當有蟲著肝。

小兒禿方。

取白頭翁根，搗，傅一宿，或作瘡二十日，愈。

灸頹。

但灸其上。又，灸莖上。又，灸白小腹脉上，及灸脚大指三中，灸一壯。又，灸小指頭，隨頹左右著灸。

姚氏方。

楊柳枝如足大指大，長三尺，二十枚，水煮令極熱，以故紙及氈掩腫處，取熱柳枝，更取拄之，如此取得差，止。

又，卵頹。

熟搗桃仁，傅之。亦療婦人陰腫，燥即易之。

《小品》牡丹散　療頹偏大氣脹

方。

牡丹、防風、桂心、豉熬、鐵精分等，合搗下，服方寸匕，小兒一刀圭，二十日愈，大良。嬰兒以乳汁和，如大豆，與之。

不用藥法，療頹必差方。

令病人自把糯米餅子一枚，并皂莢刺一百個，就百姓間坐社處，先將皂莢刺分合社人、社官，三老已下各付一針，即出餅子示人，從頭至尾，皆言從社官已下，乞針捶，社人問云：捶何物？病人云：捶人魁。周匝總遍訖，針并插盡，即時餅却到家，收掌於一處，餅乾，頹不覺自散，永差，極神效。

附方

《千金方》：有人陰冷，漸漸冷氣入，陰囊腫滿恐死，日夜疼悶不得眠。

取生椒，擇之令淨，以布帛裹著丸囊，令厚半寸，須臾熱氣大通，日再易之，取消，差。

又，《外臺秘要方》：

煮大薊根汁，服之立差。

《梅師方》：治卒外腎偏腫疼痛。

大黄末，和醋塗之，乾即易之。

又方，桂心末，和水調方寸匕，塗之。

又方，治卒外腎偏疼。

皂莢和皮爲末，水調傅之，良。

初虞世方，治水癩偏大，上下不定，疼痛。

牡蠣不限多少，鹽泥固濟，炭三斤，煅令火盡，冷，取二兩，乾薑一兩，炮，右爲細末，用冷水調，稀稠得所，塗病處，小便利即愈。

《經驗方》：治丈夫本藏氣傷，膀胱氣急，宜下之，取良。

葛仙翁肘後備急方卷之五

又，治陰下濕。

吴茱萸一升，水三升，煮三沸，去滓，洗，癢差。

又，治陰頭生瘡。

以蜜煎甘草，塗之，差。

《千金方》：治丈夫陰頭癰，師所不能治。

烏賊魚骨末，粉傅之，良。

又，《千金翼方》：

鱉甲一枚，燒令末，以鷄子白和傅之，良。

---

❶上：疑當作『土』。

❷酒：原作『各』，據萬曆本改。

❸又：原作『人』，據萬曆本改。

❹黄：原作『莖』，據上下文義及萬曆本改。

❺卧：原作『師』，據萬曆本改。

❻同：原作『曰』，據萬曆本改。

❼橘：原作『揭』，據萬曆本改。

❽此篇僅有標題而無正文。

❾此篇有文無標題，此標題據目録加。

❿燥：原作『澡』，據萬曆本改。

⓫此篇有文無標題，標題據目録加。

⑫襲：原作『襲』，據文義改。
⑬目：萬曆本無此字，疑爲衍文。
⑭榻：疑當作『揚』。
⑮艾：原作『及』，據萬曆本改。
⑯潰：疑當作『潰』。
⑰丸：原作『九』，據萬曆本改。
⑱又：原脱，據萬曆本補。

葛仙翁肘後備急方卷之六

治目赤痛暗昧刺諸病方第四十三

華佗禁方。

令病人自用手兩指擘所患眼，垂空咒之曰：疋疋，屋舍狹窄，不容宿客。即出也。

傷寒方末，亦有眼方。姚方，目中冷泪出，眦赤癢，乳汁煎方。

黄連三分，蔍仁二分，乾薑四分，以乳汁一升，漬一宿，微火煎取三合，去滓，取米大傅眦。

睛爲所傷損破方。

牛旋，日二點，避風。黑睛破，亦差。

附方

《范汪方》：主目中泪出，不得開，即刺痛方。

以鹽如大豆許，内目中，習習去鹽，以冷水數洗目，差。

《博濟方》：治風毒上攻，眼腫癢澁，痛不可忍者，或上下瞼眦赤爛，浮翳瘀肉侵睛，神效驅風散。五倍子一兩，蔓荆子一兩半，同杵末，每服二錢，水二盞，銅石器内煎及一盞，澄滓，熱淋洗，留滓二服，又依前煎淋洗，大能明眼目，去澁癢。

《簡要濟衆》：治肝虚目睛疼，冷泪不止，筋脉痛，及眼羞明怕日，補肝散。

夏枯草半兩，香附子一兩，共爲末，每服一錢，臘茶調下，無時。

《聖惠方》：治眼癢急赤澁，用犬膽汁注目中。

又方，治風赤眼。

以地龍十條，炙乾，爲末，夜卧以冷茶調下二錢匕。

又方，治傷寒熱毒氣攻眼，生白翳。

用烏賊魚骨二兩，不用大皮，杵末，入龍腦少許，更研令細，日三四度，取少許點之。

又方，治久患内障眼。

車前子、乾地黄、麥門冬等分，爲

末，蜜丸，如梧桐子大，服屢效。

治目方，用黄連多矣，而羊肝丸尤奇異。

取黄連末一大兩，白羊子肝一具，去膜，同於砂盆内研，令極細，衆手捻爲丸，如梧桐子，每食以暖漿水吞二七枚，連作五劑，差。但是諸眼目疾，及障翳青盲，皆主之。禁食猪肉及冷水。

劉禹錫云：有崔承元者，因官治一死罪囚出活之，因後數年，以病自致死。一旦崔爲内障所苦，喪明，逾年後，半夜嘆息獨坐時，聞階除間悉窣之聲，崔問爲誰，曰：是昔所蒙活者囚，今故報恩至此。遂以此方告訖而没。崔依此合服，不數月眼復明。因傳此方於世。

又方，今醫家洗眼湯。

以當歸、芍藥、黄連等分停，細，以雪水或甜❶水煎濃汁，乘熱洗，冷即再温洗，甚益眼目。但是風毒，赤目花翳等，皆可用之。其説云：凡眼目之病，皆以血脉凝滯使然，故以行血藥合黄連治之，血得熱即行，故乘熱洗之，用者無不神效。

又方，治雀目不計時月。

用蒼术二兩，搗羅爲散，每服一錢，不計時候。以好羊子肝一個，用竹刀子批破，糝藥在内，麻繩纏定，以粟米泔一大盞，煮熟爲度，患人先薰眼，藥氣絶，即吃之。《簡要濟衆》治小兒雀目。

孫真人《食忌》：主眼有翳。

取芒消一大兩，置銅器中，急火上煉之，放冷後，以生絹細羅，點眼角中，每夜欲卧時一度點，妙。

《經驗方》：退翳明目，白龍散。

馬牙消光淨者，用厚紙裹，令按實，安在懷内著肉處，養一百二十日，取出，研如粉，入少龍腦，同研細，不計年歲深遠，眼内生翳膜，漸漸昏暗，遠視不明，但瞳人不破散，并醫得。每點用藥末兩米許，點目中。

又方，治内外障眼。

蒼术四兩，米泔浸七日，逐日换水後，刮去黑皮，細切，入青鹽一兩，同炒，黄色爲度，去鹽不用。木賊二兩，以童子小便浸一宿，水淘，焙乾。同搗

爲末，每日不計時候，但飲食蔬菜内調下一錢匕服，甚驗。

《經驗後方》：治虚勞眼暗。

采三月蔓菁花，陰乾，爲末，以井花水每空心調下二錢匕，久服長生，可讀夜書。

《外臺秘要》：主目翳及努肉。

用礬石最白者，内一黍米大於翳上及努肉上，即冷泪出，綿拭之，令惡汁盡，其疾日日減，翳自消薄，便差。礬石須真白好者，方可使用。

又，補肝散　治三十年失明。

蒺藜子，七月七日收，陰乾，擣散，食後水服方寸匕。

又，療盲。

猪膽一枚，微火上煎之可丸，如黍米大，内眼中，食頃，良。

又方，治翳如重者。

取猪膽白皮，曝乾，合作小繩子如粗釵股大小，燒作灰，待冷，便以灰點翳上，不過三五度即差。

又方，輕身益氣明目。

蕪菁子一升，水九升，煮令汁盡，日乾，如此三度，擣末，水服方寸匕，日三。

《斗門方》：治火眼。

用艾，燒令烟起，以碗蓋之，候烟上碗成煤，取下，用温水調化，洗火眼，即差。更入黄連，甚妙。

《廣利方》：治眼築損努肉出。

生杏仁七枚，去皮，細嚼，吐於掌中，及熱以綿裹箸頭，將點努肉上，不過四五度，差。

《藥性論》云：

空心用鹽揩齒，夜見小字，良。

顧含養嫂失明。

含嘗藥視膳，不冠不食，嫂目疾，須用蚺蛇膽，含計盡求不得，有一童子，以一合授含，含開乃蚺蛇膽也，童子出門，化爲青鳥而去，嫂目遂差。

治卒耳聾諸病方第四十七❸

葛氏，耳卒聾。

取鼠膽，内耳中，不過三，愈。有人云：側卧瀝一膽盡，須臾膽汁從下邊出，初出益聾，半日頃，乃差。治三十年老聾。

又方，巴豆十四枚，擣，鵝脂半兩，火熔，内巴豆，和取如小豆，綿裹内耳中，差，日一易。姚云：差三十年聾。

若卒得風，覺耳中怳怳者。

急取鹽七升，甑蒸使熱，以耳枕鹽上，冷復易。亦療耳卒疼痛，蒸熨。

又方，栝蔞根削令可入耳，以臘月猪脂煎三沸，出塞耳，每日作，三七日即愈。

姚氏，耳痛有汁出方。

熬杏仁令亦黑，擣如膏，以綿裹塞耳，日三易，三日即愈。

聤耳，耳中痛，膿血出方。

用蚺蛇膽，含計畫灰吹滿耳，令深入無苦，即自出。

耳聾，菖蒲根丸。

菖蒲根一寸，巴豆一粒，去皮心，合擣，篩，分作七丸，綿裹，卧即塞，夜易之，十日立愈，黄汁立差。

耳中膿血出方。

細附子末，以葱涕和，灌耳中，良。

單葱涕亦佳，側耳令入耳。

耳中常鳴方。

生地黄切，以塞耳，日十數易。

《小品》療聤耳，出膿汁散方。

礬石二兩，燒，黄連一兩，烏賊魚骨一兩，三物爲散，即如棗核大，綿裹塞耳中，再易，更加龍骨。

耳聾，巴豆丸。

巴豆一枚，去心皮，班猫一枚，去翅足，二物合搗，篩，綿裹塞耳中，再易，甚驗。云此來所用則良。

又方，磁石、菖蒲、通草、熏陸香、杏仁、莽麻、松脂，搗篩，爲末，分等，蠟及鵝脂和硬，和爲丸，稍長，用釵子穿心爲孔，先去耳塞，然後内於藥，日再，初著癢，及作聲月餘總差。殿中侯監效。

耳卒痛。

蒸鹽熨之。

痛不可忍求死者。

菖蒲、附子各一分，末，煉，點耳中，則立止。

聤耳膿血出。

車轄脂塞耳中，膿血出盡，愈。

附方

《肘後方》：療耳卒腫出膿水方。

礬石燒，末，以筆管吹耳内，日三四度，或以綿裹塞耳中，立差。

《經驗方》：治底耳方。

用桑螵蛸一個，慢火炙，及八分熟，存性，細研，入麝香一字，爲末，糝在耳内，每用半字，如神效。如有膿，先用綿包子捻去，次後糝藥末入耳内。

又方，治耳卒聾。

巴豆一粒，臘裹，針刺令通透，用塞耳中。

《梅師方》：治耳久聾。

松脂三兩，煉，巴豆一兩，相和，熟搗可丸，通過以薄綿裹，内耳孔中塞之，日一度易。

《聖惠方》：治腎氣虚損耳聾。

用鹿腎一對，去脂膜切，於豉汁中，入粳米二合，和煮粥，入五味之法，調和，空腹令之作羹及酒并得。

《杜壬方》：治耳聾，因腎虚所致，十年内一服愈。

蝎至小者四十九枚，生薑如蝎大四十九片，二物銅器内炒，至生薑乾爲度，爲末，都作一服，初夜温酒下，至二更盡，盡量飲酒；至醉不妨，次日耳中如笙簧，即效。

《勝金方》：治耳聾，立效。

以乾地龍，入鹽，貯在葱尾内，爲水，點之。

《千金方》：治耳聾。

以雄黄、硫黄等分，爲末，綿裹，塞耳中。

又方，治耳卒聾方，以醇酢微火煎附子，削令尖，塞耳，效。

《外臺秘要》治聾。

芥子搗碎，以人乳調和，綿裹塞耳，差。

《楊氏産乳方》：療耳鳴無晝夜。

烏頭燒作灰、菖蒲，等分爲末，綿裹，塞耳中，日再用，效。

治耳為百蟲雜物所入方第四十八

葛氏，百蟲入耳。以好酒灌之，起行自出。

又方，閉氣，令人以蘆吹一耳。又方，以桃葉塞兩耳，立出。

蜈蚣入耳。以樹葉裹鹽灰令熱，以掩耳，冷復易，立出。

蚰蜒入耳。熬胡麻，以葛囊貯，枕之，蟲聞香則自出。

蟻入耳。炙猪脂、香物，安耳孔邊，即自出。

神效方，蚰蜒入耳。以牛酪灌滿耳，蚰蜒即出，出當半銷。若入腹中，空腹食好酪一二升，即化爲黃水而出。不盡，更作服，手用神驗無比，此方是近得。

又方，小鷄一隻，去毛足，以油煎令黃，箸穿作孔，枕之。

又方，取蚯蚓內葱葉中，并化爲水，滴入耳中，蚰蜒亦化爲水矣。

附方

《勝金方》：主百蟲入耳不出。以鷄冠血滴入耳內，即出。

又，《千金方》：搗韭汁，灌耳中，差。

又方，治耳中有物不可出。以麻繩剪令頭散，傅好膠，著耳中物上粘之，令相著，徐徐引之令出。

又，《梅師方》：取車釭脂，塗耳孔中，自出。

《兵部手集》：治蚰蜒入耳。小蒜汁理一切蟲入耳，皆同。

錢相公《篋中方》：治百節蚰蜒并蟻入耳。以苦醋注之，起行即出。

《聖惠方》：治飛蛾入耳。醬汁灌入耳，即出。又，擊銅器於耳傍。

《經驗方》：治水入耳。以薄荷汁點，立效。

治卒食噎不下方第四十九

葛氏方，取少蜜含之，即立下。

又方，取老牛涎沫，如棗核大，置水中飲之，終身不復患噎也。

附方

《外臺秘要》：治噎。羚羊角屑一物，多少自在，末之，飲服方寸匕。亦可以角摩噎上，良。

《食醫心鏡》：治卒食噎。

以陳皮一兩，湯浸去穰，焙，爲末，以水一大盞，煎取半盞，熱服。

《聖惠方》：治膈氣，咽喉噎塞，飲食不下。

用碓觜上細糠，蜜丸彈子大，非時含一丸，嚥津。

《廣五行記》云：永❻徽中，絳州僧病噎不下食，告弟子：吾死之後，便可開吾胸喉，視有何物。言終而卒。弟子依言，而開視胸中，得一物，形似魚，而有兩頭，遍體是肉鱗，弟子置器中，跳躍不止，戲以諸味，皆隨化盡。時夏中，藍多作澱，有一僧以澱置器中，此蟲遂繞器中走，須臾化爲水。

治卒諸雜物鯁不下方第五十

食諸魚骨鯁。

以魚骨於頭上，立即愈。下云聲咳，即出。

又方，小嚼薤白，令柔，以繩繫中，持繩端，吞薤到鯁處，引之，鯁當隨出。

療骨鯁。

仍取所餘者骨，左右手反覆擲背後，立出。

雜物鯁方。

解衣帶，目窺下部，不下即出。

又方，好蜜，以匕抄，稍稍嚥之，令下。

魚骨鯁在喉中，衆法不能去者方。

取飴糖，丸如鷄子黄大，吞之，不去又吞，以漸大作丸，用得效。

附方

《斗門方》：治骨鯁。

用鹿角爲末，含津嚥下，妙。

《外臺秘要》：療鯁。

取虎骨爲末，水服方寸匕。

又方，螻蛄腦一物，吞。亦治刺不出，傅之，刺即出。

又方，口稱鸕鷀，則下。

又，《古今録驗》：療魚鯁骨横喉中，六七日不出，取鯉魚鱗皮，合燒作屑，以水服之，則出，未出更服。

《勝金方》：治小兒大人一切骨鯁，或竹木簽刺喉中不下方。

於臘月中取鱖魚膽，懸北檐下，令乾。每魚鯁，即取一皂子許，以酒煎化，温温呷，若得逆，便吐，骨即隨頑涎出。若未吐，更吃温酒，但以吐爲妙。酒即隨性量力也，若未出，更煎一塊子，無不出者。此藥但是鯁物在藏腑中，日久痛，黄瘦甚者，服之皆出。若卒求鱖魚不得，鱟魚、鯇魚、鯽魚俱可，臘月收之，甚佳。

孟詵云：人患卒痘。

取杏仁三分，去皮尖，熬，别杵，桂一分，和如泥，取李核，用綿裹含，細細嚥之，日五夜三。

治卒誤吞諸物及患方第五十一

葛氏，誤吞釵方。

取薤曝令萎，煮使熟，勿切，食一大束，釵即隨出。生麥菜若節縷，皆可用。

誤吞釘及箭、金針、錢鐵等物方。

多食肥羊脂、諸般肥肉等，自裹之，必得出。

吞諸珠璫鐵而鯁方。

燒弩銅令赤，內水中，飲其汁，立愈。

誤吞錢。

燒火炭末，服方寸匕，即出。《小品》同。

又方，服蜜三升，即出。

姚氏，食中吞髮，繞喉不出方。

取梳頭髮，燒作灰，服一錢匕。

吞環若指彊。

燒鵝羽數枚，末，飲之

吞錢。

臘月米餳，頓服半升。

又方，濃煎艾汁服，效。

附方

《聖惠方》：治誤吞銀環子、釵子。以水銀半兩服之，再服，即出。

又方，治小兒誤吞針。用磁石如棗核大，磨令光，鑽作竅，絲穿，令含，針自出。

又方，治小兒誤吞銅鐵物，在咽喉內不下。

用南燭根，燒，細研，熟水調一錢，下之。

鐵相公《篋中方》：療誤吞錢。以磁石棗許大一塊，含之，立出。

又方，取艾蒿一把，細剉，用水五升，煎取一升，頓服，便下。

又《外臺秘要》：

取飴糖一斤，漸漸盡食之，環及釵便出。

又《楊氏產乳》：

菜耳頭一把，以水一升，浸水中，十餘度飲水，愈。

《孫用和方》：治誤吞金銀或錢，在腹內不下方。

石灰一杏核大，硫黃一皂子大，同研爲末，酒調下，不計時候。

姚氏方，治食中誤吞髮，繞喉不出。

取己頭亂髮，燒作灰，服一錢匕，水調。

陳藏器云：

故鋸無毒，主誤吞竹木入喉咽，出入不得者，燒令赤，漬酒中，及熱飲，并得。

治面疱髮禿身臭心悸鄙醜方第五

十二

葛氏療年少氣充，面生疱瘡。

胡粉、水銀、臘月猪脂，和熟研，令水銀消散，向暝以粉面，曉拭去，勿水洗，至暝又塗之，三度即差。姚方同。

又方，塗麋脂，即差。

又方，三歲苦酒，漬鷄子三宿，軟取白，以塗上。

隱居效方，疱瘡方。

黃連、牡蠣各二兩，二物搗篩，和水作泥，封瘡上，濃汁粉之，神驗。

冬葵散。

冬葵子、柏子仁、茯苓、瓜瓣各一兩，四物爲散，食後服方寸匕，日三，酒下之。

療面及鼻酒齄方。

真珠、胡粉、水銀分等，猪脂和塗。

又，鸕鷀矢和臘月猪脂塗，亦大驗，神效。

面多黑黯，或似雀卵色者。

苦酒煮术，常以拭面，稍稍自去。

又方，新生鷄子一枚，穿去其黄，以朱末一兩，内中漆固。别方云：蠟塞以鷄伏著例，出取塗面，立去而白。又别方，出西王母枕中，陳朝張貴妃常用膏方，鷄子一枚，丹砂二兩，末之，仍云安白鷄腹下伏之，餘同。鷄子令面皮急而光滑，丹砂發紅色，不過五度傅面，面白如玉，光潤照人，大佳。

卒病餘面如米粉傅者。

熬礬石，酒和塗之，姚云不過三度。

又方，白蘞二分，杏人半分，鷄矢白一分，搗下，以蜜和之，雜水以拭面，良。

療人頭面患癧瘍方。

雄黄、硫黄、礬石，末，猪脂和塗之。

又方，取生樹木孔中蚛汁拭之，末桂，和傅上，日再三。

又方，蛇蜕皮，熟以磨之，數百度，令熱，乃弃草中，勿顧。

療人面體黎黑，膚色麤❼陋，皮厚狀醜。

細搗羖羊脛骨，鷄子白和，傅面，乾，以白粱米泔汁洗之，三日如素，神效。

又方，蕪菁子二兩，杏仁一兩，并搗，破栝蔞去子，囊猪胰五具，淳酒和，夜傅之，寒月以爲手面膏。别方云：老者少，黑者白。亦可加土瓜根一兩，大棗七枚，日漸白悦。姚方，猪胰五具。神驗。

隱居《效驗方》：面黑令白去黯方。

烏賊魚骨、細辛、栝蔞、乾薑、椒各二兩，五物切，以苦酒漬三日，以成煉牛髓二斤，煎之，苦酒氣盡，藥成，以粉面，醜人特異鮮好，神妙方。

又，令面白如玉色方。

羊脂、狗脂各一升，白芷半升，甘草七尺，半夏半兩，烏喙十四枚，合煎，以白器成，塗面二十日即變，兄弟不相識，何况餘人乎？

《傳效方》：療化面方。

真珠屑、光明砂，并别熟研，冬瓜陳人各二兩，亦研，水銀四兩，以四五重帛練袋子貯之，銅鐺中，醋漿微火煮之一宿一日，堪用，取水銀和面脂，熟研使消，乃合珠屑、砂并瓜子末，更合調，然後傅面。

又，療人面無光潤，黑黔及皺，常傅面脂方。

細辛、萎蕤、黄耆、薯蕷、白附子、辛夷、芎藭、白芷各一兩，栝蔞、木蘭皮各一分，成煉猪脂二升，十一物切之，以綿裹，用少酒漬之一宿，内猪脂煎之，七上七下，别出一片白芷，内煎，候白芷黄色成，去滓，絞，用汁以傅面，千金不傳。此膏亦療金瘡并吐血。

療人黔，令人面皮薄如蕣華方。

鹿角尖，取實白處，於平石上以磨之，稍濃取一大合，乾薑一大兩，搗，密絹篩，和鹿角汁，攪使調匀，每夜先以暖漿水洗面，軟帛拭之，以白蜜塗面，以手拍，使蜜盡，手指不粘爲盡，然後塗藥，平旦還以暖漿水洗，二三七日，顔色驚人。塗藥不見風日，慎之。

又，面上暴生黔方。

生杏仁去皮，搗，以鷄子白和，如煎餅麵，入夜洗面，乾，塗之，旦以水洗之，立愈。姚方云：經宿拭去。

面上硉罍子化面并療，仍得光潤皮急方。

土瓜根搗篩，以漿水和，令調匀，入夜漿水以洗面，塗藥，旦復洗之，百日光華射人，夫妻不相識。

葛氏服藥取白方。

取三樹桃花，陰乾，末之，食前服方寸匕，日三。姚云：并細腰身。

又方，白瓜子中仁五分，白楊皮二分，桃花四分，搗末，食後服方寸匕，日三。欲白，加瓜子。欲赤，加桃花。三十日面白，五十日手足俱白。又一方有橘皮三分，無楊皮。

又方，汝❽苑三分，鉛丹一分，末，以醋漿服一刀圭，日三服，十日大便黑，十八十九日如漆，二十一日全白，便止，過此太白，其年過三十，難復療。服藥忌五辛。

又方，朱丹五兩，桃花三兩，末，井朝水服方寸匕，日三服，十日知，二十日太白，小便當出黑汁。

又方，白松脂十分，乾地黃九分，乾漆五分，熬，附子一分炮，桂心二分，搗下篩，蜜丸，服十丸，日三，諸蟲悉出，便肥白。

又方，乾薑、桂、甘草分等，末之，且以生鷄子一枚，內一升酒中，攪温以服方寸匕，十日知，一月白光潤。

又方，去黑。

羊❾膽、猪胰、細辛等分，煎三沸，塗面咽❿，旦醋漿洗之。

又方，茯苓、白石脂分等，蜜和塗之，日三度

服一種藥⓫，一月即得肥白方。

大豆黃炒，舂如作醬滓，取純黃一大升，搗篩，煉猪脂和令熟，丸，酒服二十丸，日再，漸加至三四十丸，服盡五升，不出一月，即大能食，肥白，試用之。

療人鬚鬢禿落不生長方。

麻子人三升，秦椒二合，置泔汁中一宿，去滓，日一沐，一月長二尺也。

又方，蔓荆子三分，附子二枚，碎，酒七升，合煮，器中封二七日，澤沐，十日長一尺。勿近面上，恐有毛生。

又方，桑白皮剉三二升，以水淹煮五六沸，去滓，以洗鬚鬢，數數爲之，即自不落。

又方，麻子人三升，白桐葉一把，米泔煮五六沸，去滓，以洗之，數之則長。

又方，東行桑根長三尺，中央當甑飯上蒸之，承取兩頭汁，以塗鬚鬢，則立愈。

療鬚鬢黃方。

燒梧桐灰，乳汁和，以塗膚及鬚鬢，佳。

染髮鬚，白令黑方。

醋漿煮豆，漆之，黑如漆色。

又方，先洗鬚髮令净，取石灰、胡粉分等，漿和温，夕卧塗訖，用油衣包裹，明日洗去，便黑，大佳。

又，拔白毛，令黑毛生方。

拔去白毛。以好白蜜任孔中，即生黑毛。眉中無毛，亦針挑傷，傅蜜，亦毛生。比見諸人水取石子，研丁香

汁，拔訖，急手傅，孔中亦即生黑毛，此法大神驗。

若頭風白屑，撿風條中方、脂澤等方，在此篇末。

姚方療黈。

白蜜和茯苓，塗上，滿七日，即愈。

又，療面胡粉刺方。

搗生菟絲絞⑫取汁，塗之，不過三五上。

又，黑面方。

牯羊膽、牛膽，淳酒三升，合煮三沸，以塗面，良。

面上惡瘡方。

黄連、黄檗、胡粉各五兩，下篩，以粉面上瘡。瘡方并出本條中，患，宜撿用之。

葛氏療身體及腋下狐臭方。

正旦以小便洗腋下即不臭。姚云大神驗。

又方，燒好礬石，作末，絹囊貯，常以粉腋下。又，用馬齒礬石，燒令汁盡，粉之，即差。

又方，青木香二兩，附子一兩，石灰一兩，細末，著粉腋中，汁出，即粉之。姚方有礬石半兩，燒。

若頭風白屑，撿風條中方、脂澤等方，在此篇末。

姚方療黈。

白蜜和茯苓，塗上，滿七日，即愈。

又，療面胡粉刺方。

搗生菟絲絞⑫取汁，塗之，不過三五上。

又，黑面方。

牯羊膽、牛膽，淳酒三升，合煮三沸，以塗面，良。

面上惡瘡方。

黄連、黄檗、胡粉各五兩，下篩，以粉面上瘡。瘡方并出本條中，患，宜撿用之。

葛氏療身體及腋下狐臭方。

正旦以小便洗腋下即不臭。姚云大神驗。

又方，燒好礬石，作末，絹囊貯，常以粉腋下。又，用馬齒礬石，燒令汁盡，粉之，即差。

又方，青木香二兩，附子一兩，石灰一兩，細末，著粉腋中，汁出，即粉之。姚方有礬石半兩，燒。

又方，炊飯及熱丸，以拭腋下臭，仍與犬食之，七日一如此，即差。

又方，煮兩鷄子熟，去殼皮，各内腋下，冷弃三路口，勿反顧，三爲之，良。

姚方，取牛脂、胡粉，合椒，以塗腋下，一宿即愈。可三兩度作之，則永差。

又，兩腋下及手足掌、陰下股裏，常汗濕致臭方。

乾枸杞根、干畜根、甘草半兩，干章陸、胡粉、滑石各一兩，六物以苦酒和，塗腋下，當汁出，易衣更塗，不過三傅，便愈。或更發，復塗之，不可多傅，傷人。腋餘處亦塗之。

若股内陰下常濕且臭或作瘡者方。

但以胡粉一分，粉之，即差。常用驗方。

隱居效方，療胡臭。

鷄舌、藿香、青木香、胡粉各二兩，

爲散，内腋下，綿裹之，常作，差。

令人香方。

白芷、薰草、杜若、杜蘅、藁本分等，蜜丸爲丸，但旦服三丸，暮服四丸，二十日足下悉香，云大神驗。

又方，瓜子、芎藭、藁本、當歸、杜蘅、細辛各二分，白芷、桂各五分，搗下，食後服方寸匕，日三服，五日口香，一十日肉中皆香，神良。

《小品》又方：

甘草、松樹根及皮、大棗、甜瓜子，四物分等，末，服方寸匕，日三，二十日覺效，五十日身體并香，百日衣服床幃皆香。姚同。

療人心孔悟塞，多忘喜誤。

七月七日，取蜘蛛網着領中，勿令人知，則永不忘也。姚方同。

又方，丁酉日，密自至市買遠志，著巾角中還，末服之，勿令人知。姚同。

又方，丙午日，取鱉甲著衣帶上，取牛、馬、猪、鷄心，干之，

末，向日酒服方寸匕，日三，問一知十。

孔子大聖智枕中方，已出在第九卷，姚同。

又方，茯苓、茯神、人參五分，遠志七分，菖蒲二分，末，服方寸匕，日三夜一服。

又方，章陸花陰干一百日，搗末，暮水服方寸匕，暮卧思念所欲知事，即於眠中醒悟。

又方，上黨人參半斤，七月七日麻勃一升，合搗，蒸，使氣盡遍，服一刀圭，暮卧，逆知未然之事。

療人嗜眠喜睡方。

馬頭骨燒作灰，末，服方寸匕，日三夜一。

又方，父鼠目一枚，燒作屑，魚膏和，注目外眦，則不肯眠，兼取兩目絳囊裹帶。

又方，麻黄、术各五分，甘草三分，日中南搗末，服一方寸匕。日三。姚方，人不忘。

菖蒲三分，茯苓五分，伏神、人參各五分，遠志七分，末，服方寸匕，日三夜一，五日則知，神良。

傅用方，頭不光澤，臘澤飾髮方。

青木香、白芷、零陵香、甘松香、澤蘭各一分，用綿裹，酒漬再宿，内油裹煎再宿，加臘澤斟量硬軟即火急煎，著少許胡粉烟脂訖，又緩火煎令粘極，去滓，作梃以飾髮，神良。

作香澤塗髮方。

依臘澤藥，内漬油裹煎，即用塗髮，亦綿裹，煎之。

作手脂法。

猪胰一具，白芷、桃人碎各一兩，辛夷各二分，冬瓜人二分，細辛半分，黄瓜、栝蔞人各三分，以油一大升，煮白芷等二三沸，去滓，挼猪胰取盡，乃内冬瓜、桃人末合和之，膏成，以塗手掌，即光。

藾豆香藻法。

藾豆一升，白附、芎藭、白芍藥、水栝蔞、當陸、桃人、冬瓜人各二兩，搗篩，和合，先用水洗手面，然後傅藥粉飾之也。

六味薰衣香方。

沉香一片，麝香一兩，蘇合香，蜜塗微火炙，少令變色，白膠香一兩，搗沉香令破，如大豆粒，丁香一兩，亦別搗，令作三兩段，搗餘香訖，蜜和爲炷，燒之，若薰衣著半兩許。又藿香一兩，

葛氏，既有膏傅面染髮等方，故疏脂澤等法，亦粉飾之所要云。

髮生方。

蔓荆子三分，附子二枚，生用，并碎之，二物以酒七升和，内瓷器中封閉，經二七日藥成。先以灰汁净洗鬚髮，痛拭乾，取烏鷄脂揩，一日三遍，凡經七日，然後以藥塗，日三四遍，四十日長一尺，餘處則勿塗。

附方

《肘後方》：姚氏療黑。

茯苓末，白蜜和塗上，滿七日，即愈。

又方，療面多皯黯，如雀卵色。

以羖羊膽一枚，酒二升，合煮三沸，以塗拭之，日三度差。

《千金方》：治血黑面皺。

取蔓菁子爛研，入常用面脂中，良。

《崔元亮海上方》：滅瘢膏。

以黄礬石燒令汁出、胡粉炒令黄各八分，惟須細研，以臘月猪脂和，更研如泥，先取生布揩令痛，則用藥塗，五度。又，取鷹屎白、燕窠中草燒作灰等分，和人乳塗之，其瘢自滅，肉平如故。

又方，治面黑子。

取李核中人，去皮，細研，以鷄子白和如稀餳，塗，至晚每以淡漿洗之，後塗胡粉，不過五六日，有神。慎風。

孫真人《食忌》：去黡子。

取石灰，炭上熬令熱，插糯米於灰上，候米化，即取米點之。

《外臺秘要》：救急去黑子方。

夜以暖漿水洗面，以布揩黑子令赤痛，水研白檀香，取濃汁以塗之，旦又復以漿水洗面，仍以鷹糞粉黑子。

又，令面生光方。

以蜜陀僧用乳煎，塗面佳。兼德瘡鼻疱。

《聖惠方》：治黔黯斑點方。

用蜜陀僧二兩，細研，以人乳汁調塗面，每夜用之。

又方，治黑痣生於身面上。

用藜蘆灰五兩，水一大碗，淋灰汁於銅器中貯，以重湯煮令如黑膏，以針微撥破痣處點之，良，不過三遍，神驗。

又方，生眉毛。

用七月烏麻花，陰乾爲末，生烏麻油浸，每夜傅之。

《千金翼》：老人令面光澤方。

大猪蹄一具，洗淨，理如食法，煮漿如膠，夜以塗面，曉以漿水洗面，皮急矣。

《譚氏小兒方》：療豆瘡瘢面黡。

以蜜陀僧細研，水調，夜塗之，明旦洗去，平復矣。

有治癜瘍三方，具風條中。

《千金方》：治諸腋臭。

伏龍肝澆作泥，傅之，立差。

《外臺秘要》：治狐臭，若股内陰下恒濕臭，或作瘡。

青木香，好醋浸，致腋下夾之，即愈。

又，生狐臭。

以三年醯醋，和石灰傅之。

《經驗方》：善治狐臭。

用生薑塗腋下，絶根本。

又方，治黑痣生於身面上。

又方，烏髭鬢，駐顔色，壯筋骨，明耳目，除風氣，潤肌膚，久服令人輕健。

蒼术不計多少，用米泔水浸三兩日，逐日換水，候滿日即出，刮去黑皮，切作片子，暴乾，用慢火炒令黄色，細搗末，每一斤末，用蒸過茯苓半斤，煉蜜爲丸，如梧桐子大，空心、卧時温熟水下十五丸，别用术末六兩，甘草末一兩，拌和勻，作湯點之，下术丸，妙。忌桃、李、雀、蛤及三白。

《千金方》：治髮落不生，令長。

麻子一升，熬黑，壓油，以傅頭，長髮，妙。

又，治髮不生。

以羊屎灰，淋取汁洗之，三日一洗，不過十度即生。

又，治眉髮髭落。

石灰三升，以水拌勻，焰火炒令

焦，以絹袋貯，使好酒一斗漬之，密封，冬十四日，春、秋七日，取服一合，常令酒氣相接。嚴云百日，即新髭髮生不落。

孫真人《食忌》生髮方。

取側柏葉，陰乾作末，和油塗之。

又方，令髮鬢烏黑。

醋煮大豆黑者，去豆，煎令稠，傅髮。

又方，治頭禿。

蕪菁子末，酢和傅之，日三。

《梅師方》：治年少髮白，拔去白髮。

以白蜜塗毛孔中，即生黑者。髮不生，取梧桐子搗汁塗上，必生黑者。

《千金翼》：療髮黃。

熊脂塗髮，梳之散，頭入床底，伏地一食頃，即出，便盡黑，不過一升脂，驗。

《楊氏產乳》：療白禿瘡及髮中生癬。

取熊白，傅之。

又，療禿瘡。

取虎膏，塗之。

《聖惠方》：治白禿。

以白鴿糞，搗，細羅爲散，先以醋米泔洗了，傅之，立差。

又治頭赤禿。

用白馬蹄燒灰，末，以臘月猪脂和傅之。

《簡要濟衆》：治頭瘡。

大笋殼葉，燒爲灰，量瘡大小，用灰調生油⑩傅，入少臘粉，佳。

葛仙翁肘後備急方卷之六

---

❶甜：原作『忸』，據萬曆本改。

❷泪：原作『浪』，據萬曆本改。

❸四十七：此上闕四十四、四十五、四十六，疑誤。

❹徹：原作『飲』，據萬曆本改。

❺自：原作『目』，據萬曆本改。

❻永：原作『水』，據萬曆本改。

❼麤：原作『鹿』，據萬曆本改。

❽汝：萬曆本作『女』。

❾羊：原作『洋』，據萬曆本改。

❿咽：疑當作『醫』，連上讀。

⓫藥：原作『築』，據萬曆本改。

⓬絞：原作『綉』，據萬曆本改。

⓭油：原作『由』，據萬曆本改。

葛仙翁肘後備急方卷之七

治為熊虎爪牙所傷毒痛方第五十三

葛氏方，燒青布以薰瘡口，毒即出，仍煮葛根令濃，以洗瘡，搗乾葛根末，以煮葛根汁，服方寸匕，日五夜一則佳。

又方，嚼粟塗之。姚同。

又，煮生鐵令有味，以洗瘡上。姚同。

凡猛獸毒蟲皆受人禁氣，將入山草，宜先禁之，其經術云：

到山下先閉氣三十五息，存神仙將虎來到吾前，乃存吾肺中，有白帝出，把虎兩目塞，吾下部又乃吐肺氣，白通冠一山林之上。於是良久，又閉氣三十五息，兩手捻都監目作三步，步皆以右足在前，乃止，祝曰：李耳，李耳，圖汝非李耳耶，汝盜黃帝之犬，黃帝教我問汝，汝答之云何。畢便行，一山之虎不可得見。若逢之者，目向立，

大張左手五指，側之極勢跳，手上下三度，於跳中大喚❶咄虎，北斗君汝去，虎即走，止宿亦先四凹❷如此。又，燒牛羊角，虎亦不敢近人。又，搗雄黄、紫石，縫囊貯而帶之。

附方

《梅師方》：治虎傷人瘡。

但飲酒，常令大醉，當吐毛出。

治卒為❸猘犬凡所咬毒方第五十四

療猘犬咬人方。

先嗍却惡血，灸瘡中十壯，明日以去，日灸一壯，滿百乃止。姚云忌酒。

又云，地榆根，末，服方寸匕，日一二，亦末傅瘡上，生根搗傅佳。

又方，刮虎牙、若虎骨，服一匕，已發如猘犬者，服此藥即差。姚同。

又方，仍殺所咬犬，取腦傅之，後不復發。

又方，搗薤汁傅之，又飲一升，日三，瘡乃差。

又方，末礬石，内瘡中裹之，止瘡不壞，速愈神妙。

又方，頭髮、猬皮，燒末，水和飲一杯，若或已目赤口噤者，折齒下之。姚云：二物等分。

又方，搗地黄汁飲之，并以塗瘡，過百度止。

又方，末乾薑常服，并以内瘡中。

凡猘犬咬人，七日一發，過三七日不發，則脱也，要過百日，乃爲大免耳。

每到七日，輒當飲薤汁三二升，又及末礬石傅之，尤佳。

得犬嚙者難療，凡犬食馬肉生狂。當終身禁食犬肉、鱉、蠶蛹，食此發則不可救矣。瘡未差之間，亦忌生物、諸肥膩及冷，但於飣下蒸魚及就膩氣中食便發。不宜飲酒，能過一年乃佳。

若重發療方。

生食蟾蜍鱠，絶良驗。姚同。亦可燒炙食之，不必令其人知，初得嚙便爲之，則後不發。姚剥作鱠吞，蒜齏下。

又方，搗薑根汁，飲之即差。姚同。

又方，服蔓菁汁亦佳。

又，凡犬咬人，封之差。

取竈中熱灰，以粉瘡，傅之。姚同。

又方，火炙蠟以灌瘡中。姚同。

又方，以頭垢少少内瘡中，以熱牛屎塗之，佳。姚同。

又方，掇蓼以傅瘡上。

又方，乾薑末，服二匕。薑汁服半升亦良。

又方，但依猘犬法，彌佳，燒蟾蜍，及末礬石傅之，尤佳。

附方

《梅師方》：治狂狗咬人。

取桃白皮一握，水三升，煎取一升服。

《食療》：治犬傷人。

杵生杏人，封之差。

治卒毒及狐溺棘所毒方第五十五

馬嚼人作瘡有毒，種❹熱疼痛方。

刺鷄冠血，瀝著瘡中三下。若駁馬用雌鷄，草馬用雄鷄。姚同。

又方，灸瘡及腫上，差。

若瘡久不差者。

馬鞭梢長二寸，鼠矢二七枚燒，末，膏和傅之效。

又方，以婦人月經傅上最良。姚云神效。

人體上先有瘡而乘馬，馬汗若馬毛入瘡中，或但爲馬氣所蒸，皆致腫痛煩熱，入腹則殺人。

燒馬鞭皮，末，以膏和傅上。

又方，多飲淳酒取醉，即愈。

又，剥死馬，馬骨傷人手，毒攻欲死方。

便取死馬腹中屎，塗之即差。姚同。

又方，以手内女人陰中，即愈。有胎者不可，令胎墮。

狐尿棘刺刺人，腫痛欲死方。

破鷄搦之，即差。

又方，以熱桑灰汁漬，冷復易，取愈。

《小品方》：以熱蠟著瘡中，又烟熏之，令汁出，即便愈。

此狐所尿之木，猶如蛇蚘也，此下有魚骨傷人。

附方

《圖經》云：治惡刺，及狐尿刺。

搗取蒲公草根莖白汁，塗之，惟多塗，立差止。此方出孫思邈《千金方》，其序云：余以正觀五年七月十五日夜，以左手中指背觸著庭木，至曉，遂患痛不可忍，經十日，痛日深，瘡日高大，色如熟小豆色。嘗聞長者之論有此方，遂依治之，手下則愈，痛亦除，瘡亦即差，未十日而平復。楊炎《南行方》亦著其效云。

效方，治狐尿刺螫痛。

杏人細研，煮一兩沸，承熱以浸螫處，數數易之。

《外臺秘要》：治剥馬被骨刺破，中毒欲死。

取剥馬腹中糞，及馬尿洗，以糞傅之，大驗。絞糞汁飲之，效。

《聖惠方》：治馬咬人，毒入心。

馬齒莧，湯食之，差。

《靈苑方》：治馬汗入瘡，腫痛漸甚，宜急療之，遲則毒深難理。

以生烏頭，末，傅瘡口，良久有黄水出，立愈。

王氏《博濟》：治驢涎馬汗毒所傷，神效。

白礬飛過，黄丹炒令紫色，各等分，相衮合，調貼患處。

治卒青蛙蝮虺衆蛇所螫方第五十六

葛氏，竹中青蜂螫人方。

雄黄、麝香、乾薑分等，搗篩，以麝罔和之，著小竹管，帶之行。急便用傅瘡，兼衆蛇虺毒之，神良。

又方，破烏鷄，熱傅之。

蛇，緑色，喜緣樹及竹上，大者不過四五尺，皆呼爲青條蛇，人中立死。

葛氏，毒蛇螫人方。急掘作坑，以埋瘡處，堅築其上，毒即入土中，須臾痛緩，乃出。

徐王治蛇毒方。用搗地榆根，絞取汁飲，兼以漬瘡。

又方，搗小蒜飲汁，以滓傅瘡上。

又方，猪耳垢著瘡中，牛耳中垢亦可用之，良。

又方，嚼鹽唾上訖，灸三壯，復嚼鹽，唾之瘡上。

又方，搗薤傅之。

又方，燒蜈蚣，末，以傅瘡上。

又方，先以無節竹筒著瘡上，熔蠟及蜜等分，灌筒中。無蜜，單蠟亦通。

又方，急且尿瘡中，乃拔向日閉氣三步，以刀掘地作小坎，以熱湯沃坎中泥，作丸如梧子大服之，并以少泥，泥之瘡上，佳。

又方，桂心、栝蔞分等，爲末，用小竹筒密塞之，以帶行，卒爲蝮蛇，即傅之。此藥療諸蛇毒，塞不密，則氣歇不中用。

一切蛇毒。

急灸瘡三五壯，則衆毒不能行。

蛇毒。

搗鬼針草，傅上即定。

又方，荆葉袋貯，薄瘡腫上。

又方，以射罔塗腫上，血出乃差。

又方，以合口椒并葉，搗，傅之，無不止。

又方，切葉刀，燒赤烙之。

附方

《梅師方》：治蛇虺螫人，九竅皆血出方。

以獨頭蒜、酸草，搗絞，傅所咬處。

《廣利方》：治蛇咬方

取黑豆葉，剉，杵，傅之，日三易，良。

《廣濟方》：治毒蛇嚙方。

菰蔣草根灰，取以封之。其草似燕尾也。

《兵部手集》：主蛇、蝎、蜘蛛毒。

鷄卵輕敲一小孔，合咬處，立差。

劉禹錫《傳信方》：治蛇咬蝎螫。

燒刀子頭令赤，以白礬置刀上，看得力者數十人，貞元三十二年，有兩僧流向南到鄧州，俱爲蛇嚙，令用此法救之，傅藥了便發，更無他苦。

治蛇瘡敗蛇骨刺人入口繞身諸方　第五十七

葛氏，凡蛇瘡未愈，禁熱食，食便發，療之依初螫人法。

蛇螫人，九竅皆血出方。

取虹蟲初食牛馬血腹滿者二七枚，燒，服之。

此上蛇瘡敗及洪腫法方，蛇螫人，牙折入肉中，痛不可堪方。

取黑豆葉，剉，杵，傅之，日三易，痛不可堪方。

又方，取蝦蟆肝以傅上，立出。

人見，以再覆瘡口上，一時著葉當上穿，穿即折牙出也。

蛇骨刺人毒痛方。

以鐵精如大豆者，以管吹瘡内。

姚同。

又方，燒死鼠，搗，傅之瘡上。

蛇螫人，瘡已合，而餘毒在肉中，成汁，便熱滴咬處，立差。此極神驗，

淫淫痛癢方。

取大小蒜各一升，合搗，熱湯淋取汁，灌瘡中。姚同。

蛇卒繞人不解方。

以熱湯淋即解，亦可令就尿之。

蛇入人口中不出方。

艾灸蛇尾即出。若無火，以刀周匝割蛇尾，截令皮斷，乃將皮倒脫，即出。《小品》同之。

七八月中，諸蛇毒旺不得泄，皆嚙草木，即枯死，名爲蛇蚳，此物傷人甚於蛇螫，即依蛇之螫法療之。

附方

《廣利方》：治蛇咬瘡。暖酒，淋洗瘡上，日三易。

《聖惠方》：治蛇入口，并入七孔中。

治卒入山草禁辟衆蛇藥術方第五十八

辟衆蛇方。

同前姚氏仙人入山草法。

辟蛇之藥雖多，唯以武都雄黃爲上，帶一塊，右稱五兩於肘間，則諸蛇毒莫敢犯。

他人中者，便磨以療之。又帶五蛄黃丸良。丸有蜈蚣，故方在於備急中，此下有禁法云，不受而行，則無驗。

蛇毒勿渡水，渡水則痛甚於初螫。亦當先存想作大蜈蚣，前已隨後渡，若乘船渡，不作法，殺人。

入山并不得呼作蛇，皆喚爲蛇中之者，彌宜勿誤。辟蛇法：到處燒羖羊角，令有烟出地，則去矣。

附方

《梅師方》：治蜈蚣咬人，痛不止。獨頭蒜，摩螫處，痛止。

又，《經驗後方》：燒鷄屎，酒和傅之佳。又，取鷄屎和醋傅之。

《聖惠方》治蜈蚣咬方。

用蝸牛擦取汁，滴入咬處。

《兵部手集》：治蜘蛛咬，遍身成瘡。

取上好春酒飲醉，使人翻不得，一向卧，恐酒毒腐人，須臾蟲於肉中小如米自出。

又《譚氏小兒方》：以葱一枝，去

治卒蜈蚣蜘蛛所螫方第五十九

葛氏方，割鷄冠血塗之。

尖，頭作孔，將蚯蚓入葱葉中，緊捏兩頭，勿泄氣，頻摇動，即化爲水，點咬處差。

劉禹錫《傳信方》：治蟲豸傷咬。取大藍汁一碗，入雄黄、麝香，二物隨意看多少，細研，投藍中，以點咬處，若是毒者，即并細服其汁，神異之極也。昔張員外在劍南爲張延賞判官，忽被斑蜘蛛咬項上，一宿，咬有二道赤色，細如箸，繞項上，從胸前下至心經；兩宿，頭面腫疼，如數升碗大，肚漸腫，幾至不救。張相素重薦，因出家資五百千，并薦家財，又數百千，募能療者。忽一人應召云：可治。張相初甚不信，欲驗其方，遂令目前合藥，其人云：不惜方，當療人性命耳。遂取大藍汁一瓷碗，取蜘蛛投之藍汁，良久方出，得汁中甚困不能動，又别搗藍汁，加麝香末，更取蜘蛛投之，至汁而死，又更取藍汁、麝香，復加雄黄和之，更取一蜘蛛投汁中，隨化爲水。張相及諸人甚異之，遂令點於咬處，兩日内悉平愈，但咬處作小瘡。痂落如舊。

《經驗方》：治蜘蛛咬，遍身生絲。羊乳一升飲之。貞元十年，崔員外從質云：目擊有人被蜘蛛咬，腹大如孕婦，其家弃之，乞食於道，有僧遇之，教飲羊乳，未幾日而平。

又方，治蚯蚓咬。濃作鹽湯，浸身數遍，差。浙西軍將張韶，爲此蟲所咬，其形大如風，眉鬚皆落，每夕蚯蚓鳴於體，有僧教以此方愈。

又方，治蚯蚓蟲咬，遍身生絲。著處，便令人體病瘡，其狀如粟粒累累，一聚慘痛，身中忽有處燥痛如芒刺，亦如刺蟲所螫後，細瘡瘺作叢，如茱萸子狀也，四畔赤，中央有白膿如黍粟，亦令人皮急，舉身惡寒壯熱，極者連起，竟腰脊胸也。治之法，初得磨犀角，塗之止。

又方，治蠼螋蟲尿人影。

《博物志》：治蠼螋蟲溺人影，亦隨所著作瘡。

以鷄腸草汁傅之良。

《外臺秘要》：治蠼螋尿瘡，繞身匝即死。

以燕巢中土，猪脂、苦酒和傅之。

又方，治蠼螋尿人成瘡，初燒鹿角，末，以苦酒調塗之。

錢相公方：療蠼螋尿瘡黄水出。嚼梨葉傅之，乾即易。

《勝金方》：治蠼螋尿人成瘡，初如糝粟，漸大如豆，更大如火烙漿庖，疼痛至甚，宜速用草茶，并臘茶俱可，以生油調，傅上，其痛藥至立止，妙。

《聖惠方》：治惡蟲咬人。

用紫草油塗之。

又方，以酥和鹽傅之。

治卒蠆螫方第六十

以玉壺丸及五蛄丸，塗其上并得。

其方在備急丸散方中。

又方，取屋霤下土，水和傅之。

治卒蜂所螫方第六十一 ❺

居住屋山，嘗於齊中，見一大蜂竄，爲蛛網絲縛之，爲蜂所螫墜地，俄頃，蛛鼓腹欲裂，徐徐行入草嚙芋梗，微破，以瘡就嚙處磨之，良久，腹漸消，輕躁如故。自後人有爲蜂螫者，授芋梗，傅之則愈。

治卒蝎所螫方第六十二

蝎螫人。

温湯漬之。

又方，授馬莧、大蒜。又，嚼乾薑，塗之，佳。姚方以冷水漬螫處，即不痛。水微暖便痛，即易水。又，以冷漬故布，搦之，數易。

新效方，蜀葵花、石榴花、艾心分等，并五月五日午時取，陰乾，合搗，和水塗之螫處，立定。一二花未定，又鬼針草，授汁傅之，立差。又，黄丹醋塗之。又，生烏頭，末，唾傅之。又，射罔封之，温酒漬之，即愈。

蜂螫人。

取人尿洗之。

又方，穀樹、桑樹白汁，塗之并佳。

又方，刮齒垢塗之。又煮蜂房塗之。燒牛角灰，苦酒和塗之。又斷葫，揩之。又，嚼青蒿傅之。

附方

《千金方》：治蜂螫人。用露蜂房末，猪膏和傅之。《楊氏産乳》：蜂房煎湯洗，亦得。

又，《外臺秘要》：授薄荷貼之差。

又，《聖惠方》：以酥傅之愈。

孫真人《食忌》：主蝎螫。

以礬石一兩，醋半升煎之，投礬末於醋中，浸螫處。

又，《勝金方》：烏頭末少許，頭醋調傅之。

又，錢相公《簸中方》：取半夏，以水研，塗之立止。

又《食醫心鏡》：以醋磨附子，傅之。

又，《經驗方》：治蝎螫人，痛不止方。

崔給事傳。

《廣利方》：以驢耳垢傅之差。

楮樹白汁，塗之立差。

治中蠱毒方第六十三

葛氏方，療蠱毒下血方。

羖羊皮方三寸，得敗鼓亦好，蘘荷水塗之螫處，立定。一方加犀角、升麻各草，授汁傅之，立差。又，黄丹醋塗之。又，生烏頭，末，唾傅之。又，射罔封之，温酒漬之，即愈。

葉、苦參、黄連、當歸各二兩，水七升，煮二升，分三服。一方加犀角、升麻各三兩。無蘘荷根，用茜根四兩代之，佳。

人有養畜蠱以病人，其診法：

中蠱令人心腹切痛，如有物嚙，或吐下血，不即療之，食人五藏則死矣。欲知蠱與非蠱，當令病人唾水中，沉者是，浮者非。《小品》、姚并同。

欲知蠱毒主姓名方。

取鼓皮少少，燒末飲病人，病人須臾自當呼蠱主姓名，可語便去，則便愈。亦有蛇蜒合作蠱毒著飲食中，使人得瘕病，此一種積年乃死，療之各自有藥。又，蘘荷葉，密著病人卧席下，其病人即自呼蠱主姓名也。

療中蠱毒吐血或下血，皆如爛肝方。

茜草根、蘘荷根各三兩，㕮咀，以水四升，煮取二升，去滓，適寒温，頓服即愈。又自當呼蠱主姓名。茜草即染絳草也。《小品》并姚方同也。

又方，巴豆一枚，去心皮，熬，豉三粒，釜底墨方寸匕，合搗爲三丸，一丸當下毒，不可者，更服一丸，即下。

又方，鹽一升，淳苦酒和，一服立吐，即愈。《小品》同。支方，苦酒一升，煮令消，服愈。

又方，取蚯蚓十四枚，以苦酒三升漬之，蚓死，但服其汁。已死者，皆可活。

又方苦瓠一枚，水二升，煮取一升服，立即吐，愈。《小品》同。支方，用苦酒一升，煮令消服，神驗。

又方，皂莢三梃，炙，去皮子，酒五升，漬一宿，去滓，分三服。《小品》同。

療飲中蠱毒，令人腹内堅痛，面目青黄，淋露骨立，病變無常方，取鐵精搗之，細篩，又別搗烏鷄肝以和之，丸如梧子大，服三丸，甚者不過十日，微者即愈。別有鐵精方。

又方，猪肝一具，蜜一升，共煎之，令熟，分爲二十服，秘方。《小品》同。支方分作丸，亦得。

又方，取棗木心，剉得一斛，著釜中淹之，令上有三寸水，煮取二斗，澄取清，微火煎得五升，宿勿食，旦服五合，則吐蠱毒出。《小品》、姚同之。

又方，雄黄、丹砂、藜蘆各一兩，搗末，旦以井華水服一刀圭，當下吐蠱蟲出。極神驗。此物苗似葛蔓，緣柴桔梗苗，人皆食之。

又方，隱蕊草汁，飲一二升。此草生子似橘子。

治蠱已食下部，肚盡腸穿者。

取長股蝦蟆青背一枚，鷄骨，支方，一分燒爲灰，合，内下部令深入。《小品》同。支方屢用大驗，姚方亦同。

又方，以猪膽瀝内下部中，以綿深塞之。

又方，五蠱黄丸　最爲療蠱之要，導内塞之。

又方，取蚯蚓十四枚，以苦酒三升漬之，蚓死，但服其汁。已死者，皆可活。

又方苦瓠一枚，水二升，煮取一升服，立即吐，愈。《小品》同。支方，用苦酒一升，煮令消服，神驗。

又方，皂莢三梃，炙，去皮子，酒五升，漬一宿，去滓，分三服。《小品》同。

療飲中蠱毒，令人腹内堅痛，面目青黄，淋露骨立，病變無常方，取鐵精搗之，細篩，又別搗烏鷄肝以和之，丸如梧子大，服三丸，甚者不過十日，微者即愈。別有鐵精方。

又方，猪肝一具，蜜一升，共煎之，令熟，分爲二十服，秘方。《小品》同。支方分作丸，亦得。

又方，取棗木心，剉得一斛，著釜中淹之，令上有三寸水，煮取二斗，澄取清，微火煎得五升，宿勿食，旦服五合，則吐蠱毒出。《小品》、姚同之。

又方，雄黄、丹砂、藜蘆各一兩，搗末，旦以井華水服一刀圭，當下吐蠱蟲出。極神驗。此物苗似葛蔓，緣柴桔梗苗，人皆食之。

又方，隱蕊草汁，飲一二升。此草生子似橘子。

治蠱已食下部，肚盡腸穿者。

取長股蝦蟆青背一枚，鷄骨，支方，一分燒爲灰，合，内下部令深入。《小品》同。支方屢用大驗，姚方亦同。

又方，以猪膽瀝内下部中，以綿深塞之。

又方，五蠱黄丸　最爲療蠱之要，導内塞之。

又方，取蚯蚓十四枚，以苦酒三升漬之，蚓死，但服其汁。已死者，皆可活。

又方苦瓠一枚，水二升，煮取一升服，立即吐，愈。《小品》同。支方，用苦酒一升，煮令消服，神驗。

又方，皂莢三梃，炙，去皮子，酒五升，漬一宿，去滓，分三服。《小品》同。

療飲中蠱毒，令人腹内堅痛，面目青黄，淋露骨立，病變無常方，取鐵精搗之，細篩，又別搗烏鷄肝以和之，丸如梧子大，服三丸，甚者不過十日，微者即愈。別有鐵精方。

又方，猪肝一具，蜜一升，共煎之，令熟，分爲二十服，秘方。《小品》同。支方分作丸，亦得。

又方，取棗木心，剉得一斛，著釜中淹之，令上有三寸水，煮取二斗，澄取清，微火煎得五升，宿勿食，旦服五合，則吐蠱毒出。《小品》、姚同之。

又方，雄黄、丹砂、藜蘆各一兩，搗末，旦以井華水服一刀圭，當下吐蠱蟲出。極神驗。此物苗似葛蔓，緣柴桔梗苗，人皆食之。

又方，隱蕊草汁，飲一二升。此草生子似橘子。

治蠱已食下部，肚盡腸穿者。

取長股蝦蟆青背一枚，鷄骨，支方，一分燒爲灰，合，内下部令深入。《小品》同。支方屢用大驗，姚方亦同。

又方，以猪膽瀝内下部中，以綿深塞之。

又方，五蠱黄丸　最爲療蠱之要，導内塞之。

又方，取蚯蚓十四枚，以苦酒三升漬之，蚓死，但服其汁。已死者，皆可活。

又方苦瓠一枚，水二升，煮取一升服，立即吐，愈。《小品》同。支方，用苦酒一升，煮令消服，神驗。

又方，皂莢三梃，炙，去皮子，酒五升，漬一宿，去滓，分三服。《小品》同。

療飲中蠱毒，令人腹内堅痛，面目青黄，淋露骨立，病變無常方，取鐵精搗之，細篩，又別搗烏鷄肝以和之，丸如梧子大，服三丸，甚者不過十日，微者即愈。別有鐵精方。

又方，猪肝一具，蜜一升，共煎之，令熟，分爲二十服，秘方。《小品》同。支方分作丸，亦得。

又方，取棗木心，剉得一斛，著釜中淹之，令上有三寸水，煮取二斗，澄取清，微火煎得五升，宿勿食，旦服五合，則吐蠱毒出。《小品》、姚同之。

又方，雄黄、丹砂、藜蘆各一兩，搗末，旦以井華水服一刀圭，當下吐蠱蟲出。極神驗。此物苗似葛蔓，緣柴桔梗苗，人皆食之。

凡畏已中蠱，欲服甘草汁。宜生煮服之，當吐疾出。若平生預服防蠱毒者，宜熟炙煮服，即內消不令吐，神驗。

又方，甘草炙，每合嚥汁。若因食中蠱反毒，即自吐出，極良。常含嚥之，永不慮藥及蠱毒也。

又有解百毒散，在後藥毒條中，亦療方。

桑白汁一合服之，須臾吐利，蠱出。

席辯刺史傳效二方云：并試用神驗。

斑猫蟲四枚，去足翅，炙，桃皮五月初五采取，去黑皮，陰乾，大戟，凡三物并搗，別篩，取斑猫一分，桃皮、大戟各二分，合和棗核大，以米清飲服之，訖，吐出蠱。一服不差，十日更一服，差。此蠱洪州最多，老媪解療一人，得縑二十疋，秘方不可傳，其子孫犯法，黃花公若於則爲都督，因以得之流傳，老媪不復得縑。席云：已差十餘人也。

又方，羖羊皮方寸匕，薤荷根四兩，苦參、黃連各二兩，當歸、犀角、升麻各三兩，七物以水九升，煮取三升，分三服，蠱即出。席云：曾與一人服，應時吐蜂兒數升，即差。此是姚大夫方。

附方

《千金翼方》：療蠱毒。以槲木北陰白皮一大握，長五寸，以水三升，煮取一升，空腹分服，即吐蠱出也。

又，治蠱毒下血。

猬皮燒，末，水服方寸匕，當吐蠱毒。

《外臺秘要》：救急治蠱。

以白鴿毛、糞燒灰，飲和服之。

《楊氏產乳》：療中蠱毒。

生玳瑁，以水磨如濃飲，服一盞，自解。

《聖惠方》：治小兒中蠱，下血欲死。

搗青藍汁，頻頻服半合。

治卒中溪毒方第六十四

姚氏中水毒秘方。

取水萍曝乾，以酒服方寸匕，差止。又云：中水病，手足指冷，即是。若暖，非也。其冷或一寸，極或竟指，未過肘膝一寸淺，至於肘膝爲劇。

葛氏，水毒中人，一名中溪，一名中灑東人呼爲蘇駭切，一名水病，似射工而無物，其診法：

初得之惡寒，頭微痛，目注疼，心中煩懊，四肢振浙，骨節皆强，筋急，但欲睡，旦醒暮劇，手逆冷，三日則復生蟲，食下瘡，不痛不癢不冷，人覺視之乃知。不即療，過六七日，下部膿潰，蟲食五藏，熱極煩毒，注下不禁。八九日，良醫不能療。覺得急，當深視下部，若有瘡，正赤如截肉者，爲陽毒，最急。若瘡如蠶魚齒者，爲陰毒，猶小緩。要皆煞人，不過二十日。欲知是中水毒，當作數升湯，以小蒜五寸，叹咀，投湯中，莫令大熱，熱即無力，捩去

滓，適寒温以浴。若身體發赤斑文者，又無異證，當以他病療之也。

病中水毒方。

取梅若桃葉，搗絞汁三升許，以少水解爲飲之。姚云：小兒不能飲，以汁傅乳頭，與之。

又方，常思草，搗絞，飲汁一二升，并以綿染寸中，以導下部，日三過，即差。

又方，搗藍青汁，以少水和塗之，頭面身體令匝。

又方，取梨葉一把，熟搗，以酒一杯和絞，服之，不過三。

又方，取蛇莓草根，搗作末，服之，并以導下部，亦可飲汁一二升。夏月常行，欲入水浴，先以少末投水中流，更無所畏。又，辟射工，家中雖以器貯水浴，亦宜少末投水中，大佳。

今東閒諸山縣，無不病溪毒，春月皆得，亦如傷寒，呼爲溪温，未必是射工輩，亦盡患瘡痢，但寒熱煩疼不解，便致死耳。方家用藥與傷寒温疾相似，令施其單法。

五加根燒末，酒若漿水飲之。荆葉汁，佳。千金不傳，秘之。

又方，密取蓼搗汁，飲一二合，又以塗身令周匝。

取牛膝莖一把，水酒共一杯，漬，絞取汁飲之，日三。雄牛膝，莖紫色者是也。

若下部生瘡，已決洞者。

秫米一升，鹽五升，水一石，煮作將純白鵝以辟之，白鴨亦善，帶好生犀角佳也。

若見身中有此四種瘡處，便急療之。

急周繞遍，去此瘡邊一寸，輒炙一處百壯，瘡亦百壯，則差。

又方，赤莧莖、葉，搗絞取汁飲之，以滓傅之。姚云：服七合，日四五服。

又方，胡蒜，令傅以搦瘡上，灸蒜上千壯，差。

又方，白鷄矢白者二枚，以小餳和調，以塗瘡上。

又方，鼠婦蟲、豉各七合，巴豆三枚，去心，合猪脂，但以此藥塗之。

又方，取水上浮走豉母蟲一枚，置

治卒中射工水弩毒方第六十五

江南有射工毒蟲，一名短狐，一名蜮，常在山間水中，人行及水浴，此蟲口中横骨角弩，唧以射人形影則病，其困者三日，齒間血出，不療即死。其中人有四種，初覺則遍身體視之，其一種正黑如墨子而繞四邊，□□□，犯之如刺狀。其一種作瘡，瘡久即穿陷。一種突起如石，□□□其一種如火灼人，肉熛起作瘡，此種最急，并皆煞人。居□□□地，天大雨或逐人行潦流，入人家而射人，又當養鵝鴨，□□食人，行

口中便差。云此蟲正黑，如大豆，浮水上相游者。

又方，取皂莢一梴，尺二者，槌碎，苦酒一升，煎如飴，去滓，傅之痛處，差。

又方，馬齒莧，搗，飲汁一升，滓傅瘡上，日四五遍，則良驗。

又方，升麻、烏翣各二兩，水三升，煮取一升，盡服之，滓傅瘡上，不差更作。姚同，更加犀角二兩。

云此蟲含沙射人影便病，欲渡水，先以石投之，口邊角弩發矢，言口息兩角能屈伸。

冬月則蟄。

有一長角橫在口前，弩檐臨其角端，曲如上弩，以氣爲矢，用水勢以射人，人中之便不能語，餘狀如葛氏所說。

治卒中沙虱毒方第六十六

山水間多有沙虱，甚細略不可見，人入水浴，及以水澡浴，此蟲在水中著人身，及陰天雨行草中，亦著人，便鑽入皮裏。其診法：

初得之皮上正赤，如小豆、黍米、粟粒，以手摩赤上，痛如刺，三日之後，令百節强，疼痛寒熱，赤上發瘡，此蟲漸入至骨，則殺人。自有山澗浴畢，當以布拭身數遍，以故帛拭之一度，乃傅粉之也。

又，療沙虱毒方。

以大蒜十片，著熱灰中，温之令熱，斷蒜及熱柱瘡上，盡十片，復以艾灸瘡上，七壯則良。

又方，斑猫二枚，熬一枚，末服之，燒一枚，令絶烟，末以傅瘡上，即差。又，以射罔傅之，佳。

又方，生麝香、大蒜合搗，以羊脂和，著小筒子中帶之行。今東間水無不有此，浴竟中拭燥燥如芒毛針刺，熟看見，則以竹葉抄挑去之。

比見嶺南人初有此者，即以茅葉、茗茗刮去，及小傷皮則爲佳，仍數塗苦苣菜汁佳。已深者，針挑取蟲子，正如疥蟲，著爪上映光方見行動也，若挑得，便就上灸三四壯，則蟲死病除。

若覺猶惛惛，見是其已太深，便應依土俗作方術，拂出，乃用諸湯藥以浴，皆一二升，出都盡乃止，亦依此方并雜□□。溪毒及射工法，急救，七日中宜差。不爾，則仍有飛蟲□□□□啖人心藏便死，慎不可輕。

治卒服藥過劑煩悶方第六十七

服藥過劑，煩悶，及中毒多，煩悶欲死方。

刮東壁土少少，以水一二升和，飲之良。

又方，於屋霤下作坎，方二尺，深三尺，以水七升，灌坎中，以物揚之，令沫出，取一二升飲之，未解更作。

又方，搗藍取汁，服數升。無藍，只洗青絹，取汁飲，亦得。

服藥失度，心中苦煩方。

飲生葛根汁大良。無生者，乾葛爲末，水服五合，亦可煮服之。

又方，吞鷄子黄數枚即愈。不差

更作。

服石藥過劑者。

白鴨屎，末，和水調服之差。

又方，大黄三兩，芒硝二兩，生地黄汁五升，煮取三升，分三服，得下便愈。

若卒服藥，吐不止者。飲新汲水一升即止。

若藥中有巴豆，下痢不止方。

末乾薑、黄連，服方寸匕差。

又方，煮豆汁一升，服之差。

附方

《外臺秘要》：治服藥過劑，及中毒煩悶欲死。

燒犀角末，水服方寸匕。

治卒中諸藥毒救解方第六十八

治食野葛已死方。

以物開口，取鷄子三枚，和以吞之，須臾吐野葛出。

又方，温猪脂一升，飲之。

又方，取生鴨就口斷鴨頭，以血瀝口中，入咽則活。若口不可開者，取大竹筒洞節，以頭注其脇，取冷水竹筒中，數易水，須臾口開，則可得下藥。若人多者，兩脇及臍中各與筒，甚佳。

又方，多飲甘草汁佳。

姚方，中諸毒藥及野葛已死方。

新小便，和人屎絞取汁一升，頓服，入腹即活。解諸毒，無過此汁。

中酖毒已死者。

粉三合，水三升，和飲之。口噤，以竹管强開灌之。

中射罔毒。

藍汁、大豆、猪犬血，并解之。

中狼毒毒，以藍汁解之。

中狼葵毒，以葵根汁解之。

中藜蘆毒，以雄黄、葱汁，并可解之。

中躑躅毒，以梔子汁解之。

中巴豆毒。

黄連、小豆、藿汁、大豆汁，并可解之。

中雄黄毒，以防己汁解之。

中蜀椒毒，中蜈蚣毒。二毒，桑汁煮桑根汁，并解之。

中礬石毒，以大豆汁解之。

中芫花毒，以防風、甘草、桂，并解之。

中半夏毒，以生薑汁、乾薑，并解之。

中附子、烏頭毒，大豆汁、遠志汁，并可解之。

中杏仁毒，以藍子汁解之。

食金已死者，取鷄屎半升，水淋得一升，飲之，日三服。

又方，吞水銀二兩，即裹金出，少者一兩，亦足。姚云：一服一兩，三度服之，扶坐與之，令入腹即活。

又方，鴨血及鷄子亦解之。

今取一種，而兼解衆毒。

取甘草，吮咀，濃煮，多飲其汁，并多食葱中涕，并佳。

又方，煮大豆，令涌，多飲其汁。無大豆，豉亦佳。

又方，藍青藍子，亦通解諸毒，常預畜之。

又方，煮薺苨，令濃飲一二升，秘

方。卒無，可煮嚼食之。亦可作散服之。此藥在諸藥中，諸藥則皆驗。

又方，凡煮此藥汁解毒者，不可熱飲之，諸毒得熱更甚，宜使小冷爲良。

帶❻辯刺史云：嶺南俚人毒，皆因食得之，多不即覺，漸不能食，或更心中漸脹，并背急悶，先寒似瘴。

微覺，即急取一片白銀含之，一宿銀變色，即是藥也。銀青是藍藥，銀黃赤是蔨藥，久久者入眼，眼或青或黃赤，青是藍藥，黃赤是蔨藥。俚人有解療者，畏人得知，在外預言三百牛藥，或云三百兩銀藥，余久任，以首領親狎，知其藥常用，俚人不識《本草》，乃妄言之，其方并如後也。

初得俚人毒藥且令定方。

生薑四兩，甘草三兩，炙，切，以水一斗，漬一宿，以月盡日漬，月一日五更，六升，煮取二升，且服三服，服訖，然後覓藥療之。

療方

常山四兩，切，白鹽四錢，以水一斗，漬一宿，以月盡日漬，月一日五更，以土釜煮，勿令奴婢鷄犬見，煮取二升，旦分再服，服了，少時即吐，以銅器貯取，若青色以杖舉五尺不斷者，即藥未盡，二日後更一劑。席辯曾飲酒得藥，月餘始覺，首領梁墳，將土常山，與爲呼爲一百頭牛藥，服之即差，差後二十日，慎毒食，唯有煮飯食之，前後得差凡九人。

又方，黃藤十兩，嶺南俚人毒，皆因水一斗，煮取二升，分三服，服訖，毒藥內消，若防己俚人藥，常服此藤，縱得，自然不發。席云：常服之，利小便。亦療數人。

又方，都淋藤十兩，嶺南皆有，切，以水一斗，煮取二升，分三服，服訖，毒藥逐小便出，十日慎毒食。不差，更服之，即愈。

又方，乾藍實四兩，白花藤四兩，出隻州者上，不得取野葛同生者，切，以水七升，酒一升，煮取半，空腹頓服之，少悶勿怪。單乾藍搗末，頓服之，亦差。

又，療腹內諸毒。

都淋藤二兩，長三寸，并細剉，酒三升，合安罌中，密封，以糠火燒四邊，燒令三沸，待冷出，温服，常令有酒色，亦無所忌，大效。

若不獲已食俚人食者。

先取甘草一寸，炙之後，熟嚼吞之，若食著毒藥即吐，便是得藥，依前法療之。席辯云：常囊貯甘草十片以自防。

附方

《勝金方》：治一切毒。

以膽子礬，爲末，用糯米糊丸，如鷄頭實大，以朱砂衣，常以朱砂養之，冷水化一丸服，立差。

《經驗方》：解藥毒上攻，如聖散。

露蜂房、甘草等分，用麩炒令黃色，去麩，爲末，水二碗，煎至八分一碗，令温，臨卧頓服，明日取下惡物。

《外臺秘要》：治諸藥石後，或熱嚥多向冷地卧，又不得食諸熱麵酒等方。

五加皮二兩，以水四升，煮取二升

半，候石發之時，便服。未定，更服。

孫思邈論云：有人中烏頭、巴豆毒。

甘草入腹即定方，稱大豆解百藥毒，嘗試之不效，乃加甘草，爲甘豆湯，其效更速。

《梅師方》：蜀椒閉口者有毒，誤食之，便氣欲絶，或下白沫，身體冷，急煎桂汁服之，多飲冷水一二升，忽食飲吐漿，煎濃豉汁服之。

《聖惠方》：治硫黄忽發氣悶，用羊血，服一合，效。

又方，治射罔在諸肉中有毒，及漏脯毒。

用貝子末，水調半錢服，效。或食面臛毒，亦同用。

初虞世方，治藥毒秘效。

巴豆去皮，不出油，馬牙硝等分，合研成膏，冷水化一彈子許，服差。

治食中諸毒方第六十九

蜀椒閉口者有毒，戟人咽，氣便欲絶，又令人吐白沫。

多飲桂汁若冷水一二升，及多食大蒜，即便愈。慎不可飲熱，殺人。比見在中椒毒，含蒜及薺苨，差。

鈎吻葉與芥相似，誤食之殺人方。

薺苨八兩，水六升，煮取三升，服五合，日五服。又云此非鈎吻。

食諸菜中毒，發狂煩悶，吐下欲死方。

取鷄屎燒末，服方寸匕，不解更服。又煮葛根飲汁。

莨菪毒，煮甘草汁，搗藍汁飲，并良。

苦瓠毒，煮黍穰令濃，飲汁數升，佳。

食馬肝中毒。

取牡鼠屎二七枚，兩頭尖者是，水和飲之。未解者更作。

食六畜鳥獸。

幞頭垢一錢匕，《小品》云：起死人。又，飲豉汁數升良。

凡物肝臟自不可輕啖，自死者，彌勿食之，生食肝中毒。

搗附子末，服一刀圭，日三服。

肉有箭毒，以藍汁、大豆，解射罔毒。

食鬱肉，謂在蜜器中經宿者，及漏脯，茅屋汁霑脯爲漏脯，此前并有毒。

燒人屎，末，酒服方寸匕。

又方，搗薤汁服二三升，各連取，以少水和之。

食黍米中藏脯中毒方。

此是鬱脯，煮大豆一沸，飲汁數升，即解。兼解諸肉漏毒。

食自死六畜諸肉中毒方。

黄檗末，服方寸匕。未解者，數服。

六畜自死，皆是遭疫，有毒，食之洞下，亦致堅積，并宜以痢丸下之。

食魚中毒。

濃煮橘皮飲汁。《小品》云：冬瓜汁最驗。

食猪肉遇冷不消，必成蟲癥，下之方。

大黄、朴硝各一兩，芒硝亦佳，煮取一升，盡服之。若不消，并皮研杏子

湯三升，和，三服，吐出神驗。

食牛肉中毒，煮甘草，飲汁一二升。

食馬肉，洞下欲死者。

豉二百粒，杏子二十枚，吮咀，蒸之五升飯下，熟，合搗之，再朝服，令盡。

此牛馬，皆謂病死者耳。

食鱸魚肝及鯸鮧魚中毒。

剉蘆根，煮汁飲一二升良。

解毒，濃煮香蘇，飲汁一升。

飲食不知是何毒。

依前，甘草、薺苨，通療此毒，皆可以救之。

食菹菜誤吞水蛭，蛭啖臟血，腸痛，漸黃瘦者，飲牛羊熱血一二升許，經一宿，便暖猪脂一升飲之，便下蛭。

食菌遇毒死方。服諸吐人即差。

絞人屎汁，飲一升即活。

痢丸，亦佳。又，掘地作土漿，服二三升則良。

誤食野芋欲死，療同菌法。

凡種芋三年不取，亦成野芋，即殺人也。

附方

《梅師方》：治飲食中毒魚肉菜等。

苦參三兩，以苦酒一升，煎三五沸，去滓服之，吐出即愈。或取煮犀角汁一升，亦佳。

又方，治食狗肉不消，心下堅，或腹脹，口乾，發熱妄語，煮蘆根飲之。

又方，杏仁一升，去皮，水三升，煎沸，去滓取汁，爲三服，下肉爲度。

《金匱》方：治食蟹中毒。

紫蘇煮汁，飲之三升。以子汁飲之，亦治。凡蟹未經霜，多毒。

又，《聖惠方》：以生藕汁，或煮乾蒜汁，或冬瓜汁，并佳。

又方，治雉肉作臛，食之吐下。

用生犀角末方寸匕，新汲水調下，即差。

唐·崔魏公云：鉉夜暴亡，有梁新聞之，乃診之曰：食毒。僕曰：常好食竹鷄。竹鷄多食半夏苗，必是半夏毒，命生薑擂汁，折齒而灌之，活。

芹菜中，人遇食之爲病，發時手青肚滿，痛不可忍，作蛟龍病，服硬糖三二升，日二度，吐出如蜥蜴三二個，便差。

《明皇雜録》云：有黄門奉使交廣回，周顧謂曰：此人腹中有蛟龍。上驚問黄門曰：卿有疾否？曰：臣馳馬大庾嶺，時當大熱，困且渴，遂飲水，覺腹中堅痞如杯。周遂以硝石及雄黄，煮服之，立吐一物，長數寸，大如指，視之鱗甲具，投之水中，俄頃長數尺，復以苦酒沃之，如故，以器覆之，明日已生一龍矣。上甚訝之。

治防避飲食諸毒方第七十

雜鳥獸他物諸忌法。

白羊不可雜雄鷄。羊肝不可合烏梅及椒食。猪肉不可雜羊肝。牛腸不可合犬肉。雄鷄肉不可合生葱菜。鷄、鴨肉不可合蒜及李子、鱉肉等。生肝投地，塵芥不著者不可食。暴脯不肯燥，及火炙不動，并見水而動，并勿

食。鳥獸自死，口不開者，不可食。

水中魚物諸忌。

魚頭有正白連諸脊上，不可食。魚無腸膽，及頭無魦勿食。魚不合烏鷄肉食。生魚目赤，不可作膾。魚勿合小豆藿。青魚鮓不可合生胡荽。鱉目凹者不可食。鱉肉不可合鷄鴨子及赤莧菜食之。妊娠者不可食鱠魚。

雜果菜諸忌。

李子不可合鷄子及臨水食之。五月五日不可食生菜。病人不可食生胡荽半夏、菖蒲、羊肉、細辛、桔梗忌菜。芥菜。妊娠勿食桑椹并鴨子、巴豆藿。甘草忌菘菜。牡丹忌胡荽。常山忌葱。黄連、桔梗忌猪肉。茯苓忌大醋。天門冬忌鯉魚。

附方

《食醫心鏡》：黄帝云：食甜瓜竟食鹽，成霍亂。

孫真人《食忌》：蒼耳合猪肉食害人。又云：九月勿食被霜瓜，食之令人成反胃病。

治卒飲酒大醉諸病方第七十一

大醉恐腹腸爛。

作湯於大器中以漬之，冷復易。

大醉不可安卧，常令摇動轉側。

欲使難醉，醉則不損人方。

搗柏子仁、麻子仁各二合，一服之，乃以飲酒多二倍。

又方，葛花，并小豆花子，末爲散，服三二匕。又，時進葛根飲、枇杷葉飲，并以雜者乾蒲、麻子等，皆使飲，而不病人。胡麻亦煞酒。先食鹽一匕，後則飲酒，亦倍。

附方

《外臺秘要》：治酒醉不醒。

九月九日真菊花，末，飲服方寸匕。

又方，斷酒，用驢駒衣，燒灰，酒服之。

又方，鸕鷀糞灰，水服方寸匕。

《聖惠方》：治酒毒，或醉昏悶煩渴，要易醒方。

取柑皮二兩，焙乾爲末，以三錢匕，水一中盞，煎三五沸，入鹽，如茶法便飲，則良。

又方，生葛根汁一二升，乾葛煮飲，亦得。

欲使難醉，醉則不損人方。

搗柏子仁、麻子仁各二合，一服之，乃以飲酒多二倍。

又方，葛花，并小豆花子，末爲散，服三二匕。又，時進葛根飲、枇杷葉飲，并以雜者乾蒲、麻子等，皆使飲，而不病人。胡麻亦煞酒。先食鹽一匕，後則飲酒，亦倍。

附方

《外臺秘要》：治酒醉不醒。

九月九日真菊花，末，飲服方寸匕。

又方，斷酒，用驢駒衣，燒灰，酒服之。

又方，鸕鷀糞灰，水服方寸匕。

《聖惠方》：治酒毒，或醉昏悶煩渴，要易醒方。

取柑皮二兩，焙乾爲末，以三錢匕，水一中盞，煎三五沸，入鹽，如茶法服妙。

又方，治酒醉不醒。

用菘菜子二合，細研，井花水一盞，調爲二服。

《千金方》：斷酒法。

以酒七升著瓶中，朱砂半兩，細研著酒中，緊閉塞瓶口，安猪圈中，任猪搖動，經七日，頓飲之。

又方，正月一日，酒五升，淋碓頭杵下，取飲。

又方，治酒病。

豉、葱白各半升，水二升，煮取一升，頓服。

葛仙翁肘後備急方卷之七

治百病備急丸散膏諸要方第七十二

裴氏五毒神膏，療中惡暴百病方。

雄黄、朱砂、當歸、椒各二兩，烏頭一升，以苦酒漬一宿，猪脂五斤，東面陳蘆，煎五上五下，絞去滓，内雄黄、朱砂末，攪令相得畢。諸卒百病，温酒服如棗核一枚，不差更服，得下即除。四肢有病，可摩。癰腫諸病瘡，皆摩傅之。夜行及病冒霧露，皆以塗人身中，佳。

效方，并療時行温疫，諸毒氣，毒惡核，金瘡等。

蒼梧道士陳元膏療百病方。

當歸、天雄、烏頭各三兩，細辛、芎藭、朱砂各二兩，乾薑、附子、雄黄各二兩半，桂心、白芷各一兩，松脂八兩，生地黄二斤，搗絞取汁，十三物別搗，雄黄、朱砂爲末，餘咬咀，以釅苦酒三升，合地黄漬藥一宿，取猪脂八斤，微火煎十五沸，白芷黄爲度，絞去滓，内雄黄、朱砂末，攪令稠和，密器貯之。腹内病，皆對火摩病上，日兩三度，從十日乃至二十日，取病出差止。四肢肥肉、風瘴，亦可酒温服之如杏子大一枚。

主心腹積聚，四肢痹躄，舉體風殘，百病效方。

華佗虎骨膏，療百病。

虎骨、野葛各三兩，附子十五枚，重九兩，椒三升，杏仁、巴豆去心皮、芎藭切各一升，甘草、細辛各一兩，雄黄二兩，十物苦酒漬周時，猪脂六斤，微煎三上三下，完附子一枚，視黄爲度，絞去滓，乃内雄黄，攪使稠和，密器貯之。百病皆摩傅上，唯不得入眼，若服之，可如棗大，内一合熱酒中，須臾後，拔白髮，以傅處即生。烏猪瘡毒風腫及馬鞍瘡等，洗即差，牛領亦然。

莽草膏，療諸賊風，腫痹，風入五藏，恍惚方。

莽草一斤，烏頭、附子、躑躅各三兩，四物切，以水苦酒一升，漬一宿，猪脂四斤，煎三上三下，絞去滓，向火以

---

❶喚：原作『嚼』，據萬曆本改。

❷凹：萬曆本作『向』。

❸爲，原作『有』，據目録及萬曆本改。

❹種：疑當作『腫』。

❺六十一：原作『六十』，據萬曆本改。

❻帶：據前後文義當作『席』。

手摩病上三百度，應手即差。耳鼻病，可以綿裹塞之。療諸疥癬、雜瘡。

隱居《效驗方》云：并療手脚攣，不得舉動，及頭惡風，背脊卒痛等。

蛇銜膏，療癰腫，金瘡瘀血，産後血積，耳目諸病，牛領、馬鞍瘡。

蛇銜、大黄、附子、當歸、芍藥、細辛、黄芩、椒、莽草、獨活各一兩，薤白十四莖，十一物苦酒淹漬一宿，猪脂三斤，合煎於七星火上，各沸，絞去滓，温酒服如彈丸一枚，日再。病在外，摩傅之。耳以綿裹塞之。目病，如黍米注眦中。其色緗黄，一名緗膏。□人又用龍銜藤一兩合煎，名爲龍銜膏。

神黄膏，療諸惡瘡，頭瘡，百雜瘡方。

黄連、黄檗、附子、雄黄、水銀、藜蘆各一兩，胡粉二兩，七物細篩，以臘月猪脂一斤，和藥調器中，急密塞口，蒸五斗米下，熟出，内水銀，又研，令調，密藏之。有諸瘡，先以鹽湯洗，乃傅上，無不差者。

隱居《效驗方》云：此膏塗瘡一度即瘥，時人爲聖。

青龍五生膏，療天下雜瘡方。

丹砂、雄黄、芎藭、椒、防己各五重，加減服之。

丹參膏，療傷寒時行，賊風惡氣。在外即支節麻痛，喉咽痹，寒入腹則心急脹滿，胸脅痞塞，内則服之，外則摩之。并癱緩不隨，風濕痹不仁，偏枯拘屈，口喎，耳聾，齒痛，頭風，痹腫，腦中風動且痛，若癱、結核漏、瘰癧堅腫，未潰傅之，取消。及丹瘕諸腫無頭，欲狀骨疽者，摩之令消。及惡結核，走身中者，風水游腫，亦摩之。其服者，如棗核大，小兒以意減之，日五服，數用之，悉效。丹參、蒴藿各三兩，莽草葉、躑躅花各一兩，秦膠、獨活、烏頭、川椒、連翹、桑白皮、牛膝各二兩，十二物，以苦酒五升，油麻七升，煎令苦酒盡，去滓，用如前法，亦用猪脂同煎之。若是風寒冷毒，可用酒服。若毒熱病，但單服。牙齒痛，單服之，仍用綿裹嚼之，比常用猪脂煎藥。有小兒耳後癮子，其堅如骨，已經數月不盡，以帛塗膏貼之，二十日消盡，神效二丸摩痛上。若蛇、蜂百病，若中溪毒、射工，其服者，視强弱大小，及病輕重，加減服之。

無比。此方出《小品》。

神明白膏，療百病，中風惡氣，頭面諸病，青盲，風爛眦鼻，耳聾，寒齒痛，癰腫疽，痔，金瘡，癬疥，悉主之。

當歸、細辛各三兩，吳茱萸、芎藭、蜀椒、朮、前胡、白芷各一兩，附子三十枚，九物切，煎猪脂十斤，炭火煎一沸即下，三上三下，白芷黃，膏成，去滓，密貯。看病在內，酒服如彈丸一枚，日三。在外，皆摩傅之。目病，如黍米內兩眦中，以目向天風可扇之，瘡蟲齒，亦得傅之。耳內底着亦療之。緩風冷者，宜用之，

成膏。

清麻油十三兩，菜油亦得，黃丹七兩，二物鐵鐺文火煎，粗濕柳批篦攪不停，至色黑，加武火，仍以扇扇之，攪不停，烟斷絶盡，看漸稠，膏成。煎須淨處，勿令鷄犬見。齒瘡帖，痔瘡服之。

藥子一物方。

婆羅門，胡名船疏樹子，國人名藥療病，唯須細研，勿令粗，皆取其中人，去皮用之。

療諸疾病方。

卒得吐瀉，霍亂，蠱毒，臍下絞痛，赤痢，心腹脹滿，宿食不消，蛇螫毒入腹，被毒箭入腹，并服二枚，取藥子中人，暖水二合，研碎服之。疽瘡、附骨疽腫、丁瘡、癰腫，此四病，量瘡腫大小，用藥子中人，暖水研，和猪膽封上。癇、癰、腫、冷游腫、癬、瘡，此五病，用醋研，封上。蛇螫、惡毛蝎、蜈蚣等螫、沙虱、射工，此六病，用暖水研，赤莧和封之。婦人難産後、腹中絞痛、及惡露不宿食不消，霍亂氣滿中毒，鹹作湯，服一二升，刺便吐之，良。

葛氏常備藥。

大黃、桂心、甘草、乾薑、黃連、椒、朮、吳茱萸、熟艾、雄黃、犀角、麝香、菖蒲、人參、芍藥、附子、巴豆、半夏、麻黃、柴胡、杏仁、葛根、黃芩、烏頭、秦膠等，此等藥并應各少許。

以前諸藥固以大要嶺南使用，仍開者，今復疏之，衆藥并成劑藥，自常和合，貯此之備，最先於衣食耳。

常山十四兩，蜀漆，石膏一斤，阿膠七兩，牡蠣、朱砂、大青各七兩，鱉三

枚，鯪鯉甲一斤，烏賊魚骨，馬藺子一大升，蜀升麻十四兩，檳榔五十枚，龍骨，赤石脂，羚羊角三枚，橘皮，獨活，其不注兩數者，各四兩，用芒硝一升，良。

成劑藥。

金牙散、玉壺黄丸、三物備急藥、紫雪、丹參、茵草膏、玉黄丸、度瘴散、末散、理中散、痢藥、丁腫藥，其有側注者，隨得一種，爲佳。

老君神明白散

术、附子炮各二兩，烏頭炮，桔梗二兩，細辛一兩，搗篩，旦服五方寸匕，若一家有藥，則一里無病，帶行者，所遇病氣皆削。若他人得病者，温酒服一方寸匕，若已四五日者，以散三匕，水三升，煮三沸，服一升，取汗即愈。

云常用辟病散。

真珠、桂肉各一分，貝母三分，杏仁二分熬，鷄子白熬令黄黑三分，五物搗篩，歲旦服方寸匕。若歲中多病，可月月朔望服。

單行方。

南向社中柏東向枝，取曝乾，末，服方寸匕。姚云：疾疫流行預備之，名爲柏枝散，服神良。《删煩方》云：旦，南行見社中柏，即便收取之。

斷温病令不相染方。

熬豉，新米酒漬，常服之。

《小品》正朝屠蘇酒法，令人不病温疫。

大黄五分，川椒五分，术、桂各三分，桔梗四分，烏頭一分，拔楔二分，七物細切，以絹囊貯之，十二月晦日正中時，懸置井中至泥，正旦取藥置酒中，屠蘇飲之。於東向，藥置井中，能迎歲，可世無此病。此華佗法，武帝有方驗中，從小至大，少隨所堪，一人飲，一家無患，飲藥三朝。

一方有防風一兩。

姚大夫辟温病粉身方。

芎藭、白芷、藁本，三物等分，下篩，内粉中，以塗粉於身，大良。

附方

張仲景三物備急方，司空裴秀爲散，用療心腹諸疾，卒暴百病。用大黄、乾薑、巴豆各一兩，須精新好者，搗篩，蜜和，更搗一千杵，丸如小豆，服三丸，老小斟量之，爲散不及丸也。若中惡客忤，心腹脹滿，卒痛如錐刀刺痛，氣急口噤，停尸卒死者，以暖水若酒服之。若不下，捧頭起，灌令下喉，須臾差。未知，更與三丸，腹當鳴轉，即吐下，便愈。若口已噤，亦須折齒灌之，藥入喉即瘥。

崔氏《海上方》云：威靈仙去衆風，通十二經脉，此藥朝服暮效，疏宣五臟冷膿、宿水變病，微利不瀉人，服此四肢輕健，手足温暖，并得清凉。時商州有人患重足不履地，經十年不瘥，忽遇新羅僧見云：此疾有藥可理。遂入山求之，遺服數日，平復後，留此藥名而去。此藥治丈夫婦人中風不語，手足不隨，口眼喎斜，筋骨節風，胎風，頭風，暗風，心風，風狂人，傷寒頭痛，鼻清涕，服經二度，傷寒即止，頭旋目眩，白癜風，極治大風，皮膚風癢，大毒熱毒，風瘡。深治勞疾，連腰骨節風，繞腕風，言語澀滯，痰積。宣通五臟，

腹内宿滯，心頭痰水，膀胱宿膿，口中涎水，好吃茶漬，手足頑痹，冷熱氣壅，腰膝疼痛，久立不得，浮氣瘴氣，憎寒壯熱，頭痛尤甚，攻耳成膿而聾，又衝眼赤，大小腸秘，服此立通，飲食即住。五月五日午時，黄疸，黑疸，面無顔色，瘰癧遍項，産後秘澁，暨腰痛，曾經損墜。心痛，注氣，膈氣，冷氣攻衝。腎臟風壅，腹肚脹滿，頭面浮腫，注毒脾肺氣，痰熱咳嗽，婦人月水氣急，坐卧不安，疥癬等瘡，不來，動經多日，血氣衝心，陰汗，盜汗，鴟臭穢甚，氣息不堪。勤服威靈仙，更用熱湯盡日頻洗，朝塗若唾，若治鴟臭，藥自塗身上，内外塗之，當得平愈。孩子無辜，令母含藥灌之。痔疾秘澁氣痢絞結，并皆治之。威靈仙一味，洗焙爲末，以好酒和，令微濕，入在竹筒内，牢塞口，九蒸丸曝，如乾，添酒重灑之，以白蜜和爲丸，如桐子大，每服二十至三十丸，湯酒下。

《千金方》：當以五月五日午時，附地刈取菓耳葉。

洗，曝燥，搗下篩，酒若漿水服方寸匕，日三夜三。散若吐逆，可蜜和爲丸，準計一方匕數也。風輕易治者，日再服。若身體有風處，皆作粟肌出，或如麻豆粒，此爲風毒出也，可以針刺潰去之，皆黄汁出乃止。五月五日，多取陰乾，著大瓮中，稍取用之。此草辟惡，若欲省病省疾者，舉家服之。若病所畏。若時氣不和，胃脹滿，心悶發熱，即服之。并殺三蟲，腸痔，能進食。一周年服之佳。七月七、九月九，可采用。

治牛馬六畜水穀疫癘諸病方第七十三

治馬熱虻顙黑汗鼻有膿，啀啀有膿，水草不進方。

黄瓜蔓根、貝母、桔梗、小青、梔子仁、吴藍、款冬花、大黄、白鮮皮、黄芩、鬱金各二大兩，黄檗、馬牙硝各四大兩，搗篩，患相當灰常要啖，重者藥三大兩，地黄半斤，豉二合，蔓菁油四合，合齋前啖，至晚飼，大效。

馬遠行到歇處，良久與空草，熟刷，刷罷飲，飲竟，當飼。

困時與料必病及水穀。

六畜瘡焦痂，以面膠封之，即落。

馬急黄黑汗。

右割取上斷訖，取陳久靴爪頭，水漬汁灌口，如不定，用大黄、當歸各一兩，鹽半升，以水三升，煎取半升，分兩度灌口，如不定，破尾尖，鑱血出即止，立效。

馬起卧，胞轉及腸結，此方并主之。

細辛、防風、芍藥各一兩，以鹽一升，水五升，煮取二升半，分爲二度，灌後、灌前，用芒硝、鬱金、寒水石、大青各一兩，水五升，煮取二升半，以酒、油各半升，和攪，分二度灌口中。

馬羯骨脹。

取四十九根羊蹄燒之，熨骨上，冷之，不論數。

飲馬以寅午二時，晚少飲之。

啖鹽法。

鹽須乾，天須晴，七日，大馬一啗腸。

一升，小馬半升，用長柄杓子深内咽中，令下肥而强水草也。

治馬後冷。

豉、葱、薑各一兩，水五升，煮取半升，和酒灌之，即瘥。

蟲顙十年者。

醬清如膽者半合，分兩度灌鼻，每灌一兩日將息。不得多，多即損馬也。

蟲顙重者。

蓴蘼子一合，熬令紫色，搗如泥，桑根白皮一大握，大棗二十枚，擘，水二升，煮藥取一升，去滓，入蓴蘼搗，令調匀，適寒温，灌口中，隔一日又灌，重者不過再，瘥。

蟲顙馬，鼻沫出，梁腫起者，不可治也。

驢馬胞轉欲死。

搗蒜，内小便孔中深五寸，立瘥。

又，用小兒屎，和水灌口，立瘥。

又方，騎馬走上坂用木，腹下來去擦，以手内大孔，探却糞，大效。探法：剪却指甲，以油塗手，恐損破馬腸。

脊瘡，以黄丹傅之，避風，立瘥。

疥，以大豆熬焦，和生油麻搗傅，醋泔淨洗。

目暈，以霜後楮葉細末，一日兩度，管吹眼中，即瘥。

馬蛆蹄。

槽下立處，掘一尺，埋鷄子許大圓石子，令常立上，一兩日，永差。

啖大麻子。

淨擇一升，飼之，治咳及毛焦，大效。

疥，以樗根末，和油麻塗，先以皂莢或米泔淨洗之，洗了塗，令中間空少許，放蟲出下得，多塗恐瘡大。

秘療疥，以巴豆、膩粉，研油麻塗定，洗之，塗數日後，看更驗。

葛仙翁肘後備急仙方卷之八

（王均寧點校）

